環境温度の野蚕の生育に及ぼす影響に関する研究

第4報 柞蚕卵の低温接触が孵化並びに作柄に及ぼす影響*

山崎 寿・西村 国男・山田たけを

(長野県蚕業試験場松本支場)

Studies on the influence of the temperature upon the development of the wild silkworm.

(4) On the influence of the lower temperature to the hatching rate and cocoon production of the *Antheraea Pernyi* silkworm.

H. YAMAZAKI, K. NISHIMURA, & T. YAMADA

(Matsumoto Branch, Nagano Sericultural Experiment Station)

1. 緒 言

天蚕及び柞蚕のような野生絹糸虫は通常夜間に交尾産卵が行われ、自然状態に於てその卵が夜間低温に晒される場合が極めて多い。特に長野県有明地方に於ける、柞蚕の春季発蛾は4月下旬から5月中旬であり、天蚕は9月以降に発蛾するものが多い関係上、自然気温が5°C以下に下降することがしばしばある。又卵期を延長することが出来れば不時の気象異変に遭遇しても放養時期を延期することが出来る事になる。従つて卵に対する低温の影響を知ることは実際の飼育上重要な問題であり、我々はこの問題に関連した実験を進め既に数回に亘つて報告している^{1),2),3)}。その内特に柞蚕卵の産下直後に於ける低温接触の影響については、次の結果を得ている。即ち25°C及び5°Cの下に1時間~120時間接触させた結果25°Cの接触は5°Cに比較して著しく孵化歩合を低下させることを知り、5°Cでも1~3時間の接触時間では孵化歩合にその影響が現われないが1日間接触すれば50%に減少し10日間接触すれば全く孵化しないことを知つた¹⁾。今回はその続報をなすもので、柞蚕卵が産下されて後、孵化するまでの間に於ける低温接触の影響について実験を行つたので、その結果について報告する。報告を行うに当り終始実験に従事した平林忠男、山田欣次及び降旗則子の三君に対し深謝の意を表する。

2. 材料及び方法

1955年7月25日夜間に発蛾交尾した柞蚕蛾雌雄150対を、翌日夕刻割愛して後次の朝まで産卵させて、その卵を混合し、その内約半分を孵化試験用に供し、残りを飼育試験用に供用した。

孵化試験用柞蚕卵は産卵後1日目から孵化前日(産卵後8日目)まで25°Cに保護し、その内から順次毎日5

°Cの低温室に移した。低温接触期間はそれぞれ1日間、3日間、5日間、7日間及び9日間とし、その後再び25°Cに保護して、その孵化状態を調査した。供試卵数は各区とも100粒を用いた。

飼育試験用柞蚕卵は産卵後25°Cに保護したものを、産卵後3日目と8日目の2回、25°Cと5°Cの低温にそれぞれ5日間及び10日間接触させた後再び25°Cに保護し、孵化の2日前に櫟樹林に放養した。そして孵化歩合、死卵の状態及び営繭歩合を調査した。供試卵数は各区とも500粒である。

3. 実験結果並びに考察

(1) 孵化試験の結果について

柞蚕卵は産下後孵化前日まで如何なる時期に低温接触しても、その孵化歩合は対照区に比較して何れも幾分不良となる。又接触期間の長い程孵化歩合が不良になる(第1表参照)。次に死卵の割合を見ると、孵化歩合で考えられる通り何れも対照区より多い。特に産卵1日目の低温接触のものに多いが、それ以後の時期では大差を認めない。又接触期間の長い程死卵歩合が多い(第2表参照)。更に孵化期間について見ると、対照区は2日間で孵化を完了し、3日以上に及ぶものはないが、低温接触の期間が長くなると孵化期間が長くなり、孵化が不齊になることがわかる(第3表参照)。

以上の結果から柞蚕卵の低温接触が孵化に及ぼす影響は家蚕卵や天蚕卵に比較すればその趣きが異なり、柞蚕卵の低温抵抗力は弱いことがわかる。即ち家蚕越冬卵の休眠状態のものゝ如きは-5°Cに接触しても何等の影響もなく、-10°Cに14日間又は-15°Cに3日間接触して初めて孵化の齊一を欠く程度であり又接触時期については家蚕卵の胚子が發育するに従つて低温に対する抵抗力の減ることが認められている⁴⁾。更に柞蚕卵と同様に家蚕卵のうち不越冬卵について見ると、その胚子がJA~JBのものでは2.5°Cに20~30日間接触しても実用上

* 昭和30年11月12日 30年度秋期全国大会において発表

第1表 孵化歩合（接触温度 5°C）

接触時期		1日間		3日間		5日間		7日間		9日間	
		孵化総数	1日最多数	孵化総数	1日最多数	孵化総数	1日最多数	孵化総数	1日最多数	孵化総数	1日最多数
産卵	1日目	76	71	87	84	80	64	49	35	35	16
"	2 "	95	85	93	81	93	82	95	73	92	61
"	3 "	93	87	85	49	85	84	89	75	90	76
"	4 "	90	79	95	49	83	59	87	82	83	66
"	5 "	90	81	92	76	91	77	79	69	60	47
"	6 "	91	78	91	88	97	88	85	84	77	58
"	7 "	95	93	96	73	97	93	90	83	78	63
"	8 "	92	89	90	87	87	72	90	82	95	77

対 照 区 (No.1) 95% (No.2) 96 (No.3) 93

第2表 死卵歩合（接触温度 5°C）

接触時期		1日間	3日間	5日間	7日間	9日間	対 照 区
		%	%	%	%	%	
産卵	1日目	4	13	20	51	75	(No.1) 5
"	2 "	5	7	7	5	8	
"	3 "	7	15	14	11	10	(No.2) 4
"	4 "	10	5	14	12	17	
"	5 "	9	8	9	19	41	(No.3) 7
"	6 "	9	8	3	14	23	
"	7 "	5	4	3	10	22	
"	8 "	8	10	13	10	5	

第3表 孵化期間（接触温度 5°C）

接触時期		1日間	3日間	5日間	7日間	9日間	対 照 区
		日	日	日	日	日	
産卵	1日目	2	2	2	3	3	(No.1) 2
"	2 "	3	3	3	3	4	
"	3 "	2	3	2	3	3	(No.2) 2
"	4 "	2	2	3	2	3	
"	5 "	2	2	2	3	3	(No.3) 2
"	6 "	2	2	2	2	3	
"	7 "	2	3	2	2	4	
"	8 "	2	2	2	2	3	

さしつかえない孵化歩合及び営繭歩合（作柄）を示し又孵化直前の卵も低温に対する抵抗力が特に大であることも認められている⁵⁾。従つて実用上最長期（産卵後3～4日目）には 2.5°C～5°C に接触させておけば 10 日間位、又催青卵（孵化前日の卵）では 5°C～7°C に5日間位は何等不良影響を及ぼすことなく卵期を延長させるこ

とが出来る。

又天蚕卵の如きは越冬期間中 0°C 附近の低温に接触させることが孵化を良好にするため必要な事柄である⁶⁾。

然るに柞蚕卵にあつては 2.5°C の接触は著しく孵化を不良にし 5°C にても幾分孵化を不良にする。又本実験の範囲においては家蚕卵の如く特に低温接触に対する抵抗力の強い時期を見出し得ないが産卵 1 日目 が特に弱い様である。

(2) 飼育試験の結果について

先ず孵化歩合を見ると 2.5°C に於てはその少数が孵化するに過ぎないが、5°C に於ては相当数が孵化し、而も卵の前期の方が後期より孵化が良好な傾向がうかがわれる。

又接触期間の長いものは短いものより孵化歩合が不良である点は孵化試験の場合と同様である。死卵の内容を剖見すると、産卵後 3 日目の卵を 2.5°C に接触させたものは胚子の發育中途に於て死亡しているか或は胚子の中で死亡したものと蟻体（幼虫体）で死亡したものとが混在しているのに対し、5°C に接触させたものはいずれも蟻体（幼虫体）が完成してから死亡している（第4表参照）。

第4表 孵化歩合及び死卵の状態

接触時期	接触 期間	接 触 温 度				対照区
		2.5℃		5℃		
		孵化 歩合	死卵の 状 態	孵化 歩合	死卵の 状 態	
産卵 3 日目	5 日間	21.0%	不受精死	95.0%	蟻体死	94.0%
	10日間	4 6	不受精死 蟻体死	90.0	蟻体死	
産卵 8 日間	5 日間	5.0	蟻体死	80.0	蟻体死	
	10日間	0	蟻体死	88.0	蟻体死	

第5表 営繭歩合

接触時期	接触期間	接 触 温 度		備 考
		2.5	5°C	
産卵 3 日目	5 日間	1.60%	9.40%	対照区 63.00%
	10 日間	0	11.40	
産卵 8 日目	5 日間	0	6.20	主なる減蚕は膿病と軟化病である
	10 日間	0	4.00	

次に営繭歩合（作柄）を見ると、2.5°C に接触させたものに於ては、産卵後 3 日目の 5 日間接触区のみが僅かに 1.6% 営繭したのみで、その外はすべて死滅している。5°C に於ては 4～11% 程度の営繭歩合を示し、而も卵の前期に接触したものの方が後期に接触したものより営繭歩合が多い。又接触期間の長いものは短いものより不良である。然し乍ら 5°C に於ける営繭歩合といえども対照

区に比較すれば極めて少い(第5表参照)。この幼虫の死亡状態を観察すると殆んど膿病と軟化病であつて、生理的障害に基くものと考えられるので、柞蚕卵に対する低温接触の影響は孵化に対してのみならず幼虫期にまでおよび、その作柄を不良にするものであることがわかる。

以上の如く卵の低温接触が孵化並びに作柄に及ぼす影響は柞蚕卵と天蚕卵及び家蚕卵とはその模様が相当異なるもので、その相違は越冬性の相違に基くものと考えられる。即ち天蚕及び家蚕の如く卵態越冬のものにあつては、卵期の厳寒に対する抵抗力が強く、柞蚕の如き蛹体越冬のものにあつては蛹体期の低温抵抗力が強く -5°C にても何等不良影響が現われないけれども⁷⁾、卵期は抵抗力が極めて弱いという適応性の相違に基くものではなからうか。

4. 摘 要

柞蚕卵の産下後1日目から孵化前日までの間に1回ずつ 2.5°C 又は 5°C の低温接触を1日間～9日間行い、その孵化状態と幼虫を飼育してその営繭歩合とを調査し

次の結果を得た。

(1) 柞蚕卵に低温(5°C)接触すれば接触時期の如何に拘らず孵化歩合が減少する。又特に産卵1日目が多い。

(2) 低温接触の期間が長い程、孵化歩合が不良で死卵歩合が多く又孵化期間が長くなる。

(3) 柞蚕卵に低温接触すれば幼虫期に病蚕を多発し営繭歩合を著しく減少する。

参 考 文 献

- 1) 山崎寿・西村国男・山田たけを(1954): 農業気象 9 3, 4: 88~90
- 2) 山崎寿・西村国男・山田たけを(1954): 農業気象 10 1, 2: 23~26
- 3) 山崎寿・西村国男・山田たけを(1955): 農業気象 11 1: 15~17
- 4) 仲野 良男: (1933): 群馬県蚕業試験場報告13号
- 5) 水野辰五郎: (1926): 蚕卵論, 明文堂発行, 東京
- 6) 山崎 寿・西村国男・山田たけを(1954): 日本蚕糸学雑誌 23, 2: 118~125
- 7) 山崎 寿・西村国男・松村タカ子(1953): 日本蚕糸学雑誌 22, 6: 266~268

本 会 記 事

北海道支部第4回総会並びに第7回例会について

昭和30年11月25日午前9時より北海道大学農学部において第4回支部総会及び第7回支部例会が開催された。例会における研究発表の題目及び講演者は次の如くである。°印は講演者

1. 灌漑水温の上昇に関する研究IV
(北大農) 八鍬利助・°前田隆・工藤勇夫・近岡一郎
2. カーボン・ペーストによる融雪促進について
(北農試) °千葉豪・石黒忠之
3. 灌漑方法を異にした場合の土壌物理性的変化と地温
(北農試) °藤原忠・大根田襄
4. 防風の温度効果
(北農試) 千葉豪・°阿部博史
5. 7月の豪雨を誘因とする稲黄化萎縮病の被害について
(道立農試) 池大司
6. 農業地帯数地点における降水量について
(北農試) 松田寿三
7. 溢流式温水溜池の水温分布について
(北大農) 八鍬利助・°前田隆・工藤勇夫
8. 結霜期における泥炭及び埴壤土の地温比較
(北大農) 八鍬利助
9. ソリバップ・グリーンによる水温上昇の報告
(旭川測候所) 木村耕三

中国四国支部30年度秋季例会について

昭和30年11月30日10時より松山市一番町自治会館3階ホールにおいて30年度秋季例会が開催され午前中に研究発表、午後特別講演が行われた。参加者は40名を越え盛会であつた。講演題目及び講演者は次の通り。

1. 微気象学的にみた河口閉塞について
(岡山大理) °松原茂・奥田節夫
2. 茄子畑の微気象について
(香川農大) 上原勝樹
3. きうり園の炭酸ガスについて
(愛媛大教育) 飯塚一郎
4. 栽植密度を異にする柑橘園の微気象について(2)
(松山農大) 武智修 °松本和夫
5. 潮汐と被圧地下水の関係について
(岡山大理) °松原茂・奥田節夫
6. 甘藷の生育に及ぼす畦の方向と土壌水分
(室戸測候所) 檀上哲郎

特別講演

1. 地面附近の風の微細構造について
(九大農) 武田京一
2. 晩霜発現時における茶園の微気候
(岡山大大原農研) 高須謙一