農業氣象學上よりみた作物型

村 越 信 夫

(青森縣農業改良課)

1. 緒 論

滿洲に於ける農作物の主要なものは大豆、高粱、粟、玉蜀黍、小麥、水稻等で何れもこの地の氣候に適している。その種類は208種¹⁾に及んでいて更にその品種數を擧げる時は數萬の多きに及ぶ。

これを日本の農作物の種類に比較するときは極めて少く僅かに半分の数²⁾に達せず、自然環境によつて可成の制限が加えられていることは明かである。

然し特殊の氣候型から熱帶性の農作物から寒帶性のものに至る迄適應して、特に南部にあつては作物生育期間に於ける平均氣温は 25°C 以上を示し高粱、棉花の如き熱帶原産の高温を要求するものから、水稻の如きも北緯 51 度の北部迄³⁾も栽培可能にして、世界水稻栽培北限地となつてゐる。一方温帶に原産地を有し長日性作物である麥類はこの滿洲が最も適地と見做すことが出来るので生育も良好、北米春小麥作地帯の收量に劣らぬ優秀な數値を示している。

これ等多數の農作物は唯々慢然と生育しているのではなく、必ず相互に連絡を有し、ある一定の方則の下に分類することが出来る。筆者は滿洲各地に適應している作物各品種の圃場栽培試験の成績と同一地に於て觀測された氣象要素との間の相互關係を計算し、各作物が氣象に對して如何なる特需を有するかを知らんとして本研究を始めた。供試試験の長きものは 28 ケ年、短きものでも 4 ケ年に渉り行い下記 13 ケ所を選んで各作物の特徴を調査した。觀測地の位置は第 1 表及び第 1 圖の如くである。

各地に於ける各作物收量と同一地に於ける月別平均氣温 (1 日 1 回觀測なる場合には、最高氣温と最低氣温との平均)並に降水量との相關係數と蓋然誤差を算出した。

2. 作物型の種類

滿洲の農作物をその生育並に收量が氣象要素によつて

- 1) 陳春澍 滿洲に於ける農作物の種類。滿洲農學會報。第 2 號。37~49 昭和 10 年 (1935)
- 2) 明峯正夫: Cultivated Crop Plants in Japan. Journ. Amer. Soc. Agronomy. 23, 1931.
- 3) A. D. Woeikoff: Rice Growing in North Manchuria. Manchurian Agriculture. No. 2. 1929.

第 1 表 供試試験觀測地

地名	北 緯	東 經	標 高	氣候型	省 名
克 山	48度 4分	125度52分	225.2	CC'b	黑龍江
海 倫	47度26分	126度58分	256.7	BC'b	"
佳木斯	46度49分	130度21分	95.0	CC'a	合 江
哈爾濱	45度45分	126度38分	141.5	CC'a	松 江
吉 林	44度20分	126度30分	160.0	BC'a	吉 林
蛟 河	44度10分	127度 0分	170.0	BC'a	"
公主嶺	43度31分	124度48分	203.0	CC'a	"
鄭家屯	43度31分	123度29分	120.7	DC'a	遼 北
敦 化	43度23分	128度23分	49.8	BC'a	吉 林
海 龍	42度26分	125度55分	290.0	BC'a	遼 北
撫 順	41度50分	124度 7分	97.2	CC'a'	遼 寧
錦 州	41度 7分	121度 6分	27.0	CC'a'	"
熊岳城	40度13分	122度11分	26.1	CC'a'	"

第 1 圖 觀測地位地

如何に影響されているかによりこれを次の通に分ける。

第 1 作物型: 低温、多雨を好む作物で長春を中心とした中部地方 (CC'a) では大豆、小麥、玉蜀黍、陸稻、大麥、燕麥、亞麻等の温帶系の作物が含まれ種類は最も多く數十種に達し、瀋陽以南の南部地方 (CC'a') では高粱、粟、玉蜀黍等の熱帶系の作物が含まれる。

第 2 作物型: 高温寡雨を好み、中部及南部兩地方で

は高粱、水稻、蓖麻、向日葵、棉花等が含まれる。所謂亞熱帶系作物で主として熱帯または亞熱帶地に原産地の作物が含まれ、滿洲では安定作物と見做しうる。

第3作物型： 氣象要素による關係は判然と現われないが、その収量は生育中の管理により特に著しく豊凶を決定されることが多い。即ち培土の深さ、耕鋤の深さ、除草回数、畦幅の廣狹等により可成密接な相關關係を示し、根菜類即ち馬鈴薯、甜菜がこの型の作物と見做される。

第4作物型： 高温、多雨を好み、北部の寒地で温帶系作物である燕麥、亞熱帶系作物である水稻、向日葵等を作つた時に示されるもので、特に水稻作ではこの型の氣象要素を生育中、晩期内に必ず特需する。

第5作物型： 低温、寡雨を好み、南部の錦州地方(CC'a)に栽培された粟、北部各地(CC'b)に栽培された温帶系作物が含まれる。假令粟の如き亞熱帶系作物では高温、多雨の地に栽培される場合にはこのような氣象要素を特需するのである。

各作物によつて示される各氣象要素の高低、多寡は作物それ自身が有する特性、即ち小麥の出穂は最高氣温 30 度の高温により促進されるさか 高粱の生長は降水量 50 耗の多雨により惹起されるさかにより現われる場合も

あるが、栽培の氣候、土壤等にあつて可成りの相違が示されて來るので、年による豊凶も雨が多ければ豊作を示すものと、凶作を示すものとが略々半分宛作付されることが多い。中部の長春附近では早魃になれば高粱、粟等が豊作となり、反對に濕潤になれば大豆、玉蜀黍、小麥等が豊作になる。また南部地方では耐旱性の強い高粱、粟等でも第1型の低温、多雨を要求し、棉花等の如き高温を要求する作物でも甚だしき高温は大なる早魃となり、かえつて収量に不利をもたらすのである。然るに濕潤地に作られる水稻、洋麻(ケナフ)等は高温が生育や授粉の結實に良好な環境を與えるので、畑の一部には必ず作られているので農業經營上からみて、作付歩合による危險の平均化が行われている。

3. 観測數値

各作物収量は可成長年間行われた豊凶考照試験の結果を用い、然らざる場合には當該地方一般農村に於ける豊凶狀態を最もよく示すものと考えられる品種試験または栽培法試験の成績を用い、該地に於ける氣象要素との相關係數及び蓋然誤差を算出した(第2～10表)。

第2表 公主嶺に於ける作物収量と氣象要素との相關係數

	月	大豆 1916~1943	高粱 1916~1943	粟 1936年を除く 1916~1943	玉蜀黍 1914~1931	亞麻 1914~1931	苜蓿 1920~1931	蓖麻 1914~1931
氣 温	V	-0.18±0.13	0.01±0.13	-0.35±0.12	0.08±0.16	-0.19±0.15	0.06±0.19	0.04±0.16
	VI	-0.31±0.12	0.18±0.13	-0.08±0.13	0.08±0.16	-0.15±0.16	-0.44±0.16	0.11±0.16
	VII	-0.31±0.12	0.26±0.12	0.10±0.13	-0.23±0.15	-0.29±0.15	-0.01±0.19	0.02±0.16
	VIII	-0.16±0.13	-0.06±0.13	-0.13±0.13	-0.23±0.15	0.03±0.16	0.06±0.19	0.24±0.15
降 水 量	IV							
	V	0.35±0.11	-0.22±0.12	-0.31±0.12	-0.16±0.16	0.19±0.15	0.05±0.19	-0.27±0.15
	VI	0.27±0.12	-0.53±0.09	-0.55±0.09	0.19±0.15	0.07±0.16	0.16±0.19	-0.04±0.16
	VII	0.35±0.11	-0.56±0.09	-0.14±0.13	0.35±0.14	-0.07±0.06	0.29±0.18	-0.35±0.14
	VIII	-0.14±0.13	0.10±0.13	0.11±0.12	0.13±0.16	0.04±0.16	-0.25±0.18	-0.20±0.15

	月	燕麥 1915~1918	甜菜 1914~1931	馬鈴薯 1917~1931	向日葵 1917~1931	小麥 1914~1931	大麥 1915~1931
氣 温	IV	0.27±0.36				-0.42±0.13	-0.55±0.11
	V	0.20±0.37	0.12±0.16	0.38±0.17	0.15±0.16	-0.51±0.12	-0.17±0.16
	VI	-0.65±0.23	-0.25±0.15	-0.24±0.16	-0.25±0.15	-0.33±0.14	-0.37±0.14
	VII	-0.75±0.17	0.22±0.15	0.30±0.16	-0.06±0.16	-0.17±0.15	-0.13±0.16
	VIII		-0.16±0.16	0.05±0.17	0.49±0.12	0.49±0.18	
降 水 量	IV	0.19±0.38				0.34±0.14	0.39±0.14
	V	0.91±0.07	0.06±0.16	-0.25±0.16	0.05±0.16	0.18±0.15	0.12±0.16
	VI	0.77±0.16	0.21±0.15	0.09±0.17	0.02±0.16	0.14±0.16	0.49±0.12
	VII	-0.15±0.38	-0.21±0.15	0.31±0.16	-0.55±0.11	-0.25±0.15	-0.58±0.11
	VIII		-0.05±0.16	-0.19±0.17	-0.48±0.13	-0.18±0.23	

第3表 克山

	月	大豆 1934~1937	粟 1934~1937	玉蜀黍 1934~1937	小麥 1934~1937	大麥 1934~1937	苜蓿 1934~1937
氣 温	IV				-0.28±0.36	-0.36±0.34	0.98±0.01
	V	-0.75±0.17	-0.58±0.26	-0.38±0.33	-0.19±0.38	-0.27±0.36	-0.69±0.20
	VI	0.98±0.02	-0.84±0.11	-0.74±0.18	-0.93±0.05	-0.86±0.10	0.11±0.38
	VII	0.15±0.38	0.70±0.20	-0.30±0.35	0.89±0.08	0.10±0.39	-0.49±0.30
	VIII	-0.55±0.27	0.07±0.39	-0.77±0.16	0.37±0.18	-0.47±0.30	-0.46±0.31
降 水 量	IV				0.22±0.37	-0.70±0.20	0.36±0.34
	V	-0.96±0.03	-0.77±0.16	-0.64±0.23	-0.47±0.30	-0.64±0.23	0.32±0.35
	VI	-0.22±0.37	0.22±0.37	-0.28±0.36	0.60±0.25	0.08±0.39	-0.86±0.10
	VII	-0.55±0.27	-0.60±0.25	0.59±0.25	-0.54±0.28	0.38±0.33	-0.25±0.37
	VIII	0.05±0.39	0.46±0.31	0.57±0.26	0.27±0.36	-0.49±0.30	0.60±0.25
	月	燕麥 1934~1937	亞麻 1934~1937	甜菜 1934~1937	桂 1934~1937	向日葵 1934~1937	蓖麻 1934~1937
氣 温	IV	-0.44±0.31					
	V	0.82±0.13	0.27±0.36	-0.29±0.36	-0.68±0.21	0.25±0.36	-0.80±0.14
	VI	0.73±0.18	-0.37±0.34	-0.74±0.18	-0.68±0.21	-0.25±0.36	-0.93±0.60
	VII	0.39±0.33	0.78±0.15	-0.23±0.37	0.65±0.22	0.77±0.16	0.39±0.33
	VIII	0.90±0.08	0.43±0.32	-0.69±0.20	0.11±0.39	0.58±0.26	-0.29±0.36
降 水 量	IV	0.47±0.30					
	V	0.87±0.09	-0.14±0.38	-0.59±0.25	-0.73±0.18	0.02±0.39	-0.95±0.04
	VI	0.68±0.21	0.83±0.12	-0.18±0.38	0.08±0.39	0.92±0.06	-0.12±0.38
	VII	-0.24±0.37	-0.12±0.38	0.61±0.24	0.79±0.15	-0.36±0.34	-0.42±0.32
	VIII	0.65±0.23	-0.23±0.37	-0.62±0.24	0.72±0.19	0.08±0.39	0.39±0.33

第4表 熊岳城

	月	高粱 1915~1943	粟 1915~1943	玉蜀黍 1921~1943	大豆 1921~1943	水稻 1915~1943
氣 温	V	0.01	-0.20±0.12	0.01	0.01	0.23±0.12
	VI	-0.11±0.13	-0.01	0.01	-0.45±0.11	-0.01
	VII	-0.11±0.13	-0.10±0.13	-0.31±0.13	-0.13±0.14	-0.12±0.13
	VIII	-0.01	-0.11±0.13	-0.17±0.14	-0.10	-0.34±0.11
	IX					0.25±0.12
降 水 量	V	0.26±0.12	0.23±0.12	-0.20±0.14	0.15±0.14	0.20±0.12
	VI	0.29±0.12	0.30±0.12	0.32±0.13	0.26±0.13	0.02
	VII	0.05	-0.44±0.12	0.27±0.13	0.00	-0.58±0.09
	VIII	0.09	0.17±0.12	0.16±0.14	0.19±0.14	0.10
	IX					0.01

第5表 敦化

	月	大豆 1930~1939	小麥 1930~1939	粟 1930~1939
氣 温	V	-0.10±0.25	0.82±0.25	-0.06±0.27
	VI	0.10±0.25	0.73±0.12	-0.49±0.24
	VII	0.72±0.12	0.19±0.25	0.54±0.20
	VIII	0.69±0.13	0.47±0.20	0.16±0.27
降 水 量	V	-0.17±0.25	-0.16±0.25	-0.25±0.26
	VI	-0.05±0.25	-0.41±0.21	-0.44±0.22
	VII	-0.30±0.23	0.19±0.25	-0.79±0.10
	VIII	0.18±0.23	-0.74±0.11	0.36±0.25

第6表 錦州

	月	大豆	高粱	粟	玉蜀黍
氣 温	V	0.44±0.18	0.82±0.07	0.57±0.15	0.21±0.21
	VI	-0.58±0.15	-0.23±0.21	-0.28±0.21	-0.48±0.17
	VII	-0.34±0.20	-0.15±0.22	-0.12±0.22	-0.14±0.22
	VIII	0.13±0.22	-0.02±0.22	-0.30±0.20	-0.21±0.22
降 水 量	V	-0.30±0.21	-0.51±0.16	-0.39±0.19	-0.34±0.20
	VI	0.74±0.10	0.54±0.16	-0.16±0.22	0.35±0.20
	VII	-0.0	-0.24±0.21	-0.47±0.18	0.13±0.22
	VIII	-0.57±0.15	0.13±0.22	-0.36±0.20	0.15±0.22

第7表 撫順(水稻品種)

	月	京 祖	婁 笠
氣	V	-0.92 ± 0.03	-0.82 ± 0.07
	VI	-0.41 ± 0.17	-0.62 ± 0.13
	VII	-0.26 ± 0.19	-0.34 ± 0.18
	VIII	0.06 ± 0.20	0.28 ± 0.19
溫	IX	-0.05 ± 0.20	0.22 ± 0.19
降 水 量	V	-0.32 ± 0.18	0.48 ± 0.16
	VI	0.47 ± 0.16	0.16 ± 0.20
	VII	-0.16 ± 0.20	-0.14 ± 0.20
	VIII	0.17 ± 0.20	0.13 ± 0.20
	IX	0.41 ± 0	0.15 ± 0.20

第8表 佳木斯

	月	大 豆 1937~1943	小 麥 1937~1943	粟 1937~1943
氣	V	0.46 ± 0.24	-0.43 ± 0.24	-0.15 ± 0.30
	VI	0.37 ± 0.25	-0.51 ± 0.22	-0.70 ± 0.15
	VII	0.38 ± 0.26	-0.28 ± 0.28	0.12 ± 0.30
	VIII	-0.09 ± 0.28	-0.01 ± 0.30	0.63 ± 0.18
溫				
降 水 量	V	0.94 ± 0.34	-0.61 ± 0.19	-0.66 ± 0.17
	VI	0.60 ± 0.19	-0.42 ± 0.25	-0.13 ± 0.30
	VII	-0.47 ± 0.24	0.54 ± 0.21	0.36 ± 0.26
	VIII	-0.08 ± 0.30	-0.03 ± 0.30	-0.08 ± 0.40

第9表 海龍(山城鎮)

	月	高 梁 1931~1937	大 豆 1932~1937	水 稻 1933~1937
氣	V	0.45 ± 0.22	0.70 ± 0.15	-0.82 ± 0.11
	VI	-0.50 ± 0.21	-0.68 ± 0.16	-0.02 ± 0.34
	VII	-0.68 ± 0.15	-0.86 ± 0.08	0.62 ± 0.21
	VIII	-0.58 ± 0.18	-0.46 ± 0.24	-0.36 ± 0.29
溫				
降 水 量	V	-0.25 ± 0.26	-0.19 ± 0.29	0.55 ± 0.23
	VI	0.70 ± 0.14	0.76 ± 0.13	-0.91 ± 0.06
	VII	-0.29 ± 0.25	0.10 ± 0.30	0.06 ± 0.34
	VIII	-0.42 ± 0.23	-0.67 ± 0.17	0.26 ± 0.32

第10表 鄭家屯(錢家店)

	月	大 豆	高 梁	粟
氣	V	-0.09 ± 0.15	-0.33 ± 0.13	-0.15 ± 0.17
	VI	0.03 ± 0.15	0.37 ± 0.15	0.24 ± 0.16
	VII	-0.14 ± 0.14	-0.39 ± 0.12	0.03 ± 0.17
	VIII	0.22 ± 0.14	0.12 ± 0.14	-0.16 ± 0.17
溫				
降 水 量	V	-0.11	0.09	0.14 ± 0.17
	VI	0.17	0.03	-0.23 ± 0.16
	VII	-0.27	0.00	0.36 ± 0.15
	VIII	0.00	0.00	-0.00

次に、初めに分類した5箇の作物型が滿洲各地に如何に分布しているかを第11表に纏めて示す。

第11表 滿洲各地に於ける作物型

作物名	氣候型 地名	CC'b	BC'b		CC'a			BC'a			CC'a'			DC'a
	名	克山	海倫	敦化	哈爾濱	佳木斯	公主嶺	蛟河	海龍	吉林	撫 順	熊岳城	錦 州	鄭家屯
大 豆		II(4)	V, IV (11)	V, II (10)	II(5)	IV, II(6)	I(28)	II(5)	I(6)	I(9)	—	I*(23)	II, V, II (10)	V, IV, V, IV (22)
高 梁		—	II(6)	—	—	—	II(28)	—	II, I, V (7)	I, IV (6)	—	I(28)	II, I, V, I (10)	I(22)
粟		II(4)	II(11)	V, II (7)	I(6)	V, IV(II) (6)	V, II, IV, (27)	IV(5)	—	I(9)	—	I(25)	V(10)	I, II, I (22)
玉蜀黍		V(4)	V, IV, I (10)	—	—	—	II, I(18)	(I), II (IV, I) (6)	—	—	—	II, I* (23)	(II), I (10)	—
小 麥		I, II(4)	II(11)	II, IV (10)	II(6)	V, I(6)	I(18)	—	—	—	—	—	—	—
水 稻		—	V, IV, I (7)	—	—	—	V, I, IV (18)	V, IV, I (5)	I, V, IV, I (5)	—	—	IV, V, I, II(8)	—	—
甜 菜		V(4)	—	—	—	—	I, II(18)	—	—	—	—	—	—	—
馬鈴薯		—	V(11)	—	—	—	IV(15)	I, II (6)	—	—	—	—	—	—
陸 稻		—	—	—	—	—	I(18)	—	—	—	—	—	—	—

- 備考 1. * 大豆, 玉蜀黍の二作物を混作による試験成績より算出せる數値 2. 括弧内は試験年數
3. 熊岳城の水稲作は多雨により水害が起るため若しこの被害がない時はIV, I, IVの型になる
4. 撫順は水稻作のみで京祖, 嘉笠は共に水稻品種名である。

即ち大豆は中部以南では第1作物型即ち低温、多雨を好むものであつたものが中部以北では第2作物型となり、高温、寡雨を特需し、栽培の限界に接近しつつある。高粱は大豆と同様な傾向を示しているが、その限界が大豆のそれより更に南とし南部地方に限られている。粟は高粱と同様中部、北部地方は第2作物型であり、南部地方が第1作物型である。玉蜀黍は北部地方第5作物型で低温寡雨を好みとし、中部、南部兩地方は第2作物型になり安定作物となる。小麥は北部地方にて第2作物型であり安定作物となつてゐるが、中部地方では第1作物型を示し大豆と同様な傾向になつてゐる。水稻は熱帯系作物の關係上、生育期間中高温多雨の氣象要素を特需するもので、その時期が中、北部地方では生育中期に、南部地方では生育末期に當つてゐる。熊岳城の水稻作は生育初期にこの氣象要素を必要とし生育末期には高温、寡雨となつてゐるが、これは同試験場水田が洪水の災害に罹り易い位置にある關係上から起つたことが、この結果に少し修正を加えなければならないことになる。甜菜は北部地方に於ては低温、寡雨の第5作物型を示し、中部地方にあつては生育前期に第1作物型、生育末期に第2作物型を示し、全生育期間を通じてみる時には第3作物型になつてゐる。馬鈴薯は甜菜と同じく北部地方では第5作物型、中部地方の蛟河では甜菜と同じく生育前期に第1作物型、生育末期に第2作物型である。公主嶺では生育期を通じて高温、多雨の第4型となつてゐる。要するに根菜類は北部で第5型で中部では第3型である。

4. 最大の相関係数

前表から各作物收量に最大な影響を及ぼす氣象要素を擧げると第11表の如く、それ等の各要素が平年に比し異常を示した場合には收量に變化を與えるもので、特に注意しなければならない。この氣象要素は各地方により著しく異なるものなれば全滿地區を3分して掲げてみよう。

且つまた前表から異常な氣象要素を示す時期が早く來るか遅く來るかにより收量に大なる變化を與えるものであるから、作物別に氣象要素を摘出してみると第12表の如くなる。また第2圖に示されたように相関係数の月別曲線が凸型を示す場合と凹型を示す場合とが起つて來る。例えば公主嶺の大豆、高粱兩作物は共に凸型である。熊岳城の水稻は凹型である。凹型の場合には生育初、末兩期に凸型の場合には生育中期に各作物收量と氣象要素とが密接な相關係を示すのである。

第2圖 作物型

第12表 各作物收量に對し最大の相関係数の現れた氣象要素

地方 作物名	北 部	中 部	南 部
大豆	5 寡雨, 6 高温, 7 寡雨	5, 7 低温多雨	6 低温多雨
高粱	7 寡雨, 5 高温	6, 7 寡雨, 7 高温, 8 寡雨	5 高温, 6 多雨
粟	6 寡雨高温	5, 6 寡雨, 5 低温, 6 寡照	5 高温, 7 寡雨
玉蜀黍	5 寡雨, 2 多雨, 8 低温	7 多雨, 8 低温	5 低温, 6 低温多雨
小麥	6 低温多雨, 7 高温寡雨	4 多雨, 5 低温	
大麥	4 寡雨, 6 低温	4 低温, 6 寡照, 7 寡雨	
燕麥	5 高温多雨	5 多雨, 7 低温	
水稻	5 高温寡雨, 8 多雨	5 低温, 6 低温多雨, 8 高温多照	5 高温多雨, 6 寡照, 8 高温多照
陸稻	6 高温寡雨	5 多雨, 7 低温	
亞麻	6 多雨, 7 高温	6 多雨, 7 低温	
甜菜	6 低温, 8 寡雨	7 寡雨, 8 高温	5 高温, 多雨, 6 寡照, 8 高温多照
馬鈴薯	8 低温	7 高温, 6 多雨	
向日葵	6 多雨, 7 高温	7 寡雨, 8 高温多雨	
桂	6 低温, 7 低温		
蓖麻	5 寡雨, 6 低温	7 寡雨, 8 高温	
苜蓿	4 高温, 6 寡雨	6 低温, 7 低温	
棉花			7 高温, 8 寡雨多照

即ち第13表に示す如く北部地方では各作物とも8月を除き全期を通じて高温が要求され、中南部地方では8月を除き全期を通じて多雨が要求されている。特に南部地方では生育初期に必要なとし、中部地方ではそれが7月

第13表 時期別にみた各作物収量に關係の深い氣象要素

地方 月別	北 部	中 部	南 部
4 月	寡雨(大麥) 高温(苜蓿)	低温(大麥) 多雨(小麥)	
5 月	寡雨(大豆, 玉蜀黍, 水稻, 蓖麻) 高温(高粱, 水稻, 燕麥) 多雨(燕麥)	寡雨(粟) 低温(大麥, 大豆, 粟, 小麥, 水稻) 多雨(小麥, 大豆, 燕麥, 陸稻)	高温(高粱, 水稻, 甜菜, 粟) 低温(玉蜀黍) 多雨(水稻, 甜菜)
6 月	寡雨(粟, 陸稻, 苜蓿) 高温(粟, 陸稻, 大豆) 低温(小麥, 大麥, 荳, 甜菜, 蓖麻) 多雨(小麥, 亞麻, 向日葵)	寡雨(粟, 高粱) 寡照(大麥) 低温(水稻, 苜蓿) 多雨(水稻, 亞麻, 馬鈴薯)	寡照(甜菜, 水稻) 低温(大豆, 玉蜀黍) 多雨(大豆, 高粱, 玉蜀黍)
7 月	寡雨(高粱, 荳, 小麥, 馬鈴薯, 大豆) 高温(小麥, 亞麻, 向日葵) 多雨(玉蜀黍)	寡雨(高粱, 甜菜, 向日葵) 高温(高粱, 馬鈴薯) 低温(大豆, 陸稻, 亞麻, 燕麥) 多雨(大豆, 玉蜀黍)	高温(棉花)
8 月	寡雨(甜菜) 多照(水稻) 低温(玉蜀黍)	寡雨(向日葵) 高温(甜菜, 水稻, 向日葵, 蓖麻) 低温(玉蜀黍) 寡照(高粱) 多照(水稻)	高温(水稻, 甜菜) 寡雨(棉花) 多照(水稻, 甜菜, 棉花)

迄及んでいる。唯熱帯系作物のみが生育末期に甚しく高温多照を必要としていることが判る。

北部に於ける大豆の生育を詳細に調査してみると生育初期の寡雨高温が最も良好な生育を遂げしめ、従つて豊富な収量となるものである。これを競走にたとえらると大豆の生育は出足の早いこと(Start dash)が極めて良く、生育末期には冷涼となるので生育、成熟も意の如くならず最後の頑張り(Last heavy)が効かぬから、生育初期に充分な生長を遂げしむることが必要である。

滿洲の農作物と氣候との關係を判然せしむるために、月別に気温と降水量とを夫々縦横軸上にとつて、平均數値よりの較差をさつて各作物収量の平年より豊作なるか凶作なるかに従つて正または負の符號を記入して、ここに相關圖を作成してみると各作物の氣象要素に對する特

需性が判然すると共に各象限に於ける豊凶の割合を知ることが出来る。

右上部即ち第1象限は温暖、濕潤區で、筆者の第4作物型に相當し、左上部の第2象限は寒冷、濕潤區で第1作物型である。左下部の第3象限は寒冷、乾燥區で第2作物型である。而して前述各作物に就いて月別に何れの象限にあるものが豊作となるか凶作となるか相關圖中に正負の符號で記號をつけてみる。

各作物は何れも特殊の氣象要素を必要とするものにして1例を擧げると公主嶺では大麥、小麥のような夏作物

第14表 滿洲に於ける各作物安全地域表

寒		濕	暖		濕
大 麥	100% 豊作(安全地域) IV 公主嶺		燕 麥	V 克山	
燕 麥	100% 豊作(安全地域) IV 公主嶺 VI 克山 V 哈爾濱		亞 麻	VII 克山	
甜 菜	73% 豊作(安全地域) VI 公主嶺				
苜 蓿	80% 豊作(安全地域) VI 公主嶺				
大 豆	71% 豊作(安全地域) VII 公主嶺				
陸 稻	86% 豊作(安全地域) VII 公主嶺				
馬鈴薯	50% 豊作(安全地域) VII 公主嶺				
小 豆	VII 克山				
亞 麻	71% 豊作 VII 公主嶺				
玉蜀黍	VII 克山				
燕 麥	VI 公主嶺				
寒		乾	暖		乾
玉蜀黍	60% 豊作(安全地域) VII 公主嶺		粟	80% 豊作(安全地域) V 公主嶺	
苘 麻	80% 豊作(安全地域) VII 公主嶺		高 梁	57% 豊作(安全地域) VI 公主嶺, 克山	
蓖 麻	69% 豊作(安全地域) VII 公主嶺		向日葵	80% 豊作(安全地域) VIII 公主嶺, 克山	
蕎 麥	VIII 克山		黍	VIII 克山	
荳	VI 克山		晚 豆	V 克山	
大 麥	VI 克山		棉	VII 金州	
粟	VI 克山		苜 蓿	IV 克山	
大 麻	VII 克山		蓖 麻	VII 克山	
甜 菜	VIII 克山		大 豆	VI 克山	
			水 稻	VIII 熊岳城	
			馬鈴薯	VII 克山	

には4月の天候が第2象限にある場合に最も安全な地域に相當し、斯様な年廻りにあつては100%豊作を豫想することが出来る。また克山では小麥には6月に第2象限にあるような氣象状態を示す場合に豊作を期待出来るのである。斯様な象限を筆者は安全地域 (Safety region) と名づけた。

今各作物について安全地域を公主嶺、克山、熊岳城、その他について示せば第14表のようになる。3地の氣候は甚しく異なるを以て各作物とも甚しくその特需天候要素を異にし大豆、苜蓿等のようなものは公主嶺では第2象限の低温、多雨區であるのに克山では第4象限の高温、寡雨區で全く反對の天候要素となつてゐる。

このことについては作物型でも説いたように南部が第1作物型で北部になると第2作物型となつてくるのと同じ原理である。此等の關係から一方にて適作地帯 (Favorable belt) を考える資料にもなる。

第15表 氣象觀測數値

	氣 温 (°C)					降 水 量 (mm)				
	IV	V	VI	VII	VIII	IV	V	VI	VII	VIII
克 山 (1934 ~37)	3.7	11.3	19.0	21.1	19.7	25	45	80	173	106
公主嶺 (1914 ~31)	7.1	14.7	20.6	24.0	22.4	17	53	85	169	144
熊岳城 (1914 ~20)	9.4	16.1	21.4	21.2	24.5	16	46	54	125	141

克山その他に於ける成績は年數が少いため月別並に象限の位置だけを記載し、豊凶の割合は擧げることゝ略した。

摘 要

1. 筆者は滿洲にて栽培せられてゐる各種作物について、それらの品種が慢然として作られてゐるのではなく、自然環境によつて制限されてゐることが判つた。

2. 各作物收量と氣象要素との相關係數を算出し大體次の5型に分れることを知つた。

(1) 低温、多雨を好むもの	第I作物型
(2) 高温、寡雨を好むもの	第II作物型
(3) 氣象要素よりは一定しないもの	第III作物型
(4) 高温、多雨を好むもの	第IV作物型
(5) 低温、寡雨を好むもの	第V作物型

とすることが出来た。觀測地は克山 (CC'b)、海倫、敦化 (BC'b) 哈爾賓、佳木斯、公主嶺 (CC'a)、蛟河、海龍、吉林 (BC'a) 熊岳城、撫順、錦州 (CC'a)、鄭家屯

DC'a)

3. 然しこの作物型は1作物に一定のものではなく、甲地より乙地に移すと變化するものであることを知り、その地に於て最も安定な作物となる場合には第II作物型の型式をとるものであることを知つた。

4. 氣象要素によつては判然と定まらなかつた第III作物型を示している根菜類の收量は生育中の管理により、收量に非常な變化を與えるものであることを知つた。故にこの作物は古來不良な天候により現われる飢饉を救う救荒作物の一つであることも判つた。

5. 作物を温度から2分して考えると次のようになる。

寒 地 性 作 物	暖 地 性 作 物
小麥、大麥、燕麥、黑麥、 亞麻、甜菜、馬鈴薯、苜蓿 荏、向日葵	高粱、棉花、粟、蓖麻、洋 麻 (Kenaf) 苘麻

その他北、中、南部地方に一樣に分布する大豆、玉蜀黍、水稻 (陸稻) 等がある。

6. 水稻 (陸稻) 玉蜀黍、大豆等は南、北兩地方に栽培されるが品種により著しく温度を要求する總量に差があり、寒暖兩地に夫々適應する品種があることを知つた。

7. 水稻の如き熱帶系作物には生育期間中必ず高温、多雨を特需しそれが概して開花期に起つてゐる。

8. 根菜類は北部では第V型、中部では第III型を示し、更に北部にも適地があるように考えられる。

9. 各作物收量に最大の相關關係を有する氣象要素 (第12表) 各作物收量に重要な影響を及ぼす氣象要素を月別地方別に擧げた (第13表)。

10. 北部地方では生育末期に低温であるため高温が要求され、中、南部地方では乾燥に失するため多雨が要求されることは一般的の傾向である。

11. 各作物收量から夫々安全地域を考え出し、氣象要素によつて示される4象限にあてはめて研究してみると中部では低温、多濕の第2象限に最も多くの安全地域があり、これに亞いで高温、寡濕の第4象限、低温、寡濕の第3象限となつてゐる。

終りに當つて本研究は瀋陽にて執筆したもので、その間絶えず激勵の辭を賜つた連合國善後救濟總署、農業專員マカンキー博士に對し厚く感謝の辭を捧ぐ。

Resume

Crop types of The Agricultural Meteorological Standpoints.

Nobuo Murakoshi

1. The various crops under cultivation in Man-

churia are cultivated with the different crop type of natural environmental factors.

2. There are five crop types by the coefficients of correlation between the yield of various crops and the meteorological elements in 13 places.

I Crop type—Cold temperature and more rainfall.

II Crop type—High temperature and low rainfall.

III Crop type—Indefinite relationship with the meteorological factors.

IV Crop type—High temperature and more rainfall.

V Crop type—Cold temperature and low rainfall.

3. Each crop has no definite crop type and turned into another type when the crop removed from one place to another. Under most adapted place the crop shows "The Second Type."

4. The yield of tuber crop which shows "The Third type", gives great variation by the management of tillage during its growth. Therefore the tuberous crop is one of the relief crop under the unfavorable climatic condition.

5. We classified the various crop by the grade of temperature into groups.

Cold-weather crops *Warm-weather crops*

Wheat, Barley	Sorghum
Oats, Rye, Flax	Italian millet
Sugar beets	Cotton
Irish potatoes	Kenaf(Ambari hemp)
Perill, Alfalfa	Castor bean plant
Sunflower	Indian mallow
Common millet	

And there are crops distributed in both region such as, soybean, corn and rice plant (included upland rice).

6. The cultivation area of soybean, corn and

rice plant have large acreage in both region and there are difference more or less in the summation of temperature required by various varieties in each crop.

7. The warm-weather crop as rice plant has special demand of high temperature and more rainfall during its growth. Generally it appears in the flowering period.

8. The tuber crop shows "the Fifth Type" in the north and "the Third Type" in the middle part and we consider that the adapted area will be in further north.

9. Reported the meteorological elements which have the maximum coefficient of correlation with crop yield (Table 12) and the important meteorological factors by every month between the crop yield in each district (Table 13).

10. Since the low temperature in the end of the crop growth in the north, it demand the higher temperature, and as the drought during the growth in the middle and south, more rainfall is necessary. These phenomena are the general tendency in agriculture of Manchuria.

11. We found the safety region in every crop by the yield and studied for the four phases by the meteorological elements. In the middle region there are many cases of the safety region in "the Second Phase" cold and wet and then in "the Fourth Phase" hot and dry and in "the Third Phase" cold and dry.

The writer wishes to express his appreciation for the helpful suggestions of Dr. O. M. Mac Conkey, Senior Agricultural Office, United Nations of Relief and Rehabilitation Administration at Mukden Office.

會員諸氏への奉仕について

巻頭「學會を育てよう」に記したように、本會に於て差し當り次のような會員諸氏への奉仕を初めようと思うから、ごしごし御利用下さるようお願いする。

(1) 文献の紹介 從來會誌に時々載せていたが、今後は定期的にプリントとして希望者に配付する様にしたいと思う。そのための費用等の詳細は追つて御案内する。

(2) 圖書の購入あつせん 地方會員の方で圖書入手困難の方には、購入のあつせんをしたいと思うので本會宛御照會願いたい。

(3) 資料の提供について 例えば農業關係者で氣象資料がほしいが調査困難な方には御照會次第調査の上お送りする。しかしあまり大量のものには手数

料の様なものを載くことになるかも知れない。又農業の資料でも本部では蒐集が容易であると思うから遠慮なく申出てほしい。

(4) 農業氣象測器について 農業氣象用の測器については本會でも委員會を持つて 研究中であるが、研究してほしい測器などの御注文を承りたい。又購入したい測器などあれば、業者の紹介等も本會で御世話出来ると思う。

以上の外會員諸氏の色々の御注文・御意見をぜひ本會に提出して載きたい。我々は微力であるが出来る限り在京の會員を動員してこれに應じたいと思う。そうすることによつて本會と會員の關係がますます密になることを信ずる。