Anat. Inst. (Vorstand: Prof. M. SEKI) und ehem. Embryol. Abt.
(Leiter: Emerit. Prof. J. SHIKINAMI) d. Med. Fak., Univ. Okayama.

Über das früheste Stadium der Entwicklung der Zähne des Menschen.

人の歯牙の発生 of 最初期に就いて.

Gaiji KAGAWA 香川 凱 二.

(Eingegangen am 28. Juni 1956.)

Über die Entwicklung der Zähne des Menschen gibt es von alters her viele Forschungen, z. B. die von RÖSE (1891), von ORBAN (1927) und anderen. Besonders hat RÖSE an Rekonstruktionsmodellen genaue Beobachtungen angestellt. In Japan hat WATANABE (1937) am Unterkiefer von Föten besonders die Beziehung der Entwicklung der Zähne mit der Bildung der Alveolen untersucht. Es gibt aber noch viel Unklares besonders bezgl. der Beziehung der sich in der Zahnreihe entwickelnden Zähne zu einander, der Beziehung der Zähne mit dem umgebenden Gewebe und der Durchbruchmechanismus. Vor Kurzem hat KATO (1953) seine Aufmerksamkeit der früheren Entwicklung der Zähne, besonders dem Entstehungsmechanismus der Zahnleiste und der Lippenfurchenleiste zugewandt.

Ich habe nun Untersuchungen über die frühere Entwicklung der Zähne vorgenommen und einige neue Kenntnisse gewonnen, deren Ergebnisse im folgenden mitgeteilt werden sollen.

I. Material und Methode.

Die Feststellung des Alters von Föten geschah nach der Scheitel-Steißlänge. Das Material ist in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Föten wurden in der ZENKER-Flüssigkeit oder im 10%igen Formalin fixiert und in toto mit Boraxkarmin gefärbt. Sie wurden dann meistens in Paraffin, die größeren aber in Celloidin eingebettet. Es wurden die nötigen Teile in den Frontal-, Sagittal- und Querschnitten 100mal vergrößert aufs Papier abgezeichnet. Diese Abzeichnungen wurden auf Wachsplatten aufgeklebt, abgeschnitten und geschichtet und so ein Rekonstruktionsmodell hergestellt.

Die Breite der Zahnleiste wurde an den Schnitten an ihrem Anfangsteil gemessen. Als die größte Entfernung der Zahnleisten der beiden Seiten bezeichnete man den Abstand zwischen den äußeren Flächen des Anfangsteils der Zahnleisten. In späteren Stadien, in welchen die distalen Enden der Zahnleisten nach der Wangenseite gebogen waren, geschah die Messung der Entfernung proximal von der Biegungsstelle.

Tabelle 1.

Stadium u. Nummer d. Föten		Scheitel- steiß- länge (mm)
1. Stadium.	Nr. 13	7.5
	Nr. 16	9.0
2. Stadium.	Nr. 15	10.0
	Nr. 14	12.5
3. Stadium.	Nr. 23	16.0
	Nr. 18	16.5
4. Stadium.	Nr. 1	17.0
	Nr. 2	18.0
5. Stadium.	Nr. 19	19.5
	Nr. 9	20.0
6. Stadium.	Nr. 17	22.5
	Nr. 51	23.0
7. Stadium.	Nr. 21	30.0
	Nr. 60	31.0
8. Stadium.	Nr. 40	32.0
	Nr. 38	35.0
9. Stadium.	Nr. 4	40.0
	Nr. 11	41.0
10. Stadium.	Nr. 30	55.0
	Nr. 8	56.0

II. Ergebnisse.

Stadium 1. Nr. 13 (Scheitelsteißlänge 7.5 mm) und Nr. 16 (Scheitelsteißlänge 9 mm).

Im lockeren Bindegewebe unter dem Deckepithel der Mundhöhle sieht man stellenweise Blutgefäße und Nerven. Der MECKELsche Knorpel kommt noch nicht vor, ebenso wenig Zahnanlagen.

Stadium 2. Nr. 15 (Scheitelsteißlänge 10 mm) und Nr. 14 (Scheitelsteißlänge 12.5 mm).

Beim 10 mm und 12.5 mm langen Fötus beginnt im Unterkiefer ein Teil des Deckepithels der Mundhöhle sich als die erste Anlage der Zahnleiste zu verdicken (Abb. 1. und Tafelabb. 1), aber im Oberkiefer noch nicht. In dem Re-

konstruktionsmodell (Tafelabb. 1) sieht man, daß die Zahnleiste nicht über die ganze Ausdehnung des Kieferbogens, sondern nur an dem Teil, wo in Zukunft Molaren erscheinen sollen, zutagekommt. Nach der Medi-

Abb. 1. Fötus von 10 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. Mh Mundhöhle, Z Zunge, Zl Zahnleiste. 100 $\times$.

anebene hin wird die Zahnleiste niedriger und verschwindet.

Die größte Entfernung zwischen den beiden Zahnleisten beträgt beim 10 mm langen Fötus 1.10 mm und beim 12.5 mm langen 1.29 mm.

Stadium 3. Nr. 23 (Scheitelsteißlänge 16 mm) und Nr. 18 (Scheitelsteißlänge 16.5 mm).

Das vordere Ende des MECKELschen Knorpels erreicht noch nicht die Medianebene. Auf der äußeren Seite seines hinteren Teils sieht man zwei Nerven, die sich dahinter zu dem Nervus mandibularis vereinigen. Im Unterkiefer hat sich das Knochengewebe entwickelt, auch die Zungenanlage hat sich vergrößert. Hinten findet sich die Zungenknochenanlage aus dicht gedrängten Zellen. Die Anlagen der Glandula submandibularis, sublingualis und parotis kommen erst in diesem Stadium zum Vorschein.

Im Unterkiefer erscheint in diesem Stadium die Zahnleiste auch am Vorderzahnteil, wie sie vorher am Molarenteil gesehen wurde (Abb. 2),

Abb. 2. Fötus von 16 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *M-k* MECKELscher Knorpel, *Mh* Mundhöhle, *Zl* Zahnleiste. 100×.

und sie verbindet sich mit derjenigen der anderen Seite an der Medianebene (Tafelabb. 2). Im Oberkiefer entsteht eine niedrige Zahnleiste über den ganzen Kieferbogen hin. Die Zahnleiste im Oberkiefer ist breiter, aber niedriger als im Unterkiefer (Tafelabb. 3).

Die Zahnleiste kommt derart aus dem Epithel hervor, daß sie sich nach innen neigt (Tafelabb. 3). Die Neigung ist im Oberkiefer stärker als im Unterkiefer, und am Molarenteil stärker als am Vorderzahnteil.

Die Entfernung der beiden Zahnleisten ist im Oberkiefer größer als im Unterkiefer. Daher befinden sich die beiden Zahnleisten des Oberkiefers

mehr lateral als diejenigen des Unterkiefers. Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten beträgt beim 16 mm langen Fötus im Oberkiefer 1.62 mm und im Unterkiefer 1.3 mm und beim 16.5 mm langen im Oberkiefer 1.63 mm und im Unterkiefer 1.33 mm.

Der Saum der Zahnleiste zeigt sich am medialen Vorderzahnteil des Unterkiefers wellenartig (Tafelabb. 2), und man zählt 4 Vorsprünge, welche die andeutenden Zahnkeime der Schneidezähne darstellen. Das Epithel des Keimes des 1. Schneidezahns hat sich lingualwärts (d. h. auf der hinteren Seite) gewuchert (Tafelabb. 2), was als die Andeutung des ACKERKNECHT'schen Organs anzunehmen ist. An der Zahnleiste des Oberkiefers wird aber ein solches Gebilde nicht gesehen.

An dem Teil, wo später Eckzähne und Molaren sitzen sollen, ist das Epithel auf der labialen Seite der Zahnleiste in das Bindegewebe hineingewachsen, so daß die Lippenfurchenleiste gebildet worden ist (Abb. 3).

Abb. 3. Fötus von 16.5 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *Lfl* Lippenfurchenleiste, *Mh* Mundhöhle, *Ukf* Unterkiefer, *Zl* Zahnleiste. 100×.

Diese Leiste ist niedriger als die Zahnleiste, aber in der labiolingualen Richtung an Dicke überlegen. Ihre Zellen sind etwas lockerer vorhanden als die der Zahnleiste.

Stadium 4. Nr. 1 (Scheitelsteißlänge 17 mm) und Nr. 2 (Scheitelsteißlänge 18 mm).

In diesem Stadium hat die Verknöcherung des Kieferknochens in der Kinngegend, in welcher sich der Nervus mandibularis verzweigt, begonnen, was sich an den Schnitten als eine Knochenplatte erkennen läßt. Auch ist der MECKEL'sche Knorpel zu sehen. Die Anlage der Subman-

dibulardrüse ist etwas vergrößert. Der Ausführungsgang der Sublingualdrüse ist ein bisschen verlängert. Die Anlage der Parotisdrüse zeigt sich an ihrem Ende angeschwollen, um die Bildung des Drüsenkörpers zu beginnen.

Die Zahnleiste neigt sich nun mehr als im vorigen Stadium, welche Neigung im Oberkiefer stärker ist als im Unterkiefer und in den beiden Kiefern am Molarenteil stärker ist als am Vorderzahnteil (Abb. 4).

Abb. 4. Fötus von 17 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. Die Zahnleiste der beiden Kiefer neigt sich nach der Zungenseite. *Lfl* Lippenfurchenleiste, *Mh* Mundhöhle, *Zl* Zahnleiste. 100×.

Nun sind die Keime der Schneidezähne, die im vorigen Stadium an der Zahnleiste des Unterkiefers entstanden sind, noch kenntlicher geworden (Tafelabb. 4). Auch an der Zahnleiste des Oberkiefers erschienen vier Keime der Schneidezähne. Die Zahnleiste des Oberkiefers ist am Molarenteil höher als am Schneidezahnteil (Tafelabb. 5). Bei den 17 und 18 mm langen Föten sind also an den beiden Kiefern acht Zahnkeime erschienen.

Der an das ACKERKNECHTSche Organ erinnernde halb kugelige Vorsprung läßt sich hinter dem ersten Schneidezahn beobachten (Tafelabb. 4). Seine Zellen sind etwas lockerer vorhanden als in der Zahnleiste.

Die größte Entfernung zwischen den beiden Zahnleisten beträgt beim 17 mm langen Fötus im Oberkiefer 1.71 mm und im Unterkiefer 1.40 mm und beim 18 mm langen im Oberkiefer 1.92 mm und im Unterkiefer 1.65 mm.

Die Lippenfurchenleiste des Unterkiefers des 18 mm langen Fötus wird vorn vom Eckzahnteil an allmählich niedriger, um endlich zu verschwinden. Hinten läuft sie eine Weile der Zahnleiste entlang und ver-

schwindet dann, ohne daß sie sich wie die Zahnleiste am Ende buccalwärts verbiegt. Auch im Oberkiefer zeigt sich die Lippenfurchenleiste. Die Zahnleiste neigt sich in Querschnitten immer lingualwärts hin, aber die Lippenfurchenleiste nicht. Diese ist übrigens niedriger als jene.

Stadium 5. Nr. 19 (Scheitelsteißlänge 19.5 mm) und Nr. 9 (Scheitelsteißlänge 20 mm).

Die Entwicklung des Kieferknochens ist in einem weit stärkeren Grade fortgeschritten als im vorigen Stadium. Die Anlage des Unterkieferknochens ist in den Frontalschnitten von V-Form mit der Öffnung nach oben und außen. Im Oberkiefer zeigt sich an der Gegend des Eckzahns und des ersten Molars eine Verknöcherung. Der MECKEL-Knorpel läuft von hinten nach vorn. Sein vorderes Ende verschwindet allmählich. Unter den Speicheldrüsen hat die Parotisdrüse ihren Ausführungsgang verlängert und ihren Drüsenkörper vergrößert. Auch die Drüsenkörper der Submandibular- und Sublingualdrüse sind etwas größer geworden.

Beim 20 mm langen Fötus hat die Zahnleiste an Höhe gewonnen, ihre Neigung nach innen ist auch stärker geworden. Im Oberkiefer kommt der Keim des Eckzahns distal am schon entstandenen Schneidezahnkeim hervor (Abb. 5 und Tafelabb. 7). Der Abstand zwischen den Zahnkeimen ist fast

Abb. 5. Fötus von 20 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *Mh* Mundhöhle
M-k MECKELscher Knorpel, *Ukf* Unterkiefer, *Zl* Zahnleiste. 100×.

gleich. Im Unterkiefer sieht man dagegen noch keine Zahnkeime (Tafelabb. 6). Die Zahnkeime zeigen alle die Neigung, schräg von der Zahnleiste nach der labialen Seite hin zu wachsen.

Das ACKERKNECHTSche Organ befindet sich beim 20 mm langen Fötus als ein deutliches, halbkugliges Gebilde auf den beiden Seiten der Medialebene hinter der Zahnleiste (Tafelabb. 6).

Die Lippenfurchenleiste entwickelt sich im Oberkiefer am Molarenteil, besonders am 1. Molarenteil am besten, im Unterkiefer aber am Eckzahn-
teil.

Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten beträgt beim 19.5 mm langen Fötus am Oberkiefer 19.5 mm und am Unterkiefer 16.9 mm und beim 20 mm langen Fötus am Oberkiefer 2.13 mm und am Unterkiefer 1.8 mm.

Stadium 6. Nr. 17 (Scheitelsteißlänge 22.5 mm) und Nr. 51 (Scheitelsteißlänge 23 mm).

Der stabförmige MECKELsche Knorpel läuft von hinten nach vorn, und sein Endteil krümmt sich an der Medialebene nach hinten. Der Unterkieferknochen bildet an Frontalschnitten eine V-Form mit der Öffnung nach oben. Die Speicheldrüsen entwickeln sich stärker als vorher. Unter ihnen ist die Submandbulardrüse die größte.

Beim Fötus von 23 mm Länge entstehen im Unterkiefer die Keime des Eckzahns und des ersten Molars distal am Schneidezahnkeim (Tafelabb. 8).

Am ersten und zweiten Schneidezahnkeim kommt der Schmelzknoten zum Vorschein. Dieser fängt an, sich den kappenförmigen Eckzahnkeim zu bilden (Abb. 6).

Abb. 6. Fötus von 23 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *Mh* Mundhöhle, *M-k* MECKELscher Knorpel, *NI* Nebenleiste, *Skn* Schmelzknoten, *Ukf* Unterkiefer. 100×.

Die Entwicklung des Eckzahnkeimes geht schnell vor sich. Er ist schon größer als die anderen. Der erste Molarenkeim steht etwas entfernt von dem Eckzahnkeim (Tafelabb. 8).

Der Schmelzknoten sitzt an der Mitte des schüsselförmigen Zahnkeims. Seine Zellen sind im Vergleich zu denjenigen des Deckepithels der Mundhöhle und denjenigen im Inneren des Zahnkeimes kleiner und dichter gedrängt vorhanden.

Das ACKERKNECHTSche Organ bleibt wie im letzten Stadium, und seine Zellen sind dichtgedrängt (Tafelabb. 8).

Im Oberkiefer sind die Keime des ersten und zweiten Schneidezahns und des Eckzahns von Kappenform und haben den Schmelzknoten. Darunter ist der Eckzahnkeim am größten. Der Keim des ersten Molars ist noch nicht zu sehen (Tafelabb. 9).

Die Neigung des Zahnkeims nach der labialen Seite ist am stärksten am Eckzahnkeim des Oberkiefers.

Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten beträgt beim 22.5 mm langen Embryo am Oberkiefer 2.52 mm und am Unterkiefer 1.82 mm und beim 23 mm langen Embryo am Oberkiefer 2.35 mm und am Unterkiefer 1.9 mm.

Die Lippenfurchenleiste ist im Oberkiefer am Molarenteil deutlich zu sehen, aber vorn vom Eckzahnteil ab wird sie undeutlich. Im Unterkiefer ist sie aber auch vorn vom Eckzahnteil deutlich gebildet.

Stadium 7. Nr. 21 (Scheitelsteißlänge 30 mm) und Nr. 60 (Scheitelsteißlänge 31 mm).

Die Entwicklung des Unterkieferknochens und des MECKELschen Knorpels ist fortgeschritten. Die vorderen Enden der beiden Knorpel berühren sich miteinander und biegen sich nach hinten, wie man es schon im vorigen Stadium gesehen hat. Der Unterkieferknochen umarmt den MECKELschen Knorpel.

Beim Fötus von 30 mm Länge sind die Keime des ersten und des zweiten Schneidezahns, des Eckzahns und des ersten Molars von Kappenform und haben den Schmelzknoten. Unter ihnen ist der Eckzahnkeim am größten und dem Glockenform-Stadium nahe (Abb. 7). Die untere Saumfläche des kappenförmigen Eckzahnkeims wendet sich schräge nach außen und unten, die des Eckzahns ebenfalls nach außen und unten und die des ersten Molars nur ein wenig nach außen und unten. Der zweite Molarenkeim erscheint noch nicht (Tafelabb. 10).

Bei diesem Fötus ist die Zahnleiste des Unterkiefers hinter der ersten Molarenanlage etwa 30° gegen die Wange zu gebogen und wird dann immer schmaler und verschwindet (Tafelabb. 10).

Das ACKERKNECHT-Organ verkleinert sich und läßt nur noch seine Spur zurück (Tafelabb. 10).

Abb. 7. Fötus von 30 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *Lfl* Lippenfurchenleiste, *Mh* Mundhöhle, *M-k* MECKELscher Knorpel, *Skn* Schmelzknoten, *Ukf* Unterkiefer, *Zl* Zahnleiste. 100×.

Wendet man nun den Blick auf den Oberkiefer, so bemerkt man eine deutliche Entwicklung der Zahnkeime, die im vorigen Stadium nur einfache Zellenmassen darstellten. Besonders auffallend ist die Erscheinung des ersten Molarenkeims, der im vorigen Stadium noch nicht vorhanden war. Sechs Keime der Eck- und Schneidezähne haben alle schüsselförmiges Schmelzorgan bekommen, das in der Richtung proximodistal etwas länger, also in der Richtung buccolingual etwas schmaler ist, was sich durch Vergleich der Frontal-, Quer- und Sagittalschnitte miteinander bestätigte. Die Zahnkeime sind auf der buccalen Seite der Zahnleiste vorhanden (Tafelabb. 11). Darunter will sich nun der Eckzahnkeim von der Zahnleiste trennen.

Die zukünftige längere Achse des kappenförmigen Zahnkeims des Mittelschneidezahns richtet sich etwas schräg nach außen. Dasselbe gilt von den Keimen des Seitenschneide- und Eckzahns. Der Keim des zweiten Molars ist noch nicht von Kappenform.

Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten ist beim 30 mm langen Fötus am Oberkiefer 3.21 mm und am Unterkiefer 2.21 mm und beim 31 mm langen Fötus am Oberkiefer 3.25 mm und am Unterkiefer 2.3 mm.

Die Lippenfurchenleiste ist im Oberkiefer am Eckzahnkeim am höchsten und am Molarenkeim am niedrigsten. Dieses dammartige Gebilde ist auf der buccalen Seite jeden Zahnkeims ein wenig besser entwickelt. Dies ist auch im Unterkiefer der Fall, nur daß im Unterkiefer die Lippenfurchenleiste von den Zahnkeimen mehr entfernt gelegen ist.

Stadium 8. Nr. 40 (Scheitelsteißlänge 32 mm) und Nr. 38 (Scheitelsteißlänge 35 mm).

Der Unterkieferknochen, der den MECKEL-Knorpel umarmt, zeigt am Eckzahnteil die größte Entwicklung. Die kappenförmigen Zahnkeime des Unterkiefers sind größer als im vorigen Stadium, ihre Schmelzknoten auch bedeutender (Tafelabb. 12). Man sieht die Anlage des zweiten Molars noch nicht. Der Eckzahnkeim ist im Unterkiefer am größten, daran schließt sich der erste Molarenkeim an.

Im Oberkiefer ist der erste Molarenkeim im Kappenstadium, der zweite Molarenkeim ist aber noch nicht zu sehen (Tafelabb. 13).

Die Zahnleiste wird in den beiden Kiefern hinter dem Eckzahnkeim etwas schmaler, und ist, wie im vorigen Stadium, ein wenig nach außen gebogen.

Das ACKERKNECHT-Organ läßt sich nicht mehr bemerken.

Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten beträgt beim 32 mm langen Fötus im Oberkiefer 2.31 mm und im Unterkiefer 2.40 mm und beim 35 mm langen Fötus im Oberkiefer 3.51 mm und im Unterkiefer 2.60 mm.

Die Lippenfurchenleiste ist wie im vorigen Stadium.

Stadium 9. Nr. 4 (Scheitelsteißlänge 40 mm) und Nr. 11 (Scheitelsteißlänge 41 mm).

Das Gewebe des Unterkieferknochens bildet sich am Eckzahnteil am stärksten. Der schüsselförmige Zahnkeim des ersten Schneidezahns im Unterkiefer des 40 mm langen Fötus will sich nun von der Zahnleiste abtrennen (Tafelabb. 14). Der Eckzahnkeim ist bedeutend entwickelt. Der erste Molarenkeim zeigt unter den Zahnkeimen des Unterkiefers die höchste Entwicklung. Er ist der größte und ist ins Glockenstadium übergegangen. Der zweite Molarenkeim ist auch erschienen (Tafelabb. 14). Sein Hals, der ihn mit der Zahnleiste verbindet, ist länger als bei den anderen Zahnkeimen.

Man findet keine Spur vom ACKERKNECHT-Organ mehr.

Im Oberkiefer verlängert sich die Zahnleiste weit nach hinten. Nahe an ihrem hinteren Ende ist der zweite Molarenkeim angeschwollen (Abb. 8). Wie in Tafelabb. 15 gezeigt ist, stehen die Schneidezahnkeime im Glockenstadium. Die Entwicklung des zweiten Schneidezahnkeims, der jetzt von Glockenform ist, folgt der des ersten Schneidezahnkeims. Der Eckzahnkeim ist ebenfalls im Glockenstadium und im Oberkiefer am besten entwickelt. Der erste Milchmolar ist noch von Kappenform. Übrigens beginnt der zweite Molarenkeim sich zu bilden (Tafelabb. 15).

Die Zahnleiste ist am Beginn ihres Entstehens, wie erwähnt, nach innen geneigt. Es ist zu bemerken, daß in diesem Stadium die Neigung

Abb. 8. Fötus von 40 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *Mh* Mundhöhle, *Mhe* Mundhöhlenepithel, *m2* Keim des zweiten Molars, *Zl* Zahnleiste. 100×.

nachläßt, und daß der Randteil der Zahnleiste sich nach außen zu biegen anfängt (Tafelabb. 15 und 18), und zwar sowohl im Ober- wie im Unterkiefer. Der zweite Molarenkeim des Ober- und Unterkiefers erscheinen erst in diesem Stadium.

Die Biegung des hinteren Teils der Zahnleiste nach buccalwärts, die in vorigen Stadien vorhanden war, ist nun kaum zu sehen.

Die zukünftige Längsachse des Schmelzorgans der Schneidezähne des Oberkiefers ist ein wenig nach oben innen hingeneigt, die des Eckzahns aber ein wenig nach oben außen und die des ersten Molars nach oben. Diejenige der Eck- und Schneidezähne des Unterkiefers richtet sich nach unten, und die des ersten Molars nach unten und außen.

Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten beträgt beim 40 mm langen Fötus im Oberkiefer 4.00 mm und im Unterkiefer 3.20 mm und beim 41 mm langen Embryo im Oberkiefer 4.10 mm und im Unterkiefer 3.20 mm.

Die Lippenfurchenleiste ist wie im letzten Stadium auf der buccalen Seite jeden Zahnkeims etwas besser entwickelt, und ihr hinteres Ende liegt nahe an dem hinteren Ende der Zahnleiste. An den Rekonstruktionsmodellen nimmt man gewahr, daß die Lippenfurchenleiste neben den Keimen der Schneide- und Eckzähne tiefer reicht als die Zahnleiste, neben dem Eckzahn und den Molaren aber nicht so tief.

Stadium 10. Nr. 30 (Scheitelsteißlänge 55.0 mm) und Nr. 8 (Scheitelsteißlänge 56.0 mm).

Der von Knochengewebe bedeckte MECKELsche Knorpel ist auf dem

Weg der Verknöcherung.

Im Unterkiefer des 56 mm langen Fötus trennen sich der erste und zweite Eckzahnkeim von der buccalen Fläche der Zahnleiste ab (Tafelabb. 16). Der erste Molarenkeim ist auffallend groß und ist nun der größte im Unterkiefer (Abb. 9). Der zweite Molarenkeim ist kappenförmig und im

Abb. 9. Fötus von 56 mm Scheitelsteißlänge. Frontalschnitt. *Mh* Mundhöhle, *M-k* MECKELscher Knorpel, *Skn* Schmelzknoten, *Ukf* Unterkiefer, *Zl* Zahnleiste. 100×.

Vergleich zu demselben des Oberkiefers an der Entwicklung verspätet.

Im Oberkiefer stehen die Keime des ersten und zweiten Schneidezahns und des Eckzahns zwischen dem Kappen- und Glockenstadium.

Bezüglich der Entwicklung der Zahnkeime im Oberkiefer steht der erste Molar an der zweiten Stelle, und der zweite Molar an der ersten (Tafelabb. 17).

Die größte Entfernung der beiden Zahnleisten ist beim 55 mm langen Fötus im Oberkiefer 5.55 mm und im Unterkiefer 4.9 mm und beim 56 mm langen Fötus im Oberkiefer 5.61 mm und im Unterkiefer 5.01 mm.

An der Lippenfurchenleiste ist kaum eine Verschiedenheit von dem im vorigen Stadium beschriebenen Zustand zu bemerken, nur daß sie am zweiten Molarenkeim bedeutend vorgesprungen ist. Der hintere Teil der Lippenfurchenleiste liegt nahe an der Zahnleiste und verschwindet allmählich, während die Zahnleiste plötzlich verschwindet. Auch im Unterkiefer ist die Lippenfurchenleiste von fast gleichem Aussehen wie im vorigen Stadium.

III. Auswertung der Ergebnisse.

a) *Erste Entwicklung der Zahnleiste.*

Die Zeit des Auftretens der ersten Anlage der Zahnleiste scheint individuell etwas verschieden zu sein. Z. B. bemerkte KOLLMANN (1907) sie erst am Anfang der 5. Woche, RÖSE (1893) beim 11—12 mm langen Fötus, angeblich im Alter von etwa 34 Tagen, ferner ORBÁN (1928) beim 11—13 mm langen Fetus, MEYER (1932) beim 13—14 mm langen, WATANABE (1937) beim 13 mm langen und KATO (1953) beim 10 mm langen. Bei meinem Material erscheint sie schon beim 10 mm langen Fötus an dem späteren Molarenteil. Es konnte die von YAMAMURA beschriebene (1937) vorlaufende Zahnleiste nicht beobachtet werden.

b) *Erstes Erscheinen der Zahnleiste.*

Es erscheint am Molarenteil des Unterkiefers. Die beiden Zahnleisten verlängern sich nach vorn medial, um sich endlich miteinander zu verbinden. Der Befund weicht von dem von WATANABE (1939) beobachteten, wonach die Zahnleiste zuerst am Vorderzahnteil des Unterkiefers erscheint, und auch von dem von KATO (1953) beobachteten, wonach sie von dem Vorderzahn- und dem ersten Molarenteil ausgeht, ab.

c) *Die Form der Zahnleiste.*

Bald nach dem Erscheinen neigt sich die Zahnleiste sowohl im Oberwie im Unterkiefer lingualwärts. Die Neigung ist im Oberkiefer stärker als im Unterkiefer und in den beiden Kiefern am Molarenteil stärker als am Vorderzahnteil.

Beim 40 mm langen Fötus nimmt diese Neigung ab. Der Randteil der Zahnleiste biegt sich dann buccalwärts, worauf anscheinend bis jetzt niemand aufmerksam gemacht hat.

Der hintere Teil der Zahnleiste des Unterkiefers wendet sich am Molarenteil nach der Wange hin und zwar mit dem Winkel von weniger als 30° , eine Tatsache, die anders ist als die Angaben im bisherigen Schrifttum, wonach die Wendung fast rechtwinklig ist. Der Wendungswinkel wird später beim 40—56 mm langen Fötus kleiner.

d) *Die Entfernung der beiden Zahnleisten voneinander.*

Die äußere Form der Zahnleiste ist, worauf auch RÖSE (1891) hingewiesen hat, im Oberkiefer größer als im Unterkiefer. Aber bisher findet sich keine genaue Messung der Entfernung der beiden Zahnleisten in der Literatur. Aus Tabelle 2 ersieht man, daß die Differenz der Größen zwischen dem Ober- und Unterkiefer bis aufs Kappenstadium nach und nach zunimmt, bis sie beim 30 mm langen Fötus mit dem Kappenstadium wieder abzunehmen anfängt.

Tabelle 2. Die Entfernung der beiden Zahnleisten (mm).

Stadium	Scheitelsteißlänge (mm)	Unterkiefer	Oberkiefer
1.	7.5 9.0		
2.	10.0 12.5	1.10 1.29	
3.	16.0 16.5	1.30 1.33	1.62 1.63
4.	17.0 18.0	1.40 1.65	1.71 1.92
5.	19.5 20.0	1.69 1.80	1.90 2.13
6.	22.5 23.0	1.82 1.90	2.32 2.35
7.	30.0 31.0	2.21 2.30	3.21 3.25
8.	32.0 35.0	2.40 2.60	3.31 3.51
9.	40.0 41.0	3.20 3.20	4.00 4.10
10.	55.0 56.0	4.90 5.01	5.55 5.61

e) *Die Entstehung des Zahnkeimes.*

Beim Fötus von 16—16.5 mm Länge kommt der Schneidezahnkeim des Unterkiefers zum Vorschein. Wenn der Fötus 17—18 mm lang wird, treten im Oberkiefer 4 Schneidezahnkeime auf, es erscheinen also in beiden Kiefern 8 Keime. Die Entstehung aller Zahnkeime in den beiden Kiefern vollendet sich erst im Fötus von 40 mm Länge. Die Zeit ist später als die bei WATANABE (1935) angegebene, der schon im Fötus von 35 mm Länge sämtliche Zahnkeime vorfand. Soweit ich die Literatur übersehe, liegt bisher keine nähere Angabe über die Reihenfolge der Entstehung der Zahnkeime vor. Dieselbe ist in Tabelle 3 gezeigt.

Die Zahnkeime sitzen in frühen Stadien weder nach der äußeren noch nach der inneren Seite der Zahnleiste verschoben, aber sie nehmen im Kappenstadium des 21 mm langen Fötus auf der lingualen Seite der Zahnleiste Platz.

Es ist angenommen worden, daß das Glockenstadium erst beim 100 mm langen Fötus am Mittelschneidezahnkeim anfange. Der Beginn des Glockenstadiums wurde aber in meinem Material schon beim 30 mm langen Fötus am Eckzahn des Unterkiefers beobachtet. Ich möchte hier noch der Beobachtung von KATO (1954) gedenken, wonach das Glockenstadium bei einem Fötus von 17.5 mm Länge am 1. und 2. Schneide- und Eckzahn, bei einem Fötus von 20 mm Länge auch noch am 1. Molar begann. Er be-

obachtete bei einem Fötus von 36.5 mm Länge die Glockenform am 2. Molar. Unser Befund weicht also von der Lehre ORBÁNS (1928) ab, daß die Zahnanlage nicht aus der Zahnleiste, sondern zugleich mit dieser unmittelbar aus dem Deckepithel der Mundhöhle entstehe.

f) *Vergleich der Reihenfolge der Zahnkeimentstehung mit der des Zahndurchbruchs.*

Man vergleiche die Reihenfolge der Entstehung der Zahnkeime (Tabelle 3) und die des schon bekannten Durchbruchs der Zähne (Tabelle 4). Sie stimmen, abgesehen von dem Eckzahn und dem 1. Molar, fast miteinander überein (s. Tabelle 5).

Tabelle 3. Die Reihenfolge der Entstehung der Zähne.

Stadium	Scheitel- steiß- länge (mm)	● Knospenform ○ Kappenform ⊙ Glockenform																																																												
3.	16.0	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table>								2	1		1	2		●	●		●	●								●	●		●	●																														
	2	1		1	2																																																									
	●	●		●	●																																																									
	●	●		●	●																																																									
4.	17.0	<table><tr><td></td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		2	1		1	2		●	●		●	●								●	●	●	●	●		3	2	1	1	2	3																													
	2	1		1	2																																																									
	●	●		●	●																																																									
	●	●	●	●	●																																																									
	3	2	1	1	2	3																																																								
5.	20.0	<table><tr><td></td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		2	1		1	2		●	●		●	●								○	○	○	○	○		3	2	1	1	2	3																													
	2	1		1	2																																																									
	●	●		●	●																																																									
	○	○	○	○	○																																																									
	3	2	1	1	2	3																																																								
6.	22.5	<table><tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>		4	3	2	1		1	2	3	4		●	○	○	○		○	○	○	●												●	○	○	○		○	○	○	●		4	3	2	1		1	2	3	4										
	4	3	2	1		1	2	3	4																																																					
	●	○	○	○		○	○	○	●																																																					
	●	○	○	○		○	○	○	●																																																					
	4	3	2	1		1	2	3	4																																																					
7.	30.0	<table><tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>		4	3	2	1		1	2	3	4		○	●	○	○		○	○	○	○												○	○	○	○		○	○	○	○		4	3	2	1		1	2	3	4										
	4	3	2	1		1	2	3	4																																																					
	○	●	○	○		○	○	○	○																																																					
	○	○	○	○		○	○	○	○																																																					
	4	3	2	1		1	2	3	4																																																					
8.	35.0	<table><tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>		4	3	2	1		1	2	3	4		○	●	○	○		○	○	○	○												●	○	○	○	○	○	○	○	●		5	4	3	2	1		1	2	3	4	5								
	4	3	2	1		1	2	3	4																																																					
	○	●	○	○		○	○	○	○																																																					
	●	○	○	○	○	○	○	○	●																																																					
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5																																																			
9.	40.0	<table><tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>		5	4	3	2	1		1	2	3	4	5		5	4	3	2	1		1	2	3	4	5		●	○	○	○	○		○	○	○	○	●														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5																																																			
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5																																																			
	●	○	○	○	○		○	○	○	○	●																																																			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																			
10.	56.0	<table><tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>		5	4	3	2	1		1	2	3	4	5		5	4	3	2	1		1	2	3	4	5		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○												
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5																																																			
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5																																																			
	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○																																																			
	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○																																																			

Tabelle 4. Die bekannte Reihenfolge des Durchbruchs der Zähne.

Monat	Reihenfolge				
8.	<table> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	1	1	1	1
1	1				
1	1				
9.	<table> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> </table>	2	2	2	2
2	2				
2	2				
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.	<table> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> </table>	4	4		
4	4				
17.					
18.	<table> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> </table>	4	4	3	3
4	4				
3	3				
19.	<table> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> </table>	3	3		
3	3				
20.					
21.					
22.	<table> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> </table>	5	5		
5	5				
23.					
24.					
25.	<table> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> </table>	5	5		
5	5				

Tabelle 5. Der Vergleich der Reihenfolge des Entstehens der Zahnkeime mit der des Durchbruchs der Zähne.

Reihen- folge	Entstehen d. Zahnkeime		Durchbruch d. Zähne	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
1.	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>
2.	<u>2 2</u>	<u>2 2</u>	<u>2 2</u>	<u>2 2</u>
3.	<u>3 3</u>	<u>3 3</u>	<u>4 4</u>	<u>4 4</u>
4.	<u>4 4</u>	<u>4 4</u>	<u>3 3</u>	<u>3 3</u>
5.	<u>5 5</u>	<u>5 5</u>	<u>5 5</u>	<u>5 5</u>

g) *Die Form und die Lage der Zahnkeime.*

Die Öffnung des schüsselartigen Schmelzorgans richtet sich vorerst schief nach vorn, schief nach außen usw., aber sie wird nachher nicht schief, sondern senkrecht.

In den beiden Kiefern entstehen die 4 Keime der Eck- und Schneidezähne fast in gleichem Abstand, der Keim der 1. Molar entsteht aber auf der distalen Seite in einem größeren Abstand. Der 2. Molarenkeim entsteht ebensoweit distal.

Jeder Zahnkeim tritt beim Fötus von bis zu 56 mm Länge in Ellipsoidform auf und ist in proximodistaler Richtung breiter. Er erinnert noch nicht an die Form der eigentlichen Zahnkrone.

h) *Das ACKERKNECHTsche Organ.*

ACKERKNECHT (1912) fand bei einigen Ungulaten und Raubtieren an der Kiefersymphyse dicht hinter den vordersten Unterkieferzähnen eine solide zapfenartige oder auch kurze röhrenförmige Einsenkung des Schleimhautepithels. Dieses Gebilde ist seitdem unter dem Namen, ACKERKNECHTsches Organ, bekannt. Weitere Untersuchungen ergaben, daß das Organ in vielen Säugetieren vorkommt, aber nicht immer. EBERLE (1925) glaubte es auch bei zwei älteren menschlichen Föten gefunden zu haben. NISHIYAMA (1933) konnte das Organ bei den Herrentieren und dem Menschen nicht finden. Nach KATO (1953) erscheint es beim 13 mm langen Fötus als winziger Vorsprung und verschwindet bald und ist beim Fötus von 27 mm Länge nicht zu finden. Nach seiner Meinung erscheine es beim Fötus des Japaners etwas früher als bei dem des Europäers, um auch früher zu verschwinden. Das Organ wird als Rest einer Drüse ange-

nommen.

Ich fand das Organ erst beim 16 mm langen Fötus, ebenso auch beim 30 mm langen Fötus kurz vor dem Verschwinden. Bei älteren Föten ließ sich aber keine Spur des Organs bemerken.

i) *Die Lippenfurchenleiste.*

Beim Embryo in der Länge von 16 mm teilt sich der freie Saum der Zahnleiste in der Gegend des künftigen Eck- und Molarenteils in ein lippenseitiges und ein wangenseitiges Blatt, welches letzteres sich als die Lippenfurchenleiste entwickelt. Sie ist dicker als die lippenseitige Zahnleiste. Ihre Zellen sind weniger dicht vorhanden als in der Zahnleiste.

Diese Lippenfurchenleiste wird beim 18 mm langen Fötus vorn von dem Eckzahnteil ab immer niedriger, hinten aber läuft sie neben der Zahnleiste, und ihr Ende biegt sich nicht buccalwärts.

Die Lippenfurchenleiste stellt sich in den beiden Kiefern zu dem Deckepithel senkrecht und geht weniger tief in das Bindegewebe als die Zahnleiste. Sie ist im Oberkiefer der Zahnleiste näher als im Unterkiefer. Beim 30 mm langen Fötus reicht sie am Eckzahnteil am tiefsten. Die Lippenfurchenleiste zeigt sich neben jedem Zahnkeim etwas besser entwickelt als an den dazwischen liegenden Anteilen.

IV. Zusammenfassung.

a) *Die Zahnleiste.*

1. Sie erscheint zuerst beim Fötus von 10 mm Scheitelsteißlänge am Molarenteil des Unterkiefers, früher als das Auftreten des MECKEL-Knorpels. Im Oberkiefer erscheint die Zahnleiste erst beim 16 mm langen Fötus.

2. Sie neigt sich bekanntlich bald nach ihrem Entstehen lingualwärts. Der Grad der Neigung ist im Oberkiefer stärker als im Unterkiefer und ist in den beiden Kiefern am Vorderzahnteil stärker als am Molarenteil. Beim 40 mm langen Fötus läßt die immer noch lingualwärts geneigte Zahnleiste ihren Saum auf die buccale Seite hin biegen.

3. Die Zahnleiste des Unterkiefers krümmt sich an dem hinteren Teil 30° gegen die Wange zu, welche Biegung im Fötus von 40 mm Länge wieder abnimmt.

4. Der Bogen, den die Zahnleiste als ganzes darstellt, ist im Oberkiefer größer als im Unterkiefer, so daß die Zahnleiste des Oberkiefers außerhalb derjenigen des Unterkiefers sitzt. Dieses Verhältnis ist beim 30 mm langen Fötus am auffallendsten, wird aber später immer unbedeutender.

b) *Die Zahnkeime.*

1. Beim 16—16.5 mm langen Fötus lassen sich im Unterkiefer 4

Schneidezahnkeime erkennen, im Oberkiefer aber erst beim 17—18 mm langen Fötus.

2. Der Eckzahnkeim des Oberkiefers erscheint erst mit der Scheitelsteißlänge von 20 mm, und der Eckzahn- und der erste Molarenkeim mit der Länge von 23 mm, aber der erste Molarenkeim des Oberkiefers und der zweite Molarenkeim der beiden Kiefer mit der Länge von 30 mm.

3. Der Zahnkeim, der im Saum der Zahnleiste erschienen ist, entwickelt sich schräg auf der lingualen Seite der Zahnleiste. Die Reihenfolge der Entstehung der Zahnkeime deckt sich im großen und ganzen mit derjenigen des Durchbruchs der Zähne nach der Geburt, ausgenommen der Eckzahnkeim, der vor dem Molarenkeim entsteht.

4. Das kappenförmige Schmelzorgan verlängert sich anfangs ganz unbestimmt schräg lingual- oder buccinalwärts, aber in den Föten, deren Länge größer ist als 30—56 mm, in der Richtung der Längsachse der Zahnwurzel.

5. Die Zahnkeime bewahren im Kappen- und Glockenstadium eine in der Wangen-Zungenrichtung ein wenig gepresste Form.

c) Das ACKERKNECHTsche Organ.

Das Organ läßt sich erst bei dem 16 mm langen Fötus neben der medialen Ebene auf der hinteren Fläche der Zahnleiste als ein kleiner Vorsprung bemerken. Beim 30 mm langen Fötus wird es schon rudimentär und beim 32 mm langen nicht mehr gefunden.

d) Die Lippenfurchenleiste.

1. Diese Leiste kommt beim Fötus von 16 mm Länge auf der Lippen- seite des Eck- und Molarenteil der Zahnleiste hervor und zwar, wie diese, aus dem Deckenepithel der Mundhöhle. Sie geht immer tiefer in das Bindegewebe hinein, ohne daß sie wie die Zahnleiste sich lingualwärts hin böge. Die Lippenfurchenleiste ist dicker als die Zahnleiste, aber ihre Zellen sind weniger dicht vorhanden.

2. Der hintere Teil der Lippenfurchenleiste biegt sich im Gegenteil zu der Zahnleiste nicht nach außen.

3. Sie ist beim 30 mm langen Fötus in den beiden Kiefern am Eck- zahn- teil am tiefsten. Sie ist im Oberkiefer näher von der Zahnleiste begleitet als im Unterkiefer.

内 容 自 抄.

齒稜が最初に発現するのは頂髻長 10 mm 胎児の下顎臼歯部である。齒稜は発生後まもなく舌側に傾く、頂髻長 40 mm 胎児に至ると齒稜は舌側に傾斜したまま更に其の先端が頰側に傾斜する。下顎齒稜は後部の 1 所で約 30 度の角度で頰側に屈曲する。頂髻長 40 mm 胎児になるとその角度は減じ始める。齒稜の弓形の全体は下顎よりも上顎に大きく、その差は頂髻

長 30 mm 胎児に比較的最も大きく、これ以後は減ずる。

頂臀長 16—16.5 mm 胎児の下顎の歯稜に 4 個の切歯歯胚が現れ、次いで頂臀長 17—18 mm 胎児の上顎の歯稜に 4 個の切歯歯胚が発生する。歯胚の発生順序は出生後の乳歯出齦の順序と大体一致するが、例外として犬歯の歯胚が臼歯のものに先だって発生する。帽状エナメル器の長さを増す方向は初めは一定せず、或は舌側に或は頬側に向うが、頂臀長 30—56 mm 胎児になると、みな歯根長軸の方向に向う。歯胚は帽状期と鐘状期を通じて唇舌の方向に圧せられた形をとる。

Ackerknecht 氏器官は項臀長 16 mm 胎児に下顎歯稜正中部の舌側に 2 個の微弱な隆起として現われるが、項臀長 30 mm 胎児には痕跡状となり、32 mm 胎児以後では認められなかった。

唇溝稜は項臀長 16 mm 胎児において歯稜の将来の犬歯部と臼歯部の唇側に現れ、歯稜のように舌側に傾斜しない。そして唇溝稜の後部は歯稜の後部のように頬側に曲らない。唇溝稜は頂臀長 30 mm 胎児では上下顎ともに犬歯部で最も深い。唇溝稜の歯胚に対する部分は少し肥厚する。

Literatur.

Ackerknecht, E.: Ein eigenartiges Organ im Mundhöhlenboden der Säugetiere. *Anat. Anz.* 41 (1912). — **Eberle, W.**: Zur Entwicklung des Ackerknechtschen Organs. *Diss. med.-vet.* Zürich. 1925. *Zit. n. Bolk u. a.*: Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere. Bd. 3. 1937. — **Kollmann, J.**: Handatlas der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Bd. 2. Jena, 1907. — **Kato, K.**: Embryological studies on the development of the tooth in human embryo, with special reference to the formation of the tooth band and the lip furrow band. (jap. m. engl. Zfass.) *Shigaku* 41 (1953). — **Meyer, W.**: Lehrbuch der normalen Histologie und Entwicklungsgeschichte der Zähne des Menschen. Bd. 1. München, 1932. — **Nishiyama, Y.**: Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Entwicklung des Ackerknechtschen Organs. *Keijo J. Med.* 4 (1933). — **Orban, B.**: Entwicklung und Wachstum der Zahnleiste und Zahnkeime. *Z. Anat.* 85 (1932). — **Röse, C.**: Über die Entwicklung der Zähne des Menschen. *Arch. mikr. Anat.* 38 (1891). — Über die erste Anlage der Zahnleiste beim Menschen. *Anat. Anz.* 8 (1893). — **Watanabe, T.**: Über die Entwicklung des Unterkiefers bei japanischen Embryos, besonders über die Entwicklung der Zähne und Alveolen. (Jap.) *Shikagakuho.* 42 (1937). — **Yamamura, Sh.**: Beitrag zur Studie über die Entwicklung des Schmelzorgans der Zähne des Menschen. *Shikagakuho* 17 (1937).

Erklärung der Tafelabbildungen.

A-O ACKERKNECHTSches Organ, c Keim des Eckzahnes, i_1 Keim des mittleren Schneidezahnes, i_2 Keim des seitlichen Schneidezahnes, Kn Knochen, L Lippe, Le Lippenepithel, Lf Lippenfurchen, Lfl Lippenfurchenleiste, Mh Mundhöhle,

M-k MECKELscher Knorpel, *m₁* Keim des ersten Molarn, *m₂* Keim des zweiten Molarn, *Nl* Nebenleiste, *Nm* Nervus mandibularis, *Okf* Oberkiefer, *prZl* Primitive Zahnleiste, *Skn* Schmelzknoten, *Subl* Sublingualdrüse, *Subm* Submandibular-drüse, *Ukf* Unterkiefer, *Z* Zunge, *Zl* Zahnleiste.

Tafelabb. 1. Unterkiefer. Fötus von 10 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 2. Unterkiefer. Fötus von 16 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Die Zahnleiste neigt sich lingualwärts. Etwa 20×.

Tafelabb. 3. Oberkiefer. Fötus von 16 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 4. Unterkiefer. Fötus von 17 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 5. Oberkiefer. Fötus von 17 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 6. Unterkiefer. Fötus von 20 mm Scheitelsteiblänge von unter. Etwa 20×.

Tafelabb. 7. Oberkiefer. Fötus von 20 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 8. Unterkiefer. Fötus von 23 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 9. Oberkiefer. Fötus von 23 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 10. Unterkiefer. Fötus von 30 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 11. Oberkiefer. Fötus von 30 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 12. Unterkiefer. Fötus von 35 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 13. Oberkiefer. Fötus von 35 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 14. Unterkiefer. Fötus von 40 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 15. Oberkiefer. Fötus von 40 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 16. Unterkiefer. Fötus von 56 mm Scheitelsteiblänge. Von unten. Etwa 20×.

Tafelabb. 17. Oberkiefer. Fötus von 56 mm Scheitelsteiblänge. Von oben. Etwa 20×.

Tafelabb. 18. Die anfangs lingualwärts (d. h. innen), dann buccalwärts (d. h. außen) geneigte Zahnleiste. Der Zahnkeim ist im Stadium des Übergangs von der Kappenform in die Glockenform. Fötus von 40 mm Scheitelsteiblänge.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15