群馬大学医学部, 解剖学教室 (主任: 伊東教授).
Anat. Inst., Gunma Univ., Maebashi (Vorstand: Prof. T. ITO).

胎生期及び生後に於ける家兎肝臓の組織発生学的研究, 特に脂肪摂取細胞の発生について.*

Untersuchungen über die embryonale und postnatale Histogenese
der Kaninchenleber mit besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der Fettspeicherungszellen (fat-storing cells).

山 岸 三 男 Mitsuo YAMAGISHI.

(Eingegangen am 25. April 1958.)

肝臓は形態学的にも生理学的にも重要な器官として, 由来これに関する研究は枚挙にいとまない程多く, その発生学的研究は人及び哺乳類について多数行われ (Pfuhl 1932, 出田 1954 参照), 就中, 人の肝臓の発生については Clara (1949), Lipp (1952), Otto と Politzer (1953) 等がその形態発生に関し, 肝原基の発生部位並びにその発現時期, その後の発育分化の過程を観察している. 更に田中 (1950), 出田 (1954), 伊東と田平 (1955), 名和 (1957) は胎生期の肝組織の一般的発生について広汎な系統的研究を行い, 胎生期肝細胞を組織化学的, 細胞学的に観察し, 更に造血に関しても記載している.

最近伊東 (伊東 1951, Ito と Nemoto 1952) によって健康な成人の肝臓の類洞壁に於て発見された脂肪摂取細胞は, その後多数の研究により形態的機能的特性が明かにされた (伊東 1956 a, b 参照). この細胞は総ての脊椎動物の肝臓に存在し, 常に脂肪を貯蔵する機能を持つが, 類洞壁の形成に与る格子線維網の中に格子線維に包まれて存在し, 肝細胞と類洞腔に接してそのいずれからも格子線維により隔てられて存在する. 従って類洞腔内に存在する星細胞や類洞壁に露出する内皮細胞とは異なる細胞として, それ等との鑑別には特に注意が払われて研究が行われつつある. 脂肪摂取細胞の形態学的特性は各種の動物に略々共通であるが, この細胞が常時保有する脂肪滴の形態は動物の種に特有であって, 決して個体差のないことが明らかにされた.

更にこの細胞の発生を究め, その起源を明かにし, 胎生期に於ける機能状態を知るために既に人の胎児 (伊東と田平 1955) 及び鶏胚 (伊東と根本 1955) に於て脂肪摂取細胞の発生に関する研究が行われ, この細胞は間葉性細胞であり, 胎生初期に於て既に星細胞とは鑑別されるが, 胎生期に於ては殆んどその機能の発現がないことが明らかになり, その機能は生後初めて発現するこれが想像された.

* 本研究は文部省科学研究費によって行われた.

そこで私は本研究に於て生後に於ける材料を比較的容易に得られる家兎を用いて脂肪摂取細胞の発生並びに生後に於ける發育及び機能発現の時期を追及したが、同時に肝組織の一般的発生及び生後發育をも観察した。

家兎の肝臓の発生に関しては安藤 (1917), 中井 (1936) 等の研究があり, 胎生期に於ける肝組織の発生, 肝細胞のグリコゲン及び脂肪の消長, 並びに肝実質内に於ける造血等についての報告が行われた。特に星細胞の発生を観察し, 胎生期の脂肪摂取細胞と比較することは両細胞の異同を論ずるには最も重要である。山口 (1937), 田中 (1950) は人胎児の肝臓に於て星細胞の発生を観察し, 中井 (1936) は家兎肝臓に於て特に星細胞の発生を実験的に観察しているが, いずれも脂肪摂取細胞, 或はそれらしき細胞については何等の記載も行っていない。

由来家兎は屢々発生学的研究に用いられ, その妊娠期間も明確で (31日間), 略々一定し (安本, 田嶋 1956), その成体は人の如く脂肪摂取細胞に脂肪滴を多量に保有し, 脂肪滴の形態も人の型と一致する (伊東, 札木, 狩野, 塚越 1952) ことから, この方面の研究には最も適している。私は家兎を用いてその胎生期より生後發育期に互り肝臓の組織発生学的研究を行うと共に, 脂肪摂取細胞の発生及びその機能発現の時期を追及し, 更に肝細胞との機能的関係をも観察した。

I. 研究材料と方法.

正常の妊娠家兎を交尾後15日, 20日, 25日, 28日に手術的に開腹して胎児を採取した。各時期とも各々2頭 (A及びB) の妊娠家兎より同腹の胎児を2乃至3

Tabelle 1. Glykogen- und Fettgehalt der Leberzellen und Fettspeicherungszellen in der fetalen und postnatalen Kaninchenleber.

Fetal- und Postnataltage	Exemplare	Leberzelle		Fettspeicherungszelle	
		Glykogengehalt	Fettgehalt	Glykogengehalt	Fettgehalt
15. Fetaltag	A	+	+	—	—
	B	+	+	—	—
20. "	A	—	++	—	±
	B	—	++	—	±
25. "	A 1	++	++++	±	±
	2	++	+++	±	±
	3	++	+++	±	±
28. "	A 1	+++	++++	±	±
	2	+++	++++	±	±
	3	+++	++++	±	±
	B 1	+	++++	+	±
	2	+	++++	±	±
	3	++	++++	±	±

1. Postnataltag	A	1	+	+	±	±
		2	+	++	+	±
		3	+	±	+	—
	B	1	—	+++	+	±
		2	—	+++	—	±
		3	—	+++	±	±
5. ”	A	1	—	+	±	+
		2	+	+++	±	+
		3	++	+	+	±
	B	1	—	+	±	+
		2	—	+++	±	+
		3	+	++	±	+
10. ”	A	1	++	+++	±	+
		2	+	++	±	+
		3	+	++	±	+
	B	1	+	+++	±	+
		2	++	+++	±	+
		3	+	+++	±	+
20. ”	A	1	+	+++	±	+
		2	++	++	±	++
		3	+	++	±	+
	B	1	++	++	±	+
		2	+	++	+	++
		3	++	+++	+	+
30. ”	A	1	+++	++	+	++
		2	+++	++	+	++
		3	+++	++	+	++
	B	1	+++	±	++	++
		2	+++	+++	++	++
		3	+++	++	+	++
40. ”	A	1	+++	±	+++	+++
		2	+++	±	+++	++
		3	+++	±	+++	+++
	B	1	++	±	++	++
		2	+++	±	++	++
		3	+++	±	++	++
50. ”	A	1	+++	±	+++	+++
		2	+++	±	+++	+++
		3	+++	±	++	++
	B	1	+	±	++	+++
		2	+++	±	++	+++
		3	+++	±	++	+++

頭取り出して使用した。15日の胎児は頭部を除き体部を、以後のものは肝臓のみを取って固定した。新生時より発育期に至る幼若家兎は娩出後数時間より、生後5日、10日と日を追って生後150日迄観察し、同腹のもの3頭を2組(A及びB)用い(表1)、撲殺後直に肝臓を取って固定した。使用した固定液はオスミウム酸を含むLevi氏液及びZenker-Formol液であるが、一般的観察にはZenker-Formol液で固定し、ヘマトキシリン(Hansen)-エオジン染色を施した標本を用い、グリコゲンの検出にはZenker-Formol液で固定したパラフィン切片に過沃素酸Schiff(PAS)反応を行い、唾液消化試験を併用して反応物質がグリコゲンなることを確めた。脂肪摂取細胞の観察にはLevi氏液で固定した切片にAzan染色及びHeidenhain氏鉄ヘマトキシリン染色を行ったが、Azan染色ではこの細胞の含む脂肪滴はオスミウム酸で黒染保存され、格子線維がAnilinblauで青染されるのでこの細胞の観察には最適である。又この細胞の分布及び肝臓の脂肪を見るためLevi氏液固定Kull氏Anilinfuchsin-Aurantia染色標本を観察したが、Zenker-Formolで固定した場合はこの細胞及び肝細胞のもつ脂肪滴は空胞として観察される。更に胎生期の肝臓のZenker-Formol固定切片にはGomori氏鍍銀法を行って格子線維を検出し、脂肪摂取細胞と肝細胞及び内皮細胞並びに星細胞との格子線維に対する位置的関係を観察した。又、鉄の検出にはTurnbullblau反応を試みた。更に星細胞の有核血球貪喰能を検するため、Feulgen氏核反応を施しLichtgrün後染色を行った。固定した組織片は総て型の如くアルコールで脱水し、キシロールを経てパラフィンに包埋し、3—4 μ の連続切片とした。

II. 所見と考察.

胎生期の肝臓に於ては、発生初期より肝組織は旺盛な発育分化を行うと共に造血像が認められ、従って成体の肝臓に比較すれば形態学的には極めて複雑である。更に類洞腔内に於ても造血が行われるので多くの未熟血球が充満し、類洞内にある星細胞、内皮細胞及びその壁にある脂肪摂取細胞の観察は容易ではない。脂肪摂取細胞の発生及びその機能発現を知る為めには脂肪滴の出現とその量的推移を観察することが重要であるが、札木(1955)の指摘した如く、この細胞は肝細胞のエネルギー源として脂肪を貯える細胞であるから、胎生期の肝細胞の観察も亦重要となる。従って本研究に於ては先ず肝組織の発生を詳細に観察し、肝細胞の脂肪、グリコゲン等の消長を同時に追及する必要に迫られた。

A. 肝組織の発生と造血.

人及び哺乳類の肝臓の初期発生については古くより多数の研究がある。Pfuhl(1932), Clara(1949), Lipp(1952), Otto u. Politzer(1953)等によれば、肝臓の原基は胎生期の前腸の前壁から膨出する凹窩の頭側壁から発生する。この壁は特に高い内胚葉性上皮細胞よりなり、漸次肥厚し、上皮細胞は増殖して集塊或は索を

形成し、分岐吻合する上皮細胞索は Septum transversum の間葉組織の中へ出芽して肝組織を形成する。この細胞索は更に増殖して網状の構造を示し、卵黄囊静脈 (Dottersackvenen 或は Vv. omphalomesentericae) の中へ侵入して、これを細裂して血管網を形成する。これが類洞になるが、肝細胞索は血管網と交錯し、その表面は血管の内皮細胞により被われ (Elias 1955 参照)、血流と密接な関係を保つ様になる。この時期の肝組織は太い肝細胞索が粗網を形成し、その網眼は血管腔即ち類洞によって占められ全体として海綿状の構造を呈する。この様な肝組織の海綿状構造は人胎児に於ては田中 (1950) によれば胎生 1 ケ月、出田 (1954)、伊東と田平 (1955)、名和 (1957) によれば胎生 2 ケ月に既に認められる。家兎に於ては中井 (1936) によれば肝原基は胎生 10 日には既に発生し胎生 14 日には肝細胞索は網状に配列するのが認められる。私の観察した最も若い胎生 15 日の家兎胎児の肝臓に於ても同様な海綿状構造が認められた。更に胎生初期より末期に至る肝組織の発生に関しては、出田 (1954)、伊東と田平 (1955)、名和 (1957) 等の人胎児に於ける詳細な研究があり、家兎に於ても安藤 (1917)、中井 (1936) 等の報告があり、阪野 (1931) はマウスの生後発育期に於ける肝臓を観察している。

胎生期の肝臓に於ては卵黄囊に次いで胎生初期から既に造血機能が営まれ、肝臓は胎生期の一定期間は主な造血器官であるが、造血細胞の起源、肝実質に於ける造血の行われる場所等については諸説があり、未だ一致した見解に達していない (Pfuhl 1932 参照)。Maximow (1927) 等は造血細胞は Septum transversum の間葉性細胞に由来すると云い、脂肪摂取細胞の起源と関係があることが考えられる。

a) 胎生 15 日胎児に於ける所見 (2 例).

私が使用した最も若い家兎胎児は胎生 15 日のものであるが、山口 (1924)、中井 (1936) はこれよりも早期の胎児について観察している。胎生 15 日の肝臓は前述の如く肝細胞は不規則な粗網状の配列をなし、肝組織は全体として海綿状の構造を示しその網眼は広くて不規則な形を持つ類洞を形成するが、かかる所見は 2 例の胎児についても全く同様であつた (図 1)。この様な肝組織の構造は既に述べた如く、人胎児に於ては胎生 1—2 ケ月に認められるが、伊東と根本 (1955) は孵卵 6 日の鶏胚の肝臓に於て同様な所見を得た。家兎に於ては此の時期には肝組織内に Glisson 氏鞘はなく、従って門脉枝、肝動脈枝、胆管の形成もなく、中心静脈も明瞭には識別し難い。肝細胞は成体に於ける如く 1 列に並んで肝細胞索を形成するのでなく、多数の肝細胞の集塊が索を作る如き配列を示し (図 1, 11)、個々の肝細胞の境界は少々不明瞭であつて、一般に成体のものより小さい。肝細胞の細胞質は少く染色性は弱くて明調であるが、核は比較的大きくて染色質に乏しく、明調で細胞の略々中央に存在する (図 2)。核小体は少々粗大で不規則形の塊として 1—数個認められることがあるが、小さい球形のものもある。肝細胞には屢々有糸分裂像を認める。肝細胞の配列は一般に不規則であるが、所により数個の肝

Abb. 1. Spongiöse Struktur des Leberparenchyms; Leberzellenstränge stellen eine grobnetzartige Anordnung dar, die Netzmaschen sind durch weite Sinusoide eingenommen. In den Leberzellensträngen kommen vorwiegend die Erythroblasten (dunkel) herdwiese angehäuft oder zerstreut vor und in den Sinusoiden finden sich größere primitive Erythroblasten (dunkel). 15tägiger Kaninchenembryo. LEVIsches Gemisch, KULLsche Anilinfuchsin-Aurantiafärbung. 250×

体に於ても認められる。渡辺 (1940) は蛇の肝臓に於て、高橋、大屋、新藤 (1957) は蛙の肝臓に於て観察している。かかる点に於て胎生期の家兎肝臓は変温脊椎動物成体の肝臓と似ているが、肝細胞核は基底部即ち類洞側へ偏在することはない。

この時期には既に肝実質内には造血が認められるが、造血細胞の数はまだ余り多くない。肝実質内には少数の骨髓芽細胞も見られるが造血細胞の大多数は赤芽細胞である。造血細胞の細胞質は一般に肝細胞のものより良染し、境界は明瞭である (図 1, 13, 24)。赤芽細胞には色々の大きさのものがあるが、骨髓芽細胞より小さく、細胞質はヘマトキシリン-エオジン染色では好塩基性に均等に青乃至紫染するものが大多数を占めるが、エオジンに好染するものは少い。Azan 染色では細胞質は肝細胞のものより Anilinblau で稍々濃染する。

細胞が狭い腔を囲んで1層に規則正しく配列して管状腺の構造を示し、これ等の細胞の基底部は未だ發育の悪い格子線維と内皮細胞を隔てて類洞に接することがある (図 2)。此の腔は明かに毛細胆管即ち腺腔に相当する。かかる所見は人胎児に於て比較的早期に認められることが報告されている。即ち Pfuhl (1932) は 10mm 長胎児、出田 (1954)、名和 (1957) は 2 ヶ月胎児、三谷 (1935) は 3 ヶ月胎児に於て認められるという。家兎に於ては今日まで報告がないようである。此の様な管状腺の構造は変温脊椎動物に於ては成

Abb. 2. Der tubulösen Drüse ähnliche Struktur des Leberzellenstrangs; die Gallenkapillare (Drüsenlichtung) ist von vielen, radiär angeordneten Leberzellen umgeben. Im Sinusoid finden sich große primitive Erythroblasten (dunkel). 15tägiger Kaninchenembryo. LEVIsches Gemisch, KULLsche Färbung. 1100×

赤芽細胞の核は円形で小さく、均質性に強染し、小なる核小体がある。造血細胞は散在性或は小集団を作つて認められるが、余り明瞭な造血竈を作らないようである。赤芽細胞の数は未だ少いが、その有糸分裂像は可成り多く認められる。赤芽細胞の大多数は肝実質内で肝細胞の間にあり、類洞腔内には少数に存在するのみである。類洞内には併し可なり多くの大なる原始赤芽細胞が認められ、Azan 染色では強く赤染する(図 1, 2, 12, 13)。無核の成熟赤血球は全く存在しない。その他肝細胞の間に、少数の複雑且つ不規則形の大きい核をもち細胞質に富む、肝細胞よりは遙かに大きい巨核巨大細胞(Megakaryocyten)が少数に存在する(図 24)。その細胞質はヘマトキシリン-エオジン染色ではエオジンで淡染し、Azan 染色では赤染する。未熟な顆粒性白血球は実内質にも類洞内にも未だ殆んど認められない。以上の如き所見より見るに胎生初期の家兎肝臓の造血に於ては赤血球形成が先行することは明らかであつて、Mollier (1909) の人胎児に於ける観察と一致する。肝臓に於ける造血の行われる場所については、古くより多くの説があり(Pfuhl 1932 参照)、血管内に於て特に毛細血管の凹窩の中で行われるとなす説(Neumann, Schmidt, Nägeli 等)、血管外に於て肝細胞と内皮細胞の間で行われるとする説(Van der Stricht, Maximow, Lobenhoffer 等)、或は睪丸に於ける Sertoli 氏細胞が精子形成の場合に精子細胞を細胞質に包含してその栄養を司ることから、肝細胞原形質内で造血が行われるとなす説(Jolly)があり、未だ一致した見解がない。更に造血細胞の起源に関しては、流血中の造血細胞に起源を求めるもの、間葉性細胞からとするもの、内皮細胞、或は肝細胞自身を起源細胞とするもの等の諸説がある(Pfuhl 1932 参照)。本研究の所見によれば家兎胎生期肝に於ける造血は肝実質内即ち肝細胞の間に於て行われるようである。類洞内に少数の赤芽細胞が見られるが、これは恐らく、実質内で形成されたものが類洞内へ出て、そこで成熟が進行するものと想像される。私は本研究に於て造血細胞の起源を論ずるに足る所見を得ていない。恐らく Maximow (1927) の説の如く、肝細胞索が Septum transversum の間葉の中へ侵入した時に間葉から肝組織へ与えられた間葉性細胞が起源となるものと想像する。

b) 胎生20日胎児に於ける所見(2例).

胎生15日の肝臓と比較して著しく発育が進み、海綿状構造は消失し、諸所に散在性に広い腔を持つ血管の断面が見られるのみとなる。肝細胞は網状に不規則な配列を示し、その網眼を形成する類洞は Levi 氏液固定標本では狭小であつて見えがたい。肝小葉の識別は未だ困難であるが、肝組織の諸所に散在する広い内腔をもつ血管の中には未だ発育の悪い少量の結合組織で囲まれたものがある(図 3)。これは門脉枝であつて、結合組織は Glisson 氏鞘である。又直接肝細胞に接するのは中心静脈であつて、類洞が開くのが見られる。門脉枝を包む薄い結合組織の中には未だ肝動脈枝は存在しないが、数個の1層に並ぶ立方乃至扁平上皮細胞により囲まれた比較的広い腔を持つ管の切断面が色々の数に認められる。これ等の管

Abb. 3. Die Gallengangsbildung aus dem Leberzellenstrang; Dem minimalen Bindegewebe der GLISSON-schen Scheide zugerückter Epithelabschnitt besteht teils aus verkleinerten Leberzellen, teils aus kubischen Gangsepithelien, was auf die Umwandlung der ersteren in die letzteren hindeutet. In Leberzellen kommen verschiedengroße Fettröpfchen (grau bis schwarz) vor. Gg Lichtung des Gallengangs. P Ast des Pfortaders. 20tägiger Kaninchenembryo. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

の中には上皮の中に肝細胞を混じ、肝細胞と上皮細胞の間に移行像が見られるものがあり(図3)、又管壁の1部が肝細胞索によって形成され、毛細胆管が管腔へ開くものがある。これ等の管はその位置及び形態より見て明らかに胆管であり、その上皮の中に肝細胞が認められ、且つ肝細胞索と直接連続することより考えると、この時期には肝細胞から胆管上皮が分化し、肝細胞索から胆管の形成がある如く思われる。Hammer (1926) は胆管の形成は単に肝細胞の分化のみによるものでなく肝管

に由来する細胞の増殖によっても形成されると云うが、私は本研究に於て肝管の観察を行う機会に接しなかった。併し胆管上皮細胞に稀れに有糸分裂像を見た。従って胆管は肝細胞索の分化により出現し、同時にその上皮細胞の有糸分裂により増殖するものと思われる。門脉枝、胆管を伴う Glisson 氏鞘の出現時期は、人胎児に於て出田 (1954)、伊東と田平 (1955) によれば胎生3ヶ月で、中心静脈も略々此の時期に出現すると云う。家兎胎児に於ける胆管の出現時期について中井 (1936) は私と同様に胎生20日と報告している。

肝細胞の細胞質は明調で Zenker-Formol 固定標本では大小の脂肪空胞が存在し、肝細胞の境界はこの時期に於ても多数の造血細胞の存在によって不明瞭である(図4)。肝細胞の核の状態は胎生15日と変らない。肝細胞の有糸分裂は此の時期に最も多く、肝組織は急速に發育することを示す。胎生15日に見られたような、数個の肝細胞が放射状に配列して狭細な腔即ち毛細胆管を囲む管状腺の構造は到るところに見られるが、造血細胞の混入によって発見には困難を感じる。

造血細胞はこの時期には著しく増加し(図4)、その大多数を占めるのは種々の發育段階にある赤芽細胞で、この時期にはヘマトキシリン-エオジン染色、Azan 染色で細胞質が強く赤染される正常赤芽細胞(Normoblasten)も多数に見られ、又無核の成熟赤血球も現われる(図14)。これ等の造血細胞は肝細胞間にあって類洞腔に面する部に集る傾向が認められるが(図14, 15)、又類洞内にも存在する。造血細胞の有糸分裂は極めて多数認められ、肝細胞間(図4, 15)に多いが類洞腔内に存在する細胞にも出現する。血球の有糸分裂数は此の時期に最高に達する。

類洞腔には無核の成熟赤血球の他になお大きくて Azan 染色で赤く強染された原始赤芽細胞が可なり多く残存する。肝実質内には未熟な顆粒性白血球即ち骨髓細胞が極めて少数出現するが、その核は円形乃至橢円形で細胞質にはヘマトキシリン-エオジン染色, Azan 染色で赤く染まる好酸性の顆粒が多数存在する。巨核巨大細胞も増加し一般に稍々大きくなり核は更に複雑な形を示すものが多い(図4)。Maximow (1927)によれば、家兎の如く妊娠期間の短い哺乳類の胎児に於ては、肝臓の造血は胎生 13 日頃開始し、赤血球造血はその発現後急速に最高に達すると云う。橋本(美)(1938)は家兎胎児の肝臓の造血について胎生 19 日に最高となり、胎生 25 日迄この状態が続くと記載している。私も胎生 20 日に於て赤芽細胞が非常に増加し、その有糸分裂が極めて多いのを認めた。

c) 胎生 25 日胎児に於ける所見 (3 例).

肝組織の構造は大体胎生 20 日と同様であって、諸所に広い内腔を持つ血管が散在し、その間に肝細胞索があり、狭細な腔を持つ類洞が不規則な方向をとって走る。数個の肝細胞が狭い腔即ち毛細胆管を囲んで放射状に配列し、管状腺の構造を示す部位も認められるが、造血細胞によって覆われて全部を観察することは出来ない。一般に類洞壁を形成する格子線維の発育は未だ悪く、更に肝細胞の間、或は類洞腔に存在する血球により類洞と肝細胞との位置の関係が不明瞭なことが多い。広い腔を持つ血管には大体中心静脈と門脈枝とが見分けられ、肝小葉を大略見分けることが出来るが未だ不明瞭な所もある。Glisson 氏鞘即ち門脈枝と胆管を囲む結合組織は稍々増加するが、肝動脈枝は未だ明瞭には認められない。胎生 20 日に見られた肝細胞からの胆管形成像は同様に認められる。胆管上皮細胞には少数乍ら有糸分裂がある。

肝細胞は Zenker-Formol 固定標本では、細胞質は大小多数の脂肪空腔により占められ(図5)、細胞質は少く、核は細胞の周辺部へ圧迫されて変形したものがある。一般に肝細胞は稍々大きさを増すが、造血細胞の存在によって細胞の境界は明瞭ではない。造血細胞は此の時期に最も多数存在する(図5)が、肝細胞及び造血細胞の有糸分裂は胎生 20 日に比べると少なくなる。

此の時期にも赤芽細胞が造血細胞の大部分を占め、各成熟段階のものを認める。赤芽細胞の核は一般に染色質が多く濃染し、細胞質はヘマトキシリン-エオジン染色, Azan 染色で赤染するものが多くなり、又小さくて細胞質が Azan 染色で暗

Abb. 4. Erythropoetischer Herd im Leberparenchym. M Megakaryocyt. 20tägiger Kaninchenembryo. ZENKER-Formol, Hämatoxylin (HANSEN)-Eosin. 1100×

Abb. 5. Erythropoetischer Herd im Leberparenchym, verschiedengroße Vakuolen zwischen den Blutbildungszellen sind Fettvakuolen in Leberzellen. L Myelocyten, M Megakaryocyt. 25tägiger Kaninchenembryo. ZENKER-Formol, Hämatoxylin(HANSEN)-Eosin. 1100×

熟なものより成熟型に至る極めて多数の造血細胞即ち、骨髓芽細胞、發育各段階の赤芽細胞、赤血球、骨髓細胞、白血球、巨核巨大細胞等が存在し、此の時期の肝臓の造血は成体に於ける骨髓の造血を思わしめる程である。唯赤血球形成が主役を演じ、顆粒性白血球形成が著しく貧弱である点が異なるが、巨核巨大細胞の数は骨髓におとらない。胎生20日に於ては造血細胞の有糸分裂は旺盛で造血機能の極期と思われるが、胎生25日に於ては有糸分裂像は稍々少なくなるも造血細胞の数は最も多数で、而も正常赤芽細胞及び成熟赤血球が多い。赤血球造血が成熟の段階に移ったものと考えられる。

d) 胎生28日胎児に於ける所見
(6例).

肝組織は胎生25日と略々同じ構造を示す。中心静脈は容易に見分けられ(図17)、孤立して不正形の広い腔をもつ。その周辺に於て類洞が広く、血球が殆んどない場合が多い。かかる部分では類洞壁及び肝細胞索を觀察しやすいが、類洞壁の格子線維層は未だ發育不充分で薄く、肝細胞索は未だ数列の肝細胞からなる太い索で、その走行も不規則であり、成体

赤色に濃染し、核も濃縮して強染する正常赤芽細胞が肝細胞間に多数存在する。類洞腔には無核の成熟赤血球が可成り多く、赤血球が並んで存在することにより類洞の走行が知られる所がある。胎生20日まで見られた原始赤芽細胞は全く消失する。更に巨核巨大細胞も増加し屢々有糸分裂像を認める。この時期には好酸性の顆粒を多数に持つ骨髓細胞が増加し(図5)、肝実質内に散在性に或は小群をなして存在しGlisson氏鞘内にも少数に見られる。中には核が2乃至3葉に分かれた成熟型も認められる。これ等骨髓細胞にも屢々有糸分裂像を認める。此の様に未

Abb. 6. Der tubulösen Drüse ähnliche Struktur des Leberzellenstrangs; die Gallenkapillare ist von einigen radiär angeordneten Leberzellen umgeben, viele verschiedengroße schwarze Tröpfchen in Leberzellen sind osmierte Fetttröpfchen, dazwischen findet man Erythroblasten. 28tägiger Kaninchenembryo. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

の如く中心静脈から放射状に走る所見は殆んど見られない。毛細胆管も数個の肝細胞で囲まれ管状腺の構造がある(図6)。Glisson氏鞘の結合組織は増加し、門脈枝、胆管の他に細い血管が見られるが、恐らく肝動脈枝と思われる(図7)。門脈枝の壁には平滑筋細胞が出現する。胆管には可成り太い立方上皮で囲まれたものが見られる。肝実質に接する細い胆管の上皮には肝細胞が介在することはなく、肝細胞索からの胆管形成が終ったことが判る(図7)が、かかる細い胆管の中には肝細胞索と連続し、その壁の

1部が肝細胞で囲まれるものがあるが、これは中間部である(Clara 1931)。肝小葉は成体に比し不明瞭で且つ小さいが、形態学的には完成に近いように思われるけれども、肝組織は組織学的に未完成である。人胎児に於て肝小葉の形成は名和(1957)によれば胎生4ヶ月、出田(1954)によれば胎生5ヶ月であって、いずれもGlisson氏鞘の形成される時期としているが、田中(1950)は肝臓の造血が略々終った胎生7ヶ月に成人同様の肝小葉を認め、伊東と田平

Abb. 7. Inhaltsgebilde der GLISSONschen Scheide; der von eigentlichen kleinen kubischen Epithelzellen bekleidete Gallengang, Äste der A. hepatica (A), und Ast des Pfortaders (P). Myelocyten sind hie und da im Bindegewebe zu sehen, die der GLISSONschen Scheide angrenzenden Leberzellen sind von zahlreichen, wechselnd großen Fetttropfchen (schwarz) ausgefüllt (links oben). 28tägiger Kaninchenembryo. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

(1955)は更に遅く胎生8ヶ月から9ヶ月に肝臓は組織学的に略々完成すると述べている。一方 Pfuhl (1932)は肝生期肝臓には小葉形成はなく分娩後に初めて形成されると考える学者があると述べている。阪野(1931)はマウスの肝臓の生後発育について、肝小葉の形成は中心静脈の発育と関連し、中心静脈の壁にある内皮細胞の有糸分裂がある間は中心静脈は分岐し、従って肝小葉は増加するという見解を述べている。

この時期の肝細胞の境界は造血細胞の減少に伴って略々明瞭に認められるところが多く(図6)、成体のものに近い大きさとなる。その形は多角形で、成体に於けるよりも少々円味を帯び、その間には成体の如く狭い毛細胆管が認められ、これを囲む肝細胞は上記の如く2個以上であるが、胎生初期に比べその数が減少し、3乃至4個の肝細胞により囲まれることが多い(図6)。この様に胎令の進むに従い毛細胆管を囲む肝細胞数が減少することは、人胎児に於て Prentis と Arey (1920)、三谷(1935)も報告しているが、私も家兎胎児に於て同様な所見を得た。

肝細胞は Zenker-Formol 固定標本では、大小多数の脂肪空胞で充たされ、核は周辺部へ圧迫されて脂肪滴による圧痕を示すものがある(図26)。空胞の間を占める細胞質も著しく明調となる。これはグリコゲンの増加によるものの如くである。尚おこの時期にヘマトキシリン-エオジン染色で肝細胞には少量の黄色で強屈折性の色素顆粒が認められるようになる。肝細胞の有糸分裂は此の時期にも少くない。

肝実質内の造血細胞は減少し始めるが、その大多数を占めるのは赤芽細胞で、小なる正常赤芽細胞が多い。造血細胞は散在性或は群をなして屢々類洞側へ偏在する。類洞腔にあるのは無核の成熟赤血球が大部分で(図16); その列状配列によって類洞の走行が識別される所も多い。原始赤芽細胞は胎生25日と同様全く消失する。肝実質内にある造血細胞には尚お少数の有糸分裂像を認める。これによって見ると、胎生末期に相当する胎生28日に於ても肝臓の造血は赤血球形成を主とするが、その機能は衰退し始める。Lacassagne (1923) も家兎に於ては分娩直前に赤血球造血機能の退行が殊に強いと述べている。しかし骨髓細胞は前期より増加し、肝実質内に散在性に或は群をなして認められる(図16)が、特に Glisson 氏鞘の結合組織の中にやや大なる群を形成することが多く、骨髓細胞が肝実質より、Glisson 氏鞘の結合組織の中へ移動する如き所見がある(図7)。骨髓細胞は顆粒を多く持つものが多数で、核が馬蹄形或は分葉形をなす成熟型も見られる。従って此の時期には赤血球造血の減退に反し、顆粒性白血球形成が盛んとなるが、数の上から見れば赤血球造血に遙に及ばない。

e) 娩出直後及び生後5日に於ける所見(各6例)。

胎生期に於ては胎児は胎盤血行により養われるが、分娩後は哺乳及び肺臓血行がこれに代り、独立した個体としての生活を営み、従って肝臓の機能更にその物質代謝に可成り影響することは当然考えられる。

娩出直後に於ては各例とも肝臓の組織学的構造には胎生28日の肝臓に比べて特筆すべき程著明な変化は殆んど認められない。肝細胞は中心静脈の周辺に於て、これを中心に略々放射状に走る索状構造を示すことがあるが、その他の部位に於ては肝細胞索は分岐吻合して不規則な網を形成し、中心静脈に近い部分を除いて一般に類洞は狭く観察に不便である。類洞壁の格子線維はよく発達して厚くなる。毛細胆管は矢張り3—4個の肝細胞で囲まれたものが多い。肝細胞原形質は再び暗調で脂肪空胞は稍々少なくなり、肝細胞の大きさは胎生末期に比し小さい。これはグリコゲンの減少によるものであろう。造血細胞の減少により肝細胞の境界は明瞭である。有糸分裂は極めて少く、小葉内に散在性に認めるのみである。肝細胞の黄色色素顆粒は急に増加し、顆粒も大きくなる。Glisson 氏鞘の結合組織は胎生28日と同様に多くなり、肝動脈枝も鑑別される。その他小葉内に極めて少量の結合組織で包まれた門脉枝があらわれ、その周囲に於て再び肝細胞よりの胆管形成が見られる(図8)。これはこの時期に再び門脉枝の分岐がおこり、それに

伴って胆管の増殖があることを示すものであろう。これによって見るも肝小葉は尚お増加しつつあることがうかがわれる。

造血細胞は前期より減少の傾向があるが、それと大差はない。成熟赤血球は多くなるが、赤芽細胞は少く、有糸分裂は尚お少数に見られる。骨髓細胞の数は前期と略々等しいが、Glisson 氏鞘には少なくなる。巨核巨大細胞の数は減少していない。一般に哺乳動物は生後直ちに胎生期状態を離脱するものではなくて、一定時日の後始めて離脱する(太田 1940 参照)と云う。私も亦肝組織の構造と造血に関してこの見解を承認する成績を得た。

生後 5 日に於ける肝臓の組織学的構造は大体に於て娩出直後のものと等しい。前記の如く門脉枝と胆管の分岐増殖があり、胆管上皮が肝細胞より分化形成される所見があるが、上皮細胞自身にも有糸分裂がある。又中心静脈にも同様の現象があるらしく、中心静脈を思わしめる血管の断面が多く認められた。従って肝小葉の増加があるものと思われる。肝細胞索と類洞の状態は娩出直後と同様である。肝細胞も娩出直後と同じ性状を示すが、色素顆粒は粗大で更に多い。肝細胞の有糸分裂像は娩出直後と同様少ない。

Abb. 9. Granulopoetische Herde im Leberparenchym, zwischen den Leberzellen finden sich viele heterophile Myelocyten (dunkel). Kaninchensäugling, am 5. Postnaltage. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

Abb. 8. Gallengangs-bildung in der GLISSON-schen Scheide wie bei der Abb. 3. P Ast der V. portae. Kaninchensäugling, am 1sten Tage nach der Geburt. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

赤血球造血は娩出直後よりも更に減退し、赤芽細胞と無核赤血球は減少し、肝細胞間にあつて類洞に面する部位に一般に認められるが、赤芽細胞の減少が著しい。有糸分裂は尚お少数存在する。これに対し骨髓細胞は此の時期に著明に増加し(図 9)、大多数は多数の好酸性の顆粒を持つ heterophile Myelocyten であるが、赤血球と混在して集団を作り或は散在性に小葉内に分

布し、Glisson 氏鞘内には少ない。核は単核のものが多く、2—4葉に分かれて多形核となった成熟型も認められ、又有糸分裂像も屢々認められる。この様に赤血球の造血が衰退すると白血球の造血が旺盛になることは従来に記載には見られないようである。胎生早期に赤芽細胞形成と同時に骨髓細胞も形成されると Maximow (1927) は述べているが、私の認めた如き所見については記載がない。橋本 (寛) (1938) は家兎の生後に於ける肝臓の造血の消退を観察し、各種血球に於てその最も幼若なものから消退するのを認めたが、赤血球及び白血球の造血の消長については記載していない。人胎児の骨髓造血に於て赤血球及び白血球の造血の消長は、加藤 (1946) の綜説によれば人胎児の脛骨及び大腿骨では赤血球と白血球の形成があり、それらの造血の行われる場所は異なるが胎児の成長と共に赤血球形成は減退し、顆粒球の造血が旺盛となると云う。併し、肝臓の造血に於てはかくの如き記載がない。巨核巨大細胞は胎生期より減少せず、多数に存在しその多極性分裂も認められる。

f) 生後10日と20日に於ける所見 (各6例)。

生後10日の肝臓に於ては、肝細胞索は細くなり、1列乃至2列に並ぶ肝細胞により形成され、中心静脈周辺では放射状の走行が明瞭で、その他の部位では分岐吻合して網を形成する。類洞腔は狭いが、格子線維の発達と、造血細胞の減少により明瞭に認められる。毛細胆管は肝細胞索の横断面では殆んど2—3個の肝細胞により囲まれる。胎生期に於ては毛細胆管を囲む肝細胞の数は胎令の進むに従い減少することは既に述べたが、毛細胆管を囲む肝細胞の数が成体に於ける如く2—3個となる時期に関して、Pfuhl (1932), Prentis と Arey (1920) は人胎児に於て分娩後であると云うが、私も家兎に於て生後10日であるとの成績を得た。即ち分娩後一定の時日を要する。Glisson 氏鞘の結合組織は増加し、門脉枝の腔は狭くなり、肝動脈枝も明瞭に鑑別されるようになって肝小葉は略々成体に近い構造を示す。併し諸所に於て小葉内に中心静脈らしき血管の断面が多く現われ、同時に僅量の結合組織で包まれた細い門脉枝の断面が認められ、そこに胆管の形成があるので、尚お中心静脈と門脉枝の分岐増殖が進行し肝小葉の増加があるのではないかと思われる。従って前期に於けると同様肝小葉は完成したとは云い難い。肝細胞は再び大きさを増すが成体のものよりやや小さい (図20)。細胞質は一般に暗調であるが、中心帯に於ては稍々明調である。これはグリコゲンの存在によるとと思われる。細胞質にはその他大小多数の脂肪空胞が存在する例があるが、一般に小葉の中間帯から周辺帯に多い。色素顆粒は急に減少し大きさも小さくなる。肝細胞の有糸分裂は少数認めるのみである。

生後10日に於ては造血細胞は急激に減少する。これは赤芽細胞の減少があるからであって、濃縮した小さい核をもつ赤芽細胞が小集団を作り或は個々に肝実質内に散在する。類洞腔には成熟した赤血球が少数見られるのみである。骨髓細胞も稍々減少するが、未だ比較的多く肝実質内に数個集団となり或は個々に散在し、

Glisson 氏鞘の結合組織の中にも少数ある。巨核巨大細胞は減少するが、未だかなりの数で見られる。此の時期には造血細胞の有糸分裂は殆んどない。

生後20日に於ける幼若家兎肝臓の組織学的及び細胞学的所見は生後10日の場合と全く同様である。唯この時期に肝造血は殆んど終息する。即ち肝実質内に稀に赤芽細胞の小群を、又 Glisson 氏鞘に骨髓細胞を見ることがあるのみで、巨核巨大細胞は全く消失する。生後20日に於て胎生期より生後に互って継続して来た肝造血機能は殆んど終る。人に於ては肝造血は生後数週間は続き、6ヶ月には全く消失する (Pfuhl 1932 参照) と云われるが、家兎に於て橋本(美)(1938)によれば造血細胞が全く消失するのは生後3週間前後である。又橋本(寛)(1938)は犬、猫、家兎、白鼠等の生後に於ける肝造血の消長を検索し、生後第1日に於ける造血は家兎が最も著明で造血の消退終了は生後20日であると云う。私の研究によれば造血の消退時期は殆んど個体差なく生後20日であり彼等の所見と一致する。

g) 生後30日と40日の家兎に於ける所見 (各6例)。

生後30日と40日の肝組織からは造血細胞は全く消失し、造血の完全な終息を示し、肝小葉は初めて完成し前期まで見られた小葉の増加を示す所見はなく、成体と同じ構造を示す(図28)。その大きさも成体と略匹敵する。肝細胞索も1列或は2列に並ぶ肝細胞より成って細く、毛細胆管は2個或は3個の肝細胞で囲まれる(図22)。肝細胞索は中心静脈を中心に放射状に配列し、互に分岐吻合して網を形成する(図28)。類洞腔は肝小葉の中心帯を除いては狭少であるが、格子線維の発達によって明瞭に認められる。Glisson 氏鞘も完成し門脉枝、胆管、肝動脈枝は明瞭に認められる。肝細胞の大きさも略成体に匹敵し、細胞質はグリコゲンの存在によって一般に明調であって、特に中心帯の肝細胞は明るい。色素顆粒は少ない。脂肪空胞は前期に比して減少し、生後30日の例では周辺帯の肝細胞に大小の滴を認める(図22)が、中心帯には殆んど存在しない。生後40日の例に於ては小葉全域から脂肪滴は殆んど消失する。この点が生後30日と40日との相異である。此の時期には肝細胞の有糸分裂は認められなかった。以上の所見から見て肝臓が組織学的に完成するのは略々生後30日乃至40日と思われる。この時期は肝造血の完全に消退する時期と一致し、又平島(1937)によれば略此の時期に仔兎は離乳すると云う。

その後の發育を観察するため更に生後50日より150日に至る家兎について検索したが、肝組織は成熟家兎と同じ組織学的構造を示し、生後50—60日に於ては肝小葉の大きさも肝細胞個々の大きさも成熟家兎と同じで、肝細胞の細胞学的所見も成熟家兎と変らない。

B. 脂肪摂取細胞と星細胞の発生並びに胎生期及び生後に於ける肝脂肪。

脂肪摂取細胞と星細胞の発生を観察する際に注意すべきことはこれらの細胞の類洞に対する位置的關係である。類洞の壁は肝細胞索に密着し極めて薄く、腔に面して一般に少数の内皮細胞があり、それを外側から囲んで格子線維網を認める。

従って類洞壁は内皮管と格子線維管より形成される(田中 1950). 内皮細胞は類洞腔に露出してその壁に密着する扁平な暗調核を持つ細胞であるが, 星細胞は腔内に浮ぶ豊富な細胞質と明調で大きい楕円形の核を持つ細胞で, その形は多様であって, 多くはその突起を以て類洞壁に附着する. 類洞の壁に存在する脂肪摂取細胞が類洞内に露出する星細胞及び内皮細胞と形態的機能的に異なることは今日までの研究によって明らかにされた(伊東 1956 a, b). 脂肪摂取細胞が星細胞及び内皮細胞と異なる最も重要な形態学的事項は前者が常に脂肪を持つこと以外に格子線維との位置の関係である. 即ち脂肪摂取細胞は伊東(1951), Ito と Nemoto (1952), 伊東, 札木, 田平(1953)等によれば類洞壁の格子線維で包まれて存在し類洞腔及び肝細胞とは共に格子線維によって隔てられるが, 星細胞及び内皮細胞は格子線維の内側にあり類洞腔に露出する細胞である. この様に脂肪摂取細胞は星細胞及び内皮細胞とは位置的にも異なるが, Niwayama (1954)はこの細胞が星細胞の一状態形であると反論した. これに対し札木, 角田, 新藤(1956)はNiwayamaの説の矛盾を指摘した. 更にこの細胞の発生を観察し, 星細胞と比較検討することは極めて重要である. 既に人胎児(伊東, 田平1955)及び鶏胚(伊東, 根本1955)について研究が行われ, それ等によって脂肪摂取細胞は間葉性の細胞であって胎生初期に既に星細胞とは鑑別される独立した細胞系であることが明らかにされた. 星細胞は細網内皮系に属する細胞としてこれに関する研究は枚挙にいとまがない程多い(田中 1950). 最近, 細胞学的見地からも観察された(Ito と Nemoto 1952, 赤崎 1952). 星細胞は今日多くの学者によって内皮細胞から分化発生した細胞と考えられ(田中 1950), 胎生期に於て内皮細胞より星細胞へ移行する過程が明らかにされた(田中 1950, 伊東, 田平 1955, 伊東, 根本 1955).

胎生期肝臓に出現する脂肪の消長に関しては, 人胎児に於ては報告は少ない. 山口(1924), 橋本(美)(1938), 出田(1954), 伊東, 田平(1955)は胎生初期より末期に至る肝臓の脂肪を形態学的に研究し, 山口(1924)は胎生期諸臓器のCholesterin代謝について報告し, 脂肪は胎児の發育に大なる意義をもつのみならず臓器個々の発生發育に重大な役割をなすと述べた. 家兎胎児に於ける肝臓の脂肪消長については多数の研究があり, Stieve と Kaps(1938)は胎生期より生後に亙り系統的な研究を行っている. 脂肪摂取細胞は成体に於ては常時脂肪を持つ細胞であって, 肝脂肪を論ずる場合にはこの細胞を無視することは不可能である. 然るに今日まで家兎の胎生期の肝脂肪を研究した学者で, この細胞を観察の対象としたものはない. 私は家兎肝臓に於て脂肪摂取細胞の発生並びに生後發育を観察すると共にこの細胞の脂肪の消長をそれと密接な関係を持つ肝細胞の脂肪と比較観察した. 脂肪摂取細胞の持つ脂肪滴は貪喰貯蔵されたものではなく, この細胞によって合成されて貯蔵されたものであることは狩野(1952), 伊東, 田平, 角田(1953), 角田(1955)等の研究によって証明された. 従って胎生期に於てこの細胞の脂肪を観察することによって, その機能状態を知ることが出来る.

a) 胎生 15 日胎児に於ける所見.

胎生 15 日に於ける肝臓は前述の如く肝組織は海綿状構造を呈し, その不規則で広い網眼は類洞である (図 1). 類洞の壁には腔に露出する扁平長楕円形核を持つ内皮細胞が見られるが, 又核が稍大きく類洞腔へ強く突出するものが可成り多く認められる (図 12). 類洞壁の形成に与かる格子線維は未だ發育が悪く, Azan 染色では好染されない. この格子線維の外側にあって肝細胞の間に生ずる凹陷の中に小さい楕円形の核をもつ細胞がある (図 10, 11, 13). この細胞は形態から見て明らかに間葉性細胞で, その位置は成熟家兎に於ける脂肪摂取細胞と一致し, 脂肪摂取細胞はこの細胞から分化するものと思われる. これは先に伊東, 田平 (1955) が人胎児に於て, 伊東, 根本 (1955) が鶏胚に於て観察した所見と全く一致する. 鍍銀標本によりこの細胞の位置を観察すると, 類洞腔及び内皮細胞よりは格子線維により隔てられ, 内皮細胞とは位置的に異ることが判り, 又肝細胞との間にも格子線維が認められる (図 10). これによって見るとこの細胞は格子線維で包まれて存在する. この時期には細胞は小さく細胞

Abb. 10. Fettspeicherungszelle (↑) in der Sinusoidwand, sie ist sowohl vom Sinusoidlumen als auch von den Leberzellen durch Gitterfasern abgeschieden vorhanden. Die Endothelzellen legen sich dem Sinusoidlumen bloß. 15tägiger Kaninchenembryo. ZENKER-Formol, GOMORISCHE Silberimprägnation, Hämatoxylin (HANSEN). 1100×

Abb. 11. Fettspeicherungszellen (↑) in der Sinusoidwand und Sternzellen (St) im Sinusoidlumen, die ersteren führen noch keine Fettröpfchen und die letzteren enthalten dagegen die Kerntrümmer der gefressenen Erythroblasten. 15tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Azan. 1100×

質は少なく, 格子線維と肝細胞の間に挟まれて紡錘形をなす. 核は肝細胞のものより小さいが, 成熟家兎の脂肪摂取細胞の核より大きく楕円形で一般に明るく小さい核小体を 1—数個認める. 細胞質には脂肪滴は存在しない (図 11, 13). 成熟家兎の脂肪摂取細胞が一般に多量の脂肪滴を持つことから見て, この時期には未だ機能の発現がないと見るべきである. 私はこの時期の脂肪摂取細胞に少数ではあるが有糸分裂を認めた (図 12). 有糸分裂の経過中に於てはやゝ腫大円形化し類洞壁と肝細胞の間に境界の明瞭な細胞とし

Abb. 12. Mitotische Kernteilung der Fettspeicherungszelle (↑), darauf liegt eine hypertrophiert ins Sinusoidlumen vorgewölbte Endothelzelle (E). 15tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Eisenhämatoxylin (HEIDENHAIN). 1100×

細胞のものより大きく略楕円形で明るく、核小体を数個もつ。細胞は一般に肥大し円形化して細胞質は淡染し赤芽細胞を貪喰することもあるが、殆んどすべての星細胞の細胞質には Azan 染色で強く赤染し、鉄ヘマトキシリン染色で濃染する粗大球形顆粒が数個存在する(図11, 13)。これは Feulgen 氏核反応陽性である。この時期には前述の如く類洞腔に原始赤芽細胞が稍多数に存在するので、その濃縮した核或は崩壊した核を貪喰したのではないと思われる。星細胞の出現時期及び貪喰能の

発現については人胎児では山口(1937)によれば胎生4—5週で既に血球を貪喰し、形態的機能的に成体の星細胞と同じ程度に發育すると云う。三谷(1935)は2ヶ月に出現すると云い、伊東、田平(1955)は2ヶ月には既に貪喰能が発現するのを観察した。田中(1950)、出田(1954)、名和(1957)等によれば稍遅く3ヶ月に出現すると云う。家兎胎児に於ては記載が少ないが、中井(1936)は妊娠家兎の羊膜内にトリパン青を注射し色素顆粒が星細胞に現われるのを実験的に観察し、胎生15日には星細胞が比較的多量の色素顆粒を摂るのを認め、私の観察した如く血球を貪喰する像も認めている。更に私は類洞壁に存在する内皮細胞の核が大きくなり細胞質も増加して、漸次肥大し類洞腔へ突出するのを認めた(図11, 12)。

て認められる。造血細胞の有糸分裂との鑑別に注意しなければならない。星細胞及び内皮細胞の有糸分裂との鑑別は上記の如き位置的相異があるので容易である。胎生早期に於て脂肪摂取細胞が有糸分裂をなすことは、この細胞が自己の分裂により増殖し、発生初期から一つの細胞系として存在することを意味する。

星細胞は既に此の時期には類洞腔に存在する細胞質に富む比較的大きい細胞として認められる(図11, 13)。類洞壁に附着して存在することもあるが多くの場合は腔内に遊離し、核は内皮

Abb. 13. Fettspeicherungszelle (↑) ohne Fetttröpfchen in der Sinusoidwand und Sternzelle mit gefressenen Kerntrümmer im Sinusoidlumen. Darin finden sich außerdem große primitive Erythroblasten. 15tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Azan. 1100×

かかる細胞の中には屢々細胞質に上記の如き崩壊せる赤芽細胞の核を貪喰し類洞壁より離れて腔内へ遊離せんとするものがある. この様な所見は明らかに内皮細胞から星細胞が分化形成されることを示す. 同様な所見は既に田中 (1950), 伊東, 田平 (1955) により記載された. Maximow (1927) は胎生初期即ち家兎では胎生13—14日, 人では15—30mm 長胎児に於て, 類洞の未分化内皮細胞は活潑な貪喰能を有し, これが肥大して血管腔に突出し, 幼若な血球を貪喰破壊すると記載している. この類洞壁の固有内皮は今日多くの学者により間葉性の細胞 (Pfuhl 1932 参照) であって, 星細胞は此の細胞より分化し, 活潑な貪喰能を現わすと考えられている. 脂肪摂取細胞も星細胞も共に起源は間葉性細胞に求められるが, 星細胞は既に早期に分化して機能を営むに反し, 脂肪摂取細胞は同時期には未分化の状態にあり機能を未だ発現しないことから考えても星細胞と脂肪摂取細胞とは異なる細胞種であって, 独立した細胞系をなすことは明らかである.

肝細胞の脂肪量は2例ともに一般に少なく(表1), 脂肪は小又は中等大の滴として肝実質内に散在性に分布し, 所によっては稍集る傾向が見られる. 脂肪滴は肝細胞内にあるが, 持たない細胞も多い. 人及び哺乳動物の胎生期肝臓に脂肪物質が存在することは橋本(美) (1938) 等により認められているが, 一般に胎生早期より存在するものの如く, 家兎では山口 (1924) は胎生9日に肝細胞に極く少量存在するのを認め, 橋本(美) (1938) は胎生13日に微細な脂肪滴が主として大血管の周囲の肝細胞に豊富に分布すると云い, 又 Stieve と Kaps (1937) は胎生13日に小脂肪滴が肝細胞に均等に分布するのを観察している.

b) 胎生20日胎児に於ける所見.

脂肪摂取細胞. 上述の如く類洞腔は一般に狭く, 原始赤芽細胞及び造血細胞がある. 稍内腔が広く血球の少ない類洞はその壁の観察に適する. 格子線維の外側に接し, 肝細胞間に生ずる凹窩の中に屢々内皮細胞と重って上記の如き脂肪摂取細胞が存在し, 核は稍大きく橢円形で細胞質は明るい(図14). 脂肪滴を持つものは極めて少ないが, その場合には核に近接して1個の小脂肪滴が認められる(図15). 即ち胎生20日にして初めてこの細胞に脂肪が出現する. 伊東と田平 (1955) によれば, 人胎児に於て脂肪摂取細胞に脂肪滴が初めて出現するのは3ヶ月である. 有糸分裂は少数存在する.

Abb. 14. Fettspeicherungszellen (↑) ohne Fetttröpfchen, auf ihren dem Sinusoid zugewandten Flächen liegt eine Endothelzelle. Im Sinusoidlumen findet sich eine Sternzelle mit gefressenen Kerntrümmer (St). Im Leberparenchym sind Anhäufungen der Blutbildungszellen (dunkel) vorhanden. 20tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Azan. 1100×

Abb. 15. Fettspeicherungszone (↑) mit einzigem kleinem Fetttropfen (schwarz), die vom Sinusoidlumen von Gitterfaser abgeschieden ist. Im Leberparenchym findet sich nach dem Sinusoid abgelenkt ein erythropoetischer Herd. Verschiedengroße Fetttropfen (geschwärzt) sind in Leberzellen vorzufinden. 20-tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Azan. 1100×

星細胞は類洞腔にあって幼若な血球の間に認められ、その数は稍増加し、前期と同様に細胞質は淡明で幼若な血球及びその崩壊せる核を貪喰し肥大したものがある(図14)。内皮細胞には屢々核が大きくなり類洞腔へ突出して星細胞へ移行する像も認められる。星細胞及び内皮細胞には少数に有糸分裂が見られた。此の時期には前述の如く肝細胞の有糸分裂は最も多く、肝組織の急速な發育が考えられるが、同時に内皮細胞、星細胞の増殖がある。星細胞は内皮細胞より分化し更に星細胞自身の有糸分裂により増加するものと思われる。

肝細胞の脂肪量は前期より増加し、その量は2例に於て略々等しい。肝組織内に略均等に分布し、肝細胞の類洞に向う細胞質内に多く出現する傾向がある(図15)。脂肪は大滴をなすものは少なく、中等大乃至小滴が大部分である。此の時期に出現する胆管上皮細胞には可なり多くの脂肪滴が存在するが、一般に脂肪滴は小さい。この上皮の形成に与る肝細胞にも中等大乃至小さい脂肪滴を持つものがある。星細胞と内皮細胞には脂肪滴はない。此の時期に肝臓の脂肪量が稍増加することは山口(1924)、StieveとKaps(1937)、橋本(美)(1938)も認めているが、橋本は内皮細胞、星細胞のみならず胆管上皮にも脂肪は存在しないと云う。

c) 胎生25日胎児に於ける所見.

脂肪摂取細胞。肝組織は胎生20日と略同じ構造を示すが、造血細胞の最も多い時期で、類洞壁の觀察は一般に困難である。脂肪摂取細胞は胎生20日と同じ位置と性状を示し、星細胞、内皮細胞とは明らかに鑑別される。胎生20日と同様に脂肪滴を持つ細胞は極めて少ない。細胞質は一般に少なく紡錘形であって、核は稍小さく暗濁で核質が濃染する。細胞は稍小さくなった感がある。かかる形態は成熟家兎の肝小葉中心帯にある脂肪滴を持たない空虚な脂肪摂取細胞に屢々認められるものである。有糸分裂は発見出来なかった。

星細胞と内皮細胞の状態は胎生20日と略等しい。有糸分裂は認められない。

肝細胞の脂肪量は急激に増加し、その量は3例に於て略等しく、肝組織全域に均等に分布する。滴は一般に前期より大きい。大、中、小不揃で、大滴には造血細胞より大なるものがある。肝細胞の中には細胞質が1個の大滴により占められ、核は周辺部へ圧迫されて圧痕を生ずるものが屢々ある。一般に中等大乃至小

滴が細胞質内に不規則に分布する. 胆管上皮には小脂肪滴が存在するが, その量は肝細胞より少ない. 星細胞及び内皮細胞には脂肪滴は存在しない.

d) 胎生28日胎児に於ける所見.

肝組織は胎生25日と略同じ所見を示す. 脂肪摂取細胞は胎生25日と略同じく, 脂肪滴を持つものは少ないが, 小脂肪滴を1—2個持つ細胞が前期より稍増加する(図16). 即ちこの時期に脂肪は稍増加する. 脂肪滴の大きさは肝細胞のものより小さく成熟家兎の脂肪摂取細胞のものと略同大のものもあるが, 一般に稍小さい. 胎生期に於けるこの細胞のもつ脂肪滴の形態は成熟家兎と等しく唯その数が少ないことは, 先に伊東(1956 a, b)がこの細胞の脂肪滴の形態は種に特有であって, 決して個体差がないと述べたことと併せて考えると興味ある所見である.

星細胞は類洞腔に存在する成熟赤血球の間に在って, 細胞質は稍少く, 赤芽細胞及びその崩壊した核を貪喰するものは少ない. 内皮細胞は類洞壁に沿って細長い楕円形の核を持ち, 肥大して類洞腔へ突出する(図16)ものは少な

Abb. 16. Fettspeicherungszelle (↑) mit einem kleinen Fettröpfchen (schwarz) in der Sinusoidwand. Im Leberparenchym und Sinusoid findet man vorwiegend reife Erythrocyten (tief grau), außerdem sind zwei Myelocyten im Leberparenchym zwischen den Erythrocyten wahrzunehmen. An der entgegengesetzten Wand des Sinusoids findet sich eine etwas abgerundete Endothelzelle, die in das Lumen hügelartig vorspringt. Fettröpfchen (tief schwarz) sind auch im Cytoplasma der Leberzellen vorhanden, einige davon sind sehr grob. 28-tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Azan. 1100×

い.

Abb. 17. Verteilung der Fettröpfchen (verschwärzt) in einem Leberläppchen. Leberzellen sind durch verschiedengroße Fettröpfchen ausgefüllt. P Ast des Pfortaders, V V. centralis. 28-tägiger Kaninchenembryo. LEVISches Gemisch, Azan. 250×

肝細胞の脂肪量は全例に於て非常に増加し, 個体差は殆んどなく胎生期を通じて最高量に達する. 小葉内に於ける分布は略均等(図17)で大, 中, 小様々の大きさの脂肪滴が肝細胞を充たし(図7), 核は周辺部へ圧迫されて圧痕を生ずる. Zenker-Formol 固定切片では脂肪滴は溶けて空胞となり, 細胞質は蜂巢様に見える

(図25, 26). 大滴の中には非常に大なるものがある. この時期には前述の如く肝細胞は成体に近い程大きくなる. これは恐らく多量の脂肪によるためであると思われる. 尚グリコゲンも増加があるようである. 安藤(1917)も此の時期の肝細胞が大きくなるのを認め, 細胞内容物即ち脂肪及びグリコゲンの発現によると述べている. 星細胞及び内皮細胞には脂肪滴は認められない. 胎生期に於て星細胞に脂肪が存在するか否かに関して山口(1937)は人胎児に於て妊娠後半期に細胞質内に脂肪空胞が存在することを認めているが, 山口(1924), 橋本(美)(1938), 出田(1954)はいずれも脂肪はないと云う. 更に橋本(美)は家兎に於ても脂肪滴の存在を否定していることは既に述べた. 私は胎生全期を通じ星細胞に脂肪滴の出現を認めない.

肝細胞の脂肪量は家兎胎児では胎生末期に増加することが一般に認められ, 鈴木(1925)は生化学的に測定した結果, 胎生日数の増加と共に肝脂肪量の絶対値及び他の組織成分に対する比率は増加することを認め, 安藤(1917), 山口(1924), 丸山(1927), Stieve と Kaps(1937), 橋本(美)(1938)等は組織学的に観察して脂肪量の増加を認めている. 更に丸山は胎生29日には脂肪量が急激に減少することを述べ, 安藤は分娩時には多量に存在した脂肪滴が減少し或は消失すると述べている. 私は分娩直前の材料が得られなかったので観察出来なかった. 人胎児に於ては脂肪は可なり早期に出現し(Pfuhl 1932), 脂肪量が最高に達する時期は山口(1924), 橋本(美)(1938)は3ヶ月頃, 出田(1954), 伊東と田平(1955)は4ヶ月と記載しているが, いずれも妊娠前半期でその後は減少すると云う. この脂肪の意義について山口(1924)は胎児の發育のみならず臓器個々の發生發育にも重大な役割をなすと云い, 出田(1954)も同様な見解であるが, 家兎では妊娠末期に多量に出現する脂肪は鈴木(1925)の述べた如く, 分娩及び子宮外生活の如き急激な環境の変化に應ずるためのエネルギー源となるべき貯蔵脂肪と考えられる.

e) 娩出直後及び生後5日に

於ける所見.

脂肪摂取細胞は娩出直後に於て各例とも胎生28日と同様脂肪滴を持つものは少なく, 小葉内には1—2個の小脂肪滴を持つ少数の脂肪摂取細胞が散在性に認められるのみで, 脂肪滴を持たない空虚な細胞(図18)が多く, 核は小さくて細胞質は少量である. 生後5日に於ては全例に於て1—2個の脂肪滴を持つ細胞の数は少々増加する. 脂肪滴は暗調な核

Abb. 18. Fettspeicherungszelle (↑) ohne Fetttröpfchen in der Sinusoidwand. Tief schwarze Granula in Leberzellen sind Fetttröpfchen, zwischen den Leberzellen sind Myelocyten (dunkel) auch zu sehen. Kaninchensäugling, am ersten Tage nach der Geburt. LEVISches Gemisch, Azan. 1100×

の周囲に(図19), 或はそれから離れた部分に出現する. 小葉内に於ける脂肪滴をもつ脂肪摂取細胞の分布は略均等である. この細胞の脂肪は胎生20日に初めて現われこの時期に至るまでその量は極めて少ないが, 胎令及び生後日数の増加に伴い, やゝ増加するのがうかがわれる. 併し個々の細胞の持つ脂肪滴の数は余り増加がない. これによって見るに, この細胞の機能の発現は僅微であると思われる.

星細胞の細胞質は一般に少なく, 赤芽細胞及びその崩壊した核を貪喰することもし少なく, 従って胎生初期の如き肥大して旺盛な貪喰をなす像は認められず, 成体の星細胞と略々同じ所見である. 星細胞, 内皮細胞には脂肪滴は存在しない.

肝細胞の脂肪量は胎生28日に比し娩出直後では一般に減少し(表1), A群同腹3頭に於ては著しく減少するが, 個体差があり, 1例(A3)では殆んど消失し, 大小滴が散在性に見られるのみであるが, 1例(A1)に於ては非常に少なく不定部に稍集まり, 1例(A2)に於ては稍多く, 大, 中, 小脂肪滴は小葉周辺部に多く見られる. B群では個体差なく非常に多く, 胎生28日より稍少ない程度で, 大滴が多く, 小葉内に略々平等に分布する. 全例に於て小葉間胆管の上皮には小脂肪滴が存在し, 中には脂肪滴で充満した細胞も見られた.

生後5日に於ては脂肪量に著しい個体差があり(表1), 同腹の例(A群3頭, B群3頭)に於ても可なり差異が認められる. 即ちA1とB1に於ては, 脂肪は非常に少なく, 胎生15日と略等しく, 小葉内に大, 小滴の散在を見るのみである. A2とB2に於ては可なり多く, A3とB3ではそれより稍少ない. いずれも大, 中, 小滴が見られ, 特に大滴の多い例もあるが, 一般に周辺帯に多く, 中心帯には少ない. 全般的に見て, 娩出直後より稍少ないように思われる. 胆管上皮には脂肪滴は殆んど見られない.

娩出直後と生後5日の間は肝細胞の脂肪量に個体差の激しいことが目立つが, 太田(1940)もこれを認めている. StieveとKaps(1937)によれば脂肪量は分娩後急激に減少し, 生後3—4日には更に少なくなると云われるが, 私の成績によればこの両期に於ては生後日数による差異よりも個体による差が可なり著しい. 恐らく新生仔の發育並びに栄養状態特に哺乳能力の差異に基づくものと思われる. このことは生後5日の例に於て娩出直後より個体差が著しいことから想像される. 家兎仔は娩出後直ちに哺乳せず3—4日より初めて哺乳すると云われる. 又吸乳能力には個体差があると思われる. 肝細胞の脂肪量が著しく異なる各例に於

Abb. 19. Fettspeicherungszelle (↑) mit einigen kleinen Fetttropfchen (schwarz) neben dem tief gefärbten Kern. Im Sinusoid finden sich zwei reife Erythrocyten. 5tägiger Kaninchensäugling. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

ても脂肪摂取細胞の脂肪量には殆んど個体差がなく少ないことは未だこの細胞の機能が殆んど営まれていないことを示している。

f) 生後10日と20日に於ける所見.

脂肪摂取細胞. 生後10乃至20日は肝造血は殆んど終息に近く、肝組織も略々完

Abb. 20. Fettspeicherungszelle (↑) mit einigen kleinen Fettröpfchen in der Sinusoidwand. Im hellen Cytoplasma der Leberzellen finden sich Mitochondrien und verhältnismäßig grobe Fettröpfchen (grau). 10tägiger Kaninchensäugling. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

成に近づく時期である。
生後10日には肝細胞の脂肪量の多少に拘らず一般に脂肪滴を2—3個もつ脂肪摂取細胞(図20)が増加し、小葉全域に均等に分布する。脂肪滴も大きさを増し略々成熟家兎のものと等しくなるが、個々の脂肪滴の大きさには多少の差がある。

成に近づく時期である。

生後20日に於ては脂肪滴をもつ細胞の数は増加し、個々の細胞のもつ脂肪滴の数も増加して数個認められるものが多くなる(図21)。即ち脂肪摂取細胞の脂肪量は稍著明に増加する。併しかかる脂肪を持つ細胞の分布は小葉全域に略々均等で特に周辺帯に多いことはない。脂肪滴は核に近接して現われることが多

いが、時に核より離れて、類洞壁に沿い或は肝細胞の間へ延びた細胞質突起の中にも現われることがあり、従って類洞壁に沿って脂肪滴のみが見られることがある。

星細胞は類洞腔に遊離し或は壁に附着して存在し、生後10日には崩壊せる造血細胞の核を貪喰するものが少数に認められるが、生後20日にはかかる所見は殆んどなく、成熟家兎と略同じ形態を示す。この時期の星細胞と内皮細胞には脂肪滴は認められない。

造血細胞に脂肪が存在することを出田(1954)は人胎児の胎生初期に認めている。

即ち肝細胞に脂肪滴が未だ出現しない胎生8週に有核赤血球に微細顆粒状の脂肪を認め

た。又 Stieve と Kaps (1937) は生後3—4日の家兎に於ては中心静脈の血中に脂肪滴が存在するのは稀ではないと述べている。私は上記の如き所見をいずれも確認し得なかった。

肝細胞の脂肪量は生後10日のA群3頭、B群3頭に於ては前期と異り個体差は殆んどなく、一般に可なり多量である(表1)。特にB群では多い。大、中、小の

Abb. 21. Fettspeicherungszelle (↑) mit kleinen Fettröpfchen (schwarz), die Zahl der Fettröpfchen ist beträchtlich zugenommen. Leberzellen führen größere Fettröpfchen (schwarz). 20-tägiger Kaninchensäugling. LEVIsches Gemisch, Azan. 1100×

脂肪滴が存在し特に非常に大きい滴が目立って多いものがある。その量は胎生25日と略同じ程度で、生後5日より稍多い。一般に中心帯には少なく、脂肪滴のない細胞が多い。Stieve と Kaps (1937), 橋本(美)(1938) は家兎に於て肝臓の脂肪量は生後漸次減少すると云うが、太田(1940) は脂肪量には個体差がある以外に生後日数による差異があり、娩出直後には多量の脂肪があるが、生後5—8日に減少し、2週間後再び増加すると述べている。阪野(1931) はマウスに於て生後一旦減少した脂肪量が再び増加するのを観察している。更に太田は哺乳している母家兎に蔗糖を添加した飼料を与えると、仔家兎の肝脂肪量が増加すると云うが、脂肪量が再び増加する理由は述べていない。私は生後10日に脂肪量が一般に増加し、個体差がなくなるのを認めたが、これは母家兎が体力を恢復し、乳汁の分泌も佳良となり、他方仔家兎は分娩後發育して哺乳能力が旺んとなり充分な栄養をとることが出来るようになるためと思われる。かかる点より見てもこの時期の肝細胞の脂肪は胎生期の肝脂肪と共に貯蔵栄養物であると考えられる。

胆管上皮には全例に於て脂肪滴は殆んど証明されない。

生後20日のA群3頭、B群3頭に於ても肝細胞の脂肪量には個体差はなく一般に再び減少し、脂肪滴は小葉周辺帯の肝細胞に局限して出現する。大、中、小の脂肪滴が存在し、大滴が目立つ例もある。

胆管上皮には脂肪滴は証明されない。

この様に肝細胞の脂肪量が減少する時期に一致して上記の如く脂肪摂取細胞に脂肪が増加するのは興味ある所見であり、伊東と根本(1955) は鶏胚に於て孵卵22日に同様な所見を得た。伊東(1956 a, b) は定温動物並びに変温動物の肝細胞と脂肪摂取細胞の脂肪貯蔵機能について述べ、哺乳類に於ては肝細胞は正常な状態では脂肪滴は持たないが、脂肪摂取細胞に脂肪が多く、変温動物の肝細胞には殆んど常に脂肪滴があるが、脂肪摂取細胞には脂肪がないか非常に少ない。この相異は肝細胞の機能的分化の程度の差に基づくもので、高度の機能的分化を遂げた哺乳類の肝細胞に於ては脂肪の貯蔵は許されず、脂肪摂取細胞に脂肪貯蔵の機能的分化が起るが、一方変温動物では肝細胞の機能的分化が低く、肝細胞に脂肪を貯蔵することが許される状態にあり、脂肪摂取細胞には末だ脂肪貯蔵の機能が十分発現しないとの想定に達した。私の観察によれば、胎生期から娩出直後及び生後5乃至10日に互る時期に於ける肝細胞と脂肪摂取細胞との脂肪量の関係は変温動物のそれに類似する。肝細胞の脂肪が減少し、脂肪摂取細胞の脂肪が増加する生後20日の時期に於ては家兎肝臓は恰も変温動物と定温動物の中間或は移行状態にあると思われる。即ち肝細胞に機能的分化が起り、それに伴って脂肪は減少し始め、脂肪摂取細胞に脂肪貯蔵の役割が局限され、この細胞に貯蔵脂肪が増加し始める。生物学的見地より見て家兎の胎生期から生後發育期の肝臓に下等動物の性状が見られることは興味深い。又本研究の所見によって伊東の見解が正鵠を得たものであることが証明された。

g) 生後30日と40日に於ける所見.

この時期には前述の如く肝造血は全く終息し、肝臓は組織学的にも完成し、成体に等しい状態となる。

Abb. 22. Fettspeicherungszelle (↑) mit einer Anzahl kleinen Fettröpfchen (schwarz), sie breiten sich entlang der Sinusoidwand einreihig aus. 30-tägiger Kaninchensäugling. LEVI-sches Gemisch, Azan. 1100×

は更に増加する(図23)が、成熟家兎に比べ脂肪量は少なく、細胞も小さい。周辺帯には稍多数の脂肪滴を持ち肥満したものもあるが、中心帯へ向って脂肪量は減じ脂肪滴を持たない空虚な細胞が多くなる。脂肪滴を持つ細胞に於てもその数は少ない。かゝる分布状態は成体と全く一致する。伊東(1956 a)によれば齧歯類の中で家兎はこの細胞に最も多量に脂肪を貯える動物で、その脂肪形態は略等大の小脂肪滴が核の周囲に多数密

集する型であり、脂肪滴は細胞質突起の中にも拡がり、2つ以上の類洞に達することもあると云われる。私も生後40日に於て小葉周辺帯にある脂肪摂取細胞に屢々同様な像を示すものがあるのを認めた。

生後40日に於てこの細胞は初めて成熟家兎と同じ形態を備え、脂肪量も増加する。従ってこの細胞が機能的にも成熟することが想像される。上記の如く、この時期には肝臓は造血の終息と共に組織学的にも略完成する時期であるが、これと一致して脂肪摂取細胞も形態学的機能的に略完成し稍多量の脂肪を貯蔵するよう

脂肪摂取細胞の脂肪量は生後30日には全例に於て更に増加する。脂肪滴を持つ細胞の数は増加し、その小葉内に於ける分布状態は成熟家兎の如く差異が認められる。周辺帯では脂肪滴を数個持つ細胞(図22)が多く、脂肪滴の大きさには変動はあるが、成体に於ける如き小滴を持つ。中心帯では一般に脂肪滴を持つ細胞は少なく、脂肪滴の数も少なくて1—2個である。脂肪滴は一般に核に接して現われ、核には屢々脂肪滴による圧痕が生ずる。即ち成熟家兎の脂肪摂取細胞に近い像を示すようになる。

生後40日には全例に於てこの細胞の脂肪量

Abb. 23. Fettspeicherungszellen (↑) aus der peripheren Zone des Leberläppchens, sie sind durch stark vermehrte kleine Fettröpfchen ausgefüllt. 40-tägiger Kaninchensäugling. LEVI-sches Gemisch, Azan. 1100×

になる. 又この時期は離乳期と一致することも重要である.

星細胞は成熟家兎と略同じ所見を示し, 造血細胞の核を貪喰する像は認められない. 脂肪摂取細胞に多量に脂肪が存在するこの時期にも星細胞には脂肪滴はない.

肝細胞の脂肪量は生後30日には全例に於て生後20日と略同じ程度であって, 著明な減少はない(表1). B1に於て脂肪は殆んど消失するが, この例には病変が見られたので除外した. 一般に中心帯の肝細胞には脂肪滴は少ない. 脂肪の少ない例では周辺帯に局限する. 以上述べた所で判るように肝細胞から脂肪が減少する場合には常に小葉中心帯より減少し始め, 消失するのは中心帯である. 三宅(1955)は人の新生児に於て肝臓の脂肪は小葉中心帯より減少すると述べ, Stieveと Kaps (1937), 橋本(美)(1938)も家兎の仔に於て同様な成績を得た. 私の成績も彼等と一致するが, 後述する如く肝細胞のグリコゲンの消長はこれと全く反対の経過をとる.

胆管上皮には脂肪滴は証明されない.

生後40日には全例に於て肝細胞の脂肪は殆んど消失する(表1). 極めて少量に見られる例では大小脂肪滴が小葉内に散在性に見られるのみで, 略成体の肝臓の脂肪所見と等しい.

胆管上皮には小脂肪滴が見られる例がある.

生後40日に肝細胞の脂肪は略完全に消失するが, 上記の如く脂肪摂取細胞の脂肪量は逆に略成熟家兎に近づく程に増加することは, 先に論じた伊東(1956 a, b)の見解を裏付ける所見である.

以上の所見から見ると生後40日は家兎の肝臓が胎生期の未熟な状態を脱して, 成熟状態に入る時期と断定される.

h) 生後50日以後に於ける所見.

脂肪摂取細胞. 生後50日には肝臓は成体と同じ組織学的所見を示し, 脂肪摂取細胞も成体と略同じ性状を示すが, 脂肪量は一般に成体より少ない. その量には多少の個体差がある.

生後60日以後は成熟家兎と同じ脂肪量を示し, この細胞は成体と全く同じ形態を示す.

星細胞は成体に於ける如く類洞腔に遊離して存在し, 細胞質は好染し, 屢々その突起を以て類洞壁に附着する. 少数の星細胞は赤血球或は白血球を貪喰する. 星細胞及び内皮細胞には脂肪滴はない.

肝細胞には一般に殆んど脂肪を認めない. 存在する場合にも脂肪滴が散在性に見られるのみである. 成熟家兎に於ても生理的に小葉周辺帯に脂肪が存在する(Pfuhl 1932)のを認める学者もあるが, 生理的と思われる個体にも正常でないものも含まれることがあると思われるので注意を要する.

胆管上皮には脂肪滴は殆んど証明されない.

C. 肝臓のグリコゲンと色素顆粒.

成体の肝臓は諸臓器の中で最も多量にグリコゲンを有し、肝細胞はグリコゲンを合成し貯蔵する細胞と考えられる。胎生期肝臓のグリコゲンの形態学的研究は古来多数の学者により各種脊椎動物について行われ、特に人及び家兎胎児に於ける研究は多い(三谷 1935 参照)。これらの研究を見るに肝臓にグリコゲンの発現する時期及びその後の量的推移等は動物によつて異り、必ずしも一致した見解に達していない。一般に発生初期に於ては肝細胞にグリコゲンは存在せず、胎生末期に増加することは認められている。最近、出田(1954)、伊東と田平(1955)、名和(1957)等は人胎児肝臓のグリコゲン量の胎令増加に伴う推移を組織学的に観察している。Stieve と Kaps (1937) は家兎の胎生期より生後に互る肝臓のグリコゲンと脂肪の量を研究したが、私は更に肝細胞のグリコゲン量の推移のみに止まらず、先に伊東、田平、角田(1953)により証明された脂肪摂取細胞のグリコゲンについても観察を行った。この細胞は糖より脂肪を合成する機能を持ち(伊東 1956 a, b 参照)、グリコゲンはその経過中に出現する中間代謝産物と考えられる。従つて脂肪摂取細胞の発生を観察すると共にそのグリコゲン量を併せて観察することはこの細胞の機能を知るために有意義である。

a) 胎生15日に於ける所見.

この時期は肝細胞の脂肪量も未だ少ない時期である。

肝細胞のグリコゲンは2例に於て少なく、広い腔をもつ類洞の周囲にある肝細胞には比較的多量にグリコゲンが証明され、細胞質に略々均等に彌漫性に分布するが、広い類洞より離れて存在する肝細胞にはグリコゲンは殆んどなく(図24)、グリコゲンを少量に持つ細胞が散在性に少数存在するのみである。

Abb. 24. Glykogengehalt der Leberzellen, er ist verschwindend klein. Der Megakaryocyt enthält dagegen viele Glykogengranula (schwarz). 15tägiger Kaninchenembryo. ZENKER-Formol, PAS-Hämatoxylin (HANSEN).

1100×

星細胞及び内皮細胞にはグリコゲンは殆んど証明されなかった。併し星細胞には貪喰された赤芽細胞の濃縮核のほか、唾液消化耐性 PAS 反応陽性の小顆粒が見られる細胞がある。鉄反応陽性の顆粒は認められない。

造血細胞に於ては、巨核巨大細胞にはグリコゲンは比較的多量に認められ(図24)、細胞質に顆粒状或は輪状をなして散在する。骨髓芽細胞及び赤芽細胞にはグリコゲンはない。

脂肪摂取細胞にはグリコゲンは証明されない。細胞質は極めて弱く

PAS 反応陽性であるが唾液消化耐性である。

肝細胞には唾液消化耐性 PAS 反応陽性顆粒（色素顆粒）は少なく、鉄反応陽性顆粒はない。

肝細胞のグリコゲンは人胎児に於ては比較的早期に出現するようであるが、出現時期について学者の報告は必ずしも一致していない（出田 1954 参照）。最近、伊東と田平（1955）は2ヶ月、出田（1954）、名和（1957）は3ヶ月と報告した。家兎胎児に於て安藤（1917）は胎生25日までは肝細胞にグリコゲンは全く存在しないと述べ、丸山（1927）は胎生20日以前にはなく、胎生25日頃初めて出現すると云い、堀田（1924）は生化学的に測定した結果、胎生17日には肝臓のグリコゲン含有量は殆んど零に近いと報告した。更に Stieve と Kaps（1937）は胎生13日には全く存在せず、胎生17日に痕跡的に出現すると報告した。私は胎生15日にその出現を認めた。

b) 胎生20胎児に於ける所見。

この時期には肝細胞の脂肪量は増加するが、グリコゲンは各例とも殆んど消失し、門脉枝、中心静脈の周辺にある肝細胞にも存在しない。PAS 陽性顆粒は殆んど証明されない。胆管上皮にはグリコゲンはないが、Glisson 氏鞘の結合組織細胞には少量のグリコゲンが存在する。

星細胞、内皮細胞には前期と同様にグリコゲンは証明されない。星細胞には赤芽細胞の濃縮した核並びに唾液消化耐性の PAS 反応陽性顆粒と混じて鉄反応陽性の小顆粒が少数認められる。

巨核巨大細胞のグリコゲンは減少し細胞質に瀰漫性に認められるのみで、その他の造血細胞にはグリコゲンは存在しない。

脂肪摂取細胞にはグリコゲンは前期と同様に証明されない。

胎生初期に肝細胞がグリコゲンを持たない理由に関して、安藤（1917）は肝臓の発育が不完全で未だグリコゲンの形成機能がない為めと考え、木村（1938）は人胎児組織の中で肝臓以外の組織細胞は形態分化が未完成の状態でグリコゲンを多量に持つが、肝細胞は形態及び機能分化が不十分な時はグリコゲンを殆んど持たないと述べている。阿部（1926）は肝臓が他の組織と異りグリコゲンを持たないのは未だ形成機能がない為めではなく、肝臓が胎生初期に異例の発育をなす為めにグリコゲンは使用され、貯蔵する余裕がないと云う。又、三谷（1935）は肝臓のグリコゲンは胎生早期には部位により量的差異を示し、門脉の進入口に近い部分の標本には早期にグリコゲンが証明されると述べた。私の観察の如く胎生15日には広い類洞の周囲のみならず稍離れた部分の肝細胞にもグリコゲンを持つものが既に認められたが、胎生20日に至って消失するのは、個体差によることも考えられるが、肝臓が急速に発育し、造血も旺盛になるためグリコゲンの消費量が増大してこれを貯蔵するに至らない為めではないかと思われる。

c) 胎生25日胎児に於ける所見。

この時期に肝細胞の脂肪は急激に増加し、造血も旺盛である。肝細胞のグリコゲン量は各例ともに胎生15日より稍増加し、グリコゲン分布は肝組織内に略平等である。細胞により量には多少の差はあるがすべての肝細胞に存在し、脂肪空胞の間にある細胞質に平等彌漫性に分布する。その量は成体に比べ遙かに少ない。肝細胞には PAS 反応陽性の顆粒(色素顆粒)が稍増加し、鉄反応陽性の稍粗大な顆粒は周辺帯の肝細胞に比較的多く認められる。

星細胞及び内皮細胞にはグリコゲンは殆んど証明されないが、門脉枝の壁にある内皮細胞及び Glisson 氏鞘の結合組織細胞には稍多量にグリコゲンが認められることがある。胆管上皮にも少量に検出された。星細胞には PAS 陽性顆粒に混じて稍粗大な鉄反応陽性顆粒が存在する。

巨核巨大細胞及び骨髓細胞に少量グリコゲンが認められた。

脂肪摂取細胞にはグリコゲンは殆んど証明されない。核の周囲の細胞質は少なく PAS 反応に極めて弱く陽性に反応するが唾液消化耐性であつて、顆粒状のグリコゲンは殆んど見られない。

肝細胞のグリコゲン量が胎生25日頃に稍増加することは堀田(1924)が生化学的に測定し報告している。三谷(1935)と名和(1957)は人胎児に於て内皮細胞にはグリコゲンが殆んど存在しないと述べ、丸山(1927)も家兎胎児に於て同じ所見を得た。然るに出田(1954)は人胎児に於てグリコゲンが存在するのを認めている。私は類洞壁の内皮細胞には殆んどグリコゲンを認めなかったが、門脉枝の壁の内皮細胞には比較的多量に存在するのを認めた。

d) 胎生28日胎児に於ける所見。

この時期には肝細胞の脂肪量は胎生期を通じて最高に達する。造血は減退し始め、造血細胞は稍減少する。

肝細胞のグリコゲン量は個体差は多少あるが全例に於て増加し、脂肪量と共に胎生期を通じて最高に達する(表1)。

Abb. 25. Glykogenverteilung in einem Leberläppchen; alle Leberzellen enthalten große Menge von Glykogen und Fettvakuolen. P Ast der V. portae. 28tägiger Kaninchenembryo. ZENKER-Formol, PAS-Hämatoxylin (HANSEN). 130×

小葉内分布は略平等である(図25)が、稍量の少ないB群では中心静脉周辺の肝細胞には多いが、小葉の他の部では少ない。肝細胞は大小多数の脂肪空胞により占められ細胞質は少ないが、多量のグリコゲンが集塊となつてその中に密に存在する。B群では胎生期を通じ初めて成体と同様な小葉内グリコゲンの分布に部位的差異が認められた。肝細胞には PAS 陽性顆粒が少数に認められる。鉄反応陽性の稍粗大な顆粒も小葉全域の

肝細胞に散在性に認められ, 一般に PAS 陽性顆粒より多い.

星細胞及び類洞壁の内皮細胞にはグリコゲンは殆んど証明されないが, 星細胞には前期と同様に鉄反応陽性顆粒, 及び PAS 陽性顆粒が混在しその量も略前期と同様である. 此の時期に出現する門脉枝の壁の平滑筋細胞には多量のグリコゲンが認められる.

巨核巨大細胞のグリコゲンは殆んど認められなくなるが, 骨髓細胞には少量認められる. 赤芽細胞にはグリコゲンは証明されない.

脂肪摂取細胞には少量ではあるがグリコゲンが認められる様になる. グリコゲンは少量の細胞質に PAS 反応で淡く紅紫色に染まり, 唾液試験では消失する. 又 1—2 個の脂肪空胞を囲む細胞質に輪状に或は少数顆粒状となってグリコゲンが証明される (図 26). 前述の如くこの時期に脂肪摂取細胞の脂肪量は稍増加するが, 同時にグリコゲン量の増加も認められた.

Abb. 26. Glykogengehalt der Fettspeicherungszelle (↑), das Glykogen tritt als einige kleine Granula (schwarz) neben dem Kern auf. In Leberzellen sind eine große Menge von Glykogen und verschiedengroße Fettvakuolen nachgewiesen. 28tägiger Kaninchenembryo. ZENKER-Formol, PAS-Hämatoxylin (HANSEN). 1100×

胎生末期に肝細胞のグリコゲン量が増加することは安藤 (1917), 丸山 (1927), Stieve と Kaps (1937) 等により組織学的に, 堀田 (1924), 鈴木 (1925) により生化学的に明らかにされた. 私も上記の如く同じ成績を得たが, 肝細胞の脂肪量も此の時期に増加して胎生期と生後を通じて最大量に達する. 既に論じた如く胎生期に於ては脂肪も亦肝細胞の貯蔵栄養物である. この 2 つの貯蔵物が胎生末期に共に増量することは, 鈴木 (1925) が述べた如く, 分娩及び子宮外生活に於ける急激な生活条件の変化及び力源の需要に応ずる為めであろうと思う.

e) 娩出直後及び生後 5 日に於ける所見.

肝細胞のグリコゲン量は娩出直後に於ては各例とも個体差はあるが胎生末期に比し著しく減少する (表 1). 小葉内に於て, 中心帯に少量存在するか, 或はグリコゲンを少量持つ肝細胞が小葉内に散在性に認められるのみで, B1 と B2 に於ては全く消失する. 前述の如く肝細胞の脂肪もこの時期に一般に減少するが, 個体差があり殆んど消失に近いものもあるが, 又可なり多く, 胎生 28 日より減少が著明でないものもある.

生後 5 日に於ける肝細胞のグリコゲン量は略々娩出直後と等しく, 1 例 (A 3) に於て小葉中間帯より中心帯に稍多い (図 27) ものを除き各例とも一般に少ない (表 1). 小葉内にグリコゲンを持つ細胞が散在性に少数認められるに過ぎない.

Abb. 27. Zentrale dichte Verteilung des Glykogens in einem Leberläppchen. P Ast der V. portae, V V. centralis. 5tägiger Kaninchensäugling. ZENKER-Formol, PAS-Hämatoxylin (HANSEN). 130×

肝細胞の脂肪量も前述の如く個体差が強いが全般的に見て娩出直後より稍少ない。

肝細胞には PAS 陽性顆粒に比して鉄反応陽性の顆粒が増加し、個体差はあるが一般に小葉周辺帯に多い。生後 5 日には更に多量になる。前述の如く肝細胞の黄色色素顆粒が急に増加し、粗大なものが多く、生後 5 日には更に粗大な顆粒が増加するの

が、ヘマトキシリン-エオジン標本でも見られるが、これ等の中 PAS 陽性のものは所謂リボフスチン顆粒であって、鉄反応陽性のものは粗大顆粒である。

星細胞及び内皮細胞にはグリコゲンは認められない。星細胞には PAS 陽性顆粒は比較的少量存在するが、鉄反応陽性顆粒は少なく、生後 5 日に於ても少量存在するのみである。

骨髄細胞はこの時期に増加があることは前述の如くであるが、グリコゲンがかなり多量認められる。グリコゲンは細胞質に顆粒状或は輪状をなして存在する。

巨核巨大細胞にはグリコゲンは殆んどない。

脂肪摂取細胞のグリコゲン量は前期に比し少なく、顆粒状をなすグリコゲンは殆んど認められず、脂肪空胞を囲む細胞質は PAS 反応で淡く染まるのみである。

肝細胞のグリコゲン量が娩出直後から生後 5 日に互って急激に減少するのは、この物質が子宮外生活の栄養源として消費されるためである。家兔仔は生後 2—3 日は殆んど哺乳しないとされている。家兔に於て分娩後仔の肝臓のグリコゲン量が減少する (堀田 1924, 鈴木 1925, 丸山 1927) と云われ、鈴木 of 生化学的研究によれば分娩直後から生後数時間に消費されるグリコゲン量は胎生末期に貯えられた量の 79% に達すると云う。一方 Stieve と Kaps (1937) は分娩後に於て肝臓のグリコゲン量には特に変化がなく脂肪量が激減すると云う。これ等の所見の相異は個体差に基づくものの如く思われる。私の所見によっても、脂肪とグリコゲンの減少は個体によって異り、グリコゲンが強く減少する個体と脂肪が強く減少する個体がある。例えば娩出直後例の B 群の中にはグリコゲンが殆んど消失するのに脂肪量が多い例がある。又生後 5 日例の A3 ではグリコゲンが比較的多いのに脂肪は殆んど消失している (表 1)。分娩後に肝臓のグリコゲンが消費されるか、脂肪が消費されるかは、その個体の条件によるものと思われる。

小葉内に於けるグリコゲン分布について、丸山 (1927)、太田 (1940) は家兔仔、三宅 (1950) は人の新生児について観察し、共に小葉中心帯に多く分布すると報

告した。私も生後5日に於てグリコゲン量の比較的多い例 A3 に於て同様な所見を得たが、人及び家兎の成体に於ても同様であって前述の如く脂肪の分布とは反対である。

f) 生後10日と20日に於ける所見.

肝細胞のグリコゲン量はこの時期には一般に増加し、個体差はあるが、小葉中心帯には各例とも認められ、多量な例では小葉全域に分布する。その場合にも特に中心帯には多い。即ち上に述べた所と一致する。多少の差はあるが肝細胞内に弥漫性且つ平等に分布する。

肝細胞には前期と反対に PAS 陽性顆粒の方が多く、鉄反応陽性顆粒は少なくなり、生後10日には尚小葉周辺帯には認められるが、生後20日には殆んど消失する。この所見は前述したヘマトキシリン-エオジン標本に於て、生後10日乃至20日には粗大な色素顆粒が減少するという所見と一致する。即ちこの粗大な色素顆粒は大部分鉄顆粒である。

星細胞及び内皮細胞にはグリコゲンは証明されない。星細胞には PAS 陽性顆粒はあるが、鉄反応陽性顆粒は認められない。

前述の如くこの時期に肝臓の造血機能は殆んど終息し、造血細胞は少なくなり、グリコゲンは骨髓細胞に少量認められるのみである。

脂肪摂取細胞のグリコゲン量は一般に少ない。脂肪空胞を2—3個もつ細胞では、脂肪空胞を囲み輪状に或は顆粒状にグリコゲンが検出される。併し多くの細胞では脂肪空胞を囲む細胞質が弱く反応を示すに過ぎない。

胎生期肝臓に鉄顆粒が存在することは知られている (Pfuhl 1932) が、人胎児では妊娠末期に増加する (井上 1931) と云われ、その分布は小葉周辺帯の肝細胞に多いと報告された (三宅, 寺坂, 山下 1955)。私の所見では家兎に於て肝細胞の鉄顆粒は胎生期には少なく、娩出直後より増加し、生後5日に最も多くなり、生後10日には減少し始め、生後20日には殆んど消失に近い程少なくなる。人では鉄顆粒は生後1年間に亘って存在し、鉄含有量に乏しい母乳を摂る間は、この鉄は造血に使われる (Pfuhl 1932) と云われる。星細胞の鉄顆粒は胎生期、生後を通じて量的変化は殆んどなく、一般に少なく、生後20日に肝細胞と同時に殆んど消失する。肝臓から鉄顆粒が消失する時期は恰も肝臓の造血が殆んど終息する時期と一致する。胎生20乃至25日から星細胞と肝細胞に出現する鉄顆粒が肝造血と関連を持つことは疑いを容れない。それが肝細胞に多くなる時期は肝造血が衰退する時期で、恐らく赤芽細胞の崩壊が強い時であろう。

g) 生後30日と40日に於ける所見.

肝細胞のグリコゲン量は個体差なく成熟家兎と同じ程度に増加し、小葉全域に略平等に分布する (図28)。個々の細胞により量の差はあるが、一般にグリコゲン塊として細胞内に存在する。

肝細胞には鉄顆粒は殆んど消失し、PAS 反応陽性顆粒が少数に認められる。

Abb. 28. Glykogenverteilung in einem Leberläppchen. V V. centralis, G GLISSONSche Scheide. 40tägiger Kaninchensäugling. ZENKER-Formol, PAS-Hämatoxylin (HANSEN). 130×

明される。中心帯には脂肪滴をもつ細胞は殆んどなく、グリコゲンも少ない。

生後40日に於ては前述の如く脂肪摂取細胞の脂肪量は増加して成熟家兎に近づき、脂肪滴は多数の脂肪空胞として認められるが、かゝる細胞のグリコゲン量は多く、脂肪空胞を囲み輪状に、或は核周囲の細胞質及び細胞の周辺部、脂肪空胞の間の少量の細胞質内に顆粒状にグリコゲンが証明される(図29, 30)。即ち脂肪量に伴いグリコゲン量も成体に近く増加する。脂肪滴を持つ細胞は成体

星細胞、内皮細胞にはグリコゲンは証明されない。顆粒性白血球には少量のグリコゲンを持つものが見られた。星細胞には鉄顆粒は認められないが、PAS 陽性顆粒は少数存在する。

脂肪摂取細胞のグリコゲン量は生後30日には稍増加し、特に周辺帯の脂肪滴を持つ細胞では少数の脂肪空胞を包む細胞質が一様に弱い反応を示すこともあるが、屢々空胞を囲んで輪状或は顆粒状のグリコゲンが証

Abb. 29. Glykogengehalt der Fettspeicherungszelle (↑), Glykogengranula (dunkel) verteilen sich zwischen den Fettvakuolen (hell) im Cytoplasma. Leberzellen sind reich an Glykogen. 40tägiger Kaninchensäugling. ZENKER-Formol, PAS-Hämatoxylin (HANSEN). 1100×

Abb. 30. Glykogen der Fettspeicherungszelle, die Erklärung wie bei der Abb. 29

の如く小葉周辺帯から中間帯に多くグリコゲン量も多いが、中心帯には空虚な細胞があって、グリコゲンは殆んど証明されない。

この時期は前述の如く肝臓が組織学的に完成する時期であるが、肝細胞の脂肪は略消失し、上記の如くグリコゲンは増加し、この時期以後は家兎肝臓の貯蔵物質は成体と同様にグリコゲンのみとなる。脂肪摂取細胞の脂肪量もグリコゲン量も成体に近い。以上によ

って家兎肝臓は生後40日には機能的にも略完成することが判る.

h) 生後50日以後に於ける所見.

肝細胞のグリコゲン量は個体差はあるが, 一般に多量で成熟家兎と等しく, その量的な変動は特に飼料摂取と関係があり, 生後50日以後の肝細胞のグリコゲン量の多寡は全くこれに因るものと思われる.

星細胞と内皮細胞の所見は生後30日と40日の所見と等しい.

脂肪摂取細胞のグリコゲン量は一般に増加するが, 伊東, 田平, 角田(1953)の報告の如く個体差がある.

III. 総 括.

胎生15日より胎生末期に至る家兎胎児及び娩出直後より生後150日に互る幼若家兎の肝臓の脂肪摂取細胞の発生を観察し, その起源をたしかめ, 更に機能発現の時期を追求した.

肝組織の一般発生及び生後発育についても同時にしらべ, 又, 脂肪摂取細胞と鑑別を要する星細胞の発生を比較観察し, 更に肝組織に於ける造血, 及び肝細胞の脂肪, グリコゲン等の発育に伴う変化を併せて観察した. 主な成績を総括すれば次の如くである.

1. 胎生15日には肝細胞の集塊は不規則な粗網状の配列をなし, 肝組織は全体として海綿状構造を示す. その網眼は広い不規則形の類洞である. 胎生20日には海綿状構造は消失するが, 所々に広い腔を持つ血管の断面が見える. 肝細胞索は網状に不規則に配列し, その網眼を占める類洞は狭い. 胎生期に於ては肝細胞索は数列に集塊状に並ぶ肝細胞より成り, 太く不規則に分岐吻合する. 娩出後も略同じ状態であるが, 生後10日には肝細胞索は細くなり1—2列に並ぶ肝細胞により形成され, 生後30—40日に至って成体と等しく中心静脈を中心に放射状の配列が明瞭となる.

2. 毛細胆管は胎生15日から既に認められるが管腔は広く, 数個の肝細胞がそれを囲み放射状に配列して管状腺の構造を示す. 胎令の進むに従い毛細胆管を囲む肝細胞の数は減少して3—4個となり, 娩出後も略同じ状態であるが, 肝細胞索が1—2列に並ぶ肝細胞で形成されるようになる生後10日には成体に於ける如く2—3個の肝細胞により囲まれる.

3. 門脉枝, 中心静脈及び胆管は胎生20日に識別可能となる. 即ちこの時期に認められる広い腔を持つ血管の中には少量の結合組織で囲まれるものがある. 結合組織は Glisson 氏鞘であり, 血管は門脉枝である. Glisson 氏鞘の中で肝実質に接して胆管の発生を見る. 結合組織を欠き直接肝細胞索に接するものは中心静脈である. 胎生28日には Glisson 氏鞘の結合組織は増加し, その中に肝動脈枝と思われる細い血管の断面が現われる.

4. 肝小葉は胎生25日に大約見分けられ, 胎生28日には略形成されるが成体に

比して小さく、胎生期及び生後初期に於て門脉枝及び中心静脈の分岐増殖があり、それ等が小葉内へ侵入し、小葉は更に増加するので不安定な状態にあり、完成したとは云い難い。生後30—40日に到って初めて完成し、成体と同じ大きさと構造を示す。この時期は離乳の時期と略一致する。

5. 胎生20日に Glisson 氏鞘内に出現する胆管は低い単層上皮で囲まれ、その管壁の1部は肝細胞索によって形成され、又、上皮内に肝細胞を混じ、更に肝細胞が次第に胆管上皮細胞へ移行する所見がある。これ等の事実は肝細胞から胆管上皮が分化形成されることを暗示する。併し胆管上皮細胞自身にも有糸分裂が見られた。かくの如き肝細胞索からの胆管形成はその後も見られるが胎生28日には1時停止するようである。併し出生後に於ても分岐増殖する門脉枝を囲む結合組織の中に同様な胆管形成が再び認められるが、生後30—40日に於て肝小葉の完成と共に胆管形成も終息する。

6. 肝造血は胎生15日には既に行われるが、造血細胞の数は余り多くない。その大多数は赤芽細胞であって、主として肝実質内に於て肝細胞の間に存在し、類洞内に在るものは少ない。胎生20日には赤血球造血は最も旺盛になり、種々の發育段階にある赤芽細胞が極めて多数に見られ、有糸分裂数も最高に達する。又無核の成熟赤血球が初めて認められ、類洞内に多く存在する。胎生25日には有糸分裂は少なくなるが、赤芽細胞の数は最も多い。胎生28日には赤芽細胞の数も分裂も減少し、赤血球造血は退行し始める。生後10日には急激に衰え、生後20日には赤血球造血は殆んど終息し、生後30—40日には赤芽細胞は肝組織より全く消失する。

胎生15日には類洞内に可成り多くの原始赤芽細胞が見られるが、20日には減少し、25日には全く消失してその後は現われない。

7. 胎生15日には未だ殆んど骨髓細胞の出現を見ないが、胎生20日に好酸性の顆粒をもつ骨髓細胞が極めて少数出現し、胎生25日には増加して成熟型も見られる。その後漸次増加し肝実質内或は Glisson 氏鞘の結合組織にも存在する。生後5日には骨髓細胞は著明に増加し有糸分裂が屢々認められる。その後減少して生後30—40日には全く消失する。

8. 上記の如く肝造血に於ては造血細胞は多く肝実質内即ち肝細胞間に存在し、造血は主として肝細胞間で行われることを示すが、類洞内へ出て、そこで分裂し成熟するものもある。肝造血に於ては赤血球造血が先行し、数に於ても著しく優勢である。顆粒性白血球の造血は数に於ても著しく少なく、赤血球造血の衰退する胎生末期より生後5日に最も旺盛になり、その後衰退する。赤血球造血も顆粒球造血もその終息は時を同じくする。

9. 巨核巨大細胞は胎生15日に既に肝細胞間に少数存在する。胎生20日には細胞は大きくなり、数も胎生25日まで増加する。その後減少の傾向なく、生後に於ても5日まで減少せず多極分裂も見出されるが、生後10日には減少し、生後20

日に到って他の造血細胞よりも早く消失する.

10. 脂肪摂取細胞は胎生15日に於て肝臓の類洞壁の形成に与る格子線維の外側で肝細胞の間に生ずる凹陷の中に小さい楕円形の核をもつ間葉性の小細胞として発生する. この細胞の位置は成熟家兎の脂肪摂取細胞と一致し, 脂肪摂取細胞はこの細胞より分化するものと思われる.

11. 胎生期には脂肪摂取細胞は小さく, 細胞質は少ないが, 核は比較的大きく明かるい. 胎生15—20日には少数の有糸分裂像が見られる.

12. 脂肪摂取細胞の脂肪は胎生20日に初めて出現するが, その量は極めて少なく小脂肪滴を1個もつ細胞が少数存在するのみである. 胎生末期より娩出後に互り胎令及び生後日数の増加に伴い脂肪量は稍増加するが, 個々の細胞のもつ脂肪滴の数はあまり増加せず, 脂肪滴を持つ細胞が増加する. 従ってこの細胞の機能は胎生期及び生後直後には甚だ微弱である. 生後10日には脂肪量は増加し個々の細胞のもつ脂肪滴の数も増加する. 生後20日には稍著明な増加があり, 脂肪滴をもつ細胞の数は増加し, 又個々の細胞のもつ脂肪滴の数も増加するが, かかる脂肪滴をもつ脂肪摂取細胞の分布は小葉内に略均等である. 生後30日には脂肪量は更に増加し, 多数の小脂肪滴をもつ細胞が現われ, 又かかる脂肪滴を多数にもつ細胞の小葉内分布は成体の如く中間帯と周辺部に限られる. 生後40日に到って初めて成熟家兎と同じ状態を備え, 脂肪量も増加し機能的にも成熟したことを暗示する. この生後30—40日の時期は肝造血が終息し肝臓が組織学的に完成する時期であり, 又肝細胞から脂肪が成体に於ける如く略消失する時期であり, 離乳期に当る. この時期に肝臓の脂肪合成能と貯蔵能は肝細胞から脂肪摂取細胞へ移ることは重要である.

胎生期及び生後に於ける幼若家兎の脂肪摂取細胞の脂肪形態は成熟家兎と一致し, 唯小脂肪滴の数が少ないのみである.

13. 脂肪摂取細胞のグリコゲンは脂肪滴を持つ細胞が少ない胎生期には殆んど証明されない. 娩出後に於ても少量であるが, 脂肪量が増加する生後30日には稍増加し, 生後40日に到って成体に近い程度に増加し, 脂肪空胞の間を占める原形質内に証明される.

14. 星細胞は胎生15日に既に類洞腔内に細胞質に富む細胞として認められ, 旺盛な貪喰能を示す. 即ち原始赤芽細胞及び赤芽細胞とそれらの崩壊せる核を貪喰し肥大したものが多い. かゝる所見は胎生期を通じて認められるが, 胎令の進むに従い貪喰能を示す細胞は少なくなり, 生後20日には成体に於けると同じ状態となる. 類洞の内皮細胞の中には胎生15—20日に既に肥大して類洞腔へ突隆し星細胞と同じ貪喰像を示し, 星細胞へ移行する像が屢々認められた. 星細胞, 内皮細胞には胎生15—20日に有糸分裂が認められた.

星細胞, 内皮細胞には胎生期及び生後に互り脂肪は出現しない. 又グリコゲンも殆んど証明されない.

以上によって星細胞は胎生初期に既に機能を開始し、位置的にも機能的にも脂肪摂取細胞と異なる細胞であることが判る。

15. 肝細胞の脂肪は胎生15日に既に出現するが、量は極めて少ない。胎令の進むに従い増加し種々の大きさの脂肪滴が出現し、胎生28日にはその量は最高に達し、肝細胞は脂肪滴で充満する。娩出後は1時減少するが個体差が著しい。生後10日には再び増加が見られるが、生後20日には減少する。この時期に一致して脂肪摂取細胞の脂肪量は増加する。生後30日には尚お略同じ量の脂肪が見られるが、生後40日に来て肝細胞の脂肪は殆んど消失し、成熟家兎の状態となる。上述の如くこれと同時に脂肪摂取細胞の脂肪量は略成熟家兎に近い程度に増加する。

16. 肝細胞のグリコゲンは胎生15日には既に証明されるが、その量は少なく、胎生20日には1時消失する。その後漸次増加し胎生28日には胎生期を通じその量は脂肪量と共に最高となる。これは分娩時及び生後に於ける急激な生活条件の変動に対応する為めと思われる。娩出後は脂肪量と共に著しく減少するが、これは分娩時及び生活条件の変動に當って消費された為であろう。グリコゲンは生後10日には増加し始め、生後30—40日には成体量に達する。

以上によって見るに脂肪とグリコゲンは家兎に於ては胎生期及び生後30日までの間は共に肝細胞の貯蔵栄養物であるが、脂肪の消失する生後40日以後は肝細胞の貯蔵物質は成体と同様グリコゲンのみとなる。

17. 造血細胞には脂肪滴は証明されなかった。グリコゲンは巨核巨大細胞に胎生15日に可なり多量認められた。又骨髓細胞には娩出直後乃至生後5日にグリコゲンが稍多量に認められた。これは成熟した *heterophile Leukocyten* に主として存在するものと思われる。

18. 肝細胞のPAS陽性顆粒は胎生15日から少数存在し、胎生期及び生後を通じてその量には著しい変動はない。これは恐らくリボフスチン顆粒である。鉄顆粒(ヘモジデリン顆粒)は胎生期には少なく娩出直後より増加し生後5日には最も多いが、生後20日に殆んど消失する。星細胞には胎生15日より貪喰された赤芽細胞の核と共にPAS陽性の小顆粒が混在する。鉄顆粒は胎生20日に認められるが、その後その量には時期による著しい変動はなく、肝造血が略終息する生後20日には肝細胞、星細胞から消失する。鉄顆粒は恐らく赤芽細胞の持つヘモグロビンに由来するものと思われる。

IV. 結 語.

家兎に於て肝小葉の増加が停止し、小葉が成体と略同じ大きさに發育し、實質内の造血が終息して肝臓が組織学的に完成するのは生後30—40日である。

肝細胞のグリコゲンと脂肪は胎生末期にその量は最大となるが、分娩直後には共に減少し、脂肪は生後40日には殆んど消失するが、グリコゲンはその後再び増加して生後30—40日には成体量に達する。グリコゲンと脂肪は胎生期より生後初

期には共に肝細胞の貯蔵物質であるが, 肝臓が形態学的に完成する生後40日以後は成体と同様肝細胞の貯蔵物質はグリコゲンのみとなり, 脂肪は専ら脂肪摂取細胞に貯えられるに到る.

脂肪摂取細胞は類洞壁の間葉性細胞より発生し, 胎生期より成体に於ける如き位置と形態を持つが, 胎生全期に亘ってその脂肪量は極めて少ない. 即ちその機能は極めて微弱であると思われる. 生後10日より増加が明らかとなり, 生後20日には著明に増加し, 肝細胞の脂肪が減少し消失する生後30—40日には略成体と等しい量に達し, その分布も成体と等しくなる. 生後40日には脂肪摂取細胞の機能も旺盛となり, 肝臓の脂肪合成能と貯蔵能は肝細胞より全く脂肪摂取細胞へ移る. この時期は肝臓が組織学的に完成する時期と一致し, 又離乳期とも一致する. 胎生期及び幼若家兎の脂肪摂取細胞の脂肪形態は成熟家兎と等しい. 即ち小脂肪滴を多数に持つ型であって, 唯その数が少ないだけである. グリコゲンは脂肪量と平行して増加する.

星細胞は胎生初期より脂肪摂取細胞とは識別され, 胎生初期より旺盛な貪喰能を現わすが, 脂肪もグリコゲンも殆んど出現しない. これによって脂肪摂取細胞と星細胞とは形態学的機能的に異なる細胞系であることが証明される.

胎生期の肝造血に於ては赤血球造血が先行し, 赤芽細胞は数に於ても圧倒的に優勢である. 赤血球造血は胎生20—25日に最も旺盛となり, 胎生末期に於ても終息せず, 生後漸次衰退して, 肝臓が組織学的に完成する生後30—40日に終息する. 顆粒球造血はおくれて始まり, 骨髓細胞の数も少なく, 赤血球造血の衰退する胎生末期より生後初期(5日)に最も旺盛となるが, その終息は赤血球造血と時を同じくする. 巨核巨大細胞は胎生25日まで増加し, その後減少しないが, 生後10日には減少し, 20日には全く消失する. 肝臓に於て造血の行われる場所は実質内即ち肝細胞の間であって, 造血細胞の中には類洞内へ出て, そこで分裂成熟するものも少なくない. 顆粒球造血は Glisson 氏鞘内にも見られる.

その他胆管の肝細胞索よりの形成, 肝細胞及び星細胞に出現するリポフスチン顆粒及び鉄顆粒についても観察した.

稿を終るに臨み, 終始御懇篤なる御指導と御校閲を賜った恩師伊東教授に衷心から感謝の意を表します.

Autoreferat.

Bei über 15 Tage alten Kaninchenembryonen und postnatalen jüngeren Kaninchen wurden die Genese und embryonale und postnatale Entwicklung der Fettspeicherungszellen im Vergleich mit denen der Sternzellen verfolgt, gleichzeitig wurden die Entwicklung des Lebergewebes, die intrahepatische Blutbildung und der Fett- sowie Glykogengehalt der Leberzellen beobachtet.

1. Am 15. Fetaltage zeichnet sich das Leberparenchym durch eine spongiöse Struktur aus; die Leberzellenmassen stellen eine grobmaschige netzartige Anordnung dar, die weiten Netzmaschen enthalten unregelmäßig geformte Sinusoide. Am 20.

Fetaltage verschwindet aber diese spongiöse Struktur des Lebergewebes, doch treten hie und da die Blutgefäße mit weiten Lichtungen auf. Die Leberzellenstränge, welche in der Embryonalzeit aus in mehreren Reihen angeordneten Leberzellen zusammengesetzt dick und miteinander anastomosiert sind, bilden ein unregelmäßiges Netz, dessen Maschen durch enge Sinusoide eingenommen sind. Am 10. Postnaltage werden die Leberstränge dünner, da sie nun aus in 1 oder 2 Reihen angeordneten Leberzellen bestehen, wie es auch bei ausgewachsenen Kaninchen der Fall ist und am 30. bis 40. Postnaltage nehmen sie eine im großen und ganzen von der V. centralis nach der Peripherie des Leberläppchens gerichtete Radiäranordnung an.

2. Die Gallenkapillaren kommen schon am 15. Fetaltage vor, sie sind aber verhältnismäßig weit und von vielen Leberzellen umgeben, wie es auch bei der tubulären Drüse der Fall ist. Mit der fortschreitenden fetalen und postnatalen Entwicklung nimmt die Zahl der je eine Gallenkapillare umgebenden Leberzellen ab und erst nach dem 10. Postnaltage sind die Gallenkapillaren wie bei ausgewachsenen Kaninchen von 2 oder 3 Leberzellen umgeben.

3. Die Unterscheidung der Pfortaderäste, Vv. centrales und Gallengänge werden am 20. Fetaltage möglich. Unter den Blutgefäßen mit weiten unregelmäßig geformten Lichtungen sind die Pfortaderäste von minimalem Bindegewebe umgeben, das nichts anders als die GLISSONsche Scheide vertritt. In dieser GLISSONsche Scheide sind die Gallengänge, die sich am Leberparenchym anschmiegen, vorzufinden. Die Vv. centrales entbehren der Bindegewebsscheide. Die Leberzellenstränge gehen unmittelbar von ihrer Wand aus. Am 28. Fetaltage kommt in der nun merklich an Menge zugenommenen GLISSONschen Scheide das anscheinlich als Ast der A. hepatica angesehene Gefäß zutage.

4. Am 25. bis 28. Embryontage werden die Konfigurationen der Leberläppchen im großen und ganzen unterschieden, doch setzen sich die Verästelung und Proliferation der Pfortader und Vv. centrales nicht nur in der Fetalzeit sondern auch in der frühen Postnatalzeit fort und die auf diese Weise neu gebildeten Blutgefäße dringen in Leberläppchen ein, und teilen diese weiter in kleinere ein. Daher findet die endgültige Ausbildung der Leberläppchen erst am 30. bis 40. Tage nach der Geburt statt. Diese Periode der Ausbildung des Lebergewebes entspricht überhaupt der Entlaktationszeit des Kaninchensäuglings.

5. Die Gallengänge, welche am 20. Fetaltage im Bindegewebe der GLISSONschen Scheide zutage kommen, sind von einem einschichtigen niedrigen Epithel bekleidet, das in einem direkten Zusammenhang mit dem Leberzellenstrang steht. Im Gallengangsepithel kommen nicht selten Leberzellen einzeln oder in kleiner Gruppe vor, welche morphologische Zeichen des Übergangs zu den Gallengangsepithelzellen darbieten. Diese Befunde sprechen davon, daß die Gallengangsepithelzellen von Leberzellen abstammen dürften, obwohl die mitotischen Teilungen an den Gallengangsepithelzellen selbst selten aufgefunden werden können. Diese Gallengangsbildung wird während der Fetal- und Postnatalzeit durchlaufend bestätigt, sie hört erst am 30. bis 40. Tage nach der Geburt gleichzeitig mit der vollkommenen Ausbildung der Leberläppchen auf.

6. Blutzellenbildung im Lebergewebe wird schon am 15. Fetaltage gefunden ;

die blutbildenden Zellen sind zum größten Teil Erythroblasten, sie sind im Leberparenchym zwischen den Leberzellen vorhanden, um sich mitotisch zu teilen und nach und nach zu reifen, sie können auch in beträchtlicher Zahl in Sinusoiden vorgefunden werden. Am 20. bis 25. Fetaltage erreicht die Erythropoese im Lebergewebe den höchsten Punkt, und kernlose Erythrocyten kommen allgemein in Sinusoiden auf. Am 28. Fetaltage fängt die Abschwächung der Erythropoese an und am 10. Tage nach der Geburt nehmen die Erythroblasten auffallend ab, sodaß die Erythropoese am 20. Tage nach der Geburt fast vollkommen aufhört. Die primitiven Erythroblasten werden bis zum 20. Tage der Fetalzeit mehr oder weniger in Sinusoiden aufgefunden, nach dem 25. Fetaltage verschwinden sie aber spurlos.

7. Myelocyten treten erst am 20. Fetaltage zwischen den Erythroblastenanhäufungen in sehr kleiner Zahl auf, sie haben am 25. Fetaltage etwas zugenommen und begleiten reife Formen. Danach nehmen sie weiter an Zahl zu und außer dem Leberparenchym finden sie sich auch im Bindegewebe der GLISSONschen Scheide. Die Granulopoese ist am 5. Tage nach der Geburt am lebhaftesten, doch ist die Zahl der Myelocyten im Vergleich mit der der Erythroblasten verschwindend klein. Nach dem 5. Tage nehmen die Myelocyten allmählich ab, bis sie am 30. bis 40. Tage vom Lebergewebe vollkommen verschwinden. Aus obigen Ergebnissen geht hervor, daß bei der Blutzellenbildung in der Leber die Erythropoese der Granulopoese vorangeht und die letztere an Menge in hohem Masse überwiegt.

8. Bei der intrahepatischen Hämatopoese kommen die Megakaryocyten in beträchtlicher Zahl vor, sie werden schon am 15. Fetaltage in kleiner Zahl vorgefunden, nehmen bis zum 25. Tage an Zahl zu und zeigen sogar am 5. Tage nach der Geburt keine Neigung zur Abnahme. Erst am 10. Tage nach der Geburt vermindern sie sich und verschwinden am 20. Tage, also früher als andere Blutbildungszellen.

9. Die Fettspeicherungszellen erweisen sich am 15. Fetaltage als kleine mesenchymale Zellen mit ovalen Kernen innerhalb der Sinusoidwand, welche sich zwischen den Gitterfasern der Sinusoidwand und den Leberzellen und zwar in den Einbuchtungen zwischen den letzteren lokalisieren. Diese Lokalisation stimmt mit derselben der Fettspeicherungszellen in der ausgewachsenen Kaninchenleber überein. An diesen jungen Fettspeicherungszellen werden mitotische Teilungen am 15. bis 20. Fetaltage selten vorgefunden.

Die Fettspeicherungszellen der ausgewachsenen Kaninchen führen im allgemeinen viele kleine Fettröpfchen. In embryonalen Fettspeicherungszellen tritt das Fett am 20. Fetaltage zum ersten Mal auf, aber man findet zu dieser Zeit Fettspeicherungszellen mit einem einzigen kleinen Fettröpfchen nur in geringer Zahl vor. Während der Fetal- und der früheren postnatalen Zeit steigt der Fettgehalt der Fettspeicherungszellen nicht so deutlich an. Dies deutet darauf hin, daß die Tätigkeit der Fettspeicherungszellen in diesen Entwicklungsstadien noch nicht merklich zum Vorschein kommt. Am 20. Tage nach der Geburt hat der Fettgehalt der Fettspeicherungszellen beträchtlich zugenommen, so vermehren sich fetthaltige Fettspeicherungszellen und die Zahl der einzelne Fettspeicherungszellen enthaltenden kleinen Fettröpfchen. Am 30. bis 40. Tage nach der Geburt werden der Fettgehalt

und die Verteilung der fetthaltigen Fettspeicherungszellen im Leberläppchen ganz gleich wie bei den ausgewachsenen Kaninchen; die viele kleine Fettröpfchen führenden Fettspeicherungszellen verteilen sich hauptsächlich in der peripheren und intermediären Zone des Leberläppchens. Auf Grund der erwähnten Ergebnisse kann man schließen, daß in diesen Stadien die Fettspeicherungszellen sich funktionell und morphologisch vollkommen ausbilden. Es ergibt sich also, daß in denjenigen Stadien die intrahepatische Hämatopoese aufhört, das Lebergewebe sich histologisch völlig ausbildet und die Fetttropfen der Leberzellen nahezu vollkommen verschwinden. Die Annahme ist also wahrscheinlich, daß in diesen Stadien der Entwicklung die Tätigkeit der Fettsynthese und Fettspeicherung von Leberzellen zu Fettspeicherungszellen übergeht.

Die Fettröpfchen in Fettspeicherungszellen behalten ihre dem Kaninchen eigene morphologische Beschaffenheiten sogar im unreifen Zustand bei.

Der Glykogengehalt der Fettspeicherungszellen steigt parallel mit der Zunahme des Fettgehaltes an.

10. Die Sternzellen erweisen sich schon am 15. Fetaltage als cytoplasmareiche Zellen innerhalb der Sinusoidlichtung, welche eine lebhaft phagocytierende Tätigkeit entfalten. Sie enthalten häufig Kerne der gefressenen Erythroblasten. Es wurde nachgewiesen, daß die Sternzellen sich von den Endothelzellen der Sinusoidwand durch Anreicherung des Cytoplasma allmählich differenziert haben. Weder in den Sternzellen noch in den Endothelzellen werden das Glykogen und Fett die ganze Fetal- und Postnatalzeit hindurch nachgewiesen. Auf Grund der obigen Ergebnisse unterliegt es keinem Zweifel, daß die Fettspeicherungszellen und die Sternzellen nach der Zeit des Eintritts der Funktion, bezüglich der Lokalisation und den Beschaffenheiten der Funktion voneinander ganz verschiedene Zellarten vertreten.

11. Embryonale Leberzellen enthalten schon am 15. Fetaltage eine kleine Menge von Fettröpfchen. Mit den fortschreitenden Fetaltagen nimmt der Fettgehalt nach und nach zu, um am 28. Fetaltage das Maximum zu erreichen; in diesem Stadium sind die Leberzellen durch verschiedengroße Fettröpfchen ausgefüllt. Unmittelbar nach der Geburt sinkt der Fettgehalt der Leberzellen plötzlich auffallend herab, während er am 10. Tage nach der Geburt wieder eine Zunahme zeigt. Nach dem 20. Postnataltage nimmt er fortwährend ab und am 40. Tage nach der Geburt verschwinden die Fettröpfchen von den Leberzellen fast spurlos, wie es auch bei den Leberzellen der ausgewachsenen Kaninchen der Fall ist. Am 20. bis 40. Postnataltage, wenn der Fettgehalt der Leberzellen herabsteigt oder verschwindend klein wird, nimmt der Fettgehalt der Fettspeicherungszellen, wie oben angegeben, deutlich zu.

12. Das Glykogen wird ebenso am 15. Fetaltage nur in sehr kleiner Menge in den Leberzellen nachgewiesen, und am 28. Fetaltage erreicht der Glykogengehalt der Leberzellen wie der Fettgehalt das Maximum. Dieser auffallend große Fett- und Glykogengehalt der Leberzellen im Endstadium der Schwangerschaft sind als Aufbewahrung der Nährstoffe anzusehen, welche in der Zeit der stark veränderten Lebensbedingungen bei und nach der Geburt aufgebraucht werden sollen. Unmittelbar nach der Geburt sinkt der Glykogengehalt der Leberzellen gleich wie der Fettgehalt vorübergehend plötzlich ab, doch steigt er wieder nach dem 10. Postnatal-

tage an und erreicht am 30. bis 40. Tage die gleiche Menge wie bei den ausgewachsenen Kaninchen.

Das Fett und Glykogen repräsentieren während des ganzen Fetallebens und bis auf den 30. Tage nach der Geburt die Reservennährstoffe der Leberzellen, während nach dem 30. Tage, wenn das Fett von Leberzellen nahezu vollkommen verschwindet, allein das Glykogen sich als der einzige Reservestoff der Leberzellen erweist. Von dieser Zeit an wird das Fett aber anstatt in den Leberzellen ausschließlich in den Fettspeicherungszellen aufbewahrt.

13. In den blutbildenden Zellen wurden die Fettröpfchen niemals nachgewiesen. Am 15. Fetaltage führten die Megakaryocyten reichliches Glykogen. Auch reife Leukocyten innerhalb des granulopoetischen Herdes enthielten öfters das Glykogen.

14. Die PAS-positiven Lipofuszingranula kommen schon am 15. Fetaltage in Leberzellen vor, welche die ganze Fetalzeit hindurch und nach der Geburt an Menge kaum schwanken. Positive Eisenreaktion zeigende Granula sind in embryonalen Leberzellen im allgemeinen gering, sie vermehren sich aber unmittelbar nach der Geburt plötzlich und erreichen am 5. Postnaltage die maximale Menge, sie verschwinden von den Leberzellen am 20. Postnaltage fast vollkommen. In Sternzellen wurden die ganze Versuchsperiode hindurch die Lipofuszingranula nachgewiesen. Die Eisengranula wurden vom 20. Fetaltage an nahezu in einer konstanten Menge vorgefunden, während sie am 20. Postnaltage gleichzeitig mit denjenigen in den Leberzellen verschwinden.

Dieser Termin entspricht der Zeit, wenn die Hämatopoese in der Leber aufhört. Die Annahme ist also treffend, daß die Eisengranula in Leber- und Sternzellen wahrscheinlich von Hämoglobin der Erythroblasten abstammen.

文 献.

- 阿部脩三郎: 人胎芽に於けるグリコーゲンの顕微化学的研究知見補遺. 愛知医会誌. 33 (1926). 頁 851—893. — 赤崎兼義: 細網内皮系統とその腫瘍. 日病会誌. 41 (1952). 頁 1—26. — 安藤画一: 哺乳獸及人の胎盤並に胎児に於ける糖原質の分布. 近畿婦会誌. 5 (1917). 頁 1—117. — 安東洪治, 田嶋嘉雄: 動物実験法. 初版. 東京, 朝倉書店, 1956. — Clara, M.: Entwicklungsgeschichte des Menschen. 4 Aufl. Quelle u. Meyer. 1949. S. 369—373. — Elias, H.: The early embryology of the liver of vertebrates. Anat. Anz. 101 (1955). S. 153—167. — 橋本 寛: 肝内造血竈消退に関する研究. I. 大阪医会誌. 37 (1938). 頁 1907—1912. — 橋本美智雄: 肝臓発生期に於ける肝細胞脂肪沈着の消長. 東京医事新誌. 62 (1938). 頁 2204—2208. — 平島正義: 正常家兎の發育学的研究. 成医会誌. 56 (1937). 頁 2385—2423. — 堀田四郎: 胎生期間の含水炭素代謝に就て. 日婦会誌. 19 (1924). 頁 893—993. — 井上進: 鉄代謝に関する生物学的研究. I. 人胎児並に初生児の肝臓及び脾臓に於ける鉄含有量に就て. 近畿婦会誌. 14 (1931). 頁 461—489. — 伊東俊夫: 人のクップエル氏星細胞と肝毛細管壁に見られる脂肪摂取細胞の研究. 解剖誌. 26 (1951). 頁 42. — 肝臓の脂肪摂取細胞の研究. 解剖誌. 31 (1956 a). 頁 10—15. — 肝臓の脂肪摂取細胞. 基礎医学最近の進歩. 解剖-病理篇. 東京. 医歯薬出版. 1956 b. 頁 503—554. — Ito, T. u. M. Nemoto: Über die Kupfferschen Sternzellen und die Fettspeicherungszellen (fat-storing cells) in der Blutkapillarenwand der menschlichen Leber. Fol. anat. jap. 24 (1952). S. 243—258. — 伊東俊夫, 札木照一朗, 狩野好一郎, 塚越 昇: 諸種脊椎動物の肝臓に於ける所謂脂肪摂取細胞の研究. 日組録. 3

(1952). 頁 239—254. — 伊東俊夫, 札木照一朗, 田平礼三: 肝「脂肪摂取細胞」と格子線維との関係に就て. 日組録, 5 (1953). 頁 477—484. — 伊東俊夫, 田平礼三, 角田公男: 正常家兔の肝「脂肪摂取細胞」に於けるグリコーゲンの出現に就いて. 日組録, 5 (1953). 頁 541—554. — 伊東俊夫, 田平礼三: 人胎児の肝臓の脂肪摂取細胞について. 解剖誌, 30 (1955). 総会号, 頁 49. — 伊東俊夫, 根本万次: 鶏胚の肝臓の脂肪摂取細胞について. 解剖誌, 30 (1955). 総会号, 頁 61. — 出田艶子: 人胎児肝組織の発生学的研究. 日組録, 6 (1954). 頁 619—636. — 狩野好一郎: インシュリン葡萄糖注射の肝「脂肪摂取細胞」に及ぼす影響に就て. 日組録, 4 (1952). 頁 13—24. — 加藤勝治: 血球の分化と新一元論. 医学の進歩, 第4集. 南条書店, 1947. 頁 1—80. 木村哲二: 動物体内グリコーゲンの発現分布と其生物学的意義. 成医会誌, 57 (1938). 頁 365—379. — Lacassagne, A.: Etats des organes sanguiformateurs pendant les jours qui précèdent et qui suivent la naissance chez le lapin. C. R. Ass. Anat. 18 (1923). P. 267. (Maximow 1927 引用). — Lipp, W.: Die frühe Strukturentwicklung des Leberparenchyms bei Menschen. Z. mikr. -anat. Forsch. 59 (1952). S. 161—186. — 丸山一郎: 胎生及初生両期に於ける肝糖原質の研究. (第一回報告). 岡山医会誌, 39 (1927). 頁 998—1011. — Maximow, A.: Bindegewebe und blutbildende Gewebe. Möllendorffs Handbuch d. mikr. Anat. des Menschen. Bd. 2, Tl. 1. 1927. S. 477—481. — 三谷 茂: 胎生及び新産両期に於ける肝糖原質の消長. 日婦会誌, 30 (1935). 頁 1691—1718, 1860—1886, 2020—2052. — 三宅清平: 胎生, 新生両期肝臓の糖原質, 脂肪, 鉄, 銅の顕微化学的検索. 日産婦誌, 7 (1955). 頁 178—179. — 三宅清平, 寺下亮利, 山下裕基: 胎児肝臓糖原質, 鉄及銅の組織化学的検索. 臨床産科婦人科 9 (1955). 頁 831—836. — Mollier, S.: Die Blutbildung in der embryonalen Leber des Menschen und der Säugetiere. Arch. mikr. Anat. 74 (1909). S. 474—524. — 中井義重: 家兔胎児肝臓実質の發育分化と生体色素摂取状態に就て. 解剖誌, 8 (1936). 頁 941—955. — 名和祐郎: 人胎児肝に於ける核酸, グリコーゲン, アルカリ性フォスファターゼの組織化学的研究. 日産婦誌, 9 (1957). 頁 1—10. — Niwayama, G.: Fatty degeneration of so-called stellate cell. Acta Med. et Biol. 2 (1954). P. 649—674. — 太田定一: 肝臓の生後發育期に於ける肝細胞内貯蔵物質の消長並に之に及ぼす母獸食餌の影響. 中央医学, 9 (1940). 頁 1048—1053. — Otto, G. u. G. Politzer: Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 4 Aufl. Springer-Verlag, 1953. S. 67—68. — Pfuhl, W.: Die Leber. Möllendorffs Handbuch d. mikr. Anat. des Menschen. Bd. 5, Tl. 2. 1932. S. 237—238. — Prentis, W.C. and L. B. Arey: A laboratory manual and text-book of embryology. 3. ed. Saunders Co., 1920. P. 176—179. — 阪野於菟: マウス肝臓の組織学的並に組織発生学的研究. 解剖誌, 4 (1931). 頁 119—156. — 札木照一朗, 角田公男, 新藤勝巳: 静脈へ注入された脂肪乳剤に対するモルモットの肝細胞, 星細胞及び脂肪摂取細胞の態度に就いて. 日組録, 9 (1956). 頁 517—548. — Stieve, H. u. U. Kaps: Fett und Glykogen in der Leber von Nagerkeimlingen und Jungtieren. Z. mikr. -anat. Forsch. 42 (1937). S. 499—510. — 鈴木甚吉: 胎生初生両期に於ける肝臓の生化学的研究. 慶応医学, 5 (1925). 頁 1677—1785. — 高橋嘉幸, 大屋正夫, 新藤勝巳: 蛙の肝臓の糸粒体, グリコーゲン量及び脂肪量の季節的变化の形態学的研究, 並に脂肪摂取細胞について. 日組録, 12 (1957). 頁 87—126. — 田中壮介: Kupffer 氏星細胞の本態に関する研究. 新潟医会誌, 64 (1950). 頁 472—485. — 角田公男: 人の肝脂肪摂取細胞のグリコーゲンに就いて. 日組録, 7 (1955). 頁 563—571. — 渡辺行正: 蛇の諸臓器に於ける糖原の季節的变化. 日病会誌, 30 (1940). 頁 131—135. — 山口正道: 生体内に於けるコレステリン新陳代謝の研究. III. 人類及び諸種動物に於ける個体発生に基ける類脂肪に就て. 北越医会誌, 39 (1924). 頁 281—340. — 山口峰市: 日本人胎児肝臓の星芒細胞並びに其の比較実験的研究. 長崎医会誌, 15 (1937). 頁 1733—1799.