大阪大学医学部, 第1解剖学教室 (主任: 高木教授).
1st Dept. of Anat., Med. School, Osaka Univ. (Director: Prof. K. TAKAGI).

肝細胞と酵素阻害剤.*

Cytological Study on the Changes of Liver Cells when Enzyme-inhibiter injected.

嶋田 豊春 Toyoharu SHIMADA.

〔昭和29年8月5日原稿受付〕

1913年 Otto Warburg が細胞内に於ける呼吸酵素系の観察に始まる酵素学の研究は, 近年急速に進歩し, 細胞内にて行われる合成及分解, 即ち物質代謝は細胞内に存在する無数の酵素系によって行われ, かゝる酵素系が細胞内の如何なる構造と関係するかは学者の興味を集めるに至った. かくて *cyclophrasse system* の研究が盛んとなり, 脂肪酸や T. C. A. cycle の酸化に干渉する酵素系がミトコンドリア (以下ミトと略す) に含まれていることが相次いで証明せられ (Stern, 1939; Claude, 1941; Hogeboom, 1948; Lehninger と Kennedy, 1948; Schneider と Potter, 1949; Harman, 1950), ミトが従来の如き形態学的観念の外に, 機能的な意義を持つに至った. 茲に於いて我が教室ではこれらの事情に鑑み, 新たな観点からミトが肝細胞機能に如何に干渉するかを, 酵素学, 形態学両面から追及しようと企てられるに至った. 予はその第一歩として酵素の作用を阻害する物質を動物に与え, 之が肝細胞の物質代謝に及ぼす影響を細胞形態学の立場から詳細に観察し, 之とその時のミトの形態変化とを比較しようと試みたのが本研究の端緒である. かくて予は阻害剤として streptomycin (以下 S. M. と略す) を選んだ. 蓋し S. M. は Umbreit (1949) と Smith (1949) が生菌に於いて, 将又 Umbreit (1949) が動物の肝, 腎及び脳に於いて, 焦性ブドウ酸とオキサロ酢酸の縮合を阻害することを明かにしたもので, 殊にトリカルボン酸系阻害剤のなかで, その基始部を阻害する唯一のものであるとされている点に興味を覚えたのである.

I. 研究方法.

実験動物は体重約 100 g の健康成熟ラッテを使用した. 先ず実験に当っては金網製の飼育箱の中で一定期間訓練し, その後1週間に亘り1日1回

* 本論文の要旨は昭和28年5月, 第58回日本解剖学会総会昭和29年5月, 第59回日本解剖学総会に於いて発表した.

30分を限り3栄養素、ビタミン塩類を適当に混和して調製した人工基本食を与えることに馴らし、最終給食から24時間を経たものについて注射した。而して観察に当っては、1. 絶食群、2. 給食群に大別し、後者を更に人工食又は豚脂投与と同時にもの及び3時間後のものに細別した。なお所見の正確を期する為め各群について対照を設けた。因みに人工食群は上記の人工食1塊約10gを30分間与えたものであり、豚脂群は日本薬局方豚脂1gを温め、金属性ゾンデで胃内に注入したものである。また注射に用いたS. M. は Merck 製であって、之を注射用蒸溜水で溶かし、1ccの中に行要の量を含むが如く調製した。その使用量はkg 当り、一は少量として0.02g (normaldosis, 即ち N. D. と略記し、人体 50kg に対する1日1gより算出したもの)、他は大量として1g (50× と略記する) を用い、必要に応じてその中間量 0.2g (10×)、0.5g (25×) 及び N. D. の $\frac{1}{2}$ 量、即ち 0.01g の3種を追加した。又注射部位はラットの背部皮下を選んだ。以上の如く処理したのち夫々30分、1、3、6 及び12時間後にエーテル麻酔の下に開腹し、一定の肝葉から取材した。

なお大量の S. M. を使用しうる限度を決定するため、先ず予備実験として次の各種の量を使用した。然るところ6g では8分、4g で23分、3g では44分、2.5g では1時間45分、2g では2時間55分にて何れも斃死した。然るに1g、即ち N. D. の50倍では格別の異常を認めず、よく長期の観察に耐えうるを以て、之を大量として用いることにした。

1. 一般構造. 固定: Zenker 氏液, formalin 液. 染色: hematoxylin-eosin.
2. マイトコンドリア. 固定: Levi 氏液, Kolster 氏液. 染色: Heidenhain 氏鉄 hematoxylin.
3. 脂肪. 固定: 10% formalin 液. 染色: scarlet red.
4. 核酸. 固定: Carnoy 氏液, Zenker 氏液. 染色: pyronin-methyl green.
5. 糖原. 固定: Carnoy 氏液. 染色: Best 氏 carmin 液.
6. 核. 固定: 10% formalin, Carnoy 液. 染色: hematoxylin-eosin, Feulgen 氏反応, acetocarmin.

II. 自家所見

A. 絶食群

ラットを24時間空腹とした時には北山(1944)、安藤(1951)がすでに明かにした如く、肝脂質及び糖原は甚だ稀で、ミトも細い糸状乃至桿状を呈し、細胞構造の動きは殆んどみられない。換言すれば細胞内に存する諸酵素は平衡状態にあるものと考えられる。いまこの状態にある時 S. M.

を注射すれば、肝細胞構造に如何なる変動を与えるかを究めんとしたのが本実験である。

a) 原形質の所見.

1. 糖原 (図 1).

24時間乃至36時間空腹にした対照では、通常肝細胞に糖原を見ることは極めて稀である。然るに S. M. を注射したものでは小量ではあるが、糖原が出現する。先ず N. D. では注射 3 時間後に少数の細胞に僅少の糖原が現

図 1. 肝糖原, 絶食動物に S. M. 注射後.

----- N. D., ----- 50x.

われ、6 時間ではその細胞数が増加し、小葉全域に点在する。然し12時間には減少し、僅かに末梢部にみられるのみとなる。また50×でも糖原が現われるが、この時には前例より早く1時間で小葉末梢部に、而して

3 時間で殆んど全域に散在性に認められる。その後稍々減少するが、12 時間にも N. D. のそれを上回る。この様に S. M. を注射すると糖原が一定時期を劃して肝細胞に現われる。而してその糖原量は S. M. の使用量に関係なく一様に小量ではあるが、大量注射では小量注射に比して早く現われ且つ減少が緩慢である。従ってこの糖原出現は S. M. の影響によることは疑を容れない。次に糖原は N. D. では一般に小顆粒で、殊に末梢部では微小顆粒状を呈し、而も之が凝塊を形成している (附図 1)。但し各れも血管側に偏在している。なお50×でも同様に小顆粒であるが、最高を示す3 時間では屢々微小糖原粒が集って半月状或は輪状をなして核をとり巻くが如き状態を示している (附図 2)。

2. 脂質.

対照例に於いては空腹36時間に至り始めて脂肪の小顆粒が小葉末梢部に認められたが、注射例ではその量の如何をとわず全然見られない。又対照の Levi 標本では osmophil lipid は殆んど現れず、注射例も亦同一の所見を呈する。但し星細胞に一時的に出現するのをみた。

3. R. N. A.

24時間空腹時の R. N. A. は濃染し塊状で均等性分布を示している。N. D. でも対照と大差を認めないが、糖原空胞を有するものは網状を呈する。之に反し50×では附図3の如く種々なる様相を示す。しかし之らを通覧するに、R. N. A. は核の周囲に濃縮する傾向があり、これは核の変化と並行してみられ、恐らくは後述する暗調細胞への道程に一致するものと想像される(a—c)。又糖原を有する細胞の R. N. A. は糖原空胞の周辺に集合し、空胞の多いものは網状を呈する。更に注目を引くのは胞体の一部に不定形塊状のものが明視層によって囲まれるもの(d)、またかゝる明視層のない円形状のもの(e)が認められることで、之らは後述する如く、前者はミトの集団化したもの、後者はヘマトキシリンに黒染する球状物でないかと考える。

4. 微細構造.

空腹1昼夜の対照を見るに、細胞像は極めて単調で、ミトは小葉周辺部に於いてさえ主として細い糸状乃至桿状で機能的表現に甚だ乏しく、僅かに血管側に少数の顆粒を認める程度である。然るに S. M. を注射すると、ミトは使用量によつて左右される変化を蒙む。以下主として小葉中間部の所見に就いて述べる。

i. N. D. (限図4).

ミトは稍々肥原の傾向を示すが、その形は対照と大差がない。但し空胞を有する細胞に於いては顆粒状をみることがある。なお小葉最外層をなす所謂 endcells のミトは他の細胞と異なり早期に顆粒化を示し、速かに旧に複する。

ii. 1.0× (附図5).

ミトは齊しく美麗な糸状体で時間的の動きはみられない。然し核の大きい細胞では稀に細い糸状体で埋つている。尚注射後6時間では毛細胆管部を囲む明視部が拡大しているものがあり、又この毛細胆管に向つて短桿状のミトが集っているものが認められる。endcells のミトはこの注射量では早くから粗大な長糸状を呈し且つ増数し、N. D. より長期に亘り変化がみられた。

iii. 25× (附図6, 7).

早くも1時間でミトは増数すると共に粗大となり、而も集簇を作る兆が現われる。他方毛細胆管は拡大する。かゝる変化は3時間後には更に著明に現われるが(附図6)、6時間では集簇は消失してミトの大きさも減じ、毛細胆管部では広き明視部又はミトの集簇形成が認められ、複旧の傾向が現

われる(附図7). Endcells では3時間後に異型顆粒が出現する.

iv. 50×(附図8—12.)

注目すべきは細胞構造の多様なことで、暗調細胞乃至暗細胞、大形の糖原空胞を有する細胞とこれらの移行型が挙げられ、之をミトの面より追及すれば、形質両面の特筆すべき変化が認められる. 特にこの時初めて細胞内にヘマトキシリンに黒染する球状物乃至顆粒団塊をみた. いま時間を追って変化のあとを辿るに、先ず注射後1時間頃に現われるミトの変化として腫大したコマ状、撥形及び滴状が見られる(附図8). この細胞は小葉末梢部に多く、殊に最外層の endcells に著明であって、核の肥大に比し細胞が狭小なものに於いてこの傾向が強い. しかも微細乃至小空胞を蔵している. この時期の中間部細胞では細い短桿状の糸状体が増数し、集簇形成の兆を示している. 3時間後では小葉全域に暗細胞が孤立性又は集団をなして出現し、それに至る各種の移行型が現われる(附図9). 即ちミトは細い長糸状のまゝ集って集簇を形成し、濃染した原形質と識別が屢々困難となり胞体は著しく暗調を呈する. この外核の濃縮が相前後して認められる. かゝる暗調細胞更にそれが嵩じたと思われる暗細胞のほか、縮れた長糸状ミトで胞体が埋っている細胞及び少々太い短桿状、糸状形のミトが糖原空胞の間にみられる細胞等異った諸構造像が入り混っている. 以上の如く糖原を有する細胞を除くものに於いてはミトの変化は特異的と考えられ、6時間後にもみられるが、12時間では殆んど現われない. 他面6時間以降に於いては太い長糸状形のミトを有する細胞群が増加する(附図10). この細胞の外に hematoxylin にて黒染する球状物を有するものがある(附図11). 後者は概ね類円形で通常1個があるが、その大きさに内部構造は種々で、大は核を凌駕し(附図12)小と雖も核の大約 $\frac{1}{2}$ の大きさを有する. また全体が暗黒色を呈し内部構造の不明なものもあるが、中には粗大顆粒又は長短糸状体の集団よりなるものもある、そのほか周囲に明量の如き巾の広い明視帯を有するものと全然之を具えないものがある. 然しこれらは成立的に一連の關係を持っている事は幾多の中間型より明かで、その形成過程を多数の標本から推測すると、先ずミトが集合し次いで肥厚し、または膨化して粗大顆粒となり、これが間質と共に濃染して出来た特殊構造物と思われる.

b) 核の所見.

1. 核の変性(表1).

N. D. では肝細胞核は明るく且つ肥大している. 然し星細胞核には濃縮

表 1. 核 変 性.

対 照	肝 細 胞	星 細 胞
N. D.	1 h	多 多
	3 h	
	6 h	
	12 h	
50×	1 h	3
	3 h	4
	6 h	27
	12 h	

備考: 細胞数 5000個を算えた.

2. 核の直径.

対照では直径 $6.5-7.5\mu$ が大部を占めている. 然るに N. D. では注射後から急に大きさを増し, $7.5-9\mu$ となる. しかも 10.5μ の大核が散見され, 12時間でも旧にかえられない. $10\times$ では N. D. と殆んど同一の傾向を示すが, 曲線は巾狭く且つ高くなり, $25\times$ では愈々中央に集り, $8-8.5\mu$ が集中的に増加する. 然るに $50\times$ では N. D. 類似の肥大核が現れる反面, $5.5-7\mu$ の比較的小核が出現する. 但し後者は変性像への移行を思わせる.

3. 2 核細胞 (表 2).

苛性カリと醋酸で処理した acetocarmin 染色標本に於いて細胞核 500 を算し, その%を見るに, 対照では概ね17%であるが, N. D. では3時間以降21%と僅かに増加し, $50\times$ では注射後から30%前後に増加し, 6時間で減少を示している.

4. 核小体数 (表 3).

対照例は 1—2 個がその大半を占めているに反し, 各使用量共に 1 個のも

のは激減し, 3 個以上が増数する. この傾向は概して量に示行している. 而して核小体の増加は注射後から起り, 12時間後でも殆んど複帰しない. 以上の核小体増数の外増大又は変性が $50\times$ で屢々見られた.

5. 分裂像.

全例に於いて認めなかった.

小 括.

肝細胞物質代謝の極めて緩徐な又は休止に近いと考えられる絶食時に

が多数みられる. 尚この変化は注射後1乃至3時間に於いて已に現われた. これより量が増えると肝細胞核に変性が現われ, 特に $50\times$ では1時間から少数に, 而して6時間後には細胞数5000個に対し27個を算する. 次に変性像としては (Feulgen染色及び pylonin-methyl green 染色) 核膜肥厚及至歪曲, 核壁染色質增多症, 濃縮を挙げることが出来る.

表 2. 2 核細胞 (%)

	1 h	3 h	6 h	12 h
対照	17.0	17.2	17.4	17.2
N. D.	17.0	21.8	21.0	21.0
$50\times$	29.2	30.2	26.0	20.0

表 3. 核小体を持つ細胞 (%).

		核 小 体 数				
		1	2	3	4	5以上
		55	38	5	2	
N. D.	1 h	10	28	35	24	3
	3 h	10	39	37	11	3
	6 h	12	42	31	14	1
	12 h	12	50	28	10	
10×	1 h	23	41	29	7	
	3 h	25	36	34	5	
	6 h	10	37	38	14	3
	12 h	17	47	26	10	
25×	1 h	13	26	43	14	4
	3 h	4	31	34	21	12
	6 h	9	35	36	15	5
	12 h	5	41	43	11	
50×	1 h	12	38	34	24	2
	3 h	3	27	48	19	3
	6 h	5	29	37	22	7
	12 h	11	23	48	14	4

S. M. を注射すると, N. D. 及び10×では少数の細胞に糖原が現れる程度であるに反し, 核の変化は比較的著明で, 12時間でも末だ旧にかえられない. 剩え星細胞核の変性がみられた. この事実は S. M. が原形質よりもむしろ核に与える影響がより大であることを物語っている. 然るに25×になるとミトは太くなり, 而も隣接のものが互に粘着して集簇を形成する傾向が現われ, 同時に毛細胆管も幾分広くなる. 一方には核の変化も著しい. かゝる所見は対照には全く見ないところで, 余は之を以つて S. M. による毒作用の初兆でないと考える. その証拠として50×を注射したものではミトの膨大は更に顕著で, コンマ状, 撥形, 球状等の異型の外縮れた繊細な糸状体がみられ,

また暗調細胞に至る一連のミト融合及び黒染構造物の出現など, ミトは甚だ多様な変形像を現わし, 毒作用が相当強度なるを思はしめる. 而してこれらが注射後1乃至3時間で顕著に現われることは, 多くの人が報告している S. M. の血中濃度と一致している. 茲に注目を引くのは注射後6時間頃になると, 毛細胆管が広くなり, 且つ之を囲む明視部が増大することと, またこの部のミトが毛細胆管を中心として集簇を形成すること等で, これ等は毒作用の恢復と胆汁との関係を暗示しているのでなかろうか. 予はこの観点に立って取材毎に小腸内容を検べたが, 注射後時間が経つにつれて腸内容の胆汁による色調が強くなることは予の想像をある程度立証している. 尚ここで一言すべきは50×にみられた特殊黒染物である. このものはその起原を肥厚したミトに求むべきは上に述べたが, 予は之を以て暗調細胞乃至暗細胞と共に毒作用の強い現われと考えたい.

以上は細胞原形質の所見であるが, 核にも大小不同, 2核細胞の激増, 核小体の増加のほか大量では核壁染色質増多症及び濃縮等の変性像が現われ, 核の受ける変化も原形質に劣らぬものあるを知った. 而もこれら核の変化は小量注射では原形質変化より早く現われ, 25×で初めて原形質に著

明の変化を見る。かくて50×では核原形質共に著明に変化をうけるが、この程度の S. M. 量ではラッテは尚よく之に耐えうることが明かとなり、今後の実験を進める上に有益なる示唆を与えた。

B. 給食群.

前項に於いて空腹時に注射した S. M. は N. D. にて已に或る程度の異変を肝細胞に起すことを明かにした。しかしこれは物質代謝の極めて緩徐な時期に於ける使用であるため、ミトの酵素的作用を測知するのに甚だ不適當で、寧ろ S. M. の毒作用の追究に役立った。茲に於いて肝細胞の物質代謝が旺んに行われているとき、換言すれば諸酵素の活動状態にあるときに S. M. を使用することこそ予の目的達成に合していると考え以下の実験を行った。

1. 給食と同時に注射.

給食すると肝細胞ミトは急激に太くなり、次第に顆粒化する。一方細胞内には脂質及び糖原が相次いで現われ、3—6 時間で略々その極に達する。即ち給食によって細胞内の諸酵素は時を移さず活潑化するものと考え。この活性化の初期に S. M. を作用せしめ、その後現れてくる糖原、脂質の消長とミトとの相関性をみるのが本実験の目的である。

a) 原形質の所見.

1. 糖原 (図2).

対照では給食すると間もなく小葉末梢部に糖原が現われ、急速に中心部に向って増量し、6 時間後には全域に充満する。然るにその後末梢部から

図2. 肝糖原, 給食と同時に S. M. 注射後.

—— 対照, - - - - N. D., 50×.

減少し、12時間でその大半が消失する。この食後に現われる糖原の増量は給食と同時に S. M. を注射した場合にも見られるが、6 時間後にて中等量で止まり、対照より低い。これまでは S. M. の

使用量による差異は認められないが、12時間後になると小量注射では明かな減少を示すに反し、大量注射では6時間後と大差がない。他方糖原顆粒は対照にみる如き桑実状を示さず、不定形塊状をなして carmin に染らない空胞に接して存在する。

2. 脂肪 (図 B).

食後脂肪は小葉末梢部に小顆粒として現れ、爾後急速に中心部に向って広がり、3時間後頃が頂点と考えられる。この際は通常大滴状乃至中等大

図 3. 肝脂肪質、給食と同時に S. M. 注射後。

—— 対照, ---- N. D., 50x.

をなし、屢々胞体を充満する。而してこれから後は減少し、12時間後にほぼ給食前にかえる。しかるに S. M. を注射すると、脂肪の増量に時を要し、3時間で極く小量、6時間で漸く中等量に達し、12時間では減少し

て小量となる。以上の経過は使用量に関係ないものゝ様であるが、3時間後では N. D. の場合に多数の星細胞に脂肪を認める点が注目される。

3. マイトコンドリア.

給食すると肝細胞ミトは糸状乃至桿状が減じて垂鈴状、連珠状が増数し、6時間では組大顆粒が大勢を占め、糖原空胞の間隙に密在する。この頃を頂点として漸次桿状乃至糸状体が現われ、ミトはやがて機能的表現に乏しい休止形にかえる (附図13)。N. D. 注射の場合にも亦給食によってミトは太さを増し且つ顆粒化を起すが (阿図14)、対照例とことなり6時間にて顆粒に混じて桿状乃至糸状体を認める。かくて12時間にしては顆粒は殆んど影を没し、桿状、糸状体が大部を占める。これらは対照例よりも太く且つ長く、休止形への復帰が著しく遅延していることが判かる。一方50xではミトの顆粒化は弱く1時間後に認めるのみで、その後は長糸状体を呈する。しかも N. D. の如く太さを増さない (附図15)。之を要するに食後のミトの形状変化は S. M. 注射の際にも或る程度認めるが、対照の如く鮮かな時間的動きを示さない。

b) 核の所見.

1. 核の直径.

絶食時には核の直径は $6.5-7.5\mu$ を頂点とする低い山を形成するが、給食すると $7.5-8.5\mu$ の高い鋭い山を作り、給食1時間後も12時間後も大差がみられない。即ち核は速かに肥大し12時間後でも給食前に戻らないことを示している。然るに N. D. を給食と同時に注射すれば、時間の経過につれかなりの動揺を来し、1時間では $8-8.5\mu$ のものが増数し、6時間頃は $9.5-10.5\mu$ の大核さえ現われるが、12時間には殆んど対照にかえる。50×に於いても注射後核が大きくなることは前例と同様であるが、更にその動揺がはげしい。但し12時間後になれば N. D. 同様対照に近い大きさにもどる。

2. 核小体数 (表4).

表4. 核小体を持つ細胞 (%)

		核 小 体 数				
		1	2	3	4	5以上
対照	1 h	42	44	12	2	
	3 h	24	45	22	7	2
	6 h	25	42	24	8	1
	12 h	31	44	22	3	
N. D.	1 h	18	49	23	5	
	3 h	11	39	35	6	2
	6 h	16	32	43	7	2
	12 h	14	37	37	11	1
50×	1 h	25	43	23	7	2
	3 h	19	48	27	4	2
	6 h	23	34	32	7	4
	12 h	22	36	33	8	1

絶食時には通常1乃至2個であるが、給食すると直後から或る程度の増数がみられ、12時間でも旧に戻らない。N. D. を給食と同時に注射すれば、後増数の傾向が更に強く、6時間では3個以上が50%に及ぶ。之に反し50×では対照に近い動きを示すのみで、N. D. の如き増数はみられない。

3. 2核細胞.

殆んど認むべき変化はない。

之を要するに、肝脂質は通常食後3時間頃が最も多いとされているが、若し給食の同時に S. M. を注射すると、3時間では極めて少量か又は殆んどみられず、漸く6時間にて中等量に達する。之に反し糖原は対照の如く初期には増量するが、中等量以上には上らない。従ってこの際脂肪並びに糖原の合成が減弱していることが判かる。次に6時間以後を見るに、脂肪、糖原共に減少するが、12時間で尚対照を上廻る。これによって S. M. 注射によって脂肪及糖原の分解も亦減弱していることが推察される。特に50×では糖原の減少は12時間までの成績では殆んど認められない。

以上の様な S. M. による物質代謝の障礙にミトが関係していることはミ

トの形態の上から窺える. 即ち合成期にみるミトの顆粒化は対照に比して著しく遅延しており, また分解に入ってから食前の糸状乃至桿状体に復帰するのが遅れている事実から容易に信ぜられる. しかしこの実験のみでは予の企図したミトの酵素的作用を形態学的に究明するの困難を悟った. 仍つて次の実験を企てた.

2. 給食3時間後に注射.

給食によって肝細胞内に物質代謝を起さしめると同時に S. M. を注射すると, 糖原の出現が少なく且つ長く細胞内に残る. また脂肪の出現が遅れることは前項の実験によって明かとなった. 然しこれは S. M. が糖原及び脂肪の合成, 分解の何れかを, また何れをも阻害したのか判明し難い. そこで予は給食後3時間, 即ち肝細胞に脂肪が多く現れ且つ糖原量も上昇していると思われる時期に S. M. を注射したならば, 如何なる変動が起るかを見んとしたのが本実験である. 之によって脂肪及び糖原の分解期に於ける S. M. の作用を究明せんがためであることは言を俟たない.

a) 糖原 (図4).

図4. 肝糖原, 給食3時間後に S. M. 注射後.
—— 対照, - - - - N. D., - - - - 50×.

注射後1時間までは殆んど対照同様に小葉の全域にみられるが, 爾後増量することなく12時間後に至るも中等量を持続する. 而してこの傾向は殆んど使用量に関係なく現われる.

b) 脂肪 (図5).

注射後時と共に肝脂質は減少し, 6時間後には殆んどみられないが, 12時間後に再び小葉の末梢部に微量の脂肪顆粒が出現する. この減少の度は

図 5. 肝脂質, 給食後 3 時間後に S. M. 注射後.

—— 対照, - - - N. D., 50×.

S. M. の使用量により差異があり, N. D. に比して 50× がより著しい. なおこの減少と同時に脂肪は小顆粒となる.

c) マイトコンドリア.

脂肪及び糖原の消長より興味を感ずるのは何れも 3 時間後と 12 時間後である. いまこの時のミトを精検するに, 先ず 3 時間後では N. D. は対照に比し顆粒化の度は低く, その胞体内分布も乱れ, 大きさも比較的小さい (附図 16). 50× では全く顆粒化はみられず, 主として糸状体で, 而も集簇の傾向が強い (附図 17). 12 時間後のミトは大量 (附図 18), 小量 (附図 19) 共糸状体で, 殊に後著の場合は長く且つ縮れており, 機能的表現は甚だ乏しい. 又注目すべきは 50× に於いては絶食時実験と同様所謂顆粒団塊の点在を認めた事である.

以上の結果を総括するに, この時期に於ける S. M. の注射は糖原に対しては対照の如き増量, 続いて減少を来たすことなく, 中等量を持続する. 之に反し脂肪に対してはかなり急激な減少を来たす. 従って S. M. は糖原の分解を阻害したことは明かであると同時に, 脂肪合成の減弱を招来したと考えられる. 蓋し最盛期を過ぎての脂肪減少は脂肪の分解に比して合成の減弱に基因するものであるから, S. M. 注射の時に脂肪減少が対照よりも急速に現われるのは合成の減弱が顕著なるに因ると言える. これは S. M. の使用量が多い程脂肪の減少が著明な事によっても首肯される. 而してこの実験成績は前項の同時注射の結果を更に立証するもので, これによって S. M. は肝細胞内に於ける脂肪の合成を阻害することを確信するものであ

る。一方糖原の合成の阻害されるのは注射後間もなく糖原の増量が停止することによって明かであり、而してその後の増量なく中等量を長く持続することは分解も亦阻害されていることを物語っている。

以上の成績から S. M. は脂肪の合成、糖原の合成及び分解を阻害するが、就中著明なのは脂肪の合成阻害で、之は使用量によって差異を呈することが予をして更に次の実験を志しめた。尚こゝに一言すべきは上記の所見に並行してミトの形態に変化が随伴していることである。

3. 豚脂注入群.

前章に於いて給食と同時に、又は給食 3 時間後に S. M. を注射した場合何れの例に於いても脂肪の出現が抑制せられることを知った。これはとりも直さず脂肪合成が阻害されていることで、ミトの形態も亦之を裏書きしている故、予が当初期待したミトの酵素的作用は或る程度形態学的に証明されたと信ずる。然し前回用いた食餌は 3 栄養素を含む人工基本食であり、従ってこの時の脂肪の消長を直ちに給食成分の脂肪のみに由来するとは考えられない。茲に於いて単独に脂肪のみを投与する本実験を計画し、その際に於けるミトの動きから S. M. の作用を観んとしたものである。蓋し肝細胞ミトには脂肪代謝に必要な酵素の存在することが最近の研究によって明かであり、また嘗て教室に於いて行われた脂肪の単独投与は肝細胞ミトに著しい形態変化を起さしめることを安藤 (1952) が報告している。更に予の前諸実験の結果も肝脂質に於いて明白に現れる故、脂肪の単独投与を計画し、特に脂肪酸よりなる豚脂を以て次の実験を行った。

a) 豚脂注入と同時に注射.

豚脂を胃内に注入すると、肝脂質は 1 時間で中等量に現われ、6 時間で大量に達する。然し 12 時間では僅かに微量を残すのみで大部分は消失する。この脂肪の消長に並行してミトは最初太くなり、次で粗大顆粒化し、脂肪顆粒の生成機序を顕微鏡下に追及することが出来るが、後半に入れば細くなり急速に注入前の形態に帰える。この明白なミトの形態の動きと肝脂質の消長とが S. M. によって如何なる変動を示すかを追及するのを目的とした。

1. 原形質の所見.

i. 糖原.

対照に於いては注入後 6 時間で末梢部に限局して現われ、12 時間では中間部に波及するが、その量は一般に少ない。注射例では出現様式は中心部

から始まる傾向を示し、対照と趣をことにする。即ち6時間後に極めて微量で、12時間にてても少量である。特に50×では12時間のみに認められた。

ii. 脂肪 (図6).

対照では早くも1時間後に中等大の脂肪顆粒を有する細胞が小葉末梢部から中間部にかけて現われ、3—6時間後に最も多いが、12時間後には末梢部に点在する程度に減少する。なお最も多く現われる時期の Levi 氏標本について脂肪を観るに、Osmium により、黒褐色から淡黄色に至る濃淡種

図6. 肝脂肪, 豚脂の胃内注入及 S.M. 注射後.

—— 対照, - - - 1/2 N.D., N.D., - . - 50x.

々で、大小もまた入り乱れ、屢々その周囲に三日月状或は類円形の明視部を有する。然るに N.D. の S.M. を注射したものでは1時間後には対照と大差ない程度に脂肪を認めるが、3時間後では顆粒は小さく且つ少数で、6時間後では

微量となる。茲に於いて試みに、N.D. の半量を注射したが、図に示す如く前同様の傾向は認められるも、量的には対照と N.D. との略々中間を占める。更に注射量を50×に多した場合には N.D. を下回る脂肪量を示しつつ同様の経過を辿る。以上の所見は scarlet red 標本によるものであるが、Levi 氏標本に於いても之を認めることが出来る。尚この時には小形顆粒であるばかりでなく一般に濃染性でその周囲に明視部が認められない。

iii. マイトコンドリア.

注入後1時間で早くもミトは太くなり、粗大顆粒状が大勢を占め、急激な形態変化が起る。この状態は脂肪の大量に現われる6時間まで継続するが(附図20)、脂肪の減少期に入ると桿状及び糸状が増加し顆粒はみられない。然るに N.D. を注射すると、1時間ではミトは桿状が主で顆粒状が少なく、しかも小形顆粒である。而して3—6時間でも桿状、糸状が主で対照の如き顆粒の増数を認めない(附図21, 22)。他面毛細胆管は広くその周囲に明視部が現われる。かゝるミトの変動異常は N.D. の1/2量でも明かに認められた。そこで50×のミトをみるに、多くの細胞では N.D. 注射

に類似の桿状、糸状を呈するが、更に細いものや塵埃状を呈するものさえ現われる。而して之と同時に肥大細胞及び倭小細胞が末梢部に散在し、前者のミトは粗大短桿状、後者にてはコマ状、球状を示している。他方少数乍ら暗調細胞がみられた。これらは何れも毒作用の結果と考えられる。かくの如く大量注射ではミトに形態異常が早く現われ、3—6時間が著しく、12時間後でも尚恢復に至らない。

2. 核の所見.

i. 核の直径.

豚脂を注入すると、肝細胞核は急激に肥大し、消長曲線は右方に移動、その後は多少の動揺を示しつつ左方に転じ、食前の大きさに近づく。但し12時間でもなお 8.5μ のものが30%を占める。この核直径の変動は S. M. を注射した時も認められ、例を $50\times$ にとれば1時間では 8μ を中心とする集中的山を画き、これと同時に一過性に大形核も現われるが、3時間後では絶食時にみる程度の小核 ($5.5-7\mu$) が多数現れる。

ii. 核小体数.

豚脂を注入した場合も人工基本食の時と同じく増数するが、6時間後では2個以上が40%を超える。N. D. でも全期間を通じて $40-50\mu$ を示し、 $50\times$ では12時間に至って64%となる。

之を要するに豚脂を胃内に注入すると、脂肪は速かに肝細胞に充満し、3—6時間を頂点とする。この時期の脂肪は Osmium によって濃淡種々、また大小並びに形態は区々で、中には三日月状或は類円形の明視部を有するものがある。これらは脂肪合成の旺盛なる時期にその化学的性状も動きつゝあるを如実に示している。この合成に際しミトが重要な役割を演じていることは、その形態の動きから容易に察知される。即ち脂肪の増量に先行してミトは太くなり、粗大顆粒化し、脂肪顆粒の母質となる所見は随所に認められる。いま豚脂注入と同時に S. M. を注入すれば、N. D. は勿論大量の $50\times$ に於いても、将又 N. D. の半量にても大量の肝脂肪を有する筈の3乃至6時間に於いて小量にすぎず、その後も低位を示している。また脂肪顆粒も小形で Osmium によって一様の濃度を示し、その周囲に明視部を見ることがない。一方ミトの形状は注入前と大差なく長短糸状体で、顆粒化が低調であり、剩え大量注射の場合にはミトの形態異常さえ認められる。以上の所見によって S. M. は明かに脂肪合成を阻害し、その原因はミト活動の抑制にあることが推察される。

b) 豚脂注入3時間後に注射.

肝細胞に於ける脂肪の合成にミトが干与していることは教室先輩の業績により、また予の行った対照実験により形態学の立場から是認される。故にこの機序が前述の諸実験にて明かな如く、S. M. 注射によって阻害されるとすれば、ミトの酵素的作用は是認さるべく、しかもそれは脂肪の合成に干与していることが証明されたと信ずる。しかし予は前項の給食実験に倣い、豚脂注入3時間後、即ち肝脂質が大量に達した時期に S. M. の注射を行い脂肪の減少期に於ける S. M. の作用を追及しようと企てた。

1. 脂肪 (図 7).

N. D. では漸減して6時間で小葉の末梢部にみるのみ。いま試みにその半量を注射したところ、対照と変りなく増量を続け、3時間後は全域に現

図 7. 肝脂質、豚脂の胃内注入3時間後に S. M. 注入後。
—— 対照, — — — 1/2 N. D., N. D.

われ、6時間にて中等量になる。なおこの時の脂肪顆粒は一般に小形で、之を取巻く明視部も少なく且つ染色性の多様なのが注目される。しかるに12時間後、即ち注入後15時間を経過したものでは対照とことなり、依然中等量の脂肪を認めた。

2. マイトコンドリア.

N. D. では対照に比べ顆粒が極めて少く、他方桿状、糸状体が増加し、6時間では糸状体が大半を占めている。更に興味あることは N. D. 12 に於いて対照に近い脂肪量を示す時にも、そのミトは桿状、糸状体で形態上の動きが弱いことである。

之を要するに N. D. の S. M. 注射は、肝脂質の減少並びにミトをして注入時の形態に復帰することを早める。従って肝脂質の合成が S. M. によ

て阻害せられることが窺える。而して12時間後、即ち豚脂注入後12時間でなおも中等量を認めることは脂肪分解の阻害も考えられる。

III. 総括的結語.

酵素阻害剤として一般に認められるストレプトマイシンが生体に於けるラッテ肝細胞に与える影響を細胞形態学の上より観察した結果を次の如く要約することが出来る。

1. 24時間絶食のラッテにストレプトマイシンを注射し空腹のまゝとして肝細胞を観察したところ、0.02 g と 0.2 g では僅かに糖原が現れるのみで、ミトコンドリアには形態変化を認め難い、然し核には、肥大核小体の増数が顕著に現われる。これに反し大量の 0.5 g 注射ではミトコンドリアは互に粘着して集簇を形成し、更に 1 g ではミトコンドリアの繊細化並びに融合及び黒染球状物体の特異像が出現し、剩さへ核には核壁色質増多症、濃縮等の変性像が随所にみられる。而してかかる変化はストレプトマイシンの血中濃度と一致し、注射後1乃至3時間に著しい。以上の所見からストレプトマイシンの大量注射は肝細胞に毒作用を与えることを立証している。

2. 3栄養素を含む人工基本食を与え、之と同時にストレプトマイシンを注射すると、肝糖原の出現は中等量以上にならない。また6時間を過ぎると、0.02 g のときには減少を示すが、対照よりもその下降は緩かである。之に反し 1 g では殆んどそのまゝで著明の減少を示さない。次に肝脂質は遅れて増量し、対照では已に減量を始める6時間で漸く中等量となる。上述の結果から肝糖原及び脂肪の出現は弱く且つ遅延し、通常6時間以降に起る減少に異変が認められる。而して上昇期、即ち合成の旺んな時期にみるミトコンドリアは、その顆粒化は著しく弱く且つ遅れ、下降期、即ち分解の行われている時期では食前の形態に復帰することが容易でない。以上の所見によってストレプトマイシンは肝糖原及び脂肪の合成を阻害した事は確かで、之に先行するミトコンドリアの形態からストレプトマイシンはその活動を抑制したと考えることが出来る。

3. 給食3時間後にストレプトマイシンを注射すると、増量の途を辿りつゝある肝糖原は、間もなく増量が止まり、そのまゝ中等量を接統する。他方肝脂質はかなり急激な減少を示し、その減少度はストレプトマイシン量の多い程強い。以上の所見から肝糖原に於いてはストレプトマイシン注射後間もなく合成の減弱を来すが、それより後は分解も亦阻害される。肝

脂質も合成の減弱を来すが、分解には大なる異変を与えないものとする。

4. 豚脂の胃内注入時に肝細胞のマイトコンドリアが著明の形態変化を起す。しかもこの変化は肝脂質の出現に先行して現われ、粗大顆粒化したものが脂質の母質となることが幾多の中間型の存在により推測される。従ってマイトコンドリアは脂肪の合成に主役を演ずるものと解される。いまストレプトマイシンを豚脂注入と同時に注射すると、肝脂質は使用量に比例して減少する。またマイトコンドリアの形態も注入前と大差を認めない。以上の所見からストレプトマイシンが脂肪の合成を阻害したことは明かで、之に先立ってマイトコンドリアの動きが抑制されていることが判かる。次いで豚脂注入3時間後、即ち肝脂質の大量と思える時期にストレプトマイシンを注射すると0.02 g では肝脂質は減少する。

之を要するにストレプトマイシンを絶食時に注射すると、大量では中毒作用を現わす。而して肝細胞物質代謝を亢進せしめる食餌を負荷すると、肝糖原の合成及分解を、又肝脂質の合成を阻害する。殊に脂肪合成の阻害は豚脂注入実験により極めて明確にすることが出来る。而してこれらの所見に先行してマイトコンドリアに機能抑制の徴が現われ、その原因はストレプトマイシンの注射にあることが明かである。一方ストレプトマイシンは酵素阻害剤として認められている以上、それがマイトコンドリアの機能を抑制するとすれば、マイトコンドリアの作用は酵素的であると考えても敢えて牽強附会でない。

稿を終るに臨み終始御懇篤なる御校閲並に御指導を賜った恩師 高木教授及び御援助を賜った大阪市立医大高木助教授、玉置博士に満腔の謝意を捧げます。

Author's Abstract.

Streptomycin, which is said to inhibit fermentation was used as a method to investigate how mitochondria participates in the function of the liver cells enzymic and morphologically. And the results of the study was as follows:

When a large amount of streptomycin was injected during fasting an intoxicifying change appeared among the liver cells. And mitochondria would gather to form groups or scatter into small specks which later gathered and united to become a dark shadowed cell.

When streptomycin was injected at the time or three hours later of feeding an artificial fundamental diet of three main nutriments the appearance of lipide was delayed and decreased, and the increase of glycogen was stopped in a short period and remained in the liver cells. On the other hand, granulation of mitochondria was weakened, and the

change of their original form was prolonged. These facts show that streptomycin inhibits the synthesis of lipides and the composition and decomposition of glycogen. In parallel to this, the movement of mitochondria was inhibited. When pig fat was given lipide in the liver was formed from the granulated mitochondria, but when streptomycin was injected at the same time, the amount of lipides in the cell was very small and the change of mitochondria was poor.

From the facts, streptomycin inhibits the morphological change of mitochondria and from the minute observation of the fine cell structure, it was found that the synthesis of lipides and the composition and decomposition of glycogen were also inhibited.

文 献.

- 安藤正雄：日組録. 3 (1951). 頁107; 頁145; 頁163. — 秋葉朝一郎と横田健：医学と生物学. 24 (1952). — 赤堀四郎と田宮博：酵素化学の進歩. 1953. — Doniach, I. a. K. Weinbren: Brit. J. exp. Pathol. 33 (1952). — Harman, J. H.: Exp. Cell Research. 1 (1950). — Hogeboom, G. H., A. Claude, a. R. D. Hotchkiss: J. biol. Chem. 165 (1946). — Hogeboom, G. H.: J. biol. Chem. 177 (1949). — 原好毅：治療. 32 (1950). — John, T. E.: Enzymes and enzyme systems. 1951. — 北山幾太郎：大阪大学医誌. 42 (1943). — 木下良順：医学の進歩. 1951. — Kennedy, E. P. a. A. L. Lehninger: J. biol. Chem. 172 (1948). — 水野厚生と小倉貞雄：名古屋医会誌. 1951. — Smith, P. H., E. L. Oginsky a. W. W. Umbreit: J. Bact. 58 (1949). — 佐藤正一と田中信徳：遺伝学誌. 26 (1951). — Schneider, W. C. a. V. R. Potter: J. biol. Chem. 177 (1949). — 高木耕三：解剖誌. 24 (1949). 号3. — 館石叔：最近医学. 6. (1951) — 高尾信安：京都府立医大誌. 54 (1953). — 上田英雄：ストレプトマイシン及びペニシリンの臨床. 1950. — Umbreit, W. W.: J. biol. Chem., 177 (1949). — 渡辺三郎：最近医学. 5 (1950). — 山崎正保：日本結核病会誌. 1950; 1953.

附 図 説 明.

図 1—3 は対物鏡 Zeiss Achr. $\times 100$, 接眼鏡 Zeiss $\times 10$, 筒長 160 mm とし, Abbe の描写器で投影, 描写した.

図 4—22 は 1000 倍に拡大して写真に撮影したものである.

図1—2. 肝細胞内の糖原. Carnoy 氏液固定, Best 氏 carmin 染色.

図 3. リボ核酸. Carnoy 氏液固定, pylonin-methyl green 染色.

図 4—22. Levi 氏液固定, Heidenhain 氏ヘマトキシリン染色.

Explanation of Plate.

Figs. 1—3 are the reproductions obtained ABBE's apparatus.

Figs. 4—22 are photomicrographs. $\times 1,000$.

Figs. 1 and 2. Glycogen in liver cells.

Fig. 3. Ribonucleic acid. Stained with pyronin-methyl green.

Figs. 4—22. Mitochondria. Fixed by LEVI's fluid and stained with HEI-DENHAIN's hematoxylin.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22