潮州郡萬巒庄平埔族の手掌理紋に就いて

臺灣平埔族の人類學的研究 II

張 山 鐘

緒言、材料及び方法

潮州郡萬巒庄平埔族の血液型に關する余の前報告（本誌第55卷第8號）の緒言によつて知られる如く、平埔族に關する手掌及び足趾皮膚の理紋に就いての研究は、從來一つも發表せられてゐない。故に余は本種族の人類學的研究の第2報として、萬巒庄平埔族の手掌部理紋に關する報告を此處に發表しようと思ふ。但し本編に於いては資料のみを發表し、人種間の比較に就いては稿を改めて記載する心算である。

材料は潮州郡萬巒庄平埔族男女 500 名（♂270, ♀230）合計 1000 手掌であり、そのうち約 80% は赤山部落民、他の約 20% は萬金部落民である。

方法は臺北帝國大學醫學部解剖學教室に於いて從來採用されてゐるものによつた。その詳細は島氏の文獻（臺灣蕃族の人類學的研究、臺灣醫學會雜誌第38卷増刊、昭和14年12月）に記載せられてゐる。

第1章 掌指部の理紋

第1節 掌指三叉線

1) “WILDER's Handformula”

萬巒庄平埔族男女 1000 手掌（♂540, ♀460）掌指部に於ける所謂 “WILDER's Handformula” の各型の出現状態は第2表の如くである。

本表に依ると、本群に於ける WILDER 手式の種類は $\times \times 53$ を最低値とし、13 10 8 7 に至る 57 種を得る。その内譯は、男性女性共に 45 種、兩者共通のもの 33 種、右側 34 種、左側 51 種、左右共通 28 種である。右側に比して左側の手掌に本手式の種類数の多いのは、世界各人種間に共通的事實である。

第 2 表 萬壽庄平埔族手掌に於ける “WIRDER'S Handformula” 各型の出現狀態

D C B A				δ		φ		δ	φ	r	l	$\delta + \varphi$ (r+l)
				r	l	r	l					
x	x	x	5	3	1	1	1	1	1	1	1	3
	x	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	74
	0(x)	5	5	3	3	5	11	5	10	6	9	195
	0	5	5	4	1	1	2	2	7	25	2	15
	7	0	5	1	2	1	1	1	1	1	1	27
	7	0	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	0	5	3	1	1	1	1	1	1	1	13
	7	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	7	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	7	5	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	 			

以上 57 種の手式中より、比較的出现数の多いものを撰出して、その百分比を掲げると第 3 表の如くなる。但し誤差は標準誤差である（以下同様）。

第 3 表 萬嶺庄平埔族手掌に於ける代表的 WILDER's Handformulae の出現率(%)

	δ	φ	$\delta - \varphi$	r	l	$r-l$	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
7 5 5 3	29.8±1.97	27.6±2.08	2.2±2.87	23.2±1.89	34.4±2.12	-11.2±2.84	28.8±1.43
9 0($\times$)5 3	6.9±1.09	6.1±1.12	0.8±1.56	4.8±0.96	8.2±1.23	-3.4±1.56	6.5±0.88
9 7 5 3	20.4±1.73	18.5±1.81	1.9±2.50	24.2±1.92	14.8±1.59	9.4±2.49	19.5±1.25
11 9 7 5	10.7±1.33	10.0±1.40	0.7±1.93	19.0±1.66	1.8±0.59	17.2±1.76	10.4±0.97
N	540	460		500	500		1000

本表によると男女共に 7 5 5 3 型の頻度が最も大きく、9 7 5 3 型が之れに次ぎ、以下 11 9 7 5, 9 0 5 3 の順序となる。男女両性間の頻度差は各型ともに證せられないが、左右兩側間では低値の手式 7 5 5 3 は左手に、高値の手式なる 9 7 5 3 及び 11 9 7 5 の兩型は明かに右手に多い。

次に本群に於ける全手掌を CUMMINS-MIDLO の分類法に従つて Typus 11, Typus 9 及び Typus 7 の 3 型に分けると、之等各型の出現状態は第 4 表 a 及び b の如くなる。

第 4 表 a 萬嶺庄平埔族手掌に於ける CUMMINS-MIDLO の 3 型の出現回数

		δ		φ		δ	φ	r	l	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
		r	l	r	l					
Typus	7	74	144	78	126	218	204	152	270	422
"	9	110	91	79	77	201	156	189	168	357
"	11	86	35	73	27	121	100	159	62	221
N		270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 4 表 b 萬嶺庄平埔族手掌に於ける CUMMINS-MIDLO の 3 型の出現率(%)

		δ	φ	$\delta - \varphi$	r	l	$r-l$	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
Typus	7	40.4±2.11	44.3±2.32	-3.9±3.14	30.4±2.06	54.0±2.23	-23.6±3.03	42.2±1.56
"	9	37.2±2.08	33.9±2.21	3.3±3.03	37.8±2.17	33.6±2.11	4.2±3.03	35.7±1.51
"	11	22.4±1.79	21.7±1.96	0.7±2.65	31.8±2.08	12.4±1.47	19.4±2.55	22.1±1.31
N		540	460		500	500		1000

本表によると、萬巒庄平埔族手掌に於ける CUMMINS-MIDLO の3型は、男女を通じて Typus 7 が最も多く、Typus 11 が最も少い。男女間の差は證せられないが、左右間には明かな頻度差があり、低値の Typus 7 は左側に、高値の Typus 11 は右側に多い。

2) 各主線の終止區

萬巒庄平埔族男女 1000 手掌々指部に於ける掌指三叉線各主線 D, C, B, A の夫れ夫れに就いてその終止區各型の出現状態を表示すると、先づ D 線に就いては第5表 a 及び b が得られる。

第 5 表 a 萬巒庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線主線 D の終止區各型の出現回数

D	♂		♀		♂	♀	r	l	♂+♀ (r+l)
	r	l	r	l					
×		6	2	8	6	10	2	14	16
7	72	133	71	112	205	183	143	245	388
8	2	5	5	6	7	11	7	11	18
9	110	86	78	76	196	154	188	162	350
10		5	1	1	5	2	1	2	7
11	86	35	72	27	121	99	158	62	220
13			1			1	1		1
N	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 5 表 b 萬巒庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 D の終止區各型の出現率(%)

D	♂	♀	♂-♀	r	l	r-l	♂+♀ (r+l)
×	1.1±0.45	2.2±0.68	-1.1±0.82	0.4±0.28	2.8±0.74	-2.4±0.79	1.6±0.40
7	38.0±2.09	39.8±2.28	-1.8±3.09	28.6±2.02	49.0±2.24	-20.4±3.02	38.8±1.54
8	1.3±0.49	2.4±0.71	-1.1±0.85	1.4±0.53	2.2±0.66	0.8±0.85	1.8±0.42
9	36.3±2.07	33.5±2.20	2.8±3.02	37.6±2.17	32.4±2.09	5.2±3.01	35.0±1.51
10	0.9±0.40	0.4±0.29	0.5±0.49	0.2±0.20	1.2±0.49	-1.0±0.53	0.7±0.26
11	22.4±1.79	21.6±1.92	0.8±2.62	31.6±2.08	12.4±1.47	19.2±2.55	22.0±1.31
13		0.2±0.21	-0.2±0.21	-0.2±0.20		0.2±0.20	0.1±0.10
N	540	460		500	500		1000

本表によると萬嶺庄平埔族手掌に於ける主線 D の終止區の Typus は $\times$ より 13 に至る 7 種を算し、就中男女を通じて Typus 7, Typus 9 及び Typus 11 の 3 型が多い。男女間の差は各型を通じて證せられないが、左右間には低値の Typus 7 が左側に、高値の Typus 11 が右側に著しく多い。全手掌を通算すると Typus 7 と Typus 9 との間の頻度差 ($3.8\% \pm 2.16\%$) は明白ではないが、第 3 位の Typus 11 の頻度は之等兩者に比して著しく小さい。

本群に於ける主線 C の終止區各型の出現状態は第 6 表 a 及び b によつて知られる。

第 6 表 a 萬嶺庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 C 線の終止區各型の出現回数

C	δ		η		δ	η	r	l	$\delta + \eta$ (r+l)
	r	l	r	l					
0, $\times$	33	50	33	39	83	72	66	89	155
5	69	129	68	112	198	180	137	241	378
6	2	5	5	6	7	11	7	11	18
7	100	68	71	56	168	127	171	124	295
9	62	18	50	17	80	67	112	35	147
10	3		3		3	3	6		6
11	1				1		1		1
N	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 6 表 b 萬嶺庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 C 線の終止區各型の出現率(%)

C	δ	η	$\delta - \eta$	r	l	r-l	$\delta + \eta$ (r+l)
0, $\times$	15.4 ± 1.53	15.7 ± 1.70	-0.3 ± 2.30	13.2 ± 1.51	17.8 ± 1.71	-4.6 ± 2.28	15.5 ± 1.14
5	36.7 ± 2.07	39.1 ± 2.28	-2.4 ± 3.08	27.4 ± 1.99	48.2 ± 2.23	-20.8 ± 2.99	37.8 ± 1.53
6	1.3 ± 0.49	2.4 ± 0.71	1.1 ± 0.85	1.4 ± 0.53	2.2 ± 0.66	-0.8 ± 0.85	1.8 ± 0.42
7	31.1 ± 1.99	27.6 ± 2.08	3.5 ± 2.88	34.2 ± 2.12	24.8 ± 1.93	9.4 ± 2.87	29.5 ± 1.46
9	14.8 ± 1.33	14.6 ± 1.65	0.2 ± 2.25	22.4 ± 1.86	7.0 ± 1.14	15.4 ± 2.18	14.7 ± 1.12
10	0.6 ± 0.33	0.7 ± 0.39	-0.1 ± 0.51	1.2 ± 0.49		1.2 ± 0.49	0.6 ± 0.24
11	0.2 ± 0.19		0.2 ± 0.19	0.2 ± 0.20		0.2 ± 0.20	0.1 ± 0.10
N	540	460		500	500		1000

本表によると萬巒群手掌に於ける主線 C の終止區は Typus 0, x より Typus 11 に至る 7 型を算し、就中男女を通じて Typus 5, Typus 7 及び Typus 9 型が多い。各型ともに男女差は證せられないが、左右兩側では依然として低値の Typus 5 は左側に、高値の Typus 7 及び Typus 9 は右側に多い。男女左右全手掌を通算した場合には Typus 5 と Typus 7 との間及び後者と Typus 9 との間には夫れ夫れ明確な差が成立する。

次に本群に於ける主線 B の終止區各型の出現状態は第 7 表 a 及び b の如く表示することが出来る。

第 7 表 a 萬巒庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 B 線の終止區各型の出現回数

B	♂		♀		♂	♀	r	l	♂+♀ (r+l)
	r	l	r	l					
3		1		2	1	2		3	3
5	184	229	156	200	413	356	340	429	769
6		5	1	1	5	2	1	6	7
7	82	35	70	27	117	97	152	62	214
8	3		3		3	3	6		6
9	1				1		1		1
	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 7 表 b 萬巒庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 B 線の終止區各型の出現率(%)

B	♂	♀	♂-♀	r	l	r-l	♂+♀ (r+l)
3	0.2±0.19	0.4±0.29	-0.2±0.35		0.6±0.35	-0.6±0.35	0.3±0.17
5	76.5±1.72	77.4±1.95	-0.9±2.60	68.0±2.09	85.8±1.56	-17.8±2.61	76.9±1.33
6	0.9±0.40	0.4±0.29	0.5±0.49	0.2±0.20	1.2±0.49	-1.0±0.53	0.7±0.26
7	21.7±1.77	21.1±1.90	0.6±2.60	30.4±2.06	12.4±1.47	18.0±2.53	21.4±1.30
8	0.6±0.33	0.7±0.39	-0.1±0.51	1.2±0.49		1.2±0.49	0.6±0.24
9	0.2±0.19		0.2±0.19	0.2±0.20		0.2±0.20	0.1±0.10
N	540	460		500	500		1000

本表によると萬巒群手掌に於ける主線 B の終止區は Typus 3 より Typus 9 に至る

6 種を算するうち、男女を通じて Typus 5 及び Typus 7 の兩型の頻度が大きく、全数の大部分を之等兩型によつて占めてゐる。各型を通じて男女兩性間の差は認められないが、左右兩側間では、低値の Typus 5 は左側に高値の Typus 7 は右側に多いことが此處でも證せられてゐる。全數通算の場合に於ける第 1 位の Typus 5 と第 2 位の Typus 7 との間の差 $55.5\% \pm 1.86\%$ は甚だ大きい。

次に本群に於ける掌指三叉線主線 A の終止區各型の出現状態を表示すると、第 8 表 a 及び b の如くなる。

第 8 表 a 萬籐庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 A 線の終止區各型の出現回数

A	δ		φ		δ	φ	r	l	$\delta + \varphi$ (r+l)
	r	l	r	l					
1	1	15	4	37	16	41	5	52	57
2		9		5	9	5		14	14
3	158	213	135	154	371	289	293	367	660
4	8	19	6	22	27	28	14	41	55
5	103	14	84	12	117	96	178	26	213
7			1			1	1		1
	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 8 表 b 萬籐庄平埔族手掌に於ける掌指三叉線 A 線の終止區各型の出現率(%)

A	δ	φ	$\delta - \varphi$	r	l	r-l	$\delta + \varphi$ (r+l)
1	3.0 ± 0.73	8.9 ± 1.33	-5.9 ± 1.52	1.0 ± 0.44	10.4 ± 1.37	-9.4 ± 1.44	5.7 ± 0.73
2	1.7 ± 0.56	1.1 ± 0.49	0.6 ± 0.74		2.8 ± 0.74	-2.8 ± 0.74	1.4 ± 0.37
3	68.7 ± 2.20	62.8 ± 2.25	5.9 ± 3.15	58.6 ± 2.20	73.4 ± 1.98	-14.8 ± 2.96	66.0 ± 1.50
4	5.0 ± 0.94	6.1 ± 1.12	-1.1 ± 1.46	2.8 ± 0.74	8.2 ± 1.23	-5.4 ± 1.44	5.5 ± 0.72
5	21.7 ± 1.79	20.9 ± 1.90	0.8 ± 2.61	37.4 ± 2.16	5.2 ± 0.99	32.2 ± 2.38	21.3 ± 1.29
7		0.2 ± 0.21	-0.2 ± 0.21	0.2 ± 0.20		0.2 ± 0.20	0.1 ± 0.10
N	540	460		500	500		1000

本表によると萬籐群手掌に於ける A 線の終止區は Typus 1 より Typus 7. に至る 6

型を算する。就中男女を通じて Typus 3 及び Typus 5 の頻度が大きい。男女間の差は Typus 1 ($\varphi > \delta$) 以外には各型を通じ依然として證せられないが、左右間では高値の Typus 5 は右側に、低値の Typus 4 以下の 4 型は左側に多いことが認められる。全数通算の上では、第 1 位の Typus 3 と第 2 位の Typus 5 の間及び後者と第 3 位の Typus 1 との間には明確な差 ($44.7\% \pm 1.98\%$) 及び ($15.6\% \pm 1.48\%$) が認められる。

以上各主線の終止區の代表的なものを挙げると、D 線では Typus 7 (或は Typus 9), C 線では Typus 5, B 線では Typus 5 而して A 線では Typus 3 である。即ち之等の代表的終止區を綜合して代表的 WILDER's Formula を作ると 7 5 5 3 型が得られる。之れは勿論第 3 表の結果と一致するものである。

第 2 節 指間の理紋

1) 指間三叉線

萬巒庄平埔族男女 1000 手掌に於ける指間三叉線の出現状態は第 9 表 a 及び b の如く

第 9 表 a 萬巒庄平埔族手掌に於ける指間三叉線各型の出現回数

	δ		φ		δ	φ	r	l	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
	r	l	r	l					
2t	10	3	4	2	13	6	14	5	19
3t	3	1	2		4	2	5	1	6
4t	19	28	21	23	47	44	40	51	91
N	270	270	230	230	540	460	500	500	1000
all t	32	32	27	25	64	52	59	57	116
N	810	810	690	690	1620	1380	1500	1500	3000

第 9 表 b 萬巒庄平埔族手掌に於ける指間三叉線各型の出現率(%)

	δ	φ	$\delta - \varphi$	r	l	$r-l$	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
2t	2.4 ± 0.66	1.3 ± 0.53	1.1 ± 0.85	2.8 ± 0.74	1.0 ± 0.44	1.8 ± 0.86	1.9 ± 0.43
3t	0.7 ± 0.36	0.4 ± 0.29	0.3 ± 0.46	1.0 ± 0.44	0.2 ± 0.20	0.8 ± 0.48	0.6 ± 0.24
4t	8.7 ± 1.21	9.6 ± 1.37	-0.9 ± 1.83	8.0 ± 1.21	10.2 ± 1.35	-2.2 ± 1.81	9.1 ± 0.91
N	540	460		500	500		1000
all t	4.0 ± 0.49	3.8 ± 0.51	0.2 ± 0.71	3.9 ± 0.50	3.8 ± 0.49	0.1 ± 0.70	3.9 ± 0.35
N	1620	1380		1500	1500		3000

である。但し 2t は第2指間の、3t は第3指間の、4t は第4指間の三叉線 t を表はし、all t は以上の全数を示す。

本表によると萬巒群手掌に於ける指間三叉線 t の出現頻度は、男女左右を通じて第4指間に最も多い。これは世界各人種間に共通の現象である。男女左右間の頻度差は各指間を通じて證明せられない。全数通算の場合の all t の頻度は世界諸人種に於ける夫れに比較して比較的小さい部類に屬してゐる。

2) 指間の渦状紋

萬巒庄平埔族手掌に於ける第2, 第3及び第4指間の小渦状紋の出現例は、全1000手掌を通じて1回も認めることが出来なかつた。此點は從來報告せられた臺灣蕃族の諸群（パイワン、ツァリセン、ピューマ、ブヌン、アミ、ヤミ）と共通の特徴であると思はれる。

第2章 小指球の理紋

萬巒庄平埔族男女1000手掌に於ける小指球部の理紋各型の出現状態は第10表a及びbの如くである。

第10表 a 萬巒庄平埔族手掌に於ける小指球理紋各型の出現回数

	δ		φ		δ	φ	r	l	$\delta + \varphi$ (r+l)
	r	l	r	l					
IIa	16	26	21	32	42	53	37	58	95
IIb	3	3	4	4	6	8	7	7	14
IIc	1		1	1	1	2	2	1	3
Hb Hb	1		1		1	1	2		2
Harch	1		3		1	3	4		4
all II	22	29	30	37	51	67	52	66	118
N	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第10表 b 萬巒庄平埔族手掌に於ける小指球理紋各型の出現率(%)

	δ	φ	$\delta - \varphi$	r	l	r-l	$\delta + \varphi$ (r+l)
IIa	7.8±1.15	11.5±1.49	-3.7±1.88	7.4±1.17	11.6±1.43	-4.2±1.85	9.5±0.93
IIb	1.1±0.45	1.7±0.60	-0.6±0.75	1.4±0.53	1.4±0.53	0.0±0.75	1.4±0.37
IIc	0.2±0.19	0.4±0.29	-0.2±0.35	0.4±0.28	0.1±0.14	0.3±0.31	0.3±0.17
Hb Hb	0.2±0.19	0.2±0.21	0.0±0.28	0.4±0.28		0.4±0.28	0.2±0.14
Harch	0.2±0.19	0.7±0.39	-0.5±0.43	0.8±0.39		0.8±0.39	0.4±0.20
all II	9.4±1.26	14.6±1.65	-5.2±2.08	10.4±1.37	13.2±1.51	-2.8±2.04	11.8±1.02
N	540	460		500	500		1000

本表によると萬巒庄平埔族手掌に於ける小指球部の理紋は Ha より Harch 型の 5 種を得る中に、一般的現象に一致して、男女を通じ Ha 型が最高の頻度を示してゐる。各型ともに男女左右間の頻度差は見られない。但し Ha 及び all H の頻度は男性に比して女性に多い傾向が見える。全 5 型を合算した all H の全数の頻度は世界各人種間の夫れに比較して、比較的頻度の低い方に屬してゐる。

第 3 章 拇 球 の 理 紋

萬巒庄平埔族男女 1000 手掌に於ける拇球理紋各型の出現状態は第 11 表 a 及び b の如くである。

第 11 表 a 萬巒庄平埔族手掌に於ける拇球部理紋各型の出現回数

	♂		♀		♂	♀	r	l	♂+♀ (r+l)
	r	l	r	l					
Th I	3	34	4	14	37	18	7	48	55
Th	1	4		2	5	2	1	6	7
I				1		1		1	1
all Th	4	38	4	16	42	20	8	54	62
all I	3	34	4	15	37	19	7	49	56
N	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 11 表 b 萬巒庄平埔族手掌に於ける拇球部理紋各型の出現率(%)

	♂	♀	♂-♀	r	l	r-l	♂+♀ (r+l)
Th I	6.9±1.09	3.9±0.90	3.0±1.41	1.4±0.53	9.6±1.32	-8.2±1.42	5.5±0.72
Th	0.9±0.40	0.4±0.29	0.5±0.49	0.2±0.20	1.2±0.49	-1.0±0.53	0.7±0.26
I		0.2±0.21	-0.2±0.21		0.2±0.20	-0.2±0.20	0.1±0.10
all Th	7.8±1.15	4.3±0.95	3.5±1.49	1.6±0.56	10.8±1.39	-9.2±1.50	6.2±0.76
all I	6.9±1.09	4.1±0.92	2.8±1.43	1.4±0.53	9.8±1.33	-8.4±1.43	5.6±0.73
N	540	460		500	500		1000

本表によると、萬巒庄平埔族手掌に於ける拇球の理紋は拇球理紋 (Th) と第 1 指間の理紋 (I) との同時に出現するもの (Th I) が男女を通じて最も多く、I のみ單獨に出現するものは甚だ少い。各型ともに男女間の頻度差は不明であるが、Th I 型は女性よりも男性

に幾分多い傾向が認められる。また左右間に於いては明かに右側よりは左側に頻度が大きい。之等の點は 世界各人種間に一般的の現象である。男女左右を 通算した場合に 於ける all Th 及び all I の頻度は比較的低い方に屬してゐる。

第 4 章 腕 三 叉 線

萬轡庄平埔族男女 1000 手掌に於ける腕三叉線各型の出現状態は第 12 表 a 及び b に示す通りである。

第 12 表 a 萬轡庄平埔族手掌に於ける腕三叉線各型の出現回數

	δ		φ		δ	φ	r	l	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
	r	l	r	l					
P	1		3		1	3	4		4
Cl	16	17	8	9	33	17	24	26	50
C	193	193	153	146	386	199	346	339	685
Ch	54	57	58	68	111	126	112	125	237
CCh	5	3	7	6	8	13	12	9	21
ChCh				1		1		1	1
CChCh	1		1		1	1	2		2
all Ch	60	60	66	75	120	141	126	135	261
N	270	270	230	230	540	460	500	500	1000

第 12 表 b 萬轡庄平埔族手掌に於ける腕三叉線各型の出現率(%)

	δ	φ	$\delta - \varphi$	r	l	$r-l$	$\delta + \varphi$ ($r+l$)
P	0.2 ± 0.19	0.7 ± 0.39	-0.5 ± 0.43	0.8 ± 0.39		0.8 ± 0.39	0.4 ± 0.20
Cl	6.1 ± 1.03	3.7 ± 0.88	2.4 ± 1.35	4.8 ± 0.96	5.2 ± 0.59	-0.4 ± 1.13	5.1 ± 0.69
C	71.5 ± 1.94	65.0 ± 2.22	6.5 ± 2.95	69.2 ± 2.06	67.8 ± 2.09	1.4 ± 2.93	68.5 ± 1.47
Ch	20.6 ± 1.74	27.4 ± 2.08	-6.8 ± 2.71	22.4 ± 1.86	25.0 ± 1.94	-2.6 ± 2.69	23.7 ± 1.34
CCh	1.5 ± 0.52	2.8 ± 0.77	-1.3 ± 0.93	2.4 ± 0.68	1.8 ± 0.59	0.6 ± 0.90	2.1 ± 0.45
ChCh		0.2 ± 0.21	-0.2 ± 0.21		0.2 ± 0.20	-0.2 ± 0.20	0.1 ± 0.10
CChCh	0.2 ± 0.19	0.2 ± 0.21	0.0 ± 0.28	0.4 ± 0.28		0.4 ± 0.28	0.2 ± 0.14
all Ch	22.2 ± 1.79	30.7 ± 2.15	-8.5 ± 2.80	25.2 ± 1.94	27.0 ± 1.99	-1.8 ± 2.78	26.1 ± 1.40
N	540	460		500	500		1000

本表によると萬巒庄平埔族手掌に於ける腕三叉線は P 型より CChCh 型に至る 7 種を算し、就中男女を通じて C 型がその大部分を占めてゐる。而して Ch 型の頻度が之れに次いで大きい。各型を通じて男女左右間の明確な頻度差は證せられないが、C 型は女性に比して男性に、Ch 型は男性に比して女性に多い傾向があるものと如くである。之れは小指球部理紋の Ha 及び all H の頻度に同様の傾向の見えることと理論上より見て必然的の関係があるものであらう。尙本群に於ける唯二つの例 (δr , ηr) なる CChCh 型は孰れも HbHb 型小指球理紋と結合してゐた。

第 5 章 綜 括

第 1 節 男女左右の手掌を通算した場合

萬巒庄平埔族 1000 手掌 (δ 540, η 460, r 500, 1500) に於ける各種理紋の型種並びにその出現率 (%) をその標準誤差 (%) と共に表示すると、次の如くなる。

I) 掌指三叉線

- 1) 代表的 WILDER's Handformula; 7 5 5 3 (28.8 ± 1.43), 9 7 5 3 (19.5 ± 1.25), 11 9 7 5 (10.4 ± 0.97), 9 0, $\times$ 5 3 (6.5 ± 0.88)
- 2) CUMMINS-MIDLO 氏等の 3 型; Typus 7 (42.2 ± 1.56), Typus 9 (35.7 ± 1.51), Typus 11 (22.1 ± 1.31)
- 3) 各主線の終止區各型
 - D 線の代表的終止區; Area 7 (38.8 ± 1.54), Area 9 (35.0 ± 1.51), Area 11 (22.0 ± 1.31)
 - C 線の代表的終止區; Area 5 (37.8 ± 1.53), Area 7 (29.5 ± 1.46), Typus 0, $\times$ (15.5 ± 1.14), Area 9 (14.7 ± 1.12)
 - B 線の代表的終止區; Area 5 (76.9 ± 1.33), Area 7 (21.4 ± 1.30)
 - A 線の代表的終止區; Area 3 (66.0 ± 1.50), Area 5 (21.3 ± 1.29)

II) 指間の理紋

- 1) 指間三叉線; 2t (1.9 ± 0.43), 3t (0.6 ± 0.24), 4t (9.1 ± 0.91), all t (3.9 ± 0.35)
- 2) 指間の渦狀紋; (0.0)

III) 小指球理紋各型

Ha (9.5 ± 0.93), Hb (1.4 ± 0.37), Hc (0.3 ± 0.17), HbHb (0.2 ± 0.14), Harch (0.4 ± 0.20), all H (11.8 ± 1.03)

IV) 拇球部の理紋

1) 拇球部理紋; all Th (6.2 ± 0.76)

2) 第 1 指間の理紋; all I (5.6 ± 0.73)

V) 腕三叉線各型

P (0.4 ± 0.20), Cl (5.0 ± 0.69), C (68.5 ± 1.47), Ch (23.7 ± 1.34), CCh (2.1 ± 0.45), ChCh (0.1 ± 0.10), CChCh (0.2 ± 0.14), all Ch (26.1 ± 1.40)

第 2 節 男女兩性間の比較

萬巒庄平埔族手掌に於ける各種理紋型の出現率に就いて、男女兩性間の差異(%)が當該誤差の 3 倍より大なる如き差を示すものを挙げると次の如くなる。

I) 掌指三叉線主線 A の終止區型; Area 1 ($\varphi > \delta$, 5.9 ± 1.52)

II) 腕三叉線; all Ch ($\varphi > \delta$, 8.5 ± 2.80)

第 3 節 左右兩側間の比較

萬巒庄平埔族手掌に於ける各種理紋型の出現率に就いて、左右兩側手掌間の差異(%)が標準誤差(%)の 3 倍より大なるものを求めると、次の如き結果になる。

I) 掌指三叉線

1) 代表的 WILDER's Handformula ; 7 5 5 3 ($l > r$, 11.2 ± 2.84), 9 7 5 3 ($r > l$, 9.4 ± 2.49), 11 9 7 5 ($r > l$, 17.2 ± 1.76)

2) CUMMINS-MIDLÖF の 3 型; Typus 7 ($l > r$, 23.6 ± 3.03), Typus 11 ($r > l$, 19.4 ± 2.55)

3) 各主線の終止區型

D 線の代表的終止區; Area 7 ($l > r$, 20.4 ± 3.02), Area 11 ($r > l$, 19.2 ± 2.55)

C 線の代表的終止區; Area 5 ($l > r$, 20.8 ± 2.99), Area 7 ($r > l$, 9.4 ± 2.87), Area 9 ($r > l$, 15.4 ± 2.18)

B 線の代表的終止區; Area 5 ($l > r$, 17.8 ± 2.61), Area 7 ($r > l$, 18.0 ± 2.53)

A 線の代表的終止區; Area 1 ($l > r$, 9.4 ± 1.44), Area 2 ($l > r$, 2.8 ± 0.74), Area 3 ($l > r$, 14.8 ± 2.96), Area 4 ($l > r$, 5.4 ± 1.44), Area 5 ($r > l$, 32.2 ± 2.38)

II) 拇球部の理紋

1) 拇球理紋; all Th ($l > r$, 9.2 ± 1.50)

2) 第 1 指間の理紋; all I ($l > r$, 8.4 ± 1.43)

(臺北帝國大學醫學部解剖學教室)

Über das Hautleistensystem der Vola der Peipo (平埔) von Banran (萬巒)

Anthropologische Untersuchungen der Peipo (平埔) in Formosa. II.

Von

SANSHÔ CHÔ

Kaibogaku Kyositu, Taihoku Teikoku Daigaku

Die Hauptresultate der Untersuchungen über das Hautleistensystem der Vola 500 Peipo, 270 ♂, 230 ♀ von Banran im Landkreis Tschôshû (潮州) lassen sich wie folgt zusammenfassen. Die vorliegenden Bildertypen und ihre prozentuelle Häufigkeit sind mit dem mittleren Fehler dargestellt.

I) Triradii metacarpophalangeales

- 1) Repräsentierende Handformeln nach WILDER; 7 5 5 3 (28.8 ± 1.43), 9 7 5 3 (19.5 ± 1.25), 11 9 7 5 (10.4 ± 0.97) 9 0, × 5 3 (6.5 ± 0.88)
- 2) Drei Typen nach CUMMINS und MIDLO; Typus 7 (42.2 ± 1.56), Typus 9 (35.7 ± 1.51), Typus 11 (22.1 ± 1.31)
- 3) Prädominierende Endigungsziffern der Linie D; Area 7 (38.8 ± 1.54), Area 9 (35.0 ± 1.51), Area 11 (22.0 ± 1.31)
- 4) Prädominierende Endigungsziffern der Linie C; Area 5 (37.8 ± 1.53), Area 7 (29.5 ± 1.46), Typus 0, × (15.5 ± 1.14), Area 9 (14.7 ± 1.12)
- 5) Prädominierende Endigungsziffern der Linie B; Area 5 (76.9 ± 1.33), Area 7 (21.4 ± 1.30)
- 6) Prädominierende Endigungsziffern der Linie A; Area 3 (66.0 ± 1.50), Area 5 (21.3 ± 1.29)

II) Figurae tactiles interdigitales

- 1) Triradius interdigitalis; 2t (1.9 ± 0.43), 3t (0.6 ± 0.24), 4t (9.1 ± 0.91), all t (3.9 ± 0.35)
- 2) Vortex interdigitalis; (0.0)

III) Figurae tactiles hypotenari; Ha (9.5 ± 0.93), Hb (1.4 ± 0.37), Hc (0.3 ± 0.17), Hb Hb (0.2 ± 0.14), Harch (0.4 ± 0.20), all H (11.8 ± 1.02)

IV) Figurae tactiles Thenari; all Th (6.2 ± 0.76),

- 1) Triradius thenari; all Th (6.2 ± 0.76)
- 2) Figura tactilis interdigitalis I; all I (5.6 ± 0.73)

V) Triradius carpalis; P (0.4 ± 0.20), Cl (5.0 ± 0.69), C (68.5 ± 1.47), Ch (23.7 ± 1.34), C Ch (2.1 ± 0.45), Ch Ch (0.1 ± 0.10), C Ch Ch (0.2 ± 0.14), all Ch (26.1 ± 1.40)