日本人齒牙の “Dryopithecus pattern” について

鈴 木 誠
酒 井 琢 朗

I 緒 言

GREGORY ('16) は Dryopithecus の下顎大白齒齒冠においては、頬側に Protoconid, Hypoconid 及び Mesoconid、舌側には Metaconid と Entoconid の5箇の主要な咬頭が存在し、然もそれらの咬頭の間に存在する裂溝が Y 型をなす事を發表し、これを “Dryopithecus pattern” と命名した。其後この形態が Sinanthropus, Meganthropus 及び Neanderthal 等の咬合面にも見られ、且、現存人類にも發見されることからして、Simidae 及び Hominidae の下顎大白齒における基本的形態である事が明かにされた。然し、現存人類の下顎第1大白齒は、Dryopithecus pattern を示すものが多いが、第2、第3大白齒では、咬頭数が減少する傾向を示し、それに伴つて、各咬頭の大さが變化し、裂溝の形態も異つて来る。即ち各咬頭中 Mesoconid が最初に影響を受けて、その大きさを減じ、遂に消失するに至り、Metaconid も可成りその大きさを減じて Protoconid と同じ大きさとなり、その結果、基本形態である Dryopithecus pattern は變化して、各咬頭の配置は對稱的となり、その間にある裂溝の形態は十字形に變化する。GREGORY 及び HELLMAN ('26) は、この形態を “Plus pattern” と名付けた。又 HELLMAN ('28) は基本的な Dryopithecus pattern から Plus pattern に退化するまでの變化を4段階に區分している。即ち、第I期——定型的な Dryopithecus pattern を示し、咬頭は5咬頭で裂溝が Y 型をなすので Y 5 によつて示される段階である。第II期——Mesoconid と Hypoconid との間にある裂溝は消失して4咬頭となるが、基本的な殘餘の形態は消失していないので Y 4 によつて示される。第III期——Metaconid はその大きさを減じ、裂溝の形態は Y 型から + 型に變化するが、咬頭は5咬頭であるので + 5 によつて示される。第IV期——定型的な plus pattern を示し、咬頭は4咬頭となり、+ 4 によつて示される。其後 HELLMAN による下顎大白齒齒冠形態の分類が多くの研究者に採用された。即ち NELSON ('38), STESLICKA ('48), GOLDSTEIN ('48), DAHLBERG ('49), PEDERSEN ('49) 等は、各人種について多くの業績を發表している。それらの研究によれば、Dryopithecus pattern の出現率には、人種的差異が著明であり、従つて系統發生學的意義を有するであろうといわれている。日本人に関しては、桐野・中村 ('54) がこの分類に従い、その出現頻度を調査し、又埴原 ('55) は、それらの形態について、遺傳様式の分析を行つている。

最近 JØRGENSEN ('55) は Danes 及び Dutchmen の下顎大白齒について、裂溝の形態

と咬頭数との相関関係を調査し、兩者の關聯性が極めて弱い事を指摘している。即ち、裂溝のY型から+型への退化は、必ずしも、その咬頭数の減少とは併行せず、咬合面裂溝の形態は、咬頭数より高度な退化傾向を示している。換言すれば、原始咬頭数はY型より遙に安定した形態的特徴であり、従つて、HELLMAN 其他が行つた様に、これら2つの形態的要素を同時に觀察することなく、分離して分析しなければならないと述べている。更に裂溝の形態についても、齒牙の形態を基準として、進化の課程を詳細に研究するために、その變化を3段階に分類している。即ちY型から+型への變化の特徴としては、Protoconid と Hypoconid との間の溝が比較的遠心に移動することであり、この遠心移動を基準として、次の如く分類する。即ち、第I期——Hypoconid と Metaconid が線狀の接觸をする Dryopithecus patternの段階で、Yといふ記號によつて示される。第II期——Hypoconid—Metaconid 及び Protoconid—Entoconid の間に點狀の接觸をなすもので、+の記號によつて示される。第III期——最も變化し、最も進化した段階であり、Protoconid—Entoconid との間に線狀接觸をなすもので、×の記號によつて示される。尙 HELLMAN の分類による“Plus pattern”は、JØRGENSEN の+型と×型とに相當する。

こゝには、日本人下顎大白齒咬合面裂溝形態と咬頭数との調査成績を發表する。

II 材料と調査方法

調査は、日本人中學校生徒（長野縣東筑摩郡鹽尻町）男子214名と、同じく女子224名の
下顎右側第1、第2大白齒咬
合面を密蠟（Bees Wax）に
て印象し、それより得た石膏
模型について、裂溝形態と咬
頭数を觀察した。

裂溝形態の分類は、上述の
JØRGENSEN ('55) の基準に則
り3型に大別した（第1圖參
照）。

第1圖 下顎大白齒咬合面裂溝形態の3型

III 調査成績及び諸人種との比較

第1表は、裂溝形態と咬頭数とを併せ觀察した成績である。同表によれば、第1大白齒においては、男女共に、Y5のものが最も多く、次いで+5、Y6の順であり、他型の出現率は極めて低く、何れも5%以下である。第2大白齒では、兩性共に×5に屬するものが最も多く、次いで+4、+5又は×4の順で次第に率を減ずる。尙男女兩性間における出現率の差異は誤差を考慮すれば、明かでない。即ち第1大白齒においては、第2大白齒に比して、裂溝形態では基本型であるY型の出現率が高く、逆に進化型と考えられる×型は稀であり、咬頭数も減少の傾向が軽度である。

次に日本人における裂溝形態の出現頻度と、JØRGENSEN の Dutchmen 及び Danes におけるそれとを比較参照すれば第2表の如くであり、第1大白齒においては、3種族共にY型の出現頻度が最も高く69%乃至70%で、その間に有意な差は認められないが、日本人の+型の出現頻度は、他の人種に比して可成り高率であり、逆に×型は低率である。第2大白齒においては、3種族共に×型の出現頻度が最も多く51%乃至58%で、その間に大なる差

第1表 裂溝形態と咬頭数の関係

	First Molar			Second Molar		
	Male 198	Female 194	Total 392	Male 179	Female 174	Total 353
Y ₇	1 (0.51) [%]		1 (0.26) [%]			
Y ₆	19 (9.60)	12 (6.19) [%]	31 (7.91)	1 (0.56) [%]		1 (0.28) [%]
Y ₅	113 (57.07)	129 (66.49)	242 (61.73)	5 (2.79)	3 (1.72) [%]	8 (2.27)
Y ₄	1 (0.51)	2 (1.03)	3 (0.77)	3 (1.68)	4 (2.30)	7 (1.98)
+ ₆	8 (4.04)	4 (2.06)	12 (3.06)	1 (0.56)	1 (0.57)	2 (0.57)
+ ₅	44 (22.22)	29 (14.95)	73 (18.62)	34 (18.99)	35 (20.11)	69 (19.55)
+ ₄	1 (0.51)	3 (1.55)	4 (1.02)	45 (25.14)	40 (22.99)	85 (24.08)
× ₆	1 (0.51)	3 (1.55)	4 (1.02)	9 (5.03)	2 (1.15)	11 (3.12)
× ₅	10 (5.05)	11 (5.67)	21 (5.36)	50 (27.93)	49 (28.16)	99 (28.05)
× ₄		1 (0.52)	1 (0.26)	31 (17.32)	40 (22.99)	71 (20.11)

第2表 裂溝形態出現頻度の比較

	First Molar				Second Molar			
	No.	Y	+	×	No.	Y	+	×
Dutchmen	674	69.2%	18.1%	12.7%	676	16.7%	26.8%	56.5%
Danes	147	69.4	12.2	18.4	217	14.3	27.2	58.5
Japanese	392	70.7	22.7	6.6	353	4.5	44.2	51.3

は認められないが、Y型出現頻度は日本人の方が遙に低率であり、逆に+型では日本人の方が遙に高率を示している。

第3表は日本人咬頭数について、他著者のものととの比較を示してある。同表によると、原始咬頭数である5・6・7咬頭は、第1大臼歯では、所・渡邊・木俣及び筆者等の成績では90%以上を占めているが、鈴木等の成績では約70%、津崎・尾形等の成績では約50%であり、その間に大なる差異が認められる。又第2大臼歯においては、5咬頭は減少し、尾形の24.7%を最低とし、大部分の著者の成績は約40%より60%の出現率を示すが、観察者によつては、

第3表 日本人下顎大臼歯咬頭数 (%)

First Molar				Second Molar			Authors
7 Cusps	6 Cusps	5 Cusps	4 Cusps	6 Cusps	5 Cusps	6 Cusps	
		93.1	6.4		64.2	35.4	TOKORO
		93.4	4.7		63.7	33.8	WATANABE
		97.5	1.5		42.0	54.5	KIMATA
		50.4	12.5		46.6	46.1	TSUZUKI
		74.0	13.0		60.0	27.0	SUZUKI
		57.2	37.5		24.7	70.6	OGATA
0.2	12.3	85.4	2.1	3.7	50.0	46.3	SUZUKI, SAKAI

柴田による。

出現率の變異が相當廣い。このことについて JØRGENSEN は、咬頭といふ名稱の解釋が、觀察者により可成り異なることを指摘しており、觀察基準の確立が俟たれるものである。

尙 ZUCKERKAND (1891) による、歐洲人の第2大臼齒における5咬頭出現率は16.5%、同じく第3大臼齒においては、43.0%であり、JØRGENSEN の Dutchmen における成績では、第2大臼齒が11.6%、第3大臼齒が52.3%である。歐洲人と Dutchmen の第3大臼齒における5咬頭出現率が、日本人における第2大臼齒に略々類似している事は、系統發生的に何らかの意味を有するものではなからうか。JØRGENSEN は3箇の大臼齒中、咬頭數の減少は先ず第2大臼齒に最も多く出現し、次いで第3大臼齒であるが、その系統發生的な説明については、未だ明確な結論を得ていないと述べている。

第6咬頭の出現率については、日本人資料での統計的調査が行われていないので、その比較は出来ないが、M. DE TERRA ('05) によると、現代人には極めて稀にしか出現せず、HELLMAN ('28) の調査でも、オーストラリア原住民において最も高率に發見され、8%の出現率を示したと云う。筆者等による第1大臼齒における、6咬頭以上の出現率12.56%は HELLMAN の8%に比して可成り高率であり、又桐野・中村も、日本人において第6咬頭の著るしく出現する事を報告している。

第4表は、男性の第1及び第2大臼齒における裂溝形態と咬頭數の出現率を他人種と比較するために、JØRGENSEN の表を引用したものである。HELLMAN の分類方法によつて比較すると、第1大臼齒のY5の出現率は、大部分の人種が約80%から100%の間にあるが、

第4表の I 第1大臼齒の裂溝形態と咬頭數出現率

	No.	Number of teeth	Y ₅ (%)	Y ₄ (%)	+ ₅ (%)	+ ₄ (%)	Y (%)	+ (%)	5 Cuspis (%)	4 Cuspis (%)	Authors
Australians	1	18	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	HELLMAN 1928
Buriat Mongols	2	36	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	"
Eskimos	3	29	97.0	0.0	3.0	0.0	97.0	3.0	100.0	0.0	"
Alaska Eskimos	4	67	89.6	1.5	6.0	3.0	91.0	9.0	95.6	4.5	GOLDSTEIN 1948
East Greenland Eskimos	5	169	95.8	0.0	3.0	1.2	95.8	4.2	98.8	1.2	PEDERSEN 1949
Chinese	6	26	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	HELLMAN 1928
Amerinds	7	97	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	"
Pima Indians	8	162	99.4	0.0	0.6	0.0	99.4	0.6	100.0	0.0	DAHLBERG 1949
Pecos Indians	9	332	88.6	0.0	10.8	0.6	88.6	11.4	99.4	0.6	NELSON 1938
Texas Indians	10	160	68.7	0.6	30.6	0.0	69.3	30.6	99.3	0.6	GOLDSTEIN 1948
Japanese	11	214	67.2	0.5	31.8	0.5	67.7	32.3	99.0	1.0	SUZUKI, SAKAI 1955
West African Negroes	12	97	99.0	1.0	0.0	0.0	100.0	0.0	99.0	1.0	HELLMAN 1928
American Negroes	13	179	98.0	1.0	1.0	0.0	99.0	1.0	99.0	1.0	"
Jews, Lublin	14	36	78.0	0.0	0.0	22.0	78.0	22.0	78.0	22.0	STESLICKA 1948
Hungarians	15	54	83.0	11.0	0.0	6.0	94.0	6.0	83.0	17.0	HELLMAN 1928
Poles	16	42	43.0	26	31.0						STESLICKA 1948
American Children	17	164	74.0	12.0	13.0	1.0	86.0	14.0	87.0	13.0	HELLMAN 1928
European Whites	18	98	87.0	7.0	2.0	4.0	94.0	6.0	89.0	11.0	"
Modern Dutchmen	19	832					69.2	30.8	89.4	10.6	JØRGENSEN 1955
Medieval Danes	20	150					69.4	30.8	95.1	4.9	"

* HELLMAN の資料は兩側のものを合せていると推測される。又 JØRGENSEN 以外の資料は性別側別が明かにされていない。

第4表のII 第2大臼歯の裂溝形態と咬頭数出現率

	No.	Number of teeth	Y ₅ (%)	Y ₄ (%)	+ ₅ (%)	+ ₄ (%)	Y(%)	+(%)	5Cusps (%)	4Cusps (%)
Australians	1	12	5.0	0.0	43.0	52.0	5.0	95.0	48.0	52.0
Buriat Mongols	2	39	0.0	5.0	31.0	64.0	5.0	95.0	31.0	69.0
Eskimos	3	30	6.0	7.0	37.0	50.0	13.0	87.0	43.0	57.0
Alaska Eskimos	4	132	12.8	3.0	63.8	20.5	15.8	84.3	76.6	23.5
East Greenland Eskimos	5	128	18.7	4.7	42.2	34.4	23.5	76.6	60.9	39.1
Chinese	6	21	0.0	0.0	19.0	81.0	0.0	100.0	19.0	81.0
Amerinds	7	99	1.0	0.0	31.0	69.0	1.0	99.0	32.0	69.0
Pima Indians	8	89	2.0	1.0	69.0	28.0	3.0	97.0	71.0	29.0
Pecos Indians	9	313	8.3	1.3	24.3	66.1	9.6	90.4	32.6	67.4
Texas Indians	10	206	1.5	3.4	26.2	68.9	4.9	95.1	27.7	72.3
Japanese	11	224	3.4	1.7	52.5	42.5	5.0	95.0	55.9	44.2
West African Negroes	12	96	17.0	12.0	8.0	63.0	29.0	71.0	25.0	75.0
American Negroes	13	218	6.0	21.0	24.0	49.0	27.0	73.0	30.0	70.0
Jews, Lublin	14	49	6.0	0.0	0.0	94.0	6.0	94.0	6.0	94.0
Hungarians	15	54	2.0	9.0	11.0	77.0	11.0	88.0	13.0	86.0
Poles	16	46	4.0	0.0	0.0	96.0	4.0	96.0	4.0	96.0
American Children	17	95	0.0	4.0	6.0	90.0	4.0	96.0	6.0	94.0
European Whites	18	110	0.0	5.0	1.0	94.0	5.0	95.0	1.0	99.0
Modern Dutchmen	19	734					16.7	83.3	11.6	88.4
Medieval Danes	20	217					14.3	85.7	10.4	89.6

Texas Indians と日本人は、各々 68.7 % 及び 67.2 % で、その出現頻度は極めて低率である。Y₄ の出現率は各人種共少く、+₅ は Texas Indians 及び日本人の約 30 % を最高としている。即ち日本人第 1 大臼歯は、他人種に比して、Y₅ が少く、逆に +₅ が多く、Texas Indians の成績と類似している。又第 2 大臼歯の Y₅ の出現率は、Eskimos 及び Negroes を除いて極めて低率である。Y₄ は Negroes が高率であり、+₅ は Pima Indians の 69 % を最高として、Alaska Eskimos、日本人の順に高率である。+₄ は Pole の 96 % を最高として、Jews, European Whites, American Children は 90 % 以上の高率を示すが、Eskimos, Pima Indians 等は 20 % ~ 35 % であり、日本人の 42.5 % も可成り低率である。

桐野・中村が、日本人より得た石膏模型について調査した成績によると、日本人第 1 大臼歯は、他人種と比較して、Y 型が比較的少く + 型が多く、第 2 大臼歯では、+₅ が Mongolian 系で最も多く、+₄ が少いという。この成績は、大略、筆者等の成績と一致している。

次に JØRGENSEN の主張した様に、裂溝形態と咬頭数の出現率を分離して観察すると、第 1 大臼歯における Y 型の出現率は、大部分の人種で 80 % ~ 100 % の間であるが、Texas Indians, Dutchmen, Danes では 70 % 前後であり、日本人は 67.7 % で最低の出現頻度を示す。又咬頭数において、5 咬頭の出現率は Mongoloid 及び Negroid が 95 % ~ 100 % の範囲であるが、Caucasian では Danes を除いて、80 % 臺であり、人種差の存在を窺うことが出来る。即ち、日本人第 1 大臼歯齒冠の形態は、Texas Indians と極めて良く一致し、

Danes にやゝ類似する。

第2大臼齒のY型の出現率は、Eskimos, Negroes, Hungarians, Dutchmen 及び Danes を除いては10%以下の出現率であり、従つて+型は90%~100%の出現率を示す。5咬頭の出現率は、Mongoloid では Chinese の19%が最低で、Alaska Eskimos の76.6%が最高率を示す。日本人においては、55.9%の頻度で、可成り高率である。然るに Negroid では、25%~30%、Caucasian では Hungarians の13.0%が最高で、極めて低率であり、他人種との間に劃然たる差が認められる。即ち日本人第2大臼齒齒冠の形態は、Australans にやゝ類似している以外、他人種とは可成りの相異がある。尙一般に裂溝形態では可成り退化の傾向が認められるが、咬頭数の減少は僅かである。

第2圖は、JØRGENSEN の示した、裂溝形態と咬頭数との相關圖に筆者等の成績を記入し、3人種圏を便宜上夫々線で囲んだものである。一般に裂溝形態については、Mongoloid 圏と Caucasian 圏との人種差は軽度であるが、Negroid 圏との間には可成りの差が見られる。尙咬頭数では、

第2圖 下顎大臼齒裂溝形態と咬頭数の相關圖 (JØRGENSEN による)

3人種圏の間に明かな差が窺われる。

IV 總 括

日本人中學校生徒、男子214名、女子224名の下顎第1及び第2大臼齒齒冠より得た石膏模型について、咬合面の裂溝形態及び咬頭数の統計的調査を行い、次の結果を得た。

- 1) 下顎第1大臼齒における、Y型の出現率は、男子67.7%、女子73.7%、男女平均70.7%で、諸人種中極めて低率である。咬頭数においては、5咬頭以上の出現率は、男女平均97.9%で、Caucasian に比較して高率である。
- 2) 下顎第2大臼齒における、Y型の出現率は男子5.0%、女子4.0%、男女平均4.5%で、諸人種中低率に屬するが、咬頭数においては、5咬頭以上の出現率が、男女平均53.7%で、Caucasian に比較して高率で、その間に劃然たる差異が見られる。
- 3) 裂溝形態及び咬頭数において、男女両性間に有意な差は認められない。
- 4) 第1及び第2大臼齒における、6咬頭以上の出現率は、各々12.5%、3.7%である。
- 5) 一般に日本人下顎第1及び第2大臼齒の裂溝形態は、可成り退化しているが、咬頭数の減少は、他人種に比しその傾向は軽度である。

文 献

- 1) Bolk, L.: 1914. Odontologische Studien. II Die Morphogenie der Primatenzähne. Jena. **
- 2) DAHLBERG, A. A.: 1949. The dentition of the American Indian. Papers of the physical anthropology of the American Indian. New York, Viking Press, Inc. 138—176.
- 3) GOLDSTEIN, M. S.: 1948. Dentition of Indian Crania from Texas. Am. J. Phys. Anthrop., n. s. 6: 63.
- 4) GREGORY, W. K.: 1916. Studies on the evolution of the primates. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 35: 239—355. *
- 5) —: 1922. The origin and evolution of the human dentition. Baltimore, William & Williams Company. *
- 6) GREGORY, W. K. and M. HELLMAN: 1926. The dentition of Dryopithecus and the origin of man. Anthrop. Papers Am. Mus. Nat. Hist., vol 28, pt. I: 1—123. *
- 7) —: 1926. The crown patterns of fossil and recent human molar teeth and their meaning. Natural Hist., 26: 300. *
- 8) —: 1937. The evidence of the dentition on the origin of man. in Early man, edited by G. G. MACCURDY London. *
- 9) 埴原和郎: 1955. 家族調査による大白歯齒冠形態の遺傳學的研究、第10回日本人類學會、日本民族學協會連合大會抄録。
- 10) HELLMAN, M.: 1928. Racial characters in human dentition. Proc. Am. Phylos. Soc., 67: 157—174. *
- 11) de JONGE COHEN, TH. E.: 1920. Die Kronenstruktur der unteren Prämolaren und Molaren. Deutsche Zahnheilkd. Fasc., 43: 8—82. **
- 12) JØRGENSEN, K. D.: 1955. The Dryopithecus pattern in recent Danes and Dutchmen. Jour. Dent. Res., 34: 195—208.
- 13) 桐野忠大・中村光雄: 1954. 日本人下顎大白歯齒冠の形態に關する研究 (第2報). 口腔病學會誌. 21 卷. 174 頁.
- 14) MOORREES, C. F. A. and TANDARTS: 1951. The dentition as a criterion of race with special reference to the Aleut. Jour. Dent. Res., 30: 815—821.
- 15) NELSON, C. T.: 1938. The teeth of the Indians of Pecos Pueblo. Am. J. Phys. Anthrop., 23: 261—293. *
- 16) PEDERSEN, P. O.: 1949. The East Greenland Eskimo Dentition. Medd. om Grønland (Reports on Greenland), 142: 256. *
- 17) ROBINSON, J. T.: 1953. Meganthropus, Australopithecines and Hominids. Am. J. Phys. Anthrop. n. s. 11: 1—38.
- 18) SCHUMAN, E. L. and C. L. BRACE: 1954. Metric and morphologic variations in the dentition of the Liberian chimpanzee; Comparisons with anthropoid and human dentitions. Human Biol., 26: 239—268.
- 19) 柴田信: 1941. 齒牙形態學. 東京.
- 20) 柴田信・黒河内敏三: 1942. 臨床齒牙形態圖説、第3版. 東京.
- 21) STESLICKA, W.: 1948. The Dryopithecus-pattern in human lower molars. Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, Lublin vol. 111: 7. *
- 22) SULLIVAN, L. R.: 1920. Difference in the pattern of the second lower molar tooth. Am. J. Phys. Anthrop., 3: 255—257.
- 23) de TERRA, M.: 1905. Beiträge zu einer Odontographie der Menschenrassen. **
- 24) WEIDENREICH, F.: 1937. The dentition of Sinanthropus pekinesis: a comparative odontography of the hominids. Palaeontologia Sinica, n. s., D No. 1 whole ser. No 101: 77—92.
- 25) —: 1945. Giant early man from Java and South China. Anthrop. Papers Am. Mus. Nat. Hist., vol. 40, pt. I.
- 26) ZUCKERKANDL, E.: 1891. Anatomie der Mundhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Zähne. Wien.

* 印は JØRGENSEN, ** 印は WEIDENREICH (' 37) に據る。

(信州大學醫學部第二解剖學教室)

On the "Dryopithecus Pattern" in Recent Japanese

MAKOTO SUZUKI

TAKURO SAKAI

The Dryopithecus pattern, as described by GREGORY in 1916, has been a subject of study by many anthropologists, and many treatises on the subject have been published, but only a few were studies on Japanese subjects.

The authors observed the fissure pattern—in three form (Y, +, X) according to JØRGENSEN's classification—and the number of cusps by the method of making a plaster cast of the crowns of the first and the second lower molars of 438 Japanese (214 males and 224 females).

The results are summarized as follows:

(1) The Y-pattern appeared in the first lower molar in 70.7 per cent of the total cases. This rate is extremely low compared with Caucasians and Negroids. The first molar had five cusps in 97.9 per cent of the cases, a very high rate compared to that for Caucasians.

(2) The Y-pattern appeared in the second lower molar in 4.5 per cent of the total cases. The second molar had five cusps in 53.7 per cent of the cases, again a high rate compared to that for Caucasians.

(3) In rate of appearance of both the Y-pattern and number of cusps no significant difference between male and female can be recognized.

(4) The first molar has six cusps in 12.5 per cent and the second molar in 3.7 per cent of total cases.

(5) The Japanese seem to be highly specialized in the trend toward a reduction in the fissure pattern on the lower molars, but they seem to have a higher frequency of five cusps in the lower molars than other racial groups.