受傷寛骨を含む縄文早期の二次埋葬例

森本岩太郎¹⁾・小片丘彦²⁾・小片保¹⁾・江坂輝弥³⁾

¹⁾ 新潟大学医学部第1解剖学教室

²⁾ 新潟大学歯学部第1口腔解剖学教室

³⁾ 慶応義塾大学文学部考古学研究室

要約 1969年8月の愛媛県上黒岩岩陰遺跡第4次発掘調査において、押捺文土器に伴う縄文早期中葉人骨少なくとも7体分が発見された。このうち、壮年男性2体と幼児1体は、岩陰最奥部に一括して二次埋葬されていた。二次埋葬様式は、小さな類円形ピットの底にまず頭蓋3個を横たえ、頭蓋のすきまに短小な骨を詰め、扁平骨でおおい、その上に成人長骨をほぼ平行に並べ、最後に土器片と平石でこれをおおっていた。二次埋葬された3体のうち、男性1体の右腸骨翼には、おそらく槍先として使用されたと思われる長さ約10cm、幅約2cmの有孔ヘラ状骨器が右外側後方やや上方から刺入してとどまつていた。この骨器による損傷は、致命傷であつたと推定された。二次埋葬に際し、その下にあつた屈葬女性人骨の下肢骨の一部は折り取られて二次埋葬ピット内に重葬されたが、頭蓋だけは岩陰のさらに奥へ移し埋められていた。

愛媛県上浮穴郡美川村大字上黒岩地籍所在の上黒岩岩陰遺跡は、久万川に面する、日当たりのよい石灰岩の岩陰で、標高約400mの所にあり、遺跡周囲の、久万川両岸の山地は標高700m内外の丘陵である。遺跡からは、古墳時代より縄文時代早期に至る遺物が出土し、さらに後期旧石器時代にも、この岩陰が利用されていたと思われる形跡がある。

この遺跡は、1961年に発見され、同年直ちに第1次発掘調査が行なわれた。その後1962年の第2次・第3次調査を経て、今回は1969年8月2日から8月14日まで、江坂・岡本健児氏（高知県立女子大）・西田栄氏（愛媛大）担当の下に第4次調査が実施され、小片（保）・森本・小片（丘）が出土人骨の調査を分担した。第4次調査では、岩陰の最奥部から縄文早期人骨少なくとも7体分が得られたが、このうち成人2体と幼児1体は、屈葬された成人1体の上に一括して二次埋葬されており、二次埋葬された成人1体の右腸骨翼にはヘラ状骨器が刺入してとどまつていた。以下、これらの縄文早期人骨の二次埋葬状態と骨器による人骨の損傷状況を中

心に報告したい。

なお、上黒岩岩陰遺跡の概要ならびに調査の経過については、江坂（1962）、江坂ら（1967・1969）、西田（1963・1969）、小片（保）（1963）の各報告を参照されたい。

人骨の埋葬状態

今回の第4次調査では、B地区保存工事とA地区拡張区の発掘調査が主として行なわれた（第1図）。A拡張区（岩陰最奥部）第4層（第1黒土層）から得られた押捺文土器に伴う縄文早期人骨は、少なくとも成人男性2体・成人女性1体・乳幼児3体・新生児1体の計7体分である。このうち成人男性2体と幼児1体は類円形ピット内に一括して二次埋葬されており、成人女性1体、乳幼児1体、新生児1体はそれぞれ別個に独立して埋葬され、幼児1体は下顎片だけが遊離して発見された。

1. 二次埋葬の人骨群

成人2体（第6901号および第6902号人骨）と幼児1体（第6903号人骨）が、直径約55cm、深さ約30cmの類円形ピット内に一括して二

ではそれがほぼ自然の状態に近い。

次いで、これらの頭蓋および下顎骨の間に、成人の椎骨・胸骨・肋骨・手骨・足骨などや、幼児の頭蓋以外の骨など、要するに比較的細くて小さな骨が無秩序に積み重ねられた。

次に、その上に成人の肩甲骨・寛骨などの扁平骨がかぶせられた(第4図)。ピットの北端には第 6901 号の左右の寛骨が、左寛骨を下に、右寛骨を上重ねて置かれているが、左寛骨は腸骨稜を北に向けて寛骨臼を上、また右寛骨

は腸骨稜を南西に向けて寛骨臼を下にしている。右寛骨の腸骨翼には、長さ約 10 cm、幅約 2 cm の有孔ヘラ状骨器(第5図)が、殿筋面から入って腸骨窩へ約 3 cm 突出するように刺入してとどまっていた。すなわち、ピット内では、このヘラ状骨器は右腸骨翼を貫いて先端を上に向けて発見された(第6図)。骨器の基部はピットの底に届いていない。これに対し、第 6902 号の寛骨はピット南隅および東隅に置かれ、左右の寛骨は第 6901 号の場合のように重ねて置かれず、また左右の寛骨とも寛骨臼を上に向けている。

さらに、その上には第 6901 号および第 6902 号の長骨が、骨軸をほぼ南北方向に向けて、おおむね水平かつ平行に並べられた(第7・8図)。しかし、なかには平行でなく相互にX字状に交差するもの、または、少数ながら平行に並べられた長骨の軸とほぼ直角に近い方向に置かれているものもある。長骨の配列順位は一定ではなく、2 体分が混ざって並べられ、近位端または遠位端を一方に集めたりせず、また、いずれかの骨端を直線上にそろえたりすることもない。

最後に、長骨群の上に楕円押捺文土器の比較的大きな破片が数片置かれ、その上を平石でおおっていた。

Fig. 4. Secondary burial in a small circular pit at Rock Shelter of Kamikuroiwa, showing the bone arrangement at the middle level of the pit.

Fig. 5. The bone spear tip from Rock Shelter at Kamikuroiwa, with which the right hip bone of an Earliest Jomon adult male was pierced. Upper, convex surface; lower, concave surface.

Fig. 6. Sharply edged Earliest Jomon bone spear tip pointed upwards in the pit for secondary burial at Rock Shelter of Kamikuroiwa in situ, penetrating the right ilium wing of an adult male hip bone.

Fig. 7. Secondary burial in a small circular pit at Rock Shelter of Kamikuroiwa, showing the bone arrangement at the upper level of the pit.

Fig. 8. Secondary burial in a small circular pit at Rock Shelter of Kamikuroiwa, showing the adult long bones arranged parallel to each other at the upper level of the pit.

以上のように、3体は全身の骨格が比較的よくそろって同一ピット内に一括して埋葬されているが、ピット内における各骨の位置関係が解剖学的に全く不自然である。しかし、おおよそは頭蓋骨・短骨・扁平骨・長骨の順にせまいピットの中にかなりコンパクトに積み重ね並べられている。また、人骨の関節部付近に人為的損傷は全く見られず、人骨に焼かれた形跡のないことなどから、3体の人骨は死後ある程度の期間を経て腐敗により各骨が関節で分離した後、ピット内に一括して二次埋葬されたものと推定される。

二次埋葬ピットからは、装身具・副葬品などは発見されなかった。

第 6901 号人骨は壮年の男性と思われ、その左大腿骨および脛骨から Pearson 式により推定した身長は約 160 cm である。骨格のがんじょうさ、筋付着部の発達の強さなどから、かなり屈強な男性であつたと想像される。この人骨の右脛骨が見当たらないが、これは再埋葬時にピット内に入れ忘れられたものであろうか。

第 6902 号人骨も壮年の男性と思われる。左大腿骨および脛骨からの Pearson 式による推定身長は約 155 cm である。筋付着部の発達は第 6901 号人骨よりもやや劣っている。頭蓋は後頭部が破損し、その一部が発見されないが、破損の状態から考えて、再埋葬時に失われた可能性がある。

第 6903 号人骨は 5～6 歳の幼児である。

2. 屈葬人骨 (第 6904 号人骨)

二次埋葬ピットの下に接して、北に頭を向け仰臥屈葬位で発見されたこの人骨は、頭蓋 (Cranium) および下肢骨の一部を除けば、ほぼ解剖学的位置関係を保っている (第 9・10 図)。すなわち、脊柱の上端は前述の第 6902 号頭蓋後頭部の直下付近にあり、脊柱は肋骨と自然の解剖学的位置を保ちながら二次埋葬ピットの南東壁付近直下を走つて、その下端は二次埋葬ピット南壁よりさらに約 20 cm 南に終る。両側上肢骨は、胸郭の外側に沿う位置で脊柱をはさむが、左右とも肘関節で極度に屈曲されているので、左右の手はそれぞれ同側の肩関節付近にある。骨盤は保存不良で、右寛骨と仙骨の大部分が失われているが、左寛骨は寛骨臼を上に向けている。下肢骨は、両側とも股関節および膝関節を強く屈曲したまま、膝が右に倒れた位置関係にある。ただし、両側膝関節を含んだ右大腿骨下半および両側下腿骨上半は断端がおおむね二次埋葬ピットの壁でそろうように折り取られ、折り取られた部分は二次埋葬ピット底の南隅に移されて二次埋葬人骨といつしよに重葬さ

Fig. 9. Human adult female skeleton at Rock Shelter of Kamikuroiwa, previously buried flexed in the same site where the secondary burial was held. Note that only the skull was removed and reinterred near the pelvis, though the parts of the limb bones forming the knee joints were carelessly broken off and put collectively in the secondary pit. Dotted interrupted line shows the outline of the pit for secondary burial.

Fig. 10. The human adult female skeleton at Rock Shelter of Kamikuroiwa, which was previously buried flexed in the same site where the pit for secondary burial was dug. Note that the skull was removed and reinterred near the pelvis.

れている。これは、おそらく二次埋葬ピットを掘った際、この屈葬人骨の膝関節部におつたので、その部分が折り取られ、二次埋葬ピット内に重葬されたものであろう。したがって、移し埋められた部分と、残された下肢骨の部分とは同一個体に属するが、両者の解剖学的位置関係は乱れている。左足骨は殿部付近にある。

屈葬人骨のための墓壇は確認できず、また装身具・副葬品などもみられない。

この屈葬人骨の頭蓋は、殿部よりさらに約15 cm 南（岩陰のさらに奥）に単独に発見された。すなわち、もとの頸・体幹・体肢とはほぼ同じ深さに、右を下にし、顔を西に向けて埋められている。下顎骨の位置は頭蓋（Calvarium）に対し解剖学的にはほぼ自然位にある。この頭蓋も、上述の膝関節部の場合と同様に、二次埋葬ピットを掘った際、その存在が気づかれ、特別に頭蓋だけを独立して、岩陰のさらに奥の位置に移し埋められたものと思われる。

第 6904 号人骨は熟年の女性と思われ、左大腿骨からの Pearson 式による推定身長は約 145 cm である。全身的に骨多孔症があり、脊柱・膝関節などに変形性関節症がみられる。

3. その他の人骨

1 年未満の乳児（第6905号人骨）がA拡張区の南西壁付近に西頭位で仰臥屈葬され、また新生児（第6906号人骨）が二次埋葬ピットの北西に接して埋葬されていた。ほかに、6 歳ぐらいの幼児（第6907号人骨）の下顎体破片が二次埋葬ピットの南西に接して単独に発見された。

なお、第 6901 号から第 6907 号までの人骨の形質的特徴については、後日あらためて報告する予定である。

骨器による人骨の損傷

上述のように、二次埋葬された第 6901 号成人男性人骨の右腸骨翼には、長さ約 10 cm、幅約 2 cm の有孔ヘラ状骨器が刺入したまま発見された。発見時には、二次埋葬ピット内で骨器

の先端は上を向いていた。この骨盤をピットから取り出し、直立姿勢の位置に置きなおしてみると、骨器は上前腸骨棘から約 3 cm 後方、腸骨稜の約 2 cm 下方の腸骨翼に、骨器の凹面を内側後上方に向けて、右外側後方やや上方から刺入している（第 11 図）。骨器の長軸とからだの前頭面とのなす角は約 30 度、また水平面とのなす角は約 5 度である。骨器の先端は刃こぼれもなく腸骨窩から大骨盤腔内に約 3 cm 突出している。したがって、腸骨翼殿筋面から外へつき出ている骨器基部の長さは 6 cm 余りである。

腸骨翼から骨器を取りはずして骨損傷部をみると、骨器の凸面および両側縁に対応する創面には骨器との摩擦による光沢があり、その創縁は鋭く、創縁周囲に骨折はみられない（第 12 図）。

Fig. 11. The secondarily buried human right hip bone in which an Earliest Jomon bone spear tip is lodged, from Rock Shelter at Kamikuroiwa.

これに対し、骨器の凹面に対応する創縁では、創縁に沿う小範囲の骨の喪失があり、したがって、その創面ならびに創縁の状態はかならずしも明瞭でない。これは、おそらく受傷時に創凹縁に沿うような小範囲の破砕骨折が起こり、破砕骨片は微細で数が多く、しかも移動せず、受傷直後はこれらの骨破片が骨膜によつて連結されていたが、二次埋葬に際し、骨片が失われたためと思われる。創傷部に治癒機転は全く見いだされない。

骨損傷部における以上の所見は、腸骨翼がまだ比較的新鮮な軟部組織におおわれていたとき、すなわち生前または死後短時日のうちに、へら状骨器が遠からぬ距離から、かなりの高速

Fig. 12. The wound by a bone spear tip in the right ilium wing of the hip bone, which put the Earliest Jomon male to death. Note that any bony reaction around the wound was absent. a, lateral or gluteal view; b, medial or iliac view.

で刺入したことを示すものである。腸骨翼のこの部における骨の薄さ、腸骨翼の殿筋面をおおう中殿筋および腸骨窩をおおう腸骨筋がこの部ではあまり厚くないこと、中殿筋膜の緊張のよいこと、皮下脂肪量も比較的少ない部位であること、など考え合わせると、このような骨器の刺入は、けつして無理な想定ではなからう。少なくとも、埋葬後に土圧により骨器が刺入したような所見ではない。もし、骨器の刺入が生前のことであるならば、この男性は腸穿孔により、即死に近いか、あるいは短時日の経過で死に至つたものと推定される。この人骨には、このほかに致命的となつたような損傷または病変はみられない。

考 察

清野（1946）によれば、縄文時代の特殊埋葬様式のうちに重葬・盤状集積などがある。清野、三宅（1940）、西村（1965）によれば、重葬例として福島県三貫地、愛知県伊川津・稻荷山・吉胡、大阪府国府、岡山県津雲、熊本県轟などの諸貝塚のものが知られているが、これらはいずれも縄文時代中期以降、とくに後・晩期の貝塚の例と思われる。著者の上黒岩の場合は縄文早期中葉の岩陰遺跡であり、しかも二次埋葬の際、以前に埋葬された屈葬女性人骨の頭蓋を移動し、膝関節部付近の大腿骨・脛骨などの破片は二次埋葬人骨3体といつしよに重葬している点が特異である。

また、清野によれば、盤状集積は愛知県吉胡貝塚で2例が経験された。第1例は1体分の人骨の四肢骨を4角形に組み合わせ、その四隅に前頭骨・後頭骨および側頭骨の左右がそれぞれ置かれていた。第2例は、第1例の盤状集積を2つ並べたもので、数人分の骨を集めて造つたものであつたが、各辺には四肢の長骨を用い、片方の4角形の中にはやや完全な頭蓋骨2個が置かれていたほかに、4角形の中に骨盤骨、椎骨、肋骨などの破片や小骨などが、ぎつしりと

すきまに埋め込まれていたという。この2例とも同貝塚の貝層下部あるいは貝層下礫層中から発見された。要するに、人骨の盤状集積は重葬の1種で、以前に埋葬した場所が忘れ去られて、その場所に新しく遺体を葬る目的で再発掘したところ古い人骨が出たので、これを取り片づけた際、古人骨を乱雑にたい積せず盤状または卓状に組み合わせたものである。しかし、これは単なるその場の思いつきで行なつたか、あるいは多少の美観を与えるためであつたか、あるいは古人骨に対してなんらかの宗教的儀礼を行なうためであつたか、今日から判断する根拠は得られないという。久永および斉藤によれば、人骨の盤状集積は近年愛知県枯木の宮・元刈谷両貝塚でも各1例が見られたという。

著者の上黒岩岩陰の例は、成人男性2体と幼児1体の計3体分の人骨がせまい類円形ピット内に二次埋葬されていたが、長骨を方形に組み合わせることはせず、ピットの底に頭蓋を置き、短小な骨をすきまに詰め、扁平骨をかぶせ、その上に長骨を並列させ、その上にさらに土器片を置き、最後に平石でおおつていた。また、3体のうち、成人男性1体の骨盤には、おそらく致命傷となつたと思われるへう状骨器による損傷がみられた。すなわち、吉胡・枯木の宮および元刈谷諸貝塚の盤状集積とは、人骨の配列方法が異なり、二次埋葬された人骨が成人・幼児の3体であり、うち成人1体は骨器により致命傷を負つており、しかも最上部に土器片や平石をかぶせている点が異なる。また、吉胡貝塚の場合は、新しく遺体を葬る際に発見された古人骨を盤状集積したとされているのに対し、著者の上黒岩岩陰の場合には二次埋葬された3体の人骨の由来がかならずしも明らかでないばかりか、二次埋葬に際して、かえつてその下にあつた屈葬人骨を発見し、その頭蓋だけを移し埋め、膝関節部は折り取つて二次埋葬ピット内に重葬している。これらが、著者の例をあえて盤状集積と呼ばなかつた理由である。

上黒岩岩陰における二次埋葬人骨の由来に関しては、吉胡貝塚の例のように、新しい埋葬に際し古い人骨が発見されたためと仮定すると、二次埋葬人骨の一次埋葬地はどこであつたかが問題となる。上黒岩岩陰では、現在のところ、二次埋葬人骨の一次埋葬地は確認されていない。したがって、一次埋葬地で発見された人骨に対する処置として二次埋葬が行なわれたものかどうかを、ここでは確言することはできない。いつぼう、清野は縄文時代の甕に人骨を入れて葬る習俗に関連して、青森県天狗岱遺跡の洗骨葬を紹介している。洗骨は環太平洋諸地方に見られる葬法の1つで、琉球・薩南諸島でも行なわれる。また、北方では死体を床上にさらす風習も多いという。著者の二次埋葬例も、甕は用いてはいないけれども、洗骨葬の可能性を全く否定し去る訳にはいかない。あるいはまた、二次埋葬された3体のうち1体に骨器による損傷のみられたことが、このような特殊埋葬を行なう動機となつたかとも考えられる。いずれにせよ、同様な二次埋葬列の追加をまつて、今後ともこの問題は考究されなければならないであろう。

上黒岩岩陰では、1962年の第2次・第3次調査に際し、A区において縄文早期人骨10数体分の埋葬が集積して発見され、A区のB区寄りの地点に中形犬2頭の埋葬骨があつた。すなわち、岩陰の最奥部は墓地として利用していたのであり、同様な例の報告は多いが、縄文早期の例は、大分県川原田洞穴、長崎県岩下洞穴など数例が知られる程度である。今回の上黒岩岩陰第4次調査で発見された二次埋葬人骨は、上記A区の集積埋葬場所よりもさらに岩陰の奥の地点にあつた。

縄文時代人骨損傷例のうち、石鏃によるものは、骨に石鏃がつき刺さつて発見されなければその確認が困難であるために、鈴木(1938・1958)による福島県三貫地貝塚の熟年男性の右寛骨および愛知県伊川津貝塚の成年男性の右尺

骨、清野による岡山県粒江貝塚の老年男性の第3胸椎の場合など、少数例が知られているにすぎない。また、骨器による獣魚骨などの損傷例の報告はあるが、人骨の損傷例はまだ見られないようである。著者の上黒岩岩陰の場合は、壮年男性右腸骨翼の有孔ヘラ状骨器による損傷例であり、この損傷が生前のものであるならば、直立姿勢の受傷者に対し、骨器は右外側後方や上方から骨盤に刺入していることになる。鈴木(1958)は三貫地・伊川津両貝塚人の場合に加えて、内藤ら(1957)による静岡県蜷塚におけるイノシシの骨盤の石鏃による損傷例を引用して、石鏃はいずれも外側後方から刺入している点に注目し、人間が弓を射る動作は両側上肢を大きく動かすだけにおん密な行動に適さないもので、その効果を確実にするために、目的物の後方で、かつ樹木上のような高所に位置することがもつとも適当であり、人畜ともに後方または後上方から射られたのは偶然でないかも知れないと述べている。著者の例も、ヘラ状骨器は右外側後方や上方から骨盤に刺入しているので、石鏃による損傷例で鈴木が推論したのとはほぼ同様なことがあつたかも知れない。この場合、ヘラ状骨器の基部には孔が2個あけられているので、骨器はおそらく木製の柄にとりつけられて槍のように使用されたものと思われる。初めから受傷者が意識的にねらわれたというよりは、仲間数人のグループで狩猟に出て、獲物とまちがえてねらわれたものか、あるいは、投げた槍が獲物からそれ、仲間にあたつて受傷し、死亡したとの想像もできる。被害者が右ききで、右手に槍を携行して獲物に迫つていたとすれば、左肩を右肩より前に出す斜位(いわゆる **boxing position**)で、からだを低くかまえているのが普通である。仲間のひとりによつて、後方から誤つて攻撃されれば、被害者の骨盤に右外側後方や上方から骨器が刺入しても不自然ではない。骨器による損傷が生前のものとすれば、この受傷例は縄文時代早期中葉における

この種のヘラ状骨器の用途の一端を示唆するものとして注目される。この場合、人骨に、軟部組織を通してこれだけの貫通力をもつためには、骨器にかなりの重量が必要であり、したがってこのヘラ状骨器は長柄の槍先として用いられたことであろう。ちなみに、上黒岩岩陰のものに類似のヘラ状骨器は長野県栃原岩陰からも数点出土しており、栃原のものは無孔であるかわりに、骨器の基部両側縁にくびれが作られているので、同様に柄に装着して用いられたことが想像される。

骨器による損傷が死後のものと仮定すれば、それは比較的新鮮な軟部組織がまだ骨盤に付着していた時期、すなわち死後短時日のうちの損傷であろうことは、前述のとおりである。これはいわゆる死体の損壊であり、この場合は、骨器はかならずしも長柄の槍のようなものの先端である必要はなく、もつと短柄のものであつたとしてもさしつかえあるまい。ただ、死体損壊とすれば、同時に二次埋葬された3体のうち、なぜ1体だけが骨器により損壊されているのかという疑問は残る。いつぼう、第6902号壮年男性人骨頭蓋後頭部が破壊され失われているが、第6901号受傷人骨の右脛骨も失われているので、これらは二次埋葬時の過失とも考えられ、第6902号人骨の後頭部の破壊をただちに死体損壊と断定するわけにはいかない。誤殺にせよ、死体損壊にせよ、二次埋葬時に、骨盤から骨器が抜き取られていないことに注意する必要がある。そのうえ、二次埋葬の際、骨盤に刺入したままの骨器の先端を意識的に上に向け、骨器と受傷人骨との関係をそのまま温存したとさえみえるような人骨の配列様式が二次埋葬ピット内でとられているように思われるのも興味深い。

二次埋葬ピットを掘るに際して、その下にある屈葬女性人骨の存在が気づかれ、彼女の膝関節部は折り取られて二次埋葬ピットの片すみに重葬されたが、頭蓋だけは重葬されずに特別に

岩陰のさらに奥に移し埋めかえられている。同じ人骨のうちでも頭蓋と他の部分の骨とでは取り扱いが異なることが注目される。頭蓋骨だけを特別に扱う習俗は、現在でもたとえばニューギニア高地諸族などのあいだにみられる。上黒岩岩陰では、二次埋葬人骨3体も、この屈葬人骨も、いずれもその顔が西に向けられており、岩陰の岩壁との関係ないしは方位に対するなんらかの考慮が、縄文早期人の間にあつたものと想像される。

ご教示をいただいた愛媛大学西田栄、高知県立女子大学岡本健児、東京国立文化財研究所岩崎友吉および樋口清治の諸氏、ならびに調査に際しお世話にあずかった愛媛県教育委員会、美川村教育委員会、地主竹口渉氏に心からお礼申し上げます。

文 献

- 江坂輝弥，1962：愛媛県上浮穴郡美川村上黒岩岩陰遺跡第2次調査速報。洞穴遺跡調査会会報，4。
- 江坂輝弥・森本岩太郎・小片丘彦，1969：愛媛県上黒岩岩陰遺跡第4次調査速報。考古学ジャーナル，37：17-19。
- 江坂輝弥・森本岩太郎・小片丘彦，1969：愛媛県上黒岩遺跡第4次発掘人骨速報。第23回日本人類学会日本民族学会連合大会講演要旨。人類誌，78：60（1970）。
- 江坂輝弥・岡本健児・西田栄・片岡廉介，1967：四国地方の洞穴遺跡。2。愛媛県上黒岩岩陰。日本考古学協会洞穴遺跡調査特別委員会編。日本の洞穴遺跡，p. 224-236。平凡社，東京。
- 久永春男・斉藤嘉彦（私信）。
- 清野謙次，1946：日本民族生成論，p. 116-163。日本評論社，東京。
- 三宅宗悦，1940：日本石器時代の埋葬。人類学先史学講座，7。日本及び隣接地の先史学，2。p. 1-26。雄山閣，東京。
- 内藤晃・市原寿文，1957：第2トレンチ第4区の発掘調査。浜松市教育委員会編。蜷塚遺跡——その第1次発掘調査——，p. 61-64。
- 西田栄一，1963：愛媛県上黒岩岩陰遺跡調査概報（第1），——上浮穴郡美川村所在——。愛媛県教育委員会編，愛媛県文化財調査第1集，上黒岩遺跡学術報告書，p. 1-13。

西田栄一, 1969: 愛媛県上黒岩遺跡第4次調査略報.

伊予史談, 195: 1-6.

西村正衛, 1965: 埋葬. 日本の考古学 2. p. 335-352.

河出書房新社, 東京.

小片保, 1963: 愛媛県上黒岩岩陰遺跡人骨概報. 愛媛

県教育委員会編, 愛媛県文化財調査第1集, 上黒

岩遺跡学術報告書. p. 14-20.

鈴木尚, 1938: 日本石器時代人骨の利器による損傷に就て. 人類誌, 53: 315-347.

鈴木尚, 1958: 石鏃が鉗入した先史時代人骨盤. 人類誌, 66: 112-115.

(昭和45年7月15日受付)

Secondarily Buried Earliest Jomon Skeletons, Including the Hip Bone Pierced by a Bone Spear Tip

Iwataro MORIMOTO¹⁾, Takahiko OGATA²⁾, Tamotsu OGATA¹⁾
and Teruya ESAKA³⁾

¹⁾ *Department of Anatomy, Niigata University
School of Medicine, Niigata, Japan.*

²⁾ *Department of Oral Anatomy, Niigata University
School of Dentistry, Niigata, Japan.*

³⁾ *Archaeological Institute, Faculty of Letters
Keio-Gijaku University, Tokyo, Japan.*

The human skeletal remains excavated at Rock Shelter of Kamikuroiwa, Ehime Prefecture, Japan, in August 1969 dated back to the middle of the Earliest stage of the Jomon period. The number of individuals estimated was seven. Three of them, two adult males and a child, were found buried secondarily in a small circular pit dug at the innermost recess of the rock shelter. The following was the form of the secondary burial observed: firstly, their skulls were placed on the bottom of the pit; secondly, the small bones were put among the skulls; thirdly, the adult flat bones were laid upon the small bones; fourthly, the adult long bones were arranged parallel to each other on the flat bones; and finally, the human remains were covered by pottery fragments and flat stones.

One of the adult males secondarily buried was found with a bone spear tip lodged in the right wing of the ilium of the hip bone. The wing of the ilium was so wounded posteriorly from the right side that the spear tip penetrated the gluteus and iliacus muscles, which sandwiched the wing of the ilium, to project approximately three centimeters into the abdominal cavity. The absence of any bony reaction around the wound showed that death followed rapidly, presumably from perforation of the intestines.

No evidence of the first temporary burial of these adult male and child skeletons during which the fleshy parts had decomposed was observed.

There was found another adult female skeleton previously buried flexed at the same site where the pit for the secondary burial was dug. Of her skeleton, only the skull was removed to, and reinterred in, the neighbourhood of the pelvis, though the parts of the lower limb bones forming the knee joints were carelessly broken off and put collectively in the secondary pit.

Anthropological and archaeological evaluation of both the secondary burial at the rock shelter and the bone spear tip wound in the male pelvis found in the Earliest stage of the Jomon period was discussed.