寒冷血管反応における手指皮膚温の測定部位について

——左手第3指末節手掌面と同背側面の比較——

木村邦彦・山下靖雄

東京教育大学体育学部応用解剖学教室

要約 男子19名について、寒冷血管反応の手指皮膚温測定部位の左手第3指末節手掌面と背側面とを、反応曲線の経過と同曲線の温度に関する4特性から比較検討した。両者の反応の経過はよく平行するが、一般にこれまでよく用いられてきている背側面よりも手掌面の反応がより鋭敏であり、測定部位としてより秀れていることを知った。

I 緒 言

厳しい寒冷下で手指皮膚温が波動状に動揺する現象は1930年 LEWIS によって発見された。その後この反応現象については、LEWIS(1930, 1931), GRANT & BLAND (1931) などによって詳細な研究が行なわれ、本反応は寒冷に対する生体組織の一種の保護作用であって、動静脈吻合の開閉反射による皮膚血行変化に起因していると説明された。しかし飯田(1949), 吉村(1953)などによれば、寒冷血管反応は必ずしも動静脈吻合だけでなく、一般に皮膚表在の細小血管と深部の太い血管の血流変化によって起こるもので、動静脈吻合が発達していれば反応は一層顕著となると報告されている。

寒冷血管反応の測定方法は LEWIS (1930), CARLSON (1966), 吉村 (1953, 1966), 井上(1970) などによって検討、報告されてきている。しかし熱電対による皮膚温の測定部位はいろいろで、手指の末節背側面、中節背側面、指間、指尖、末節手掌面などである。一般に左手第3指の末節背側面が多く用いられてきている。本論文では、左手第3指の手掌面と背側面での寒冷血管反応が比較され、測定部位としての適性について検討された。

II. 資料と方法

実験は昭和45年2月に一般者10名、および昭和44年11月と同45年2月に駅伝選手9名の計19名の男子学生を対象として行なわれた。冬のその時期の駅伝選手はトレーニング中で、一般により秀れた寒冷血管反応を示すことが知られている(木村・山下, 1971)ことから、特に区別されて資料とされた。測定時の月の平均気温は12.8°C(11月)および6.0°C(2月)、室温は20~22°Cであった。

冷水(0°C)中の手指皮膚温の測定には銅コンスタンタン熱電対と電位差計が用いられた。浸漬中の手掌面での測定は浸漬1分後に1回、以後30分まで1分間隔、また背側面では浸漬30秒後に1回、以後30分30秒まで1分間隔で同一計器で行なわれ、両面の測定時間には30秒間のずれを余儀なくされた。

Fig. 1は、左手第3指の末節手掌面(指尖部近く)と同背側面(爪の付け根)への熱電対の添付方法を示している。銅コンスタンタン熱電対の接合端を皮膚面にあて、厚さ約0.2 mmに圧縮された直径約6 mmの発泡スチロールの薄片でおおい、ビニールテープで固定した。さらに浸漬中冷水の浸入を防ぐためその上にワセリンが十分に塗布された。

従来、銅コンスタンタン熱電対の接合端は、

Fig. 1. Method of the application of thermo-piles made of copper and constantan wires on the palmar surface (near the tip) and the dorsal one (near the base of nail) of the distal phalanx of the left middle finger with adhesive plaster and a piece of foaming styrol.

Fig. 2. Effect of a piece of foaming styrol to the protection of thermo-pile against the direct cooling.

D.L.: Double layers (foaming styrol and adhesive plaster),
S.L.: Single layer (only adhesive plaster), R.T.: Room temperature.

単に一層のビニールテープあるいは絆創膏で固着されてきている。本実験では、冷水の接合端への直接の影響をできるだけ少なくする目的で、発泡スチロールの薄片を用いる方法が試みられている。予備実験として左手第3指末節手掌面に同時に2つの接合端をあて、一方を一層のビニールテープだけで、他方を発泡スチロールの薄片の上からビニールテープで固着し、両者の反応が比較された。Fig. 2には、2名の男子被験者Y.Y.とT.S.の両方法による寒冷血

管反応曲線が比較されているが、明らかに薄片挿入による効果と思われる反応性上昇の傾向が認められた。

冷却槽は鈴木(1969)と同型のものが用いられたが、さらに水温が常時0°Cに保たれるように若干の改良が加えられた(Fig. 3)。なお実験中、被験者は椅子に座わり、腕を楽に下げたまま左手の第3指の基節の中部まで冷却槽に没し、さらに同指の手掌面と背側面に均一の水ながるよう配慮された。

Fig. 3. Apparatus for the studies (Exposure bath). The finger is immersed into A(A') area, crushed ice is in B(B') area and water is stirred by the motor M to which a screw propeller is attached in C area.

III. 結果と考察

Fig. 4 の左には一般者、右には駅伝選手の各 3 名の反応曲線が例示されている。それぞれ、手掌面と背側面の皮膚温の反応性上昇の差の程度によって、上から、著しいもの、中等程度のもの、比較的少ないものの各代表例である。いずれの被験者においても手掌面の反応性上昇は背側面のそれに比べて著しく高い。また両面での測定時間には 30 秒のずれがあるが、皮膚温の動揺曲線は互いに平行している。すなわち手掌面では背側面に比べて反応現象がより明らかに、またより拡大されて現われ、しかも手掌面

での皮膚温は背側面での皮膚温より高いレベルで動揺の周期を同調しているといえる。この傾向はすべての被験者に共通して認められた。Fig. 5 は一般者 10 名と駅伝選手 9 名の各平均動揺曲線である。平均曲線からも明らかに背側面に比べて手掌面の反応の顕著なことが知られる。

吉村・飯田 (1950, 1952), 近藤 (1969), 鈴木 (1969), 井上 (1970), 木村・山下 (1970, 1971) などは本反応による対寒冷適応能の考察で、反応曲線 (皮膚温の動揺曲線) から皮膚温、反応時間、反応速度に関するいくつかの特性を取りあげて論じている。Fig. 6 に示されているように、このうち温度に関する 4 特性、すなわち冷却後最初の皮膚温の上昇が開始した時の温度 (TFR), 最初の皮膚温の反応性上昇がピークに達した時の温度 (TFP), 6 分～30 分までの平均皮膚温、ただし背側面では 6 分 30 秒～30 分 30 秒までの平均皮膚温 (MST) と皮膚温の反応性上昇の大きさ、すなわち TFP と TFR の差 (AT) について、手掌、背側両面の反応の差が検討された。なお本実験の両面の測定には 30 秒の時間的ずれがあるので、反応時間に関する特性は検討することができなかった。Table 1 に一般者と駅伝選手の手掌、背側両面での測定からの 4 特性の平均値と不偏分散が示されている。両群の 4 特性のすべてで、両面の平均値には 1% あるいは 5% の危険率で有意の差が認められ、手掌面で背側面よりも反応の明らかなことが知られる。

GRANT & BLAND (1931) は右手第 2 指の指尖部、中節手掌面の中部、末節背側面 (爪の付け根)、中節背側面の中部の 4 か所の皮膚温を測定し、皮膚温の上昇は指尖部がもっとも著しく、末節背側面 (爪の付け根) がこれにつき、中節の両面はいずれも劣ると述べている。同時にヒトの手足の動静脈吻合の分布について検討し、動静脈吻合は特に指の末端部に多く、指の背面には見られないことを知り、さらに動静脈吻合の多い部位では寒冷血管反応も著しいと述

Fig. 4. Comparison of the skin temperature response to cold between the palmar (P.S.) and the dorsal surface (D.S.) of the distal phalanx of the left middle finger based on 3 controls (left) and 3 runners (right).

Fig. 5. Mean curves of the skin temperature response to cold based on 10 controls and 9 runners. P.S.: Palmar surface, D.S.: Dorsal surface, R.T.: Room temperature.

Fig. 6. Illustration of four characteristics of the finger skin temperature curve.

TFR...Temperature of first rise after immersion. ($^{\circ}\text{C}$)

TFP...Temperature of first peak after first spontaneous rewarming. ($^{\circ}\text{C}$)

MST...Mean skin temperature. ($^{\circ}\text{C}$)

AT... Amplitude of temperature reaction, i.e. difference between TFP and TFR. ($^{\circ}\text{C}$)

Table 1. Means and mean squares of each characteristic of the palmar and the dorsal surface in room temperature of 20.0~22.0°C.

		N	Palmar Surface		Dorsal Surface		
			$\bar{x}$	u^2	$\bar{x}$	u^2	
Control	TFR (°C)	10	0.63	0.0753	0.48	0.0424	*
	TFP (°C)	10	15.79	4.6075	10.47	2.1179	**
	MST (°C)	10	10.80	11.0334	7.01	2.2787	**
	AT (°C)	10	15.15	4.5457	10.00	1.9967	**
Runner	TFR (°C)	9	0.61	0.0612	0.51	0.0407	**
	TFP (°C)	9	17.11	12.1683	11.80	5.3074	**
	MST (°C)	9	11.71	17.1493	7.94	6.3462	**
	AT (°C)	9	16.50	10.9871	11.30	4.6274	**

** Significant differences at 0.01 level.

* Significant differences at 0.05 level.

べている。

高橋 (1943) は足の第1指と第2指の指間部と、第3指の最尖端の皮膚温を同時に測定し、後者の皮膚温の上昇が大きいと報告している。吉村 (1966) も Nail bed と Finger ball での反応を比較し、両者の曲線は互いにはほぼ平行するが Finger ball は Nail bed よりも反応が著しいと報告している。

これらの知見と、一般者のみならず寒冷にさらされる駅伝選手にも同様に見られた本実験の結果とから、従来寒冷血管反応の測定に第3指末節背側面が多く用いられてきているが、同様の反応を示しながら末節手掌面（指尖部近く）は末節背側面（爪の付け根）よりも一層鋭敏に反応し、測定部位としてより適していることが知られた。

IV. 総括

昭和44年11月と同45年2月、室温 20~22°C のもとで一般者10名、駅伝選手9名の男子学生の測定結果に基づいて、銅コンスタンタン熱電対と電位差計を用いた 0°C の水中の皮膚温、いわゆる寒冷血管反応の測定部位としての左手第3指末節手掌面と同背側面の適性が比較検討された。

反応の比較は反応曲線（皮膚温の動揺曲線）の経過と反応曲線からの4特性（TFR, TFP, MST, AT）とについてなされた。その結果、

(1) 反応曲線の経過では、すべての被験者で、末節手掌面の皮膚温の反応性上昇は同背側面のそれに比べて著しい。

(2) 皮膚温に関する4特性の両面での平均値には、一般者、駅伝選手とも1%あるいは5%の危険率で有意な差が認められ、手掌面が同背側面に比べてより高い。

これらから寒冷血管反応における手指皮膚温の測定には、末節背側面よりも同手掌面がより鋭敏に反応し、より適しているということが知られた。

なお、銅コンスタンタン熱電対接合端をビニールテープで皮膚面に固着するとき、冷水の接合端への直接の影響を少なくする目的で、あらかじめ発泡スチロールの薄片で接合端をおおったのちにテープで固着する方法の効果が認められた。

文 献

CARLSON, L.D., 1966: Method of estimating local tolerance to extreme cold. Human adapt-

- ability and its methodology, (ed. H. YOSHIMURA and J.S. WEINER) pp.60-63, Japan.
- GRANT, R.T. and E.F. BLAND, 1931: Observations on arteriovenous anastomoses in human skin and in the bird's foot with special reference to the reaction to cold. *Heart*, 15: 385-407.
- 井上太郎, 1970:3. 局所耐寒性. 日本人の適応能 (生物圏動態ヒトの適応能分科会編), pp.32-45, 講談社, 東京.
- 飯田敏行, 1949: 寒冷血管反応に関する研究; (第1報) 寒冷血管反応の生理的意義について. *日本生理学雑誌*, 11: 73-78.
- 飯田敏行, 1949: 寒冷血管反応に関する研究; (第2報) 寒冷血管反応に關する血管について. *日本生理学雑誌*, 11: 79-85.
- 木村邦彦, 山下靖雄, 1970: 冷水中における手指皮膚温反応の研究; 水泳者について. *人類学雑誌*, 78: 31-38.
- 木村邦彦, 山下靖雄, 1971: 冷水中における寒冷血管反応の研究; 駅伝選手について. *東京教育大学体育学部紀要*, 10: 27-33.
- KONDO, S., 1969: A study on acclimatization of the Ainu and the Japanese with reference to hunting temperature reaction. *J. Fac. Sc., Univ. Tokyo, Sec. V, III-4*: 253-265.
- LEWIS, T., 1930: Observations upon the reactions of the vessels of the human skin to cold. *Heart*, 15: 177-208.
- LEWIS, T., 1931: Supplementary notes upon the reactions of the vessels of the human skin to cold. *Heart*, 15: 351-358.
- SUZUKI, M., 1969: Peripheral response to cold. *J. Anthropol. Soc. Nippon*, 77: 213-223.
- 高橋史郎, 1943: 指趾皮膚血管に於ける寒冷反応の習慣による増進. *日本生理学雑誌*, 8: 461-482.
- YOSHIMURA, H. and T. IIDA, 1950: Studies on the reactivity of skin vessels to extreme cold. Pt. 1. A point test on the resistance against frost bite. *Jap. J. Physiol.*, 1: 147-159.
- YOSHIMURA, H. and T. IIDA, 1952: Studies on the reactivity of skin vessels to extreme cold. Pt. 2. Factors governing the individual difference of the reactivity, or the resistance against frost-bite. *Jap. J. Physiol.*, 2: 177-185.
- 吉村寿人, 1953: 寒冷血管反応と凍傷ポイントテスト. *日本医事新報*, 1513: 72-73.
- 吉村寿人, 1953: 皮膚温の測定法と生理的意義. *日本医事新報*, 1517: 72.
- YOSHIMURA, H., 1966: A comment for the method of estimating peripheral tolerance to extreme cold. *Human adaptability and its methodology*, (ed. H. YOSHIMURA and J.S. WEINER) pp.64-66, Japan.

(昭和46年3月31日受付)

A Comment for the Method of Estimating

Vascular Reaction to Cold

—A Comparison of the Skin Temperature Response
between the Palmar and the Dorsal Surface of
the Distal Phalanx of the Left Middle Finger—

Kunihiko KIMURA and Yasuo YAMASHITA

*Department of Anatomy, Faculty of Physical Education,
Tokyo University of Education*

In this paper, the comparison of skin temperature response between the palmar and the dorsal surfaces of the distal phalanx of the left middle finger was carried out in order to find a more proper location for the test of estimating vascular reaction to cold water (0°C).

The experiment was made under the room temperature from 20 to 22°C based on 19 male subjects (10 controls and 9 Ekiden, long relay road race, runners) in November in 1969 and February in 1970.

The finger skin temperature during ice-water (°C) was measured by the micropyrometer and the thermopiles made of copper and constantan wires.

The following results are found; Based on the progress of fluctuation curve, the skin temperature rise of vascular reaction to cold was more apparent on the palmar surface than on the dorsal one of the distal phalanx in all subjects (Fig. 4). As for four characteristics (Fig. 6) from the skin temperature response, significant differences are recognized between the mean on both surfaces at 1% or 5% significant levels (Table 1).

It has been found from these results that the response to cold is more sensible at the palmar surface than at the dorsal surface, and that the former was suited for estimating of finger skin temperature.

In a preliminary examination, it was found that the double layers of the adhesive plaster and a piece of foaming styrol might have effect of the the protection against the direct cooling of the thermopile in cold water.