新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児の検討

中津愛子¹⁾²⁾, 橋本 誠¹⁾²⁾, 菅原一真¹⁾, 下郡博明¹⁾,
廣瀬敬信¹⁾, 池田卓生³⁾, 山下裕司¹⁾²⁾

¹⁾ 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野

²⁾ 山口大学医学部附属病院高次総合感覚器医療センター

³⁾ 鼓ヶ浦こども医療福祉センター耳鼻咽喉科

要旨：新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児28名の診断に至る経緯を調査し、問題点を検討した。リスクファクターのない重・高度難聴児13名のうち、親が難聴に気づき、0歳代で診断されたのは3名にすぎなかった。しかし、親がことばの遅れに気づき、1歳6か月児健診や3歳児健診で精査を勧められた児は8名であった。これらの結果から、新生児聴覚スクリーニングを受診していない児にはとくに聴覚発達チェックリストの活用と1歳6か月児健診や3歳児健診における聴覚チェックが重要であると考えられた。

リスクファクターのある児のうち、小児科からの紹介で定期的に聴覚検査を受けた8名は早期に診断されていた。とくに、先天性横隔膜ヘルニアの3名には定期的な聴覚検査によって進行性難聴を検出することができた。リスクファクターのある児には遅発性・進行性の難聴の可能性も考えられるため、早期からの定期的な聴覚検査が重要であると考えられる。

キーワード

新生児聴覚スクリーニング, 聴覚検査, リスクファクター

はじめに

近年、新生児聴覚スクリーニング後の精密検査に関する各地域の現状が報告されている^{1)～8)}。山口県でも新生児聴覚スクリーニングとその後の体制が確立するとともに⁹⁾、早期に難聴が発見され、療育が開始できるようになった。しかし、出生児の全てがスクリーニングを受けるわけではないため、スクリーニングを受けていない子どもの対応を考える必要がある。福田ら⁴⁾は、全県でスクリーニングを施行している岡山県でも、全出生児のうち25%はスクリーニングを受けておらず、未受診児への対応が課題であると報告した。また、針谷・田中¹⁾は、スクリーニング後の精密検査で聴力低下を認めた症例を報

告し、新生児聴覚スクリーニングの見直しの機会として1歳6か月児健診での聴覚チェックの実施を提唱している。

本研究では、新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児の実態を調査し、問題点を明らかにすることで、スクリーニングを受けていない子どもの対応について検討した。

対象および方法

対象は、1997年から2007年までに山口大学医学部附属病院耳鼻咽喉科を受診した新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児28名とした。本研究で新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児とは、現在多くの施設で行われている出生後約1週間以内

に、主として産科で行われる新生児スクリーニングを受けていない難聴児のことである。この28名に対し、難聴発見のきっかけ、受診の経緯、診断年齢、聴覚検査の経過について、診療録をもとに調査した。難聴の程度は、良聴耳の4分法による平均聴力をもとに、30dB以上40dB未満を軽度難聴、40dB以上70dB未満を中等度難聴、70dB以上90dB未満を高度難聴、90dB以上を重度難聴とした。難聴の程度別の人数は、重度10名、高度11名、中等度6名、軽度1名であった。

なお、山口県の新生児聴覚検査事業は2003年の10月から開始された⁹⁾。したがって、対象児にはこの事業が開始される前の子どもも含まれている。

当科では、当院のNeonatal Intensive Care Unit (NICU) や小児科と連携して、難聴のリスクファクターを持つ児に対する聴覚検査を行っている¹⁰⁾。2000年10月以前に出生したハイリスク児には小児科でABRを用いたスクリーニングを行い、当科で精査を行った。また、2000年10月以降に出生したハイリスク児には当科で自動聴性脳幹反応(自動ABR)と歪成分耳音響放射(DPOAE)によるスクリーニングを行い、スクリーニングがパスであっても、その後に聴性行動反応聴力検査(behavioral observation audiometry, BOA)や条件詮索反応聴力検査(conditioned orientation response audiometry, COR)、症例に応じて聴性脳幹反応(ABR)を用いて3か月ごとに聴覚検査を実施し、診断を行った。なお、NICUに入室した児は、全身状態が落ち着き、NICU退室後、小児科に転棟してからスクリーニングを行った。

このようなハイリスク児の聴覚検査は、現在多くの施設で行われている新生児聴覚スクリーニングの流れとは異なるものである。したがって、本研究では当科で聴覚検査を受けたハイリスク児も新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児とした。

今回検討した難聴のリスクファクターを持つ児は13名である。このうちの8名が上記のシステムで難聴と診断された。その他の児は、他院からの紹介、または、健診等を経由して当科で精査を受け、難聴と診断された症例である。なお、乳児期を過ぎて当科を受診した症例には、その子どもの年齢や発達に応じた方法で聴力検査を行った。

結 果

1. リスクファクターを持たない児(表1)

リスクファクターを持たない症例では、難聴に対する親の気づきは重度であっても3例にすぎず、高度および中等度の症例には、難聴に対する親の気づきが認められていなかった。しかし、親がことばの遅れに気づいた症例は8例(重度難聴4例、高度難聴4例)であった。そのうちの5例は、親が1歳6か月児健診でことばの遅れを相談した結果、難聴の疑いを指摘され、精査をすすめられた症例であった。また、3歳児健診でことばの遅れを相談した結果、難聴の疑いを指摘され、精査をすすめられた症例も1例あった。症例10は1歳6か月児健診で、症例13は3歳児健診で、いずれも親がことばの遅れを相談した結果、難聴の疑いを指摘され、精査のために当科を受診した症例であった。この2例には前庭水管拡大が認められた。

また、小児科医が難聴を疑い、当科に紹介された症例が4例あった。症例1と症例9には心疾患、症例14と症例15には発達の遅れがあり、各担当の小児科医が経過観察中に難聴を指摘し、当科で精査を行った結果、難聴と診断された経緯があった。

2. リスクファクターを持つ児(表2)

まず、当科のハイリスク児に対する聴覚検査によって難聴と診断された8例(症例16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25)について述べる。症例16と症例18は細菌性髄膜炎のために当院小児科に入院した症例である。発症は、症例16が1歳2か月、症例18が0歳5か月であり、いずれも当院小児科で行われたABRで閾値上昇を認めたために当科に紹介され、難聴と診断された。次に、脳性麻痺と診断された症例20と症例24について述べる。この2例は仮死出生のために当院NICUで管理され、症例20は0歳8か月、症例24は0歳10か月の時に小児科でABRが行われた。その後、直ちに当科で精査を行い、乳児期に診断することが可能であった。次に、症例17, 19, 21の経過について述べる。この3例は先天性横隔膜ヘルニアと診断され、新生児遷延性肺高血圧症(persistent pulmonary hypertension of the newborn, PPHN)を引き起こした症例である。呼吸障害のために人工呼吸管理を要し、当院NICUで管理され

表1 リスクファクターを持たない症例

程度	症例	発見のきっかけ	診断年齢
重 度	1	小児科医の指摘	0歳6か月
	2	親の気づき(難聴)	0歳8か月
	3	親の気づき(難聴)	0歳11か月
	4	親の気づき(難聴)	1歳1か月
	5	親の気づき(ことばの遅れ) ⇒ 1歳6か月児健診で指摘	1歳7か月
	6	親の気づき(ことばの遅れ) ⇒ 1歳6か月児健診で指摘	1歳7か月
	7	親の気づき(ことばの遅れ) ⇒ 1歳6か月児健診で指摘	2歳0か月
	8	親の気づき(ことばの遅れ) ⇒ 1歳6か月児健診で指摘	2歳1か月
	9	ことばの遅れ, 小児科医の指摘(難聴)	2歳11か月
高 度	10 [※]	親の気づき(ことばの遅れ) ⇒ 1歳6か月児健診で指摘	2歳0か月
	11	親の気づき(ことばの遅れ)	2歳6か月
	12	親の気づき(ことばの遅れ)	2歳7か月
	13 [※]	親の気づき(ことばの遅れ) ⇒ 3歳児健診で指摘	3歳0か月
中 等 度	14	小児科医の指摘(難聴)	2歳11か月
	15	小児科医がことばの遅れを指摘 ⇒ 小児科でのABR	5歳5か月

※前庭水管拡大による難聴症例

表2 リスクファクターを持つ症例

程度	症例	特記事項	受診の経緯	診断年齢
重 度	16	細菌性髄膜炎, 内耳奇形	当院小児科 ⇒ 当科	1歳3か月
	17	先天性横隔膜ヘルニア, 仮死, 人工呼吸管理, PPHN	当院小児科 ⇒ 当科	0歳6か月
	18	細菌性髄膜炎	当院小児科 ⇒ 当科	0歳6か月
	19	先天性横隔膜ヘルニア, 人工呼吸管理, PPHN	当院小児科 ⇒ 当科	0歳7か月
	20	仮死, 人工呼吸管理, 脳性麻痺	当院小児科 ⇒ 当科	0歳8か月
	21	先天性横隔膜ヘルニア, 仮死, 人工呼吸管理, PPHN	当院小児科 ⇒ 当科	1歳4か月
	22	ピエール・ロバン症候群	他院耳鼻科(滲出性中耳炎の治療) ⇒ 当科	1歳4か月
	23	仮死, 胎便吸引症候群, 人工呼吸管理, PPHN	1歳6か月児健診で指摘 ⇒ 他院耳鼻科 ⇒ 当科	1歳6か月
	24	仮死, 脳性麻痺	当院小児科 ⇒ 当科	0歳10か月
中 等 度	25	超低出生体重児, 仮死, 高ビリルビン血症, 人工呼吸管理	当院小児科 ⇒ 当科	2歳3か月
	26	低出生体重児	親の気づき(難聴・発音不明瞭) ⇒ 3歳児健診 ⇒ 当科	3歳0か月
	27	先天性横隔膜ヘルニア, 人工呼吸管理	幼稚園教諭による難聴への気づき ⇒ 当科	5歳3か月
軽 度	28	家族性難聴	就学時健診 ⇒ 他院耳鼻科 ⇒ 当科	6歳8か月

PPHN: persistent pulmonary hypertension of the newborn(新生児遷延性肺高血圧症)

た。その後、当院小児科に転棟し、0歳2か月のときに初回のABRを受けている。その結果は症例17が40dB、症例19と症例21は20dBであった。この3例はその後小児科で定期的にABRを受け、閾値上昇を認めたために当科に紹介された経緯があった。当科での精査によって、ABRとBOAやCORの閾値も経時的に変化していることがわかり、難聴

と診断された。同様に、症例25も人工呼吸管理を要した症例である。この症例は発育が良好ではなく、当院のNICUで長期間管理された後、小児科に入院した。全身状態が落ち着き、2歳3か月のときに小児科から聴覚検査の依頼があった。当科で聴覚検査を行った結果、難聴と診断された。

さて、次に、当科のハイリスク児に対する聴覚検

査とは異なる経緯で診断された5例（症例22, 23, 26, 27, 28）について述べる。症例23は胎便吸引症候群にPPHNを伴う症例、症例27は先天性横隔膜ヘルニアの症例であり、いずれも呼吸障害のために人工呼吸管理を要した。この2例は他院で出生し、直ちに当院NICUに入室した。しかし、その後の発達が良好であったためにいずれも出生した病院の小児科で発達のフォローが行われた。そのため、当科に紹介され定期的に聴覚検査を受けるという機会を得ていなかった。症例23はことばの遅れに気づいた親が1歳6か月児健診で相談し、難聴の疑いを指摘されて他院耳鼻科を受診した後に当科に紹介され、難聴と診断された経緯があった。症例27は4歳のときに幼稚園教諭が難聴に気づき、5歳になって当科を受診し、難聴と診断された経緯があった。次に、症例26について述べる。この症例は低出生体重児であるが、発達全般が良好であり、ことばの遅れもなく、1歳6か月児健診でも異常を指摘されていなかった。しかし、2歳になり、聞き返しが多いこと、ことばがはっきりしないことに親が気づき、3歳児健診で難聴を指摘され、当科を受診した経緯があった。この症例は発達が良好であり、小児科でのフォローでも異常を指摘されなかったため、早期に聴覚検査を受けることを勧められていなかった。一方、症例22は滲出性中耳炎の治療のために受診した他院耳鼻科でABRを受け、精査目的で当科を受診し、難聴と診断された経緯があった。この症例は他院耳鼻科を受診したことがきっかけで、1歳前半に難聴と診断された。

次に、軽度難聴の症例28について述べる。この症例は、2000Hz以上の高周波数で低下を認める軽度難聴児であり、家族に難聴者が存在する。しかし、児の難聴は3歳児健診では指摘されず、就学時健診で指摘された。親の気づきは、「6歳になって、テレビの音を大きくするようになった」「ことばは遅いと感じていたが、会話に支障はない程度に発達していた」ということであった。家族の難聴は進行性であるため、親の不安はあったようだが、耳鼻科を受診することはなく、就学時健診がきっかけで他院耳鼻科を受診し、精査のために当科を紹介された経緯があった。

考 察

1. 新生児聴覚スクリーニングを経由しない子どもへの対応について

難聴のリスクファクターを持たない児のうち、親が難聴に気づいたのは重度の3例にすぎなかったことから、新生児聴覚スクリーニングを経由しない子どもの難聴を早期に発見することは、難聴の程度が重度であっても容易ではないと考えられた。したがって、リスクのない先天性の難聴を早期に診断するためには新生児聴覚スクリーニングを広めることが重要であると考えられた。

さて、山口県では母子手帳に聴覚発達チェックリストを挟みこみ、子どもの聴覚発達を家庭でチェックできるようにしている。中澤ら⁶⁾によれば、3～4か月児健診で聴覚言語発達リスト（田中・進藤）の到達度が低い場合は高度難聴が示唆されるので、積極的に聴力検査を勧めると述べている。このことから、スクリーニングを受けていない子どもへの対応として、3か月児健診でリストの到達度を確認し、到達度の低い子どもに精査を勧めることが重要であると考えられる。今後は、聴覚の発達を家庭でチェックすることに関する親への指導の充実が必要である。また、乳児健診などで親がチェックをしたリストの到達度を確認する機会を持つことが望ましいと考えられる。

また、今回検討した症例には、親がことばの遅れに気づき1歳6か月児健診で相談したことがきっかけで難聴の疑いを指摘され当科を受診した児が複数存在したことから、スクリーニングを受診していない子どもには、とくに1歳6か月児健診における聞こえと言葉の発達のチェックが必要であると考えられた。森田ら¹¹⁾は、1歳6か月児健診における聴覚検診の手引きによって、両側中等度難聴も含めて難聴の選別が可能であることを報告し、1歳6か月児健診での聴覚チェックの意義を唱えている。今回検討した症例の中には、1歳6か月児健診や3歳児健診で難聴を指摘されて当科を受診し、前庭水管拡大による難聴と診断された症例もあった。このことから、畠ら⁵⁾が述べるように、3歳児健診における聴覚検診をも含めた包括的なシステムが重要であると考えられる。さらに、中等度難聴は、新生児聴覚

表3 先天性横隔膜ヘルニアの症例

症例	在胎週数	出生体重	アプガールスコア		人工呼吸管理	PPHN	検査の経過	診断年齢
			1分	5分				
17	37週	2780g	2	2	36日 ECMO	+	0歳2か月 ABR 右40dB 左40dB 0歳6か月 ABR 右60dB 左60dB 0歳8か月 ABR 右70dB 左80dB BOA 80dB	0歳6か月
19	38週	2474g	2	2	39日 ECMO	+	0歳2か月 ABR 右20dB 左20dB 0歳4か月 ABR 右40dB 左40dB 0歳7か月 ABR 右70dB 左80dB BOA 80dB	0歳7か月
21	38週	3348g	2	2	9日 HFO	-	0歳2か月 ABR 右20dB 左20dB 1歳0か月 ABR 右60dB 左60dB 1歳11か月 COR 50-70dB	1歳4か月
27	40週	3216g	9	9	19日 HFO	-	4歳 難聴への気づき 5歳3か月 ABR 右50dB 左60dB 平均聴力レベル 右 56.3dB 左 53.8dB	5歳3か月

PPHN: persistent pulmonary hypertension of the newborn(新生児遷延性肺高血圧症)

ECMO: extracorporeal membrane oxygenation(体外式膜型人工肺)

HFO: high-frequency oscillation(高頻度換気)

スクリーニングの導入によって早期に発見されるようになったという報告⁷⁾¹²⁾からも、スクリーニングを受診していない場合には診断に至るまでに時間を要することが予測されるため、1歳6か月児健診と3歳児健診での聴覚チェックはきわめて重要であると考えられる。

次に、リスクファクターを持つ子どもへの対応について述べる。一般に、NICUで管理されるハイリスク児の難聴発生率は高く、早期から聴覚検査を行うことが重要であるとされている。Joint Committee on Infant Hearing が2007年に発表したupdateにも、NICU児は別のプロトコルでスクリーニングを行うことが示されている¹³⁾。今回検討したリスクファクターを持つ児のうち、当院小児科からの紹介により、当科で定期的に聴力検査を行った症例は、早期に難聴を発見することができた。しかし、親がことばの遅れに気づき1歳6か月児健診や3歳児健診で難聴の疑いを指摘された症例や、幼稚園教諭が難聴に気づいたことがきっかけで当科を受診した症例もあった。これらの症例は、その後の発達を出生した病院の小児科でフォローされており、聴覚検査を定期的に行うということが確立しがたい状態であったと予想され、そのことによって診断に至るまでの時間を要した可能性が考えられた。

また、家族性難聴の症例28のように、周産期には異常がなく発達も良好な軽度の難聴児が、3歳児健診でも指摘されず、就学前でようやく精査を勧められたという児も存在した。この症例のように言葉の獲得もあり、周囲に気づかれにくい軽度難聴は、診断に至るまでにさらに時間を要することが予想される。以上のことから、リスクファクターを持つ児を早期に診断するためには、聴覚検査を定期的に行うルートを早期に確立することが重要であると考えられる。

2. 遅発性・進行性の難聴について

川城ら¹⁴⁾は、先天性横隔膜ヘルニアの症例に遅発性・進行性の難聴が高率であることを報告し、初回の検査が正常であっても、長期のフォローが必要であると述べている。塚本・伊藤¹⁵⁾によれば、新生児仮死や先天性横隔膜ヘルニアなどによるPPHNは体外式膜型人工肺(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO)の導入によって生存率が改善したが、感音性難聴の発生率が高いという。また、Fligorら¹⁶⁾もECMOを使用した症例の原疾患が先天性横隔膜ヘルニアの場合には、感音性難聴の出現率が高いことを報告している。我々が今回検討した症例にも、先天性横隔膜ヘルニアの難聴症例がある(表3)。いずれも呼吸障害を認め、人工呼吸管理を

行った。呼吸管理の方法は高頻度換気 (high-frequency oscillation, HFO) が2例, ECMO が2例であった。PPHN を合併した症例は2例である。症例17, 19, 21は当院で出生, 症例27は他院で出生したが, すべて当院のNICUに入院し, 当院で手術を受けている。症例17, 19, 21は当院小児科で発達をフォローされ, 聴覚検査を定期的に行うことができた。初回のABRの結果は症例19と21は正常, 症例17は40dBであった。しかし, その後, 定期的に行ったABRの結果とBOA, CORの結果から聴力が経時的に変化していることが判明し, 症例17は0歳6か月, 症例19は0歳7か月, 症例21は1歳4か月に難聴と診断された。この3例は聴覚検査の経過から進行性の難聴と考えられた。一方, 症例27はその後の発達を他院小児科でフォローされ, 聴覚検査を定期的に受けていなかった。そのため, 難聴を呈した時期は不明であり, 診断も5歳と遅れていた。この結果から, 先天性横隔膜ヘルニアの症例のように, 進行性難聴のリスクがある児には早期から定期的に聴力検査を行い, 聴力の経時的な変化を調べることが難聴を診断するために必要であると考えられる。

川城ら¹⁷⁾は, NICUで管理された新生児のうちABRが正常であった児が, 退院後, 難聴を呈した10症例を報告し, 全例に重篤な呼吸障害があり, 30日以上 of 長期にわたる人工呼吸管理を受けていたこと, そのうちの8例はECMOを使用していたことから, 人工呼吸管理の方法に問題があるという可能性を指摘した。また, 畠ら¹⁸⁾も, NICUに入室し10日以上 of 人工呼吸管理を受けた症例で, PPHNを合併し, HFOを使用した児にその後の検査で進行性難聴が認められたことを報告している。さらに, 池原ら¹⁹⁾も長期間の呼吸管理を要する重度の呼吸障害では難聴の発生の可能性が高いと考えられると述べている。また, 泰地ら²⁰⁾がABR無反応でCOR閾値が100dB以上であった症例に呼吸障害を伴うものが多かったことを指摘しているように, 重い呼吸障害がある児には, 初回の検査でパスしても, 遅発性・進行性の難聴のリスクを考え, 定期的に聴覚検査を行って経過を追うことが重要であると考えられる。

ま と め

1. 新生児聴覚スクリーニングを経由しない難聴児28名について検討した。
2. リスクファクターを持たない難聴児15名のうち, 難聴に対する親の気づきは重度の3名にすぎず, 新生児聴覚スクリーニングを経由しない子どもの難聴を早期に発見するためには, 聴覚発達チェックリストの活用と1歳6か月児健診や3歳児健診における聴覚チェックが重要であると考えられた。
3. 難聴のリスクファクターを持つ難聴児13名のうち, 早期から定期的に聴覚検査が行われた8名は早期に診断されたが, 定期的な聴覚検査が行われなかった児には診断までに時間を要した症例が認められた。
4. 先天性横隔膜ヘルニアのように重度の呼吸障害を伴い, 長期間の人工呼吸管理, ECMO や HFO を使用した症例には, 遅発性や進行性の難聴が起きる可能性があるため, 早期から定期的に聴覚検査を行い, 経過を追うことが難聴の早期診断のために必要であると考えられた。

A study of infants with hearing loss who had not undergone newborn auditory screening to identify problems

Aiko Nakatsu¹⁾, Makoto Hashimoto¹⁾, Kazuma Sugahara¹⁾, Hiroaki Shimogori¹⁾, Yoshinobu Hirose¹⁾, Takuo Ikeda²⁾, Hiroshi Yamashita¹⁾

¹⁾Department of Otolaryngology, Graduate school of Medicine, University of Yamaguchi

²⁾Tsuzumigaura Handicapped Childrens' Hospital

We examined the status of twenty-eight infants with hearing loss who had not undergone auditory screening when newborns to identify problems. Of thirteen infants with severe or advanced hearing loss who showed no risk factor, the parents of only three infants noticed their hearing problem and consulted a physician before their child's first birthday.

Since it is very difficult to identify hearing loss in infants who do not undergo screening, it is important to recommend to their parents to utilize a checklist for hearing development. During the 1.5- and 3-year-old checkups, some parents who had been worried about a delay in their children's language development were advised to have them undergo an auditory test. Therefore, auditory tests in these checkups are very important. Hearing loss in eight children with risk factors was identified at an early stage since they had undergone auditory tests regularly at the recommendation of a pediatrician. Of these eight infants, three with congenital diaphragmatic hernia were diagnosed as having progressive hearing loss during a regular auditory examination. It is important for infants with risk factors to undergo auditory tests on a regular basis because they are likely to develop delayed or progressive hearing loss.

参考文献

- 1) 針谷しげ子, 田中美郷: 新生児聴覚スクリーニング精密検査後の聴力変動例。Audiology Japan **48**: 196-204, 2005
- 2) 井上理絵, 岡本敦子, 大沼幸恵, 他: 当院における新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査。Audiology Japan **48**: 174-180, 2005
- 3) 仲野敦子, 工藤典代, 有本友季子: 新生児聴覚スクリーニング後の精密検査機関受診児の経過について。Audiology Japan **50**: 665-670, 2007
- 4) 福田章一郎, 塚村恵子, 福島邦博: 岡山県新生児聴覚スクリーニングの現状と課題。音声言語医学 **47**: 379-383, 2006
- 5) 畠史子, 長谷川賢作, 玉川友哉, 他: 鳥取県における新生児聴覚スクリーニングおよび3歳児聴覚検診の有効性の検討。Audiology Japan **50**: 107-112, 2007
- 6) 中澤操, 高橋辰, 佐藤輝幸, 他: 新生児聴覚スクリーニング後の精密検査結果と聴覚言語発達リスト到達度との関連性の検討。Audiology Japan **50**: 113-121, 2007
- 7) 柴田康子, 堀江友子, 服部琢, 他: 平成17年度, 新生児聴覚スクリーニングの結果から紹介された症例の診断過程。Audiology Japan **50**: 211-217, 2007
- 8) 千葉寛之, 伊藤吏, 渡辺知緒, 他: 山形県の新児聴覚スクリーニングの現状と当科におけるスクリーニング refer 児の精密聴力検査。Audiology Japan **50**: 218-224, 2007
- 9) 山下裕司, 池田卓生, 小田梨恵, 他: 山口県における新生児聴覚スクリーニングとそのフォローアップ体制 (第2報)。Audiology Japan **47**: 607-608, 2004
- 10) 三浦正子, 池田卓生, 今本美智代, 他: 当科におけるハイリスク児の聴覚スクリーニングの検討。Audiology Japan **45**: 541-542, 2002
- 11) 森田訓子, 長嶺尚代, 工藤多賀, 他: 1歳6か月児健診における聴覚検診手引きの検討。Audiology Japan **51**: 423-424, 2008
- 12) 井上理絵, 大沼幸恵, 原由紀, 他: 中等度難聴の早期診断, 早期療育における新生児聴覚スクリーニング検査の有用性。Audiology Japan **51**: 77-82, 2008
- 13) Joint Committee on Infant Hearing Year 2007 Position Statement: Principles and Guidelines for Early Hearing Detection and Intervention Programs. American Academy of Pediatrics **120**(4): 898-921, 2007
- 14) 川城信子, 守本倫子, 泰地秀信: 先天性横隔膜ヘルニア (CDH) と難聴。Audiology Japan **50**: 461-462, 2007
- 15) 塚本桂子, 伊藤裕司: 新生児遷延性肺高血圧症と聴力障害。周産期医学 **36**: 322-326, 2006
- 16) Fligor BJ, Neault MW, Mullen CH, et al: Factors Associated With Sensorineural Hearing Loss Among Survivors of Extracorporeal Membrane Oxygenation Therapy. Pediatrics **115**: 1519-1528, 2005
- 17) 川城信子, 土橋信明, 荒木昭夫, 他: NICU 退院後に発症した聴力障害。日耳鼻 **97**: 1056-1061, 1994
- 18) 畠史子, 田中真理子, 北奥恵之, 他: NICU 入院児の聴力スクリーニングについての検討。Audiology Japan **41**: 200-206, 1998

- 19) 池原由香, 津田幸子, 川上義, 他: 周産期障害と聴覚スクリーニング異常。JOHNS **16**: 205-208, 2000
- 20) 泰地秀信, 守本倫子, 飯ヶ谷七重, 他: ABR無反応の乳幼児のCORおよびASSR閾値についての検討。Audiology Japan **50**: 101-106, 2007
(原稿受付 平成21. 7. 7)

別冊請求先: 〒755-8505

山口県宇部市南小串 1-1-1

山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野

中津愛子

Reprint request:

Aiko Nakatsu

Department of Otolaryngology, Graduate school of Medicine, University of Yamaguchi, 1-1-1 Minamikogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505, Japan