急性低音障害型感音難聴をめぐる諸問題

佐藤宏昭

岩手医科大学耳鼻咽喉科

要旨：急性低音障害型難聴（ALHL）が突発性難聴と異なる疾患として認知されるようになって30年が経過した。2000年には厚生労働省急性高度難聴に関する調査研究班により本疾患の診断基準（試案）が設けられ、この基準に基づく多くの報告がなされてきた。本総説では、ALHLの問題点として、診断基準、難治例、治療薬剤について取り上げた。

診断基準では高音部に加齢による難聴を有する例を正確実例として診断基準に加える必要があること、およびALHLの反復、再発例とメニエール病非定形例（蝸牛型）の名称の問題について述べた。長期的にみるとALHLは反復、再発例やメニエール病への移行例が少なくなく、少数ながら進行性の感音難聴をきたす例もみられ、この中には稀であるが低音障害型感音難聴で発症する聴神経腫瘍もあり注意を要する。また、ステロイドやイソソルビドなど現在使われている薬剤の有効性に関しても、十分なエビデンスが得られていない点が問題点といえる。

キーワード

急性低音障害型感音難聴、難治例、メニエール病

はじめに

突発性難聴は突然発症の原因不明と定義されるが、その中に難聴が125Hz-500Hzの低音部に限局し、高音部が正常に保たれる例がある。1982年、阿部ら¹⁾はこのような難聴の診断基準を定め、一つの疾患群として提唱したことから注目されるようになってきた。当初は低音障害型感音性難聴²⁾、突発性低音性感音難聴³⁾、低音障害型突発難聴^{1, 4-6)}、などいくつかの名称で報告されたが、現在では急性低音障害型感音難聴（以下、ALHLと略す）という疾患名が定着している⁷⁻¹²⁾。この疾患の特徴は①難聴が低音域に限局する、②めまいを伴わない、③難聴の程度が軽く耳閉塞感を主訴とすることが多い、④回復しやすいが再発を繰り返すことがある、⑤一部はメニエール病に移行する、などの点から突発性難聴とは異なる疾患単位と認知されるようになってき

た²⁻¹²⁾。このうち、再発を繰り返す例は従来から知られていた「endocochlear hydrops without vertigo」¹³⁾、「めまいを伴わない反復性聴力障害」¹⁴⁻¹⁵⁾、「蝸牛型メニエール病」^{14, 16)}に該当するものと理解されている。

本疾患は厚生労働省急性高度難聴に関する調査研究班の疫学調査により、突発性難聴やメニエール病よりはるかに発症頻度が高く¹⁷⁾、日常臨床で扱うことの多い疾患であることが明らかとなった。当初は予後良好とされていたが、長期に経過観察を行うと予後不良例も少なくないことがわかり、近年本疾患に対する関心が高まってきた^{4, 18-21)}。本総説では診断基準、難治例、治療をめぐる諸問題について述べたい。

ALHLの診断基準について

阿部は1982年原因不明な低音障害型感音難聴の診

断基準（選択基準）を 125Hz, 250Hz, 500Hz の低音 3 周波数（以下, LT3 と略す）の合計が 60dB 以上, 2, 4, 8kHz の高音 3 周波数（以下, HT3 と略す）の合計が 45dB 以内とし¹⁾, 後に JIS 改正・ISO 規格（聴力レベル）の導入を機に LT3 の合計を 100 dB 以上, HT3 の合計を 60dB 以下に変更した⁴⁾。しかし, この基準では LT3 の基準が厳しく, 軽症例が除外されてしまうため, LT3 合計 70dB 以上, HT3 合計 60dB 以下に修正された⁵⁾。その後, 志津木ら¹⁰⁾ は純音聴力検査の低音 3 周波数のうち最大の閾値が 30dB 以上, 2kHz, 4kHz の両方が 20dB 以下でめまいのないものとする, 阿部らの規準と比較して幅広く本疾患を選択できることを報告したが, 2000年に厚生労働省急性高度難聴研究班が提案した診断基準（試案）では阿部らの基準を踏襲したものとなった（表 1）。まず, この試案の各項目について補足説明を加える。

主症状 1. 急性あるいは突発性に蝸牛症状が発症する。本疾患の発症は急性であるが, 突発性難聴のように発症した日時を特定できないことも多いため, 急性または突発性の発症としている。また, 主訴としては耳閉感の訴えが 80%前後と最も多く^{1, 12, 17, 18)}, 難聴を訴えない例も 30%にみられる^{12, 17)}。したがって耳管狭窄など耳閉感を訴える疾患との鑑別が必要であり⁷⁾, この点は参考事項の註 2 に明記された。

主症状 2. 難聴は低音障害型感音難聴である。オーディオグラムの基準として参考事項 1 に前述のオーディオグラムの基準を定めているが, 1000Hz の聴力レベルについては基準を設けていない。1000Hz の聴力レベルは予後と関連することが指摘されており^{18, 22-24)}, 低音障害型の突発性難聴と本疾患を鑑別するうえで 35dB 以下とする意見もあるため, 参考事項の註 5 で検討が必要と付記された。また, HT3 の聴力レベルの合計が 60dB 以下とすると, 元々高音部の閾値上昇を有する高齢者が除外される点が, 当初より問題点として挙げられてきた^{21, 22, 25-29)}。この点を考慮し, 2006年に高音部閾値上昇例を正確実例とする診断基準改正の提案³⁰⁾ がなされたが, この提案を用いた報告³¹⁾ はまだ少ない。これまでの報告^{21, 22, 25, 27-29, 31)} を集計すると正確実例は 365 例, 確実例は 1248 例で, 正確実例は確実例の約 1/3 の発症

数がある。これらの正確実例が除外されてしまうと, 発症頻度, 好発年齢などに偏りを生じ, 正確な疫学データを得ることができない。この点を考慮すると, 診断基準には正確実例を追記すべきである。

主症状 3. 難聴の原因は不明または不確実である。低音域の感音難聴は聴覚伝導路のいずれの部位の障害でも起こりうる³²⁾。実際, ステロイド依存性難聴^{33, 34)}, 外リンパ瘻³⁴⁾, 音響外傷³⁴⁾, 内耳奇形³⁵⁾などの内耳疾患, 微小血管減圧術後^{34, 36)}, 小脳橋角部腫瘍^{37, 38)}, 特発性肥厚性硬膜炎³⁵⁾などの中枢性疾患で急性発症の低音障害型感音難聴を示した例が報告されている。また, 聴覚伝導路の病変ではないが, 特発性低髄液圧症候群^{35, 39)}でも急性発症の低音障害型感音難聴がみられることが多い。ALHL の診断に際しては, これらの原因のわかっている疾患をすべて除外して初めて診断が確定する。しかし, そのための検査をどこまで行うかは, 規定されていない。この点は突発性難聴の診断でも問題点として挙げられている⁴⁰⁾。現在, 聴神経腫瘍では突発性難聴に類似した症状で発症する例の多いことが広く知られており, 突発性難聴の診断にあたっては除外診断を目的とした ABR や MRI がルーチン化しつつある。ALHL では幸い, 聴神経腫瘍の発見される頻度は稀であるため³¹⁾, ルーチンとしてこれらの検査を行う必要はないが, 予後不良例には考慮する必要がある。

主症状 4. めまいを伴わない。ALHL に限らず, 眼振があってもめまいを訴えない例はしばしばみられるが, 註 3 に「明らかな眼振はないが, 軽いめまい感, 浮動感を訴える例は含める」とあるように, 眼振が観察されれば急性発症の低音障害型感音難聴であっても本疾患からは除外される。ただし, 軽いめまい感や浮動感を含めてよいかについては今後も議論すべき点といえる。

海外における突発性難聴の診断基準と ALHL

ALHL が突発性難聴から区別されるようになって, すでに 30 年が経過しているが, 海外では区別されていない。突発性難聴の診断基準で, 最も多く使われているのは「連続する 3 周波数で少なくとも 30dBHL 以上」⁴¹⁾ であるが, 急性低音障害型感音難聴の中にはこの基準に合致するものが少なくない。

表 1 急性低音障害型感音難聴の診断基準（試案）

主症状

1. 急性あるいは突発性に蝸牛症状（耳閉塞感、耳鳴、難聴など）が発症する。
2. 難聴は低音障害型感音難聴である。
3. 難聴の原因は不明または不確実である。
4. めまいを伴わない。

参考事項

1. 難聴に関しては以下の基準による。
 - （1）オーディオグラム低音域 3 周波数（125、250、500Hz）の聴力レベルの合計が 70dB 以上。
 - （2）同様に高音域 3 周波数（2000、4000、8000Hz）の聴力レベルの合計が 60dB 以下。
2. 蝸牛症状が反復する例がある。
3. 反復発症時に聴力レベルが診断基準に合致しない例、または聴力型が変化する例がある。
4. メニエール病に移行する例がある。
5. 時に両側性の例がある。
6. 上気道炎、過労、ストレスなどが先行することがある。

駐 1. 本症は突発性難聴とは基本的に異なる疾患と考えられる（突発性難聴診断基準参照）。

駐 2. 本症の診断にあたって、しばしば耳管狭窄症、滲出性中耳炎などのオーディオグラムが酷似することがあるので、低音域の骨導値を正確に測定することが重要である。また、鼓膜所見やティンパノグラムも参考にする。

駐 3. 発症時に明らかな眼振はみられないが、軽いめまい感、浮動感を訴えることがある（特に眼振の検査法は問わない）。

駐 4. 予後の判定は以下のように定める。

- （1）治癒 低音 3 周波数（125、250、500Hz）の聴力レベルがいずれも 20dB 以内にもどったもの。あるいは健側と同程度まで回復したとき。
- （2）改善 低音 3 周波数の聴力レベルの平均が 10dB 以上回復し、かつ治癒に至らないもの。
- （3）不変 低音 3 周波数の聴力レベルの平均が 10dB 未満のもの。
- （4）悪化 （1） （2） （3）以外のもの。

反復発症例で聴力レベルが診断基準に合致しない例、または聴力型が変化する例の予後判定基準は別に定める。

駐 5. 1000Hz の聴力レベルについては、予後に対する影響があり、また 35dB 以下とするという意見もあるが、さらに検討する必要がある。

当科受診例（平成元年～平成18年）で検討してみると、確実例326例中145例（44.5%）、準確実例109例中83例（76.1%）、合計435例中228例（52.4%）が「連続する3周波数で少なくとも30dBHL以上」の基準を満たしている。したがって、海外の突発性難聴の報告例には急性低音障害型感音難聴症例が多く含まれている可能性があり、治療成績を評価する際には注意が必要である。

メニエール病の診断基準とALHL

メニエール病の診断基準は「メニエール病診断の手引き」（厚生省特定疾患調査研究班，1974年）が長らく用いられてきたが、昨年改定された⁴²⁾。この改定に伴い、めまいを伴わない蝸牛症状の反復例は「メニエール病疑い例」から「メニエール病非定形例（蝸牛型）」に分類されることとなった。したがってこの新しい診断基準に従えばALHLの反復、再発例はすべてメニエール病非定形例（蝸牛型）に含まれることになる。ALHLの再発例（初回発作が治癒後、6ヵ月以上経過して同様の症状を呈するもの^{43,44)}）では、再発時の聴力型がALHLの基準を満たさない例がしばしばみられるが^{18,19,21,43,44)}、この点はALHL診断基準の参考事項3にも明記されており、このような症例はどちらの診断基準にも該当する。一方、AAO-HNS（1995）の基準⁴⁵⁾ではメニエール病見込み例（Possible Meniere's disease）は、「感音難聴（変動または固定）で、はっきりした発作はないが平衡障害がある」と明記されており、平衡障害の有無を明記していない「メニエール病非定形例（蝸牛型）」と同じではない。逆に、眼振はなくめまい感、浮動感を訴えるALHLの反復、再発例は平衡障害を有すると考えるなら、AAO-HNS（1995）の基準⁴⁵⁾ではPossible Meniere's diseaseに含まれることになる。ALHLの病態の1つとして内リンパ水腫が有力視されている理由には、①反復、再発、メニエール病への移行があること^{2,4,5-8,9,11,12,17,18-23,34,43,44)}、②グリセロールテスト陽性率が25%～83.3%と多いこと^{18,46,47)}、③蝸电图で-SP/AP比の増大例が27%～54%にみられること^{46,48)}、④相対的内リンパ水腫と考えられる脳髄液圧の低下で低音障害型感音難聴が認められること^{39,49,50)}、⑤病理組織学的に内リンパ水腫の確認さ

れた前庭症状を伴わない低音障害型感音難聴例が報告されていること⁵¹⁾、⑥両側罹患が突発性難聴に比べて多くメニエール病と類似すること⁵²⁾、などが挙げられる。ALHLの反復、再発例はメニエール病に移行するものが多く^{44,53)}、内リンパ水腫を病態とするものは確実に存在するといつてよい。メニエール病をめまい、平衡障害を伴う疾患とみなす立場からは、平衡障害のないALHL反復例はメニエール病見込み例（Possible Meniere's disease）にも該当しない。一方、メニエール病は内リンパ水腫をきたす疾患とみなす立場からは、メニエール病非定形例（蝸牛型）に分類される。いずれも病態は共通すると考えられるが、めまいを伴わない反復性難聴をどのような観点で捉えるかという考え方の違いが、各々の診断基準に反映されており、名称や分類については今後も議論が必要といえる。

難治例について

ALHLの難治例には①難聴の回復までに長期間を要する例、②反復例、③メニエール病移行例、④高音または全周波数の悪化例、などが含まれる⁴⁴⁾。突発性難聴では発症後およそ4週経過すると聴力は固定するが、ALHLでは発症後4週以上経過した例でも治癒または改善する例は多く、1年間不変のまま経過した後に初回発作時より聴力の改善が認められた例も報告されている。したがって、聴力の回復まで長期間を要する例が必ずしも難治とはいえないが、短期間で回復しないという点では難治例といつてよい。また、短期的な予後の不良な例では再発率も高い（図1）。反復例の頻度は9.2%～81.3%^{4,11,12,17-20,54)}と報告による様々であるが、これは川島らが指摘しているように登録例数、経過観察例数、経過観察期間の違いが主な要因と考えられ、これらの報告をもとに考えると2～3割程度と見積もられる。このような反復例はメニエール病に移行しやすく^{44,53)}、反復回数が多くなるほど聴力予後は不良になる^{11,44)}。メニエール病の移行率は反復例の頻度と同様に2.0%～22%^{4,12,17,20,18,19,21,53,54)}と幅があるが、2～3年の経過で5～10%程度と推測される¹⁷⁾。メニエール病の移行例の多くは2年以内に発症していることから¹⁷⁾、少なくとも2年は経過観察を行うべきであるが、実際には外来通院を継続させ

図1 ALHLの短期的な予後と4年後の再発率

ることは難しく、班研究のアンケート調査では約2/3の症例でめまいがあっても医療機関を受診していない⁵⁴⁾。現実的な対応としてはALHLの長期予後を説明し、症状の再発やめまいが出現した場合は受診するよう促す他にない。現在のところ初診時にメニエール病移行例や反復、再発例を予測するよい指標はないが、メニエール病では前庭水管の發育不良例が多いことが知られており⁵⁵⁻⁵⁹⁾、ALHLでも前庭水管の發育と予後との間に相関がみられることから⁶⁰⁾、画像診断によりある程度は予後の推測が可能である(図2, 3)。他には蝸電図で反復型は単発型に比べSP/AP比が有意に高く、予後予測に有用との報告⁶¹⁾や反復例で難聴の進行がみられる例はそうでない例に比べ陽性率が有意に高いとする報告があるが⁶²⁾、一方でグリセロールテストや蝸電図の結果とメニエール病への移行には相関がないとの報告¹⁸⁾もありまだ評価は定まっていない。高音域あるいは全周波数の閾値上昇を認めるが回転性めまい発作がなくメニエール病の診断に至っていない難治例の報告は多く、45例中4例¹⁸⁾、46例中10例¹⁹⁾、357例中8例²¹⁾、195例中7例⁴⁴⁾など頻度は様々であるが長期観察例では決して少なくない。高音域に聴力障害が生じたものは、全例で改善がみられなかったとの報告や⁴⁴⁾、グリセロールテストが陰性であった例⁶³⁾も報告されており、いわゆるALHLとは異なる病態と考えられる。このような難治例の原因は不明であるが、低音障害型の急性感音難聴として発症する

聴神経腫瘍の報告もあり³⁷⁻³⁸⁾、除外診断のための画像診断が必要となる。

治療をめぐる問題点

ALHLの特徴として、①短期的には予後良好例が多いこと、②長期的には反復、再発例が多いこと、③長期間経過していても回復する例が多いこと、④自然治癒例も少なくないこと^{9, 64)}、などから治療効果を評価する際に、投薬期間や効果の判定時期、最終的な予後の判定時期などを決めるのはなかなか難しい。予後についての報告は数多くなされているが、投薬期間や効果判定の時期について明記されていない報告も多く、報告間の治療成績の比較や評価が難しい。無作為比較試験の報告は少なく、真鍋ら、鳥谷ら、Kitajiriらの報告があるのみで、単剤で比較しているのは真鍋の報告だけである。そのため、単剤の治療効果に関してはエビデンスが得られていないのが現状である。ALHLの治療には、原因不明の急性感音難聴という突発性難聴との共通点やメニエール病と同様な内リンパ水腫が病因として想定されていることなどから、副腎皮質ステロイド薬、イソソルビド、代謝賦活薬(ATP)、ビタミン薬などが複数用いられている^{17, 65, 66)}。副腎皮質ステロイドについては有効とする報告^{68, 69-72)}、無効とする報告⁶⁷⁾、必要性は少ない^{65, 66, 73, 74)}とする報告など様々である。また、有効とする報告の中でも大量投与が有効とするもの^{69, 72)}、標準量の方が効果は高いとす

図2 前庭水管外孔幅の比較

図3 単発例, 再発例における前庭水管外孔幅の比較

るもの⁶⁸⁾の両者がみられる。さらにプレドニゾロンのようなミネラルコルチコイド活性を有するステロイドを大量投与すると聴力は一時的に悪化するという報告もみられる⁷⁵⁾。これらの報告の多くは比較試験ではなく、前向きは無作為比較試験はKitajiriら⁶⁷⁾、真鍋ら⁶⁸⁾、鳥谷ら⁷³⁾の報告のみである。Kitajiriら⁶⁷⁾、鳥谷ら⁷³⁾は多剤併用の中でステロイド併用の有無を比較しており、単剤での比較は真鍋らの報告⁶⁸⁾だけである。いずれの報告も症例数は36例～62例と少なく、投薬内容も異なるため単純に比較することはできないが、このように全く異なる結果が複数みられる以上ステロイドの有効性については疑問を持たざるを得ない。イソソルビドに関しては有効とする報告⁶⁴⁾、グリセロールテスト陽性例には有効⁷⁶⁾、効果に乏しいとする報告^{68,74)}など様々で、メニエール病ではもともと難聴に対する効果は高いこと⁷⁷⁾もあり、有効性の評価は定まっていない。

文頭で述べた①、③、④の点からALHLでは短期間の単剤投与による比較試験は倫理的にも問題が少ないため、厚生労働省研究班では副腎皮質ステロイド薬、イソソルビド、ATPの単独投与による多施設共同の比較試験を行っている⁷⁸⁾。まだ目標症例数に達していないため、中間報告の段階であるが、2週間投与直後の聴力改善はプレドニゾロン (38例, 84%), イソバイド (67例, 73%) 投与群に比べ、ATP投与群 (39例, 90%) で良好な傾向が認められている。

おわりに

ALHLの疫学的特徴として若年者に多いとされて

きたが、オーディオグラムの診断基準で加齢による高音部の難聴を有する高齢者が除外されてきたためとも考えられる。このような症例を正確実例として扱うことで、好発年齢や発症数などのより正確な疫学データが得られると思われる。また、最近改訂されたメニエール病の診断基準では、めまいを伴わない蝸牛症状の反復例は「メニエール病非定形例 (蝸牛型)」と明記されているため、ALHLの反復、再発例とオーバーラップすることになり混乱を招きかねない。単発例はALHLで問題はないが、反復、再発例についてはこの点に関する注釈が必要になると思われる。難治例とくに進行性に高音部や全周波数の聴力悪化を有する例の頻度は少ないが、ALHLとは異なる病態と考えられ、その解明も今後の課題である。また、ALHLは定型的な聴力型から比較的単純な一つの病態が想定され、薬効の評価は突発性難聴よりも容易と考えられてきたが、ステロイド、イソソルビドのいずれの薬剤も報告により結果は様々で有効性の評価は定まっていない。この点は臨床的にも重要な問題であり、現在進行中の厚生労働省研究班で行われている単剤投与による多施設共同比較試験の結果に期待したい。

Clinical issues regarding diagnostic criteria, retractable cases, and treatment of acute low-tone sensorineural hearing loss

Hiroaki Sato

Department of Otolaryngology, Iwate Medical

University

In 2000, the Acute Profound Deafness Research Committee of the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan proposed diagnostic criteria for acute low-tone sensorineural hearing loss (ALHL). Based on these criteria, elderly people with high-tone loss resulting from presbycusis are not included in the ALHL category. This situation has produced a bias in the epidemiological features of ALHL. Therefore, the criteria should include these cases as probable ALHL. The short-term outcome of ALHL is generally good, but the long-term prognosis is not necessarily good, as recurrences occur in 20-30% of patients and 5-10% of patients develop Ménière disease. In addition, some patients develop hearing deterioration across the frequencies. Among these intractable cases, the possibility of an acoustic tumor exists. An imaging study is required in such intractable cases to rule out such rare diseases. Steroids and isosorbide are the standard medications for the treatment of ALHL; however, reliable evidence of their efficacies has not been obtained to date. A prospective randomized controlled study examining the use of these drugs is needed in the future.

参考文献

- 1) 阿部隆: 低音障害型突発難聴。耳喉 **54**: 385-392, 1982
- 2) 小林央雄, 小林玲子: 急性低音障害型感音性難聴。耳鼻 **24**: 656-659, 1978
- 3) 守口孝和, 本間利美: 突発性低音性感音難聴について。岩手医誌 **31**: 571-576, 1979
- 4) 阿部隆, 近芳久, 村井和夫, 他: 低音型突発難聴の臨床像。日耳鼻 **91**: 667-676, 1988
- 5) 阿部隆, 立木孝, 村井和夫, 他: 低音型突発難聴の診断基準の再検討。日耳鼻 **95**: 7-14, 1992
- 6) 伊藤真郎, 季雅次, 新井雅之, 他: 低音型突発難聴の臨床観察。耳鼻臨床 **82**: 1055-1062, 1989
- 7) 市村恵一, 池田利昭, 田山二郎, 他: 耳閉感と急性低音障害型感音難聴。耳鼻臨床 **82**: 529-535, 1989
- 8) 山嵜達也, 菅沢正, 八木昌人, 他: 蝸牛水腫の示唆される急性低音障害型感音難聴の臨床的観察。日耳鼻 **93**: 219-228, 1990
- 9) 田中映子, 佐々木修, 坂口正範, 他: 急性低音障害型感音難聴の臨床統計。耳鼻臨床 補 **38**: 128-134, 1990
- 10) 志津木健, 小川郁, 井上泰宏, 他: 急性低音障害型感音難聴の診断基準の比較検討。Audiology Japan **43**: 242-249, 2000
- 11) 佐藤賢太郎, 佐野肇, 新田光邦, 他: 6ヵ月以上経過観察できた急性低音障害型感音難聴の検討。Audiology Japan **43**: 220-225, 2000
- 12) 佐藤宏昭, 村井和夫, 岡本牧人, 他: 急性低音障害型感音難聴の平成12年全国疫学調査結果。Audiology Japan **45**: 161-166, 2002
- 13) Williams HL, Horton BT, Day LA: Endolymphatic hydrops without vertigo. Arch Otolaryngo **51**: 557-579, 1950
- 14) 切替一郎, 松崎力, 星野知之: 眩暈を伴わない反復性聴力障害の1例。耳喉 **39**: 1059-1068, 1967
- 15) 神崎仁, 猪忠彦, 高橋正紘, 他: 変動する聴力障害の臨床的観察—めまいを伴わない症例について—。Audiology Japan **18**: 88-98, 1975
- 16) Kitahara M, Takeda T, Yazawa Y, et al: Pathophysiology of Meniere's disease and its subvarieties. Acta Otolaryngol (Stockh) Suppl. **406**: 52-55, 1984
- 17) 川島慶之, 佐藤宏昭, 岡本牧人, 他: 神奈川県と岩手県における急性低音障害型感音難聴の疫学調査(厚生労働省急性高度難聴に関する調査研究)。Audiology Japan **49**: 373-380, 2006
- 18) 山嵜達也, 菊地茂, 八木昌人, 他: 急性低音障害型感音難聴の予後について。日耳鼻 **95**: 41-50, 1992
- 19) 平山方俊, 設楽哲也, 岡本牧人, 他: 低音障害型感音難聴長期観察例の検討。Audiology Japan **37**: 142-149, 1994
- 20) 野出美知子, 瀬尾徹, 野間晶子, 他: 急性低音障害型感音難聴長期観察例の検討。Audiology Japan **45**: 192-196, 2002

- 21) 今村俊一, 本田英幸, 宮田政則, 他: 急性低音障害型感音難聴予後不良例の検討—典型例と非典型例の比較—. 日耳鼻 **110**: 520-526, 2007
- 22) 千田英二, 佐藤信清, 犬山征夫: 低音障害型感音難聴の検討。Audiology Japan **33**: 571-572, 1990
- 23) 神永千織, 石川和宏, 石田孝, 他: 当科における急性低音障害型感音難聴。Audiology Japan **37**: 116-120, 1994
- 24) 原田博文, 小倉朋子, 田中雅博, 他: 急性低音障害型感音難聴の予後因子。Audiology Japan **45**: 149-154, 2002
- 25) 朝隈真一郎: 急性低音障害型感音難聴—10年間, 241例の検討—. 日耳鼻 **102**: 299-304, 1999
- 26) 厚生省特定疾患急性高度感音難聴調査研究班 平成11年度研究業績報告書。2000
- 27) 阿部隆, 立木孝: 低音域の急性感音難聴と急性低音障害型突発難聴。Audiology Japan **45**: 167-175, 2002
- 28) 西田吉直: 急性低音障害型感音難聴類似疾患の取り扱い。Audiology Japan **45**: 182-186, 2002
- 29) 佐藤宏昭, 村井和夫, 岡本牧人, 他: 急性低音障害型感音難聴典型例と非典型例の比較。Audiology Japan **47**: 258-262, 2004
- 30) 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服事業 急性高度難聴に関する調査研究 平成17年度総括・分担研究報告書。2006
- 31) 水川敦裕, 水川知子, 佐藤宏昭: 当科における急性低音障害型感音難聴—18年間の臨床統計—. Audiology Japan **51**: 14-18, 2008
- 32) 服部浩: 低音障害型感音難聴に関する臨床的ならびに実験的研究。耳鼻臨床 **62**: 215-227, 1969
- 33) 神崎仁: ステロイド依存性難聴—免疫複合体性感音難聴。感音難聴 update, 野村恭也(編), 医学教育出版社, 東京, 103-135, 1984
- 34) 深谷卓, 畑裕子: 低音障害型の感音難聴の検討。Audiology Japan **37**: 112-115, 1994
- 35) 杉浦真: 急性低音障害型感音難聴と画像。MB ENT **78**: 27-34, 2007
- 36) Fukaya T, Nomura Y, Fukushima T: Transient retrocochlear low-frequency sensorineural hearing loss: a new clinical entity. Laryngoscope **101**: 643-647, 1991
- 37) 今村俊一, 宮田正則, 水越昭仁, 他: 初診時急性低音障害型感音難聴とした3例。耳鼻臨床 **100**: 793-800, 2007
- 38) 野口佳裕: 急性低音障害型感音難聴。よくわかる聴覚障害—難聴と耳鳴のすべて, 小川郁(編), 永井書店, 大阪, 167-173, 2010
- 39) 中島成人: 特発性低髄液圧症候群に伴った両側急性低音障害型感音難聴の1例。Audiology Japan **45**: 187-191, 2002
- 40) 朝隈真一郎, 村井和夫: 突発性難聴—診断・治療の問題点とそれに対する対応—. Audiology Japan **53**: 46-53, 2010
- 41) Wilson WR, Byl FM, Laird N: The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss. A doubleblind clinical study. Arch Otolaryngol **106**: 772-776, 1980
- 42) 厚生労働省難治性疾患克服事業 前庭機能異常に関する調査研究班代表研究者 渡部行雄: メニエール病診断基準改定にあたって。Equilibrium Res **68**: 101-106, 2009
- 43) 中島正己, 岡本牧人, 佐野肇, 他: 急性低音障害型感音難聴再発例の平成12年, 13年全国疫学調査。Audiology Japan **46**: 241-248, 2003
- 44) 川島慶之, 佐藤宏昭, 岡本牧人, 他: 平成12・13年度登録の急性低音障害型感音難聴症例の平成19年時点での経過調査(厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業による急性高度難聴に関する調査研究)。Audiology Japan **51**: 200-207, 2008
- 45) Monsell EM: Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in Meniere's disease. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Foundation. Otolaryngol Head Neck Surg **113**: 181-185, 1995
- 46) Yamasoba T, Kikuchi S, Sugawara M, et al: Acute low-tone sensorineural hearing loss without vertigo. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **120**: 532-535, 1994
- 47) Nozawa I, Imamura S, Mizukoshi A, et al: Clinical study of acute low-tone sensorineural hearing loss; survey and analysis of glycerol test

- and orthostatic test. *Ann Otol Rhinol Laryngol* **111**: 160-164, 2002
- 48) Noguchi Y, Nishida H, Tokano H, et al: A comparison of acute low-tone sensorineural hearing loss versus Meniere's disease by electrocochleography. *Ann Otol Rhinol Laryngo* **113**: 194-199, 2004
- 49) Allen G, Habibi M: The effect of increasing the cerebrospinal fluid pressure upon the cochlear microphonics. *Laryngoscope* **72**: 423-434, 1962
- 50) Walsted A, Nielsen OA, Borum P: Hearing loss after neurosurgery. The influence of low cerebrospinal fluid pressure. *J Laryngol Otol* **108**: 637-641, 1994
- 51) Lindsay JR, Schulthess G von: An unusual case of labyrinthine hydrops. *Acta Otolaryngol (Stockh)* **49**: 315-324, 1958
- 52) 今村俊一, 本田英幸, 宮田政則, 他: 急性低音障害型感音難聴における両側性の検討。日耳鼻 **108**: 214-221: 2005
- 53) 阿部隆, 立木孝, 村井和夫, 他: 低音型突発難聴のメニエール病移行例に関する検討—いわゆるメニエール病前駆期の蝸牛障害について—。日耳鼻 **95**: 1352-1359, 1992
- 54) 佐藤宏昭, 村井和夫, 岡本牧人, 他: 急性低音障害型感音難聴の長期予後に関するアンケート調査。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 急性高度難聴に関する調査研究 平成16年度総括・分担研究報告書: 41-43, 2005
- 55) Valvassori GE, Dobben GD: Multidirectional and computerized tomography of the vestibular aqueduct in Meniere's disease. *Ann Otol Rhinol Laryngol* **93**: 547-550, 1984
- 56) Sando I, Ikeda M: The vestibular aqueduct in patients with Meniere's disease. A temporal bone histopathological investigation. *Acta Otolaryngol (Stockh)* **97**: 558-570, 1984
- 57) Hebbard GK, Rask-Anderson H, Linthicum FH: Three-dimensional analysis of 61 human endolymphatic ducts and sacs in ears with and without Meniere's disease. *Ann Otol Rhinol Laryngol* **100**: 219-225, 1991
- 58) Yamamoto E, Mizukami C, Isono M, et al: Observation of the external aperture of the vestibular aqueduct using three-dimensional surface reconstruction imaging. *Laryngoscope* **101**: 480-483, 1991
- 59) Shea JJ, Ge X, Warner RM, et al: External aperture of the vestibular aqueduct in Meniere's disease. *Am J Otol* **21**: 351-355, 2000
- 60) 佐藤宏昭, 水川敦裕, 桑島秀, 他: 急性低音障害型感音難聴における前庭水管発育の検討。厚生労働省特定疾患 急性高度難聴調査研究班 平成21年度研究報告書: 63-65, 2010
- 61) 十二町真樹子, 麻生伸, 木村寛, 他: 突発性難聴の蝸電図所見—低音障害型との比較—。Audiology Japan **41**: 142-146, 1998
- 62) 麻生伸, 木村寛, 十二町真樹子, 他: メニエール病へ移行した急性低音障害型感音難聴の特徴。Audiology Japan **45**: 155-160, 2002
- 63) 小川郁, 井上泰宏, 新田清一, 他: 高度難聴まで進行した急性低音障害型感音難聴の2症例。Audiology Japan **44**: 60-65, 2001
- 64) 佐野肇, 設楽哲也, 岡本牧人, 他: 低音障害型感音難聴の臨床経過からみた病因の検討。Audiology Japan **37**: 105-111, 1994
- 65) 木谷芳晴, 福島英行, 中村一, 他: 急性低音障害型感音難聴の検討。耳鼻臨床 **95**: 999-1004, 2002
- 66) 石井哲夫, 高山幹子: 低音障害型感音難聴にステロイドを使うのは適切か?—使用しない立場から—。JOHNS **21**: 1635-1637, 2005
- 67) Kitajiri S, Tabuchi K, Hiraumi H, et al: Is corticosteroid therapy effective for sudden-onset sensorineural hearing loss at lower frequencies? *Arch otolaryngol Head Neck Surg* **128**: 365-367, 2002
- 68) 真鍋恭弘, 鈴木弟, 斎藤武久, 他: 急性低音障害型感音難聴の治療薬剤について—ステロイド剤とイソソルビドの比較—。耳鼻臨床 **98**: 9-14, 2005
- 69) Suzuki M, Otake R, Kashio A: Effect of corticosteroids or diuretics in low-tone sensorineural hearing loss. *ORL* **68**: 170-176, 2006

- 70) Alatas N: Use of intratympanic dexamethasone for the therapy of low frequency hearing loss. *Eur Arch Otorhinolaryngol* **266**: 1205-1212, 2009
- 71) Hillman TM, Arriaga MA, Chen DA: Intratympanic steroids: Do they acutely improve hearing in cases of cochlear hydrops? *Laryngoscope* **113**: 1903-1907, 2003
- 72) Fuse T, Aoyagi M, Funakubo T, et al: Short-term outcome and prognosis of acute low-tone sensorineural hearing loss by administration of steroid. *ORL* **64**: 6-10, 2002
- 73) 鳥谷龍三, 江浦正郎, 大磯正剛, 他: 急性低音障害型感音難聴の初期治療—ステロイド剤使用の是非について—. *耳鼻* **52**: 271-277, 2006
- 74) 朝隈真一郎: 急性低音障害型感音難聴: その治療と最近の動向. *Audiology Japan* **49**: 156-161, 2006
- 75) 真鍋恭弘, 斎藤武久, 斎藤等: 急性低音障害型感音難聴に対する異なるステロイド剤による効果の相違について. *Audiology Japan* **45**: 176-181, 2002
- 76) 今村俊一, 本田英幸, 水越昭仁, 他: 急性低音障害型感音難聴における内リンパ水腫の関与について. *Audiology Japan* **47**: 251-257, 2004
- 77) 将積日出夫, 水越鉄理, 麻生伸, 他: メニエール病の長期経過観察例の推移—AAO-HNSの判定基準による Isosorbide の治療効果について—. *Equilibrium Res Suppl* **4**: 120-123, 1988
- 78) 小川郁, 宇佐美真一, 岡本牧人, 他: 低音障害型感音難聴に対する単剤治療における共同研究. 厚生労働省特定疾患 急性高度難聴調査研究班 平成21年度研究報告書: 52-55, 2010
(2010年6月28日受稿 2010年7月6日受理)

別冊請求先: 〒020-8505 岩手県盛岡市内丸19-1

岩手医科大学耳鼻咽喉科

佐藤宏昭

Hiroaki Sato

Department of Otolaryngology, Iwate Medical University 19-1 Uchimaru, Morioka, Iwate 020-8505, Japan