家族性感音性難聴の検討

弘前大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：栗田口省吾教授）

坂本伸一郎， 葛西 美代， 渡辺貴和子

はじめに

個々の感音性難聴の原因を追求する場合には必ずしも容易ではない。特に家族性感音性難聴の診断には、色々の多くの問題を含んでいる。例えば、その一つとして一定の遺伝形式を示す場合が少ない点が挙げられる。また難聴の型、聴力損失の程度等の聴力検査成績上にも、特定の傾向を捉え難いし、難聴の発病年齢、難聴の進行の程度もまちまちである。更に後天的に種々の外的因子によって、一定の傾向が修飾された形として現われることも考えられる。著者らは家族性感音性難聴症例について、その特徴を把握せんとし、臨床的立場から検討を加えてみた。

対 象

過去6年間に弘前大学耳鼻咽喉科外来を訪れた難聴症例のうち、同一家系内に少なくとも感音性難聴が多発して存在するという家族性感音性難聴102例について検討した。102例のうち12例は、他覚的聴力検査結果のみである。診断の基準としては、耳鏡検査では鼓膜は正常あるいは略々正常にて、聴力検査で感音性難聴を示し、詳細な問診を行い、少なくとも一家系のなかで感音性難聴が多発して存在するという条件にした。

成績および検討

対象は102症例59家系であった（表1）。このうち詳細な家系図のとれたものは47家系、詳細な家系図のとれなかったものは12家系であった。また47家系のうちでは家系図とはとれたが同胞者のみの難聴で、難聴家系が母方か、父方か不明のもの1家系があった。

1 家系図について

家系図のとれた47家系を調べてみると、母方の家系に難聴者が存在するもの33家系で、難聴者は男子67例女子79例であり、父方の家系に難聴者が存在するもの7家系で男子9例、女子12例であり、父母両家系にまたがって難聴者が存在しているものは6家系で男子22例、女子10例があった。また兄弟のみが難聴があり、

表 1

		家系	男	女	計	検査例		観察例	
						男	女	男	女
家系図のとれたもの	母方	33	67	79	146	22 (2)	36 (2)	11	19
	父方	7	9	12	21	3 (1)	6	1	1
	両家系	6	22	10	32	7 (1)	2 (1)	4	1
	不明	1	2	0	2	0 (1)	0	0	0
	計	47	100	101	201	32 (4)	44 (3)	16	21
家系図のとれなかったもの		12	17	12	29	6 (4)	8 (1)	1	3
計		59				38 (8)	52 (4)	17	24

() 他覚的検査例

難聴が母方の家系か、父方の家系か不明のもの1家系男子2例があった。詳細に家系図のとれなかったものは12家系で、男子17例、女子12例であった。以上より家系図のとれた47家系のうちでは、母方の家系の方に難聴のみられる症例が多くみられた。

また遺伝様式では直接遺伝のみられたもの13家系で、このうちⅢ代にわたり難聴者のみられたもの3家系、Ⅱ代にわたり難聴者のみられたもの10家系であり、Ⅰ代とびこえてあらわれた隔世遺伝のもの5家系、残り29家系は、傍系に難聴者がみられる例であった。

また血族結婚によると思われた例は6家系であり、父方祖父母がいとこ結婚の3家系、母方祖父母がいとこ結婚の2家系、父方祖父母および両親のⅡ代にわたるとこ結婚の1家系があった。Ⅱ代にわたる血族結婚のもの1家系には、父方および母方の両家系に難聴者が多発しており、父親と子供3人のうち2人が高度の難聴があった。母方祖父母がいとこ結婚の1家系

は、難聴者が母の世代をとびこえてあらわれた1家系であり、残りの4家系は傍系に難聴者があらわれているものであった。

2 性別および発病年令について

102例のうち男子は46例、女子は56例で、男女比は1:1.22で女子にわずかに多くみられた。また発病年令は(図1)、思春期以前、特に10才未満の発病例が多いことがわかる。また発病年令が不明な例も多かった。発病時期には男女別では特に目立った差があるようには思われなかった。また親と子のⅡ代にわたって聴力検査の施行しえた13家系32例について、その発病年令を調べてみると(図2)、このうち5例は発病年令が不明の例で、初診年令をとった。全家系が発病年令または初診年令は子供の方が早いことを示していた。

3 聴力検査成績について

(i) 聴力像について

純音聴力検査の施行された90例、180耳についてその聴力像を調べてみると(表2)、漸傾型が129耳と最も多く、次に高度難聴型15耳、中音障害型13耳、水平型12耳、山型5耳、急墜型4耳、低音障害型2耳の順

表2 聴 力 像

	男	女	計
漸 傾 型	57	72	129(耳)
高 度 難 聴 型	4	11	15
中 音 障 害 型	10	3	13
水 平 型	2	10	12
山 型	3	2	5
急 墜 型	0	4	4
低 音 障 害 型	0	2	2

であった。

(ii) 聴力像の対称性について

聴力像の対称性を調べてみると、90例のうち非対称性を示すものは3例で、87例(97%)は対称性を示すものであり、殆どどの症例が対称性を示していた。

(iii) 発病年令と聴力像について

発病年令と聴力像の関係をみると(図3)、漸傾型および高度難聴型に比較的发病年令が若い年令に多い傾向を示し、特に高度難聴型は幼年期に発病の認められるものが多いことを示していた。中音障害型、水平型、低音障害型には、漸傾型、高度難聴型に較べ、やや年令が進んでから発病する傾向がみられた。

(iv) 発病年令と聴力損失程度について

発病年令と聴力損失程度の関係について調べてみると(図4)、発病年令が若い症例においては、聴力損失程度は高度な例が多く、発病年令が増すにつれて聴力損失の程度が比較的軽度の傾向を認める。また発病年令が不明な群では、聴力損失程度を初診年令でとって調べてみると(図5)、同じく初診年令が若い年令では聴力損失程度が高度な例が多い。また発病年令が不明な例には、聴力損失程度の軽度の例では、聴力損失が会話域においてはごく軽度のため、日常生活に不自由を感じず、難聴を自覚していない例が含まれており、家系内に難聴者がおり、検査を受けてはじめて難聴が判明した例も含まれていた。

(v) 同一家系内の聴力像の類似性について

表3のごとく、同一家系内で2名以上聴力検査のできたものは27家系の65例であり、このうち5名検査したものの1家系、4名検査したものの1家系、3名検査したものの6家系、2名検査したものの19家系であった。同一家系内で類似性のあるものは18家系であった。9家

図3 発病年令と聴力像(耳数)

図4 発病年令と聴力損失(耳数)

図5 発病年令(不明群)

系に類似性を欠いていた。類似性のあるもの18家系のうちでは、漸傾型16家系、中音障害型2家系であった。

(iv) 難聴の進行性について

表3 同一家系内の聴力の類似性

類似性のあるもの	家系数	例数
母と	2	(4)
母・兄弟と	2	(7)
母・おばと	1	(3)
兄弟姉妹と	8	(17)
いとこと	4	(8)
おじと	1	(2)
計	18	(41)
類似性の欠くもの		
母と	5	(10)
母と(妹とは類似性ある)	1	(3)
祖母と(おばとは類似性ある)	1	(3)
母・妹と	1	(3)
母・おじ・おばと	1	(5)
計	9	(24)

次に、4カ月以上6年間にわたって少なくとも2回以上検査しえた41例82耳について、その聴力損失の程度を follow up できた。図6はその観察期間と聴力の変動を示したものである。縦軸は観察期間中の域値差を示し、プラスの方向は500Hz, 1,000Hz, 2,000Hz, 4,000Hzの平均値の上昇を意味している(悪化例)。横軸は観察期間年数を示す。一般に観察期間年数が増加するにつれて、悪化例が増加していることがわかる。また82耳中17耳に15dB以上の域値上昇を示しており、63耳は14dB以内に存在していた。2耳は15dB以上の域値下降を示した。

次に、経過観察できた例について、聴力の域値差を、発病年齢別に検討した結果を図7に示している。この図で縦軸は観察期間中の初回時と最終時の域値差をdBで示し、マイナスの方向は域値下降を、プラスの方向は域値上昇を示す。横軸は発病年齢を示している。15dB以上の域値上昇を示した例は、発病年齢が早い例に多い傾向がみられる。

また、初回時の聴力像と難聴の進行性についてみると(表4)、15dB以上の悪化を示した例は、特定のオーディオグラムを示す例にみられるわけではなく、難聴の進行性とオーディオグラムの型との間には関連性は見出せない。

考 按

家系図、性別、発病年齢等に関する結果については

図6 観察期間と聴力の変動(耳数)

表4 聴力像と難聴の進行性(耳数)

聴力の変動 型	±14dB 以内	15dB 以上 悪化	15dB 以上 改善
漸傾型	48	10	1
高度難聴型	1	3	
中音障害型	4	2	
水平型	5	1	
急墜型	1	1	
山型	2		1
低音障害型	2		

従来から数多くの報告がなされている。今回、これらの諸点に関する考察ははぶき、聴力像を主体に、殊にその進行性の点から若干の考察を加えてみたい。

聴力像について

聴力像について調べてみると、従来の報告では、荻場¹⁾は検査をした6例が全例漸傾型を示しており、沼倉²⁾は漸傾型、凹型(中音障害型)の二つの型に大き

図7 発病年令と聴力の変動(耳数)

く分けられるとし、凹型のオーディオグラムは家族性内耳性難聴に特異的なものであるとのべ、林ら³⁾は高音急墜型、C₅ dip 型、漸傾型を示しておるが、最後には水平型に移行するのだとのべている。切替ら⁴⁾は60例120耳の聴力像を分類し、高音漸傾型ないし急墜型をあわせて42耳、中音あるいは低音障害型が57耳で、各々症例の半数ずつをほぼ占めていたと報告している。著者らの例は漸傾型が129耳と圧倒的に多く、次に高

度難聴型15耳、中音障害型13耳、水平型12耳、山型5耳、急墜型4耳、低音障害型2耳となっていた。

聴力像の対称性について

従来から家族性内耳性難聴は Langenbeck の Symmetriegesetz にあてはまるものと報告されているが、本邦での佐藤⁵⁾の報告以来、山田⁶⁾、施⁷⁾、原口⁸⁾、松本⁹⁾、福田ら¹⁰⁾も左右対称性であると報告、沼倉²⁾は全症例の90% (29例) に、切替ら⁴⁾は93% (56例)

に聴力像の対称性が認められると報告、林ら³⁾はすべての症例が左右対称であったとのべている。著者らの症例も聴力検査を施行しえた90例のうち3例を除く87例(97%)に左右対称性が認められた。

発病年令と聴力像について

切替ら⁴⁾は各聴力像の症例のなかにも、発病期にかなりばらつきはあるが、このばらつきは高音障害型は難聴を自覚することが遅いから発病から初診までの期間を考慮する必要があるとのべ、しかし全体的にみると高音障害型の発病は早く、次いで中音障害型・低音障害型の発病は遅れるようであるとのべている。著者らの症例では、一般に漸傾型はかなりばらつきはみられるが、比較的発病年令が若年期に多い傾向があり、また高度難聴型は幼年期に発病時期が認められることが多いことを示す。難聴が高度のため早く気付かれることが多いのだとも考えられる。一方中音障害型、水平型、低音障害型には、一般にやや遅く発病する傾向がみられた。このことは発病年令の不明群で、初診年令をとってみても同じ傾向が認められた。

発病年令と聴力損失について

発病年令が早い症例においては、聴力損失程度が高度な例が多く、聴力損失の程度は発病年令が増すにつれ軽い傾向を認めた($r=0.351$)。初診年令をとって調べた沼倉²⁾、切替ら⁴⁾は、前者は高年になるにしたがい高度になるとのべ、後者は高齢者で高度の難聴を示すものを除くと、年令と難聴の程度との間には逆の相関がみられ、若年者でもかなり高度の聴力損失をみるものがあるとのべている。

同一家系内の聴力像の類似性について

同一家系内の聴力像の類似性については、切替ら⁴⁾は同一家系内での難聴者19家系を検討し類似性のあるもの15家系で、このうちには低音障害型7、漸傾型3、中音障害型4、急墜型1家系があり、類似性を欠くものは4家系にみられたと報告している。著者らの例では同一家系内で2名以上聴力検査をした27家系を検討すると、類似性のあるもの18家系でこれらの聴力像は漸傾型16家系、中音障害型2家系であり、聴力像の類似性を欠くものは9家系にみられた。このうちには親と子供の違うもの4家系、子供達は同じで親とは違うもの2家系、母親と母親の兄妹達は同じで子供が違うもの1家系、叔母とは同じで祖母とは違うもの1家系、母と妹は類似性があるが、これとは似ないもの1家系があった。

難聴の進行性について

原口ら⁸⁾は家族性内耳性難聴は両側性で緩慢であるが常に進行性であるとし、幼年期から青春期までの間に進行性に高度の難聴に達するものであるとしている。また Huizing ら¹¹⁾も58例についてその進行の段階を5型に分類し、1,000Hz~1,500Hz以上が60dB以上の聴力損失を示す例を(A)とし、さらにこれらの高音部が80dB以上の聴力損失になり(B)、やがて低音部も障害され(C)、さらに低音部の進行が進んで高度となり(D)最終的にはろうとなる(E)としている。切替ら⁴⁾はその進行の仕方を、直線的というよりむしろ発症期にかなり急速に進行し、ある一定の段階に達した以後は、非常に緩慢にしか増悪しないと推論している。また Dolowitz ら¹²⁾は14年間にわたって6代にわたる一家系の家族性難聴について詳細にのべ、349人中71例の成人および20人の子供の家族性難聴を指摘し、ことに若年期に現われる高音障害は急速に進行することを推測している。一方 Williams ら¹³⁾は母親とその子供3人の聴力の推移を1953年から1960年までの7年間 follow up した結果では、これらの全体がⅢ型の audigram を示し、難聴の進行性は認められないとのべている。一方 Johnsen¹⁴⁾は80例中大部分を占める劣性遺伝を示す家族性難聴では、ほとんど進行は認められず、一部の優性遺伝を示す難聴に進行性が認められたとしている。著者らの症例においては、聴力の変動を観察できた41例82耳を調べてみると、発病年令が若い年令であると始めから聴力損失が高度の例が多く、また年令が若いものでは聴力の悪化する例が比較的多い例もみられ、年令が進むと聴力の悪化する例は少なく、一般に家族性内耳性難聴は、進行性であるとしても、ある時点からは比較的ゆっくりと悪化をしていくように思われる。この点に関連して、立木¹⁰⁾は家族性内耳性難聴で、遺伝するものは聴器の素質または弱質であり、難聴を発現するものは、その強いものあるいはなんらかの誘因によって、それが誘発されたものであろうと推測している。すなわち、難聴になる素質が優性遺伝をし、それが実際に難聴になるか否かは、その遺伝の浸透率の強弱によって決定されるのであろうとし、その素因に加えて、外因的な要素、例えばストマイ難聴のごとく、それが trigger 的働きによって惹起されうことを暗示している。

著者らは母方の親類に高度難聴者が存在し、その母親が遺伝的素因について心配し、相談のため来院した症例で、初回の検査で正常聴力を示した女兒で、感冒罹患後、急激なかつ高度難聴を惹起した症例を報告¹⁰⁾

している。また立木¹⁷⁾もストマイ難聴のなかには家族的素因を有するものがあり、そのような場合の難聴は進行性が強く、かつ高度難聴になる傾向が強いとしている。このような観点からみると、家族性難聴のなかには、その聴器の外因に対する感受性が非常に強い素質として遺伝され得るものも存在するのではなかろうかと思われる。この場合その外因が、ウィルス性炎症であれ、聴器毒であれ、さらに物理的な原因であったとしても、一度惹起された難聴は進行性にある難聴を作り上げてしまうのではなかろうかと推測される。この点、同一家系のオーディオグラムが夫々ほぼ同様の型の、同程度の難聴に落着いてしまう事実と一致している。

結 語

家族性感音性難聴 59家系、102例について 臨床的観察を行なった。その結果、男女比は46:56でやや女性に多い傾向がみられた。発病年齢は10才未満が多く、男女間には発病時期に差違は認め難かった。

聴力像は大部分が漸傾型で、次いで高度難聴型、中音障害型、水平型が多かった。

聴力像は3例を除き87例が対称性を示していた。

漸傾型はかなりばらつきはあるが、比較的発病年齢が若い例が多く、また高度難聴型は幼年期までの発病が大部分で、一方中音障害型、水平型、低音障害型はやや発病が遅いように思われた。

4カ月から6年間の難聴の経過をおえた41例82耳について難聴の進行の仕方をみると、発病時期が早い例では比較的短期間に聴力の進行する例もあるが、その他は少なくとも、比較的長期間にごく軽度の進行をしていくようと思われた。

Clinical Studies on Familial Deafness

By

Shinichiro Sakamoto, Miyo Kasai, and
Kiwako Watanabe

From the Department of Oto-Rhino-
Laryngology, Faculty of Medicine, Hiro-
saki University

(Director: Prof. S. Awataguchi)

A hundred and two patients in 59 families diagnosed as familial deafness at the Otolaryngological Department of the Hirosaki University Hospital during the past 6 years, were clinically observed.

Forty-six cases were male and 56 female. In the

majority of cases the onset of deafness started under 10 years old. Audiograms in most cases showed a descending type and bilateral audiograms were symmetrical in all except 3 cases.

From the follow-up of hearing in 41 cases from 4 months to 6 years, it was suspected that the progression of hearing loss in many cases occurred gradually for a long period of time.

文 献

- 1) 荻場芳雄: 家族性進行性内耳性難聴の3家系。耳喉, 31; 169, 1959.
- 2) 沼倉昌雄: 家族性内耳性難聴について。耳喉, 37; 15, 1965.
- 3) 林 宏典, 他: 家族性内耳性難聴の1症例。耳喉, 38; 39, 1966.
- 4) 切替一郎, 他: 家族性難聴の臨床的観察。耳喉, 40; 107, 1968.
- 5) 佐藤重一: 一家系中に見られたる遺伝的難聴について。日耳鼻, 41; 1394, 1935.
- 6) 山田喜郎: 家族性内耳性難聴について。日耳鼻, 44; 2114, 1938.
- 7) 施 庭療: 家族性難聴の一例。日耳鼻, 46; 1582, 1940.
- 8) 原口静彦, 他: 家族性内耳性難聴, 耳喉, 26; 476, 1954.
- 9) 松本正規: 家族性内耳性難聴症例。日耳鼻, 60; 858, 1957.
- 10) 福田栄三, 他: 遺伝性内耳性難聴。耳喉, 35; 801, 1963.
- 11) Huizing, E.H. et al.: Studies on progressive hereditary perceptive deafness in a family of 335 members. I. Genetical and general audiological results. Acta Otolaryng., 61; 35, 1966a.
- 12) Dolowitz, D.A. et al.: Hereditary nerve deafness. Ann. Otol., 70; 851, 1961.
- 13) Williams, F. et al.: Hereditary nerve deafness. Arch. Otolaryng., 75; 69, 1962.
- 14) Johnsen, S.: The Heredity of perceptive deafness. Acta Otolaryng., 42; 539, 1952.
- 15) 立木 孝: 難聴の診断と治療。南江堂,
- 16) 坂本伸一郎, 他: 感音性難聴悪化例の検討, Audiology Japan, 14; 83, 1971.
- 17) 立木 孝: 所謂家族性ストマイ難聴の症例。日耳鼻, 63; 393, 1960. (受付 47.2.4.)