鼓室内薬剤による内耳障害

大阪市立大学医学部耳鼻咽喉科学教室

中井義明, 山本 馨

Department of Otolaryngology, Baylor College of Medicine (U.S.A.)

五十嵐 真

緒 言

中耳腔内炎症はその病変が高度、あるいは長期間の持続によって時には隣接する内耳にも波及することは臨床的、実験的に知られている¹⁾²⁾。一方中耳病変の局部治療に種々の薬剤が中耳腔内に使用される。しかしこれら薬剤が中耳・内耳を境する両円窓、特に正円窓膜を通じて内耳にも波及し、それが内耳障害を惹起する可能性もある。

内耳に毒性作用をおよぼす薬物はアミノ配糖体抗生物質を筆頭に種々あり、その全身投与による内耳障害様式は薬物の種類により異なることが知られている³⁾⁴⁾。その障害様式あるいは内耳障害に対する治療薬の効果を知らんとする場合、全身投与による観察に際しては個体差の存在も無視できない。

今回鼓室内に注入された種々の薬物がどのように内耳に障害をおよぼすか、あるいはその程度を知ろうとし、動物実験による形態的観察を試みた。このことは点耳薬の内耳毒性を知る臨床的な必要性に応ずることであり、他面、基礎的な見地より内耳感覚細胞やその他の組織がどのように変性、消失していくものであるかを明らかにするのに有用である。この種の実験は上述のごとく個体差が少ないが、動物種差が大であるので、その成績の判定にはヒトのそれと多少異なることも念頭におかねばならない。

実験材料および方法

実験動物としてプライエル反射、鼓膜正常の成熟白色モルモットを下記の条件に対して各5匹、計35匹、およびリスザル2匹を使用した。モルモット鼓室腔内注入には下記の薬物を下記の濃度および量、経鼓膜的に各1回注入した。最終注入2～6日後断頭、内耳を採取し、2%オスミック酸固定後、漸進アルコール脱水、型のごとくエポキシ樹脂に包埋した。包埋された試料

は必要な部分に細切し、エポンブランク上に再包埋し、1 μ 切片作成、位相差顕微鏡あるいはトルイジンブルー染色後光顕的観察を行なった。その同部位をPonter blum MT-1, MT-2で超薄切片作成、酢酸ウラニル、鉛重染色後JEM-7電子顕微鏡にて観察した。

(1) DKB (3'4'-dideoxy kanamycin B) 100mg を0.6ml および0.4mlの生理的食塩水で溶解、その0.3mlを鼓室内注入。

(2) chloramphenicol succinate (CM) 200mg を0.4mlの生理的食塩水で溶解、その0.3ml

(3) minocycline monohydrochloride (MC) 100mg を1mlの生理的食塩水に溶解、その0.3ml

(4) プレデックス点耳液(酢酸プレドニゾロン0.5%, 硫酸フラジオマイシン0.35%, プロピオン酸ナトリウム含有・武田薬品社製)を0.3ml

(5) (1)の条件で鼓室内注入1～2日後cocarboxylase (100mg/生理的食塩水1ml)を0.1ml鼓室内注入、

(6) DKB (100mg/生理的食塩水2ml) およびcocarboxylase (100mg/生理的食塩水1ml)を各0.15ml計0.3mlを同時鼓室内注入

なお対照として上記薬物を含まない生理的食塩水を反対側の中耳腔に注入した。

(7) リスザルに対してはgentamicin (80mg/ml)を鼓室内注入薬物として使用した。全麻下にgentamicinをたっぷり左耳鼓室内に注入、少なくとも3時間は注入耳を上にし、耳管より流出する気配のあるときは追加して滴した。この左耳は運動失調が明らかになるまで5回目をかえて注入し、他側耳は症状に関係なく1回注入した。最終注入24時間後に試料を採取観察した。

実験成績

聴器毒性薬物の全身投与に際しては、内耳への障害は個体差は大であるが鼓室内注入例では、個体差は殆

どなく、同一条件ではほぼ同様の変化が内耳にみられた。

(1) DKB 注入例

高濃度注入例ではラセン器の内、外有毛細胞が下部回転で消失し(図1)、上部回転では変形した有毛細胞が僅かに認められるにすぎなかった(図2)。神経終末も消失していたが神経線維は所々に遺残していた。血管条、ラセン隆起は下部回転で変化は殆んどなく、上部回転では血管条の毛細血管の変性、消失(図3)、細胞相互の嵌合や infoldings が消失し、正常では三層より構成されているべき血管条が扁平な一層の細胞層として観察された。

低濃度注入例では上記変化が軽度となるが、下部回転では外有毛細胞、上部回転では内有毛細胞の変性が大きかった(図4)。これら感覚細胞は細胞内のライゾゾームの増大、あるいは蓋板下部の糸粒体の変性にはじまり、感覚毛の融合、細胞体の膨化、一部は上方の蓋膜下腔に圧出され、一部はコルチリンパ腔に浮遊し、支持細胞、とくにダイテルス細胞に貪食される。ダイテルス細胞は膨大し、外有毛細胞の消失したコルチリンパ腔を埋めつくすことが多く、また上部網状膜を補強し、内リンパとコルチリンパの交通を阻止する。

これらの変性様式は薬物を全身投与した場合に似ているが、鼓室内注入の場合の変性はより高度でその進行は急速であった。

前庭半規管感覚細胞の変性も大きかった。この場合、II型感覚細胞よりI型感覚細胞の変性は高度であった。

(2) chloramphenicol succinate 注入例

ほぼ全回転にわたり感覚細胞の消失がみられ、特に下部回転ではラセン器の消失とともに基板上に扁平な一層の細胞がみられるにすぎなかった(図5, 6)。上方回転では変性した支持細胞などが内リンパ腔に浮遊しているのが観察され、血管条はいわゆる萎縮像を示していた。

前庭半規管においては斑および稜とも感覚細胞はほとんど変性消失し(図8)、基底膜下部の有髄、無髄神経線維も高度の変性像を示した(図9)。耳石もその配列の乱れ、減少とともに平衡斑の支持細胞内に耳石が貪食されているのが観察された(図7)。

(3) minocycline monohydrochloride (MC), プレデックス注入例

ラセン器感覚細胞の変性あるいは消失がみられた

が、上記2例のそれよりも軽度であった(図10)。とくにMC注入例では外有毛細胞の滑面小胞体の増大、毛の融合、胞体膨化(図11)、遠心神経終末内の小胞の集積(図12)など変性の比較的初期像が多くみられ、血管条では細胞間隙の増大、毛細血管腔の虚脱、内皮細胞の膨化など特異な像が観察された(図13)。

(4) DKB注入後に co-carboxylase 注入例ではDKB単独注入例と同様の変化がみられた。しかしこの両者を同時に鼓室内注入した例では蝸牛内の変性像は殆んどみられなかった。

(5) リスザル鼓室内 gentamicin 注入例

鼓室内注入1回の場合には内耳諸組織には全く変化はみられなかった。

しかし反復5回注入の場合、基底回転下部(lower basal turn)で内有毛細胞は正常像を呈したが、ラセン器外有毛細胞は完全に消失していた(図14)。基底回転上方(upper basal turn)では外有毛細胞の一部は遺残していた(図15)。上部回転ではラセン器に変性像はみられなかった。前庭半規管感覚細胞はその大部分は消失し、支持細胞が感覚上皮の大部分を占め、それらの間隙に神経線維は遺残しているのが観察された(図16)。

考 察

外耳、中耳内の炎症あるいは耳手術の際に、その治療あるいは感染予防に種々の抗生物質を主とする薬剤が全身投与とともに局部にも広く一般に使用されている。中耳内炎症あるいはその手術後に気導聴力の低下のみならず、内耳性の骨導聴力低下も多く認められている¹⁾⁵⁾。これが局所に使用された薬剤に原因する所も否定できない。これを実験的に証明しようとし、主として光顕的あるいは電気生理的検索による報告がみられる。なお全身投与の場合、両側耳同程度に障害を受けるので、プライエル反射などの機能検査は意義があるが、鼓室内注入実験では伝音系の障害あるいは片側耳を対象とする場合が多く、その機能検査の判定は意義が少なく、形態的観察の報告が多い。

Schuknecht (1950)⁶⁾ はネコ、モルモットの中耳腔への高濃度のストレプトマイシン注入により、ラセン器および前庭感覚細胞の変性をみている。Spoendlin (1966)⁷⁾ も同様の現象を観察している。Gulick & Patterson (1963, 1964)⁸⁾⁹⁾ はモルモット、ネコで低濃度のクロラムフェニコールを一回正円窓膜に接触した場合、蝸牛電位の低下を報告し、Proudら(1968)¹⁰⁾ は

モルモットでクロラムフェニコールの正円窓窩への一回の注入により基底回転のラセン器、血管条の変性を光顕で観察している。Koideら(1966)¹⁴¹⁾はクロマイ、カナマイシン、デヒドロストレプトマイシン、キニンのモルモット鼓室内注入により基底回転ラセン器の変性を証明している。類似の実験が Wersällら(1969)¹²²⁾によるモルモットのゲンタマイシン鼓室内注入 Kohonen & Tarkkanen (1966)¹³²⁾によるネオマイシン、ポリミキシシンB、コリマイシンのモルモット鼓室内注入、Mittelman (1972)¹⁴²⁾によるクロマイ、ネオマイシン、アンピシリン、ゲンタマイシンのモルモット鼓室内注入、Dalら(1973)¹⁵²⁾によるプレオマイシンのモルモット鼓室内注入、志多ら(1973)¹⁶²⁾立木ら(1973)¹⁷²⁾によるクロマイサクシネートのモルモット鼓室内注入によりなされ、程度の差があるがいずれも内耳感覚細胞に変性が惹起されることを認めている。

モルモットにおける実験においては鼓室内注入薬剤による内耳諸組織の受傷性が大であることは上記のごとく、衆知の事実となっている。本実験における観察ではその障害が蝸牛ラセン器においては下部回転が大であり、外有毛細胞が内有毛細胞よりも易受傷性であり、神経成分は感覚細胞よりも抵抗性が大であった。上部回転では内有毛細胞が外有毛細胞よりも易受傷性であり、血管条は下部回転よりも上部回転が易受傷性であった。これらの障害様式は全身投与の場合とほぼ同様の所見を呈しているが、鼓室内注入の場合は、変性の速度が全身投与の際、緩慢であるのに反し、急速であり、変性した感覚細胞の破片が蓋膜下腔、内リンパ腔、コルチリンパ腔に多く浮遊しているのがみられた。一方正円窓膜に近い部位が概してその障害が大であり、中耳腔内薬剤は主としてこの膜を通過して作用すると考えて誤りはないことを示唆している。前庭半規管においては、斑、稜とも障害はほぼ同程度であり、稜が斑よりも易受傷性である全身投与の場合とやや異なっていた。これは正円窓膜より侵入する薬剤の前庭半規管内での濃度が全身投与の場合と差があることによるものであろう。

鼓室内注入実験において内耳が障害される場合、注入薬剤の薬理作用による以外に滲透圧の変化による障害が加味されている可能性がある。正円窓窩に食塩結晶を接触させた場合正円窓膜の変性とともに入耳液がこの膜を通過して、鼓室側に流出するのが観られるとともに、ラセン器、血管条に変性が惹起される⁴⁾¹⁸⁾¹⁹⁾。しかしこの変性は正円窓に近い部に限局されているこ

と、あるいは対照として生理的食塩水液を入れた場合には内耳に変化がみられないことより、本研究に使用した薬剤による内耳障害はその薬物固有の薬理作用によると考えて差支えない。一方耳手術の際、その感染予防に薬剤を粉末のまま鼓室腔に使用する場合は、その薬剤の耳毒性作用とともに浸透圧の変化による内耳障害も否定できない。

モルモットによる鼓室内注入例ではただ一回の注入で内耳障害が高度にみられた。一方臨床これら薬剤を鼓室内に使用した場合、内耳障害が明らかでないことが多い。その理由は種々あるが、その一つにこの種実験には動物種差が大であることを考慮に入れなければならない。Wersällら(1969)¹²²⁾のモルモット鼓室内への0.3%ゲンタマイシン注入実験でラセン器の障害を認めているにもかかわらず、Websterら(1970)²⁰²⁾のネコによる実験で、高濃度のゲンタマイシン注入において内耳に変化を認めているが、3%ゲンタマイシン注入においては内耳に変化を認めていない。すなわち鼓室内薬剤による内耳の感受性はネコよりモルモットが大であることがわかる。ヒトにおける鼓室内薬剤による内耳障害を実験的に知ろうとする場合、側頭骨の構造がかなり異なっているモルモットによる実験成績では殆んど役に立たないといっても過言でない。そこでヒトに側頭骨の構造が類似しているサルを実験動物として使用することが望ましい。本実験でゲンタマイシンをサル鼓室内に注入した場合、一回の注入のみでは内耳に変化がみられなかったが、数回反復して注入した場合、ラセン器下部回転、前庭半規管感覚細胞の変性消失が観察された。Schuknecht (1957)²¹⁾はメニエール病の患者中耳腔にストレプトマイシンを1日1回、1週間注入した例において高度の蝸牛、前庭障害を認めている。この成績より、ヒトにおいてはモルモットにおけるよりも感受性は非常に低いがやはり鼓室内注入薬剤が内耳障害を起すといえる。

ヒトにおける鼓室内注入薬剤が内耳障害を起しにくい原因の今一つの理由に臨床上使用する場合は中耳内炎症に対してであることにもよる。鼓室内薬剤の内耳への侵入には正円窓膜を通過するのが主であると考えられるが、中耳炎の場合両円窓部に肉芽が存在したり、あるいは炎症性細胞浸潤による正円窓膜の肥厚があり、薬剤の透過性は低下していると推察される。しかしこの場合は、中耳内炎症そのものが両円窓、とくに正円窓膜を通過し、内耳を侵襲することも多く²²⁾、これと薬剤による内耳障害と区別して知ることは困難

であるが、この両者加味された内耳障害が発生すると考え、臨床上の中耳内炎症治療にあたるべきであろう。

DKB と co-carboxylase との同時鼓室内注入例では内耳障害は認められなかった。すなわち co-carboxylase はすでに障害の発生した感覚細胞に対してはこれを回復させることは困難であるが、変性に陥る以前に対する予防効果が存在することを示唆している。また薬物の鼓室内注入は全身投与によるよりも高濃度に内耳に移行すると考えられるので、これら薬剤の鼓室内注入も内耳障害に対する治療法として一考すべき方法であろう。しかしこれに関しては薬物の濃度、中耳粘膜への薬物による刺激など考慮すべき問題も残されている。

ま と め

モルモット、リスザルを使用、種々の薬物の鼓室内注入による内耳の変性像を光顕および電顕で観察し、感覚細胞の変性、消失や血管条の変性の過程を微細構造のレベルで明らかにした。

鼓室内注入薬剤による内耳障害はモルモットにおいては高度であったが、サルではモルモットに比しかなり軽度であり、この種実験には動物差が大であることを強調した。

ラセン器変性の様式は、蝸牛下部回転外有毛細胞、上方回転の内有毛細胞、上方回転の血管条などの変性が優先されるのは全身投与による場合に類似していた。前庭半規管感覚細胞の変性は稜、斑とも同程度であった。変性の進行は全身投与に比し速やかで強度であった。

鼓室内への co-carboxylase 注入によりラセン器感覚細胞変性の予防効果を認め、内耳障害治療薬剤の投与法に対しても考察を加えた。

Ototoxicity of Topically Applied Antibiotics in Guinea Pigs and Squirrel Monkeys.

Yoshiaki Nakai, M.D. and Kaoru Yamamoto M.D.

Department of Otolaryngology, Osaka City University Medical School

Makoto Igarashi, M.D.

Department of Otolaryngology, Baylor College of Medicine

Inner ear damage resulting from intratympanic application of 3', 4'-dideoxy kanamycin B chloramphenicol succinate, minocycline monohydrochloride, predex (an ototopical applied drug Which is contained

fradimycin) and gentamicin was studied experimentally in guinea pigs and squirrel monkeys. The inner ears were examined by light and electron microscopy. It was found that the drugs caused severe damage to the hair cells in the organ of Corti and vestibule as well as some damage to stria vascularis. These damages to the inner ears in guinea pigs were more severe than that in squirrel monkeys. These damages in the inner ear were considerably reduced by ototopically applied co-carboxylase. On the basis of the findings, the possible diffusion routes of the ototopically applied drugs in the inner ear fluid, the dangers arising from their topical use and it's prevention were discussed.

文 献

- 1) Paparella, M.M., Brady, D.R., & Moel, R.: Sensorineural hearing loss in chronic otitis media and mastoiditis. Tr. Am. Acad. Ophth. & Otol., 74; 108-115, 1970.
- 2) 中井義明: ヒトおよび動物中耳病変の内耳への波及に関する形態的研究. 第13回オトマイクロサージェリー研究会, パネルディスカッション, 1972.
- 3) 中井義明, 山本 馨, 岩本 勉: 薬物中毒および先天ろう動物蝸牛の成立機転に関する電子顕微鏡的研究. Audiology Japan, 14; 504-512, 1971.
- 4) Nakai, Y.: Pathogenesis of vestibular labyrinth. An electron microscopical study. Equilibrium Res., 3; 17-29, 1973.
- 5) 中井義明, 金子 実: 慢性中耳炎における感音性難聴. 投稿予定
- 6) Schuknecht, H.F.: Ablation therapy for the relief of Ménière's disease. Laryngoscope, 66; 859-870, 1956.
- 7) Spoendlin, H.: Zur Ototoxizität des Streptomycins. Pract. Otorhinolaryng., 28; 305-322, 1966.
- 8) Patterson, W.C. & Gulick, W.L.: The effects of chloramphenicol upon the electrical activity of the ear. Ann. Otol., 72; 50-55, 1963.
- 9) Gulick, W.L. & Patterson, W.C.: The effects of chloramphenicol upon the electrical activity of the ear. Long term data. Ann. Otol., 73; 204-209, 1964.
- 10) Proud, G.O., Mittelman, H. & Seiden, G.D.: Ototoxicity of topically applied chloramphenicol.

- Arch. Otolaryng., 87; 580-587 1968.
- 11) Koide, Y., Hara, A. & Hando, R.: Vulnerability of the organ of Corti in poisoning. Acta Otolaryng., 61; 332-344, 1966.
 - 12) Wersäll, J., Lundquist, P. -G. & Björkroth, B.: Ototoxicity of gentamicin. J. Infect. Dis., 119; 410-416, 1969.
 - 13) Kohonen, A. & Tarkkanen, J.: Cochlear damage from ototoxic antibiotics by intratympanic application. Acta Otolaryng., 68; 90-97, 1969.
 - 14) Mittelman, L.: Ototoxicity of "Otopical" antibiotics: past, present, and future. Tr. Am. Acad. Ophth. & Otol., 76; 1432-1443, 1972.
 - 15) Dal, I., Edsmyr, F. & Stahle, J.: Bleomycin therapy and ototoxicity. Acta Otolaryng., 75; 323-324, 1973.
 - 16) 志多 享, 鈴木政昭, 志多英佐, 菅野 亨, 藤井正憲, 吉村元昭: 蝸牛内諸電気現象の上からみたクロマイサクシネートの鼓室腔内注入の影響. Audiology Japan, 16; 277-229, 1973.
 - 17) 立木 孝, 川瀬 尚, 橋本雅夫: Chloramphenicol Succinate の鼓室内注入の蝸牛膜迷路に及ぼす影響について. 内耳生化学, 4; 15-17, 1973.
 - 18) 中井義明: 前庭半規管感覚上皮の病態. 耳鼻, 19; 863-874, 1973.
 - 19) Nakai, Y.: Passive transport of the stria vascularis. Arch. Otolaryng., 206; 127-136, 1974.
 - 20) Webster, J.C., McGee, T.M., Carroll, R. et al.: Ototoxicity of gentamicin: Histopathologic and functional results in the cat. Tr. Am. Acad. Ophth. & Otol. 74; 1155-1165, 1970.
 - 21) Schuknecht, H. F.: Ablation therapy in the management Ménière's disease. Acta Otolaryng., Suppl. 132, 1-42, 1957.

本研究の一部は厚生省特別研究費補助金によった。

(受付 49.4.9)

附 図 説 明

- 図1 DKB 鼓室内注入蝸牛下部回転ラセン器, 感覚細胞は変性し, その大部分は消失しているが遺残細胞片(→)が膨化したダイテルス細胞にとり囲まれている。モルモット, ×2,700
- 図2 DKB 鼓室内注入上部回転ラセン器, 外有毛細胞

胞は(H)変性し, 上方に圧出されている。モルモット ×2,700

図3 DKB 鼓室内注入蝸牛中部回転血管条, 細胞膜の infolding の消失, 毛細血管(C)の変性がみられる。モルモット, ×3,600

図4 DKB 鼓室内注入上部回転ラセン器. 内有毛細胞は完全に消失している。モルモット, ×2,700

図5 chloramphenicol succinate 鼓室内注入蝸牛, ラセン器は完全に消失し, 基底板(B)上に一層の扁平な細胞が認められるにすぎない。モルモット, ×4,000

図6 前図と同条件の光顕像

図7 図5と同条件の卵形囊斑, 感覚細胞は消失し, 耳石(O)が支持細胞に貪食されている。×4,000

図8 図5と同条件卵形囊斑, 感覚細胞は消失し, 支持細胞がかろうじて基底膜上に遺残している。×2,700

図9 図5と同条件. 卵形囊斑の神経線維の変性を示す。×6,200

図10 プレデックス鼓室内注入下部回転ラセン器, 外有毛細胞は消失し, ダイテルス細胞(D)や神経線維は認められる。モルモット ×2,700

図11 minocycline monohydrochloride (MC) 鼓室内注入ラセン器. 外有毛細胞(H)の胞体内の変性, 感覚毛の変形を示す。モルモット, ×2,700

図12 MC 鼓室内注入ラセン器, 外有毛細胞(H)の小胞体の増大, 神経終末(N)の小胞の集積を示す。モルモット, ×2,700

図13 MC 鼓室内注入血管条, 細胞間隙の拡大, 毛細血管の虚脱がみられる。E: 内皮細胞, R: 赤血球, モルモット, ×2,700

図14 gentamicin 鼓室内反復注入基底回転下方, ラセン器, 外有毛細胞は全く消失している。リスザル, ×5,300

図15 図14と同条件, 基底回転上方, ラセン器, 外有毛細胞(H)は一部消失, 一部遺残している。外有毛細胞が消失している部においてもそれへの神経終末(N)は健存している。リスザル, ×5,300

図16 図14と同条件後半規管膨大部臓。感覚細胞は殆んど消失し, 支持細胞間に神経線維(N)のみ認められる。リスザル, ×4,400