実験的音響障害による蝸牛の病態

大阪市立大学医学部耳鼻咽喉科学教室

(主任: 山本 馨教授)

中井義明, 森本明子, 頭司研作, 山本 馨

同第1生理学教室

時本 孝行

緒 言

音響性外傷による聴覚の変動を知り, これらによる聴力障害の予防あるいは治療について論ずる基礎の一部をなすものとして, 末梢聴覚受容器である蝸牛の形態的变化をも熟知しておく必要があると考える。今回末梢聴覚受容器である蝸牛の病態を, 主として動物を使用した実験的音響外傷により形態的に明らかにするとともに, その機能的変動をも検索した。

実験動物および方法

実験動物には鼓膜所見, プライエル反射正常の体重約 20 g のマウス, および体重約 300 g のハートレイ系モルモットを使用した。なお一部の実験には新生仔より生後 5 日までのマウスを使用した。それぞれの動物に対して, 下記のような実験条件を加えた。なお各条件に対して 5~10 匹の動物を使用した。

(1) 上記成熟モルモット, マウスに対して実験的曝露音には 500, 2,000, 4,000 Hz, 110~115 dB SPL の純音を使用, 10分, 1.5, 10, 15, 20 時間, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 日間連続曝露を行なった。純音発生器には Rion AA-34 を使用し, 音響曝露はスピーカを介して行われた。音圧測定には, Brüel & Kjaer Type 2203 を用いた。曝露終了後直ちに, あるいは経時的に 2 カ月までの蝸牛を採取した。採取された蝸牛はただちに 2% オスミック酸 (pH 7.0, 磷酸緩衝) にて固定を行い, 一側耳は常法によりエポキシ樹脂包埋し, 切片作成, 光顕および HS-9 透過電子顕微鏡にて観察した。同一動物の他側耳はエタノール脱水, 臨界点乾燥法により乾燥させ, カーボン・金の二重蒸着後 JSM-50 A 走査電子顕微鏡にて観察した。なお一部は固定後 surface preparation にて光顕的观察をも行なった。

次述の条件における形態的検索もすべて同方法を用

いた。

(2) 新生仔マウスに対して, 上記 (1) と同方法にて各純音曝露を生後 5 日まで行なった後蝸牛を観察した。

(3) 新生仔マウス, 成熟マウス, 成熟モルモットに対して, starting pistol 音をその頭上にて 1~10 回曝露した。

(4) 成熟モルモットに対して DKB-(3', 4'-dideoxykanamycin B) 200 mg/kg を 5~7 日間筋注を行なった後 4,000 Hz, 110~120 dB SPL 10~15 時間の音曝露を行なって後, 蝸牛を観察した。

(5) 音響外傷の機会があってもその音の強さ, 曝露時間により蝸牛に形態上の変化がみられない場合も多い。しかし機能的には変化が生じている。これを量的に知ろうとし, 脳波上の聴性誘発反応 (ERA) を聴覚の指標として強大音曝露後の機能的な変動をも検索した。

本実験には成熟モルモットを使用し, 活性電極を頭部で耳に近い部, 不関電極を前頭部におき, ERA の測定には 25 msec の音刺激を用い, 加算回数は 100 回, 解析時間 125 msec とした。図 1 はその実験装置の概略を示している。

強大音曝露条件は 2,000, 4,000 Hz, 110~120 dB SPL の純音を 10 分間および 1.5 時間曝露した。一方

図 1 モルモット脳波聴性誘発反応測定装置模式図

starting pistol を頭上にて一回曝露をも行なった。

成 績

(1) 成熟動物における純音強大音曝露

個体差は一部存在したが、一般にいずれの周波数においても15時間以内の音曝露では殆んど蝸牛に変化はみられなかった。しかしそれより長時間曝露の場合はラセン器に種々の程度の変性像がみられた。

障害部位は蝸牛ラセン器の各 response area にほぼ一致し、負荷時間が増大するほどその障害範囲も増していた。

まずラセン器の表面像を走査電顕で観察すると、聴毛の配列の乱れ、あるいは水泡様膨隆が初発変化としてみられた(図2)。特にその乱れは周辺部から生ずる

図2 500 Hz, 115 dB SPL 3日間曝露モルモット第3回転ラセン器, 外有毛細胞聴毛の排列の乱れ一部消失をみる。(実線は 1μ を示す。他図も同様)

図3 4,000 Hz, 115 dB SPL 5日間曝露直後のモルモット第2回転下部。多くの聴毛および感覚細胞の消失をみる。左下図は surface preparation 位相差顕微鏡像

ことが多い。次いで聴毛の融合、あるいは全消失がみられる(図3)。この場合、聴毛のみが消失するのではなく有毛細胞全体が変性消失し、周囲の支持細胞により補充される。その表面に変性した細胞破片が散在している。音響曝露後長時間を経過した例ではこの表面に散在していた細胞破片は消失し、支持細胞の占める範囲が増していた。

以上の変化を透過電顕にて観察すると、聴毛の変化として水泡様膨隆、変形、融合、一部あるいは全消失、

図4 音響外傷の初発変化の一つとして外有毛細胞蓋板下部の滑面小胞体の増加(矢印)がみられる。モルモット

図5 4,000 Hz, 115 dB SPL 4日間曝露直後モルモット第2回転下部外有毛細胞は高度に変性し(矢印), その原型をとどめていない。

感覚細胞胞体内の変化として蓋板下部のライソゾームの増大、蓋板層の融解しているとき像、滑面小胞体の著明な増大が初期の変化として観察された(図4)。これらの時期の変化は可逆性と考えられる。次いで感覚細胞全体の変性が進行し、その変形消失を観た。すなわち感覚細胞の屈曲、膨化、細胞膜の断裂とともに細胞内小器官がヌエル腔にばらばらになって浮遊する像が一般にみられた(図5)。一方変性感覚細胞が蓋膜下腔に圧出されている像が種々観察された。ヌエル腔内の変性感覚細胞は隣接する支持細胞により処理される様子であり、消失した感覚細胞の占めていた部位は膨化した支持細胞により直ちに補充され、コルチリンパと内リンパの交流は極力避けられるのは他種原因による障害と同様であった。以上の胞体の変性は外有毛細胞に主としてみられ、内有毛細胞ではその胞体は純音曝露に対し非常に抵抗が大であった。500 Hz 音曝露の場合は外側列の聴毛、2,000 Hz、4,000 Hz の音曝露の場合は内側列の聴毛の障害が比較的大であることが多いが、長期間曝露の場合には感覚細胞各列の障害の程度にはあまり差を見出せなかった。

ラセン器の神経線維や終末は概して感覚細胞よりも抵抗性が大であり、感覚細胞の消失した場合もその神経終末がチューリップ状に遺残していることが刺激後短期間にみられる一般的な像であった(図6)。曝露長期間後には外有毛細胞への神経線維の多くは消失し、遺残している少数の神経線維がダイテルス細胞間にみられるにすぎなかった。

しかし外有毛細胞が存在する場合も求心神経終末の変性、消失(図7)、遠心神経終末内の小胞の増量、糸粒体の一部変性、コルチトンネル内ラセン神経線維

図6 強音曝露により外有毛細胞は変性(H)しても神経終末(N)は遺残することが多い。モルモット

図7 強音曝露により前図のごとく神経終末はかなり抵抗性は大であるが、時には感覚細胞が存在するに拘わらず神経終末(A: 求心神経)の変性がみられる場合がある。E: 遠心神経終末

(tunnel spiral bundle)の一部変性などがみられることがあり、また内毛細胞下部の神経線維内の糸粒体の変性も存在することがあり、これら神経線維の音曝露による影響もみられた。

音響曝露終了長期間後には、短期間後にみられた細胞破片の大部分は処理され消失し、支持細胞の膨化がみられ、生き残りの変形した外有毛細胞がその間に遺残している像、外有毛細胞の全消失像(図8)、内外有毛細胞ならびに外有毛細胞への神経線維は完全に消失し内ラセン神経線維のみの遺残像(図9)など様々の像が音曝露の量にほぼ比例して種々観察された。

内リンパ分泌吸収の部位といわれている血管条には主としてその辺縁細胞に小胞の増大、あるいは広範囲

図8 2,000 Hz, 115 dB SPL 15日間曝露1カ月後モルモット第2回転、外有毛細胞は完全に消失し、支持細胞に置換されている。

の電子密度の低い無構造物質の出現が存在した(図10)。これらの変化は長期間の音曝露の際にみられたが、曝露終了長期間後ではほぼ正常に回復していた。

図9 4,000 Hz, 115 dB SPL 15日間曝露1カ月後モルモット第2回転下部。ラセン器内外有毛細胞は全く消失し、内ラセン神経線維束(矢印)のみが遺残している。

図10 4,000 Hz, 115 dB SPL 15日間曝露30分後モルモット第2回転血管条、辺縁細胞に無構造物質の出現がみられる。(矢印)

図11 starting pistol 曝露後、生後3日マウス下部回転ラセン器、障害はみられない。

(2) 未成熟蝸牛に対する音曝露の影響

新生仔マウスに前記方法の項に挙げた純音強大音曝露、あるいは starting pistol 音曝露を行なった場合、いずれの条件においてもその蝸牛には変化は認められなかった(図11,12)。

(3) 衝撃音曝露による蝸牛の病態

図13 のオーディオグラムは耳のすぐそばで大砲が爆

図12 前図と同条件ラセン器走査電顕像、正常像を呈している。

図13 大砲音障害による50才の聴力像

図14 starting pistol 曝露1日後のモルモット第2回転ラセン器、内外有毛細胞、支持細胞は高度に破壊されている。

発し、直後より高度の難聴を来した50才男子の症例である。この際蝸牛がどのような状態になっているかを実験的に知ろうとした。本実験には衝撃音として starting pistol を使用したが、図14に示すごとく蝸牛ラセン器に非常に高度の機械的破壊がみられた。すなわち内外有毛細胞のみでなく、ダイテルス細胞、支柱細胞、神経線維などが破壊さればらばらに基底板上に存在していた。この障害の程度は個体差あるいは発火回数により異なったが、下部回転が上部回転よりも障害の程度が大であるという傾向のほかに、同一回転でも島状に局限したラセン器の障害がみられた(図15)。障害の軽度の部位では外有毛細胞の変性が主であり、その変性様式は前記純音強大音曝露の際のそれに類似していた。また離断された内有毛細胞感覚毛が蓋膜に接着しているのも観察された(図16)。曝露終了後日数を

図15 starting pistol 曝露モルモット第2回転ラセン器、この例では島状に外有毛細胞が消失している(矢印)。

図16 starting pistol 曝露翌日のマウス第2回転ラセン器、内有毛細胞聴毛が断裂し蓋膜に附着している(矢印)。

図17 starting pistol 曝露3週間後マウス基底回転ラセン器、外有毛細胞は完全に消失し、支持細胞におき代っている。IH: 内有毛細胞。

経過した例ではラセン器は完全に消失し、基底板上に一層の細胞層がみられるにすぎず(図17)、この際は骨ラセン板内神経線維も変性、一部消失していた。

(4) アミノ配糖体薬物(DKB)と強大音同時曝露例

前記方法(4)における曝露条件は各単独負荷では内耳障害を惹起しない量であるが¹⁾、併用曝露を行なった場合、高度のラセン器変性が観られた。その障害はDKBによる障害と音響外傷によるそれと混合した高度の変性を示した(図18)。すなわち第2回転下部を中心として広範囲の内外有毛細胞、神経成分の変性破壊とともに支持細胞の膨化、破壊された細胞破片のコルチリンパ腔、あるいは蓋膜下腔への浮遊などが観察された(図19)。以上の変化は個体差が少ないのも特徴的所見であった。

図18 DKB 200 mg/kg 5日間投与後 4,000 Hz, 115 dB SPL 15時間曝露直後モルモット第2回転ラセン器、各単独曝露にはみられない高度の変性がみられる。

図19 前図と同条件ラセン器。外有毛細胞の変性消失，ダイテルス細胞の膨化がみられる。
IH: 内有毛細胞

(5) 強高音曝露と脳波聴性誘発反応

正常モルモットでは音に対する脳波上の誘発反応は陽性と陰性の頂をもった2相性の波形を示す。

純音曝露においては 2,000 Hz, 4,000 Hz, 115 dB SPL 10 分間, 1.5 時間曝露とも曝露終了直後よりその反応域値の上昇を認め時間の経過とともに正常値に回復するいわゆる NITTS が認められた。図 20 はその1例を示している。

次いで域値上の刺激音に対する反応波形の振幅の増

Sound Exposure 2000Hz 115dB 1.5hrs.

図20 2,000 Hz, 115 dB SPL 1.5時間曝露後モルモット聴力像，一過性の域値上昇が認められる。

減について興味ある所見が得られた。すなわち，いずれの純音曝露条件においても 70 dB, 80 dB の刺激音 (test sound) に対して曝露直後その反応波形の振幅減少後10～数10分後にはその振幅の一時増大が認められた。その後数時間～1日以後にはほぼ正常値に回復していた。図21はその 4,000 Hz, 115 dB SPL 10分間曝露後 500, 1,000, 2,000 Hz, 70 dB の刺激音に対する反応波形の1例を示している。図22は 2,000 Hz, 115 dB SPL 1.5時間曝露後の 2,000 Hz, 70 dB, 80 dB の刺激音に対する反応波形の1例であり，図23はその1例

図 21

の各周波数 70 dB の刺激音に対する波形の振幅値の増減をグラフに示している。

次に衝撃音として starting pistol 1 回曝露を行なった例では、4,000、6,000 Hz、70 dB の音刺激に対する反応波形の 1 例は図24のごとくであり、曝露直後よりその振幅は 0 となり、5 時間後にはやや回復している。1,000、2,000 Hz の音刺激に対しても同じ傾向を示した (図25)。このようにいずれの周波数音刺激においても振幅が著明に減少することは、前記純音強大音曝露と異なる成績であり、この場合はラセン器の高度の破壊に原因しているのであろう。

図 22

図 23

図 24

図 25

考 案

音響性外傷に関する研究の歴史は古く、すでに19世紀の末より今世紀はじめにかけてその端を発し、病理組織学的研究にもとづいた Wittmaack (1907)²⁾ の業績をはじめとし、種々の技術を使用して幾多の研究結果があげられている。しかしこれら多くの先人の貢献にもかかわらず、なお多くの問題点を残している。その原因の一つとして蝸牛が骨組織にとざされた微細な組織であるため、その研究手段が他組織にみられない微細、繊細な方法を工夫されることが要求される。近

年内耳の研究には 1800 年代に使用された surface preparation 技術による光顕的観察が再認識されている。一方走査・透過電子顕微鏡が使用されることにより、その微細な構造の変化まで知り得ようになり、内耳に関する私どもの知識は飛躍的に増大している。私どもは今回これらの方法を主に使用し、音響外傷の際の内耳の病態を観察した。

近年騒音公害あるいは爆発音による内耳障害が問題にされることが多い。騒音ならびにそれに対する人体への影響は図 26 に示すように種々の程度に分類され得る。今回は全身他臓器に対する騒音による影響については触れず、最も関係の深い蝸牛に限って検索した。この図の中で蝸牛に他覚的に変化が生ずるのは temporary および permanent hearing impairment の部である。

図26 (Environmental Health Criteria for Noise. WHO, 1974 より一部引用)。

騒音による受傷性の機会のあったヒト側頭骨大切片標本により内耳を検索した症例ではラセン器感覚細胞の変性消失がその主なる所見であることが報告されている⁸⁾。これらの変性過程を逐次追跡することは稀少なヒト側頭骨症例のみでは不十分であるので、実験的音響外傷成績が有意義となる。

報告者によってやや差があるが、80~90 dB 以下の音曝露では不可逆的变化は内耳に生じないが、90 dB

以上の音曝露では内耳諸組織の物質代謝障害が生じ、その障害はその音の強さならびに曝露時間の増大に比例して増加するとともに、代謝障害のみでなく機械的な障害が加わる。130 dB 以上の音曝露では機械的な障害を主とする変化が短時間においても発生する⁴⁾⁵⁾。今回使用した音曝露は 100~120 dB SPL 音ならびに機械的破壊が主となる衝撃音を使用した。

純音強大音曝露における蝸牛内ラセン器の受傷範囲は曝露音の強さ、持続期間、曝露終了後経過時間によりかなり変動が生ずるが、これらについてはすでに光顕的観察を主とする秀れた業績がある⁶⁾⁷⁾。一方本特集号においても他演者が述べられているので重複は避け、本編ではその微細構造の変化に主眼点をおき考察を試みる。

音響外傷により聴毛は屈曲、水泡様膨隆、次いで融合などの変化が比較的早期に発生することは、感覚細胞体内の変化がより大である場合の多い薬物中毒などによる他種原因による障害に比し、特徴といえる所見である。それについて、あるいは並行して蓋板下部のライソゾームの増大、滑面小体の著明な増大、核膨化などが感覚細胞々体内の変化として観られる。胞体内の変化は本実験条件ではいずれの周波数の純音強大音曝露に対しても外有毛細胞が内有毛細胞に比し大であり、音曝露長期間後外有毛細胞が完全に消失した場合も内有毛細胞々体の遺残が多く観察された。

ラセン器内神経線維および終末は感覚細胞が変性消失した場合も遺残していることが多く、音響外傷にかなり抵抗性が大であった。しかし Spoendlin (1971)⁸⁾ が報告しているごとく遠心神経終末内のシナプス小胞の増大あるいは内有毛細胞への求心神経終末の膨化がみられたが、このような例は少数であった。稀にほぼ正常形態を示す外有毛細胞への求心神経終末の変性消失もみられた。これらの所見より強低音に対して抑制効果の増大、求心神経の疲労変性などが伺い知り得る。

強低音に対しての蝸牛の変化はラセン器に限局することが大部分であり、血管条に対する変化はラセン器に比し微少であり、現在までの音響外傷に対する実験報告の殆んどは血管条に対しては変化は出現しないかあるいはこれに関しては触れられていない。しかし 1974 年 Duvall⁹⁾ らは音響外傷後著明な変化が血管条に惹起されることを報告し、これらは音響曝露終了後に生じ、可逆性であると、興味深い観察をしている。本実験においても長期間の純音強大音曝露において血管条辺縁細胞内に可逆性をもつ変化がみられた。この

所見は、Duvall らの報告のような細胞間隙の著明な増大、毛細血管腔の減少などの大きな変化とは異なるが音響曝露条件の差によると考えられる。しかしいずれにしてもこれらの知見は強高音により内耳液組成の変化も生じていることが推察され得る。

130 dB SPL 以上の音圧が急激に聴器に負荷された場合、蝸牛ラセン器に機械的破壊が高度にみられることが推察され、その光顕的研究報告は古くよりみられる¹⁰⁾¹¹⁾。これを微細構造のレベルにて starting pistol 音を負荷して観察した。この場合高度のラセン器の破壊が観察されたが、特に走査電顕にてラセン器の障害範囲が下部回転に大であるが、同一回転でも感覚細胞の消失部位が島状になり、感覚細胞の存在部と非常に明瞭に境されていることが特徴ある所見であった。この変性部位は衝撃波の振巾の大である部と考えられる。starting pistol 発火回数とラセン器変性度とは必ずしも並行しなかったが、これは衝撃音に対しての鼓膜穿孔程度や、耳小骨の脱臼などが個体によって異なるためといえよう。

ラセン器感覚細胞刺激の機序を知る上にラセン器感覚毛と蓋膜との関係を知ることは重要であり、これに関しては外有毛細胞の感覚毛の最長列が蓋膜に凹みを作って接していることは知られている。一方内有毛細胞との接着については動物によっては一部蓋膜と凹みを作って接している場合があるが、大部分は凹みがなく、その接触状態は標本作成の際の人工産物の影響のため充分に知ることは困難とされている¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾。衝撃音により内有毛細胞の感覚毛がその胞体より離断し、蓋膜にその先端が接着している所見はこの両者は正常ラセン器においてもかなり強く接触していることを意味している。

マウスラセン器は生下時には感覚細胞は未分化であり、コルチリンパ腔は開大していず、その神経支配もなされていない。これらのラセン器は生後約2週間で完成される¹⁶⁾¹⁷⁾。この未分化のラセン器に対して今回の条件の強高音曝露ではその変化は全くみられなかった。これは内耳とともに外耳、中耳伝音機構が未完成であることによるといえる。

同程度の強高音曝露においても個体が異なることによって聴器の受傷性に差が存在することが知られている。聴器の易受傷性条件を実験的に作成する一つの方法として聴器毒性薬物 DKB を使用し、それ単独では内耳障害を惹起しない量の投与とともに、限界強度以下の音響曝露を加えた。この場合非常に高度のラセン

器変性がみられた。アミノ配糖体系薬剤を投与された患者が騒音受傷性が大である臨床例も報告されているが¹⁸⁾、このように易受傷性条件下での強高音曝露は内耳への障害性が倍加することが証明された。この際は個体差が少ないことも特徴である。アミノ配糖体系薬物と作用機序の異なるエタクリン酸との同時負荷においても非常に高度の内耳障害が起るが¹⁹⁾、このように2種以上の聴器障害因子の同時負荷は臨床において極力避けられねばならない。

音響外傷により形態的变化の生ずる以前の機能的变化を量的に知ろうとし、脳波上の聴性誘発反応を指標として検索した所、既知のごとく、NITTS が観察された。一方その波形の振巾は純音強高音負荷後一時低下して後、漸次正常値に戻るという常識的なパターンをとらず、一時著明にその振巾の増大後正常値に回復する現象がみられた。これは強高音負荷による感覚細胞物質代謝の一時的な増量²⁰⁾、補充現象、遠心神経の機能低下、中枢における血流の増大、耳小骨筋の麻痺など種々の原因が考察され得るが、いずれにしても内耳に形態的变化が認め得ない段階でも可逆的な機能的变化が種々生じていることが分る。

聴器とくに内耳に障害をおよぼす主な因子には加齢によるもの、中耳炎の内耳への病変波及、アミノ配糖体系薬物を代表とする聴器毒性薬物中毒などがあげられるが、これらと相まって騒音による内耳障害の占める因子も最近とくに重視されるようになってきているが、この問題をおもに実験室内の研究としてとりあげ、強高音による内耳の病態について論じた。

む す び

騒音外傷の問題を主として実験的研究により検索した。これに関して実験手段は種々あるが、今回は光顕、走査および透過電子顕微鏡による形態的手段ならびに脳波聴性誘発反応を主な手段として使用した。

実験動物にモルモットおよびマウスを使用し、500, 2,000, 4,000 Hz, 110~120 dB SPL の純音強高音 10分~15日間種々の期間連続曝露および衝撃音曝露を行ない、曝露終了直後および2カ月後までの蝸牛を検索し、その病変の初発より高度の変性まで、その広がりかたを詳細に明らかにした。

一方、未成熟蝸牛においては音響外傷の受傷性は少なく、成熟蝸牛においてアミノ配糖体系薬物の同時投薬では受傷性が非常に大であることを証明した。

形態的变化のみられない時期における機能的聴覚変

動を脳波聴性誘発反応にて検索した結果、音響外傷の恢復までにその波形の振巾の一時増大がみられた。

本論文の要旨は第19回日本医学会総会シンポジウム(1975年)、第20回日本オージオロジー学会(1975年)において報告した。

Cochlear Pathology with Experimental Acoustic Trauma

Yoshiaki Nakai, M. D., Akiko Morimoto,
M. D., Kensaku Zushi, M. D., Kaoru
Yamamoto, M. D., and *Takayuki Toki-
moto, Ph. D.

(Department of Otolaryngology, Osaka
City University Medical School *Depart-
ment of Physiology)

Cochlear pathology due to noise exposure were investigated by chiefly experimental approaches. Among a variety of the experimental procedures were predominantly employed optical microscopy and scanning and transmission electron microscopy for morphological examination and evoked response audiometry.

Experimental animals used were guinea-pigs and mice. They were exposed to pure tone of 500, 2,000 and 4,000 Hz with 110-120 dB SPL for various durations from 10 minutes to 15 days consecutively, or to a shock sound. Immediately and in different periods of time within 2 months after the completion of the exposure, the cochlea was examined and the extent of the lesions ranging initial sign to advanced degeneration was minutely clarified.

Besides, it was demonstrated that the immature cochlea is less affected by sound injury while vulnerability of the mature cochlea is much intensified by concomitant medication with aminoglycoside drugs.

Changes in auditory function were studied by evoked response audiometry at the stage in which no morphological change was found, and, as a result, a transient increase in amplitude of the course of recovery from the sound injury.

文 献

- 1) 中井義明, 他: DKB (3', 4'-Dideoxy Kanamycin B) の内耳毒性に関する実験的研究. *Chemotherapy*, 22; 1000-1006, 1974.
- 2) Wittmaack, K.: Über Schädigung des Gehörs durch Schalleinwirkung. *Zeitschr. Ohrenheilk.* usw., 54; 37-80, 1907.
- 3) Igarashi, M., Schuknecht, H. F. and Meyers, E. N.: Cochlear pathology in humans with stimulation deafness. *J. Laryng.*, 74; 115-123, 1964.
- 4) Lim, D. J., and Melnick, W.: Acoustic damage of the cochlea. *Arch. Otolaryng.*, 94; 294-306, 1971.
- 5) Spöndlin, H., and Brun, J. P.: Relation of structural damage to exposure time and intensity in acoustic trauma. *Acta Otolaryng.*, 75; 220-226, 1973.
- 6) Stockwell, C. W., Ades, H. W., and Engström, H.: Patterns of hair cell damage after intense auditory stimulation. *Ann. Otol.*, 78; 1144-1168, 1969.
- 7) 中村四郎: 騒音外傷の基礎的諸問題. 第65回日本耳鼻咽喉科学会宿題報告, 1964.
- 8) Spöndlin, H.: Primary structural changes in the organ of Corti after acoustic overstimulation. *Acta Otolaryng.*, 71; 166-176, 1971.
- 9) Duvall, A. J., Ward, W. D., and Laruhala, K. E.: Stria ultrastructure and vessel transport in acoustic trauma. *Ann. Otol.*, 83; 498-514, 1974.
- 10) 河田政一, 他: 耳鼻咽喉科学, 金原出版 385-389頁, 1966.
- 11) 堀口申作, 秋吉正豊: 爆圧による聴器の病理組織学的研究. *内耳生化*, 1; 12, 1970.
- 12) 星野知之, 児玉 章: 蝸牛内毛細胞感覚毛と蓋膜との接続. *Audiology Japan*, 18; 643-644, 1975.
- 13) Lim, D. A.: Fine morphology of the tectorial membrane. *Arch. Otolaryng.*, 96; 199-215, 1972.
- 14) Ross, M. D.: The tectorial membrane of the rat. *Am. J. Anat.*, 139; 449-482, 1974.
- 15) 中井義明, 藤本明子, 山本 馨: ラセン器の発生における蓋膜. *内耳生化*, 6; 19-21, 1975.
- 16) Nakai, Y., and Hilding, D.: Cochlear development. *Acta Otolaryng.*, 66; 369-385, 1968.

- 17) 中井義明: コルチ氏器および血管条の発生. 耳喉, 43; 11-24, 1971.
18) 志多 享: 音響性聴器障害の発生について. 耳鼻, 19; 441-436, 1973.
19) 中井義明, 藤本明子, 山本 馨: アミノ配糖体系薬物および利尿剤との併用による内耳病態. Audiology

Japan, 18; 290-298, 1975.

- 20) 石田 稔, 中島章雄, 里見真美子: 騒音負荷下におけるモルモット内耳の乳酸脱水素酵素の変化について. 内耳生化, 6; 1-2, 1975.

(受付 51, 2, 2)

日本で最初の合成ペニシリン配合剤 混合感染・重症感染症に!!

VICCILLIN-S **ビクシリンS**

ビクシリンSは、ビクシリン(アンピシリン)とメトシリンS(クロキサシリンナトリウム)を1:1の割合に配合した日本で最初の合成ペニシリン製剤です。

■包装

- 1 錠中 アンピシリン 125mg(力価)
クロキサシリンナトリウム 125mg(力価)
注射用ビクシリンS500 10瓶入
1 瓶中 アンピシリンナトリウム 250mg(力価)
クロキサシリンナトリウム 250mg(力価)

姉妹品

新生児・乳児の細菌感染症に!!

注射用ビクシリンS

〔健保適用〕

明治製薬株式会社

104 東京都中央区京橋 2-8 TEL (272) 6511