Hours of hydrolysis	Cysteine found	Cystine found	Rate of oxidation (%)
2	0.90	0.21	18.6
4	0.86	0.24	22.1
6	0.78	0.33	30.0
8	0.73	0.38	33.8
10	0.67	0.44	39.4
15	0.65	0.47	41.5
25	0.60	0.51	45.5
30	0.56	0.55	49.3
54	0.36	0.75	67.1
82	0.14	0.95	87.8
100	0.00	1.01	100.0

In this case, the oxidation was slow and the cysteine reaction disappeared after about 100 hours of hydrolysis, but when muscle-proteins containing the cysteine group was treated in the same way the oxidation was more rapid, and after 20 hours the cysteine reaction was negative. From these experimental results we see that isolated cysteine is more stable than cysteine in the nascent state which is reactive and is easily oxidizable to cystine in the instant of the cleavage and during the hydrolysis, and that when cysteine was boiled with hydrochloric acid as mentioned above it became cystine quantitatively.

Conclusion.

So far as these experimental results are concerned, we came to the following conclusions:— During prolonged hydrolysis of proteins, cysteine is not produced from cystine but on the contrary cysteine gives rise to cystine. A cysteine group is present in some protein molecules and cysteine found in the hydrolysates. Both cysteine and cystine are the primary products of the complete hydrolysis.

My thanks are due to Mr. Y. Nishijima, my assistant, for his analytical work.

Reference.

- (1) Arnold: *Zeitschr. f. physiol. Chem.*, **70**, 300, 1910—11.
- (2) Heffter: *Jahrber. u. d. F. d. Tierchem.* **37**, 565.
- (3) Mörner: *Zeitschr. f. physiol. Chem.*, **28**, 595, 1899.
- (4) Okuda: *J. Departm. of. Agr. Kyushu Imp. Univ.*, **1**, 163, 1925.

SUR LES PRODUITS DE LA FERMENTATION DU *MONASCUS PURPUREUS* (*CHAMPIGNON DE L'ANG-QUAC*).

Par Yusuke Sumiki.

(Collège de chimie agricole de l'Université de Tokyo).

(Received June 5th, 1926)

Le genre *Monascus* a été classifié en deux espèces, c'est-à-dire *Mon. ruber* et *Mon. mucoroides* par Van Tieghem. (*Bull. de Soc. Bot. de France*,

31,1884.)

F. A. Went a isolé une nouvelle espèce du champignon de l'ang-quac et a donné à cause de sa couleur pourpre le nom *Mon. purpureus*. Il a étudié sa morphologie, son développement et sa nourriture. (*Ann. Soc. Nat. Bot.*, 8, 1, 1895.)

Prinsen Geerlig a fait une étude des propriétés chimiques de matière colorante de l'ang-quac. (*Chem. Ztg.*, 19,1311, 1895.)

Ueda a prouvé l'existence du *Mon. purpureus* dans "Beni-koji" de l'Anchô. (*Tokyo Bot. Mag.*, 1902,)

S. Ikeno (*Ber. Deut. Bot. Ges.*, 11,259,1903.) et H. Kuyper (*Ann. Myco.*, 3,32,1905.) ont étudié sur les divers points le développement de périthèces et la formation de spores.

Récemment S. Hagiwara a étudié les enzymes et la matière colorante de ce champignon. (*Taiwan Kôgyôbu Hôkokusho*, 5,1924.)

EXPERIENCE. I. Les produits de la fermentation.

J'ai cultivé le *Mon. purpureus* à la température de 26—30° pendant 14—50 jours dans l'extrait kojique ou dans une solution nutritive suivante:

Glucose ou sucre de canne.....10g.	KH_2PO_4 0.015g.
Peptone ou KNO_3 0.1—1g.	K_2HPO_4 0.015g.
MgSO_4 0.01g.	CaCl_2 0.010g.
FeCl_3 et NaCl trace.	Eau distillée.....100g.

On distille la solution cultivante de ce champignon à la vapeur d'eau. Après l'évaporation du résidu, on l'acidifie et l'extrait avec l'éther. On obtient l'acide succinique et l'acide lactique de cette solution éthérée (A).

On ajoute l'excès du carbonate de barium dans ce distillatum à la vapeur d'eau et le chauffe dans le ballon fourni d'un réfrigérant descendant, on filtre le contenu du ballon et distillele filtratum à la vapeur d'eau encore une fois. On obtient un distillatum(B) contenant de l'alcool éthylique, de l'aldéhyde acétique et de l'huile de fusel.

Après l'évaporation du résidu de la distillation à la vapeur d'eau, on obtient des sels de barium des acides volatils (C); acides formique et acétique.

Présence de l'alcool éthylique.

Par la répétition des distillations fractionnées du distillatum (B), on obtient une fraction 78°, l'on ajoute l'oxyde de calcium pour échapper de l'eau. On chauffe avec la quantité théorique du isocynate de phenyl au bain-marie dans le tube fermé. On obtient des cristaux longues aiguilles de phenyl uréthane fondant à 50—52°.

0.0924g. Subst. ont donné 7.1cm ³	N_2 (24°, 758m.m.).
Calculé pour $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$	N 8.49%.
Trouvé	N 8.55%.

Présence de l'huile de fusel.

On trouve la présence de l'huile de fusel dans le distillatum (B) par les réactions suivantes:

Réaction de T. Takahashi (Ztschr. f. N. u. G., 27,820,1914.).

Réaction de Komoroski (Chem. Ztg., 27,808,1903.).

Réaction de Udrannszky (Ztschr. f. Phy. Chem., 13,261,1888.).

Présence de l'aldéhyde acétique.

Par la distillation fractionnée du distillatum(B), on obtient une fraction 50—78° qui donne une couleur rouge avec le réactif de Schiff.

Réactions:

couleur rouge avec le réactif de Schiff.

précipité jaune avec le réactif de Nessler (E. Pittarelli, Chem. Zentbl., 4,616, 1920) (jaune par l'aldéhyde; blanche par l'acéton).

réduction de la solution de Fehling.

réduction de nitrate d'argent ammoniacal.

réaction de Jeau.

réaction de Auld et Hantzsch (Ber. Deut. Chem. Ges., 27,514,1888).

réaction de E. Pittarelli (Jour. Pharm. Chem., 23,21,1921).

On ajoute du dimedon dans le distillatum obtenu et obtient des cristaux blancs de l'acétaldomedon fondant à 137—9°. Mélangé avec l'acétaldomedon pur, il fond à la même température.

Présence de l'acide succinique.

Après distillation de l'éther de la solution éthérée(A), on obtient des cristaux prismatiques fondant à 183° par récrystallisation dans l'eau bouillante.

0.1482g. Subst. ont donné 0.2202g. CO₂ et 0.0705g. H₂O.

Calculé pour C₄H₆O₄ C 40.67% H 5.08%.

Trouvé C 40.52% H 5.28%.

Présence de l'acide lactique(racémique).

Par le traitement avec le carbonate de calcium, on obtient des cristaux longues aiguilles de lactate de calcium. Pour analyser il a été desséché à 110°.

0.4193g. Subst. ont donné 0.2675g. CaSO₄.

Calculé pour C₆H₁₀O₆Ca Ca 18.34%

Trouvé Ca 18.62%

Par le traitement avec le carbonate de zinc, on obtient le lactate de zinc cristallisé en rhombique et on le sèche à 110° pour l'analyse.

0.2552g. Subst. ont donné 0.0845g. ZnO.

Calculé pour C₆H₁₀O₆Zn Zn 26.75%.

Trouvé Zn 26.60%.

Rotation optique en solution aqueuse et eau de cristallisation du lactate de zinc:

dissout 0.4823g. Subst. dans 30g. d'eau. L=Idm. (α) = 0.

0.2296g. Subst. ont perdu à 110° 0.0412g. H₂O.

Calculé pour (C₆H₅O₃)₂Zn±3H₂O H₂O 18.18%.....(α)D= 0.

" " " ±2H₂O H₂O 12.89%.....(α)D= ±9°.

Trouvé H₂O 17.90%.

Présence de l'acide formique et de l'acide acétique.

On récrystallise les sels de barium des acides volatils(C) dans l'eau et

sèche à 110°.

0.3765g. Subst.	ont donné 0.3412g. BaSO ₄ .
Calculé pour	(HCOO) ₂ Ba Ba 60.42%.
" "	(CH ₃ COO) ₂ Ba Ba 53.97%.
" "	(C ₂ H ₅ COO) ₂ Ba Ba 48.55%.
Trouvé	Ba 53.42%.

On acidifie les sels de barium et distille. On trouve la présence de l'acide formique dans ce distillatum avec les réactions suivantes:

réduction de la solution du HgCl₂(précipité blanche du HgCl).

réduction de nitrate d'argent ammoniacal(miror d'argent).

On ajoute l'oxyde mercurique jaune dans ce distillatum et chauffe pour décomposer de l'acide formique, on filtre, on évapore doucement.

On récrystallise dans l'eau et sèche dans vide sur de l'acide sulfurique jusqu'à poids constant.

0.6226g. Subst.	ont donné 0.4500g. HgS.
Calculé pour	(CH ₃ COO) ₂ Hg Hg 62.96%.
" "	(C ₂ H ₅ COO) ₂ Hg Hg 52.48%.
Trouvé	Hg 62.43%.

EXPERIENCE. II. Relation entre la nourriture azotée et les produits de la fermentation.

Nourriture azotée.....Les quantités différentes des (NH₄)₂SO₄, KNO₃, peptone et asparagine, chacun en comprenant 0.1, 0.3, 0.5 et 1%, sont dissoutes dans la solution nutritive.

J'ai déterminé de la solution cultivante fermentée:

- 1° L'alcool éthylique(fig. 3), par la méthode du distillation.
- 2° L'acide volatil (fig.5). On distille 50c.c. de la solution cultivante à la vapeur d'eau jusqu'à 200c.c. du distillatum et titre avec l'alcali titré.
- 3° L'acide non volatil(fig.4). On titre la solution cultivante fermentée avec l'alcali titré et diminue de cette acidité déterminée l'acidité de l'acide volatil précédent et l'acidité primitive de la solution nutritive in-fermentée.
- 4° La glucose(fig.1), par la méthode de Bertrand.
- 5° Poids du champignon(fig.2).

EXPERIENCE. 111. Sur la zymase.

Par la méthode de macération de A. Lebedeff(Ann. de Inst. Past., 26,7,1912) J'ai obtenu le résultat positif, mais Je mettrai cette publication à l'autre jour.

CONCLUSION.

- 1° Comme produits de la fermentation avec ce champignon, se produisent en grand partie l'alcool éthylique, puis l'acide succinique, ensuite l'acide lactique et l'acide acétique; en petite quantité l'aldéhyde acétique et l'acide formique.
- 2° Entre les quantités différentes.....0.1—1%.....des matières azotées la quantité la plus favorable pour produire l'alcool éthylique est de 1% de la solution nutritive. Et pour produire les acides, j'ai trouvé que 0.1% de matière azotée est la plus favorable.