珊瑚礁の地形と藻類 *

野 沢 治 治

(鹿児島大学 水産学部)

Algae and topographies of coral reefs

Koji Nozawa

サンゴ礁は藻類学者にとってはすばらしい宝庫である。サンゴ礁からは学者の生き甲斐を感じさせるような珍種・稀種が次々と発見されるのである。多少とも藻類に関心をもつものがサンゴ礁に立つとき、そのすばらしさに目を見張らずには居られない。しかしサンゴ礁に関する研究が次第に進み、サンゴ礁と云う生態系が非常に持異なものであり、その解明の重要性が指摘されているとき、藻類学者もいつまでもこのつきせぬ宝庫のとりことなって新種を求めてばかりいるわけには行かないであろう。サンゴ礁における藻類の存在様式を追求するもっとも手近かなことの一つとして、藻類の分布について検討することができる。

ところが分布を考えるにあたって、サンゴ礁の地形が複雑なために環境の特徴をつかむのに非常に困難を感じる。

そこでは一寸場所が変わっても波や潮流や光などの条件が変わり、それにともなって植生が変化している。しかし一見変化に富み複雑に思われるサンゴ礁の地形も、地形学的に見るとかなり整理されており、我々は先づサンゴ礁についての地形学的な知識の助けを借りなくてはならない。

先づサンゴ礁の地形について概説し、次に我々の調査域である奄美諸島のサンゴ礁について触れてみたい。しかし奄美諸島のサンゴ礁について地形学的な調査を本格的にしたものではなく、今までの経験をもとにしているだけであるので、むしろこれから確かめ、又修正していく積りである。又サンゴ礁地形に関する研究の殆んどは南太平洋及び西インド諸島のもので、このような熱帯のサンゴ礁の知識がそのまま亜熱帯の北限附近のサンゴ礁に適用できるかどうかは問題である。又南太平洋や西インド諸島のサンゴ礁を実見していないための誤りもないとは言えない。更にサンゴ礁に関する多くの用語には定義の不明確なものがあり、人によっては用語の使い方が異なっていてかなりの混乱があるように思われる。以上のことを一応ことわっておきたい。

サンゴ礁の地形

サンゴ礁の型については、環礁 (Atoll)、堡礁 (Barrier reef)、裾礁 (Fringing reef) の3つがよく知られているが、地形学者 Shepard は浅瀬や堆 (bank) 上にある小型の環礁状の faros、外洋の浅海にあたる中心に礁湖 (lagoon) や隆地をもたない台礁 (Table reef、Coral bank)、及び礁湖などの底から隆起するサンゴ塊 (Coral knoll、Patch reef、Pinnacle) を

* 1970年11月 海洋研究所主催「珊瑚礁に関するシンポジウム」における講演に補筆した。

ども特徴的なサンゴ礁地形としてあげている。

環礁はサンゴ礁を代表するもっとも特徴のある地形であるが、細かい点でも色々と特徴があり、Tracey 等はその特徴を模式化した図を示している（第1図）

第1図 環礁の断面図 (Tracey et al, 1955)

- 1, Outer seaward slope. 2, Shallow sublittoral, 3, Seaward reef margin.
- 4, 5, Outer and inner reef flat. 6, Seaward beach. 7, Lagoon beach.
- 8, Lagoon shelf. 9, Lagoon reef margin. 10, Lagoon slope. 11, Lagoon floor.
- 12, Coral knoll. 13, Lagoon slope. 14, Lagoon reef margin. 15, Reef flat.
- 16, Seaward reef margin. 17, Reef slope

図において1は外礁斜面 (Outer seaward slope) で、風上側 (南太平洋では一年中一方向から貿易風が吹いている) の環礁外側のやや深い、傾斜の急な所で、サンゴや藻類の生育は貧弱である。2は礁端 (Reef front) で、十尋棚 (ten fathom terrace) と呼ばれる18 m位の深さにある棚状の部分より浅い部分で、ここは第2図のように斜面に溝 (groove) が多数あり、溝と溝の間を障壁面 (Buttress, spurs) と言っている。

第2図 reef front の模式図

(Munk and Sargent 1948)

す型であり、もう1つは、もっとも普通に見られる型で、沖に隆起があって波はここでさえぎられる。後者には algal ridge がなく、外礁も急深な場合が多いと言う。又礁面は非常に不規則であると言うこの二つの区別は裾礁の発達程度の違いによるのか、他の理由によるのかははっきりしないし、他にこのような分け方をしている例は見られないので、多少疑問もあるが、実際には岸から数十メートル程度の巾の狭い、隆起のないものと、内側に礁湖をもつ隆起した礁面をもつものが見られる。

裾礁と海岸との間の礁面のくぼみは、時には深さ30 cmから1.5 m、時には数メートルの溝となって海岸と平行に伸びていることが多い。この溝は boat channel と呼ばれ、底は砂や礫によって覆われ、sea grass (海草) が生育していることが多い。この boat channel の大きなものは細長い礁湖 (barrier lagoon) と区別することがむずかしいとも言われている。

Goreau はジャマイカの裾礁についてくわしくのべている。第4図はGoreau の図であるが、1

は海岸帯 (shore zone)

で水深は3 m位で、ここにはもっとも耐性の強いサンゴの種類の混合群落がある。

2は水路 (channel) 又

は礁湖帯 (lagoon zone)

第4図 裾礁の断面図 (Goreau, 1959)

で100 m乃至300 mの巾で水深は2乃至15 mあり、底は砂で sea grass が生えていることが多く、サンゴは少ない。3は背面 (rear zone) でサンゴ礁の内側の斜面の2乃至3 mより深い部分にあたり、サンゴの量も種類も増加する。4は礁面で Zoanthus zone とも言われる。この礁面は水面下5.0 m足らずにあり巾は約40 mで、殆んど Acropora palmata の枝で覆われているが、その上に Zoanthus sociatus がある。5は palmata zone で、外洋側のゆるやかな斜面の6 m以浅の部分である。波の力を全面的に受け、大きな樹状の Acropora palmata の殆んど単一種群落からなっている。6は5より深い部分で Acropora palmata が優勢であるが、いくらか他の種類も混生し、死サンゴの堆積も見られる。7は障壁帯 (buttress zone) で、もっとも見事なサンゴの景観を示し、サンゴが群生して外洋に向かって枝を張り出している。優占種は Agricia agricites や板状の Acropora palmata で、Montastrea annularis, Porites, Millepora も壁面に生育している。8は cervicornis zone で巾30 m乃至100 m深さ8乃至15 mの部分になる。Montastrea annularis, Porites の大きな群体を含む Acropora cervicornis の地帯である。9は annularis zone で、Montastrea annularis の大群体が多く Acropora はほんの少しになる。深さは30 mに達する。

これは西インド諸島の裾礁の一例であるが、Newell は Indo-Pacific のサンゴ礁と西インド諸島のものとを比較して、西インド諸島のものは傾斜がゆるやかで、algal ridge がなく、礁面が低く、礁湖の発達が強いなどの特徴をあげている。

以上はサンゴ礁の地形とサンゴの分布から区分を考えているが、サンゴ礁はサンゴ自身が生長し

て地形をつくって行くことを考えると、サンゴの分布と密接な関係があるのは当然であろう。

サンゴ礁の内部には大小の洞穴があり、Tracey はその成立過程について仮説を立てている。

第5図 洞穴や柱状構造形成の
模式図
(Tracey et al, 1948)

それは第5図のようにはじめ独立してサンゴ塊が生長するが、やがて接するようになり上部が融合して礁面を作り、融合しなかった所にタイドプールや洞穴(cavern)が出来ると言うのである。又 Kuenen は surge channel などから流れこむ海水が洞穴を通して吹き上げ、その海水が流れ落ちる所に Lithothamnion が繁茂して、堅固な algal ridge を形成すると考えた(第6図)。

Storr は Abaco 島(バハマ諸島)のサンゴ礁の内部構造について調べ、4つの型に分けている。第1は小型の Table reef の場合で、第7図のように中に広い internal cavern があり人間が充分に立てると言う。

すき間から光が入るのでうす明るく、天井から落下した破片が下に堆積している。このような洞穴は海水に

第6図 Lithothamnion ridge(algal ridge)の模式断面図
(Kuenen, 1960)

よる化学的な
浸食と藻類や
動物による生
物的な浸食に
よると言う。
第2は堡礁な
どの場合で、
第8図のよう
に洞穴は沖側

のものが大きく、煙突状の穴が各所にあり光が射し込む。底は荒い砂で美しい波紋があり、これは波によるのではなく潮流によって出来ると考えられる。第3は沖に近いサンゴ塊に見られるもので、第9図上の図のように basal cavern もないことが多い。

以上のようにサンゴ礁の地形や構造について概括して見たが、生物の環境として非常に変化に富み豊かな動植物の生物相を支える物理的な条件を与えていることが分る。

このような地形とサンゴ以外の生物の分布の関係については Harry がサンゴ礁の地形と魚類の行動分布についてのべている。Wiens は著書の中でサンゴ礁の生態区分をとりまとめているが、やはりサンゴの分布が中心である。藻類の分布に関しては、分類学的研究が非常に多いにもかかわらずきわめて少ない。

第7図 Coral moundの洞穴 (storr, 1964)

第8図 保礁の洞穴 (storr, 1964)

第9図 Coral Knollの洞穴 (storr, 1964)

上：沖側のKnoll 下：岸側のknoll

奄美諸島のサンゴ礁

奄美諸島の代表的なサンゴ礁としては、奄美本島笠利半島太平洋岸の裾礁と、与論島をとり囲むサンゴ礁があげられる。

笠利半島太平洋岸のサンゴ礁は全長25kmに及ぶもので、巾は300乃至900mあり、殆んどの場所に barrier lagoon 又は boat channelと見なされる水路がある。その深さは数十センチから4m位で、深い所にはサンゴ塊 (coral knoll) があり、その上面が干潮面に達するものはつぶれているが、水面下に没しているものはサンゴが生育している。サンゴ礁に近づくにつれてサンゴは多くなり礁面が高い所にはタイドプールが有って、礁面が低い所にはサンゴが群生する。外礁の斜面は外洋性のサンゴが豊かで見事である。礁湖の広い所ではサンゴ礁は堡礁の様相を呈し、又明らかに裾礁である所もあり、変化のあるサンゴ礁である。

サンゴの種類や形態の変化の分布についてはWellsやGoreauの場合と異なる種に置きかわっていると思われるが、指標種を明らかにすることは今後の課題であろう。

与論島のサンゴ礁は島の西側によく発達した堡礁をなすサンゴ礁があり、東側は礁面が低く裾礁も分布する。

例えば島の北端のウカチ附近は比較的サンゴ礁の巾が狭く、その断面は第10図のように1の岸に接した boat channel と2の枝サンゴが堆積する砂底の barrier lagoon と3のサンゴが次第に多くなる斜面、4のサンゴが一面に生育する礁面、5の外礁のサンゴが見事で、又谷が礁壁を切りこんでいる Buttress に相当する部分等に分けられ、5の部分は cavern も発達し魚類がにぎやかである。これはGoreauの図に見られる地形と非常によく似ている。

寺崎附近もウカチとよく似ていて、唯礁湖が広くなり、礁面が高くなっている点異なる。地形だけから見ると堡礁と見なすことが出来るが、生態的には裾礁に属すると思われる(第11図)。

大金久、百合ヶ浜には広大な礁湖があり、サンゴ礁までの距離はもっとも遠い所では1.5kmもある。礁湖の底質は砂でサンゴ塊 (coral knoll) も少ないし、サンゴ塊には洞穴はあまりない。Storrの第4の型であろう。沖に近づくに従ってサンゴ塊は増え、洞穴も大きくなる。内礁側の斜面には内礁性のサンゴがあり藻類も少しづつ見られる。礁面にはタイドプールがあり藻類もあるが、特に豊富とは言えない。最外縁は藻類も豊富になり、外礁はサンゴ、藻類ともに非常に多い。

与論島の東側のサンゴ礁は、礁面が高いことや、礁湖が広いことなどから堡礁と見なされているが、南太平洋などに見られる環礁や堡礁の礁湖は水深が数十メートルあり、与論島のものとはかなり異なるようである。外礁面の地形にしても algal ridge や surge channel と言う名称をそのまま適用してよいかどうかよく検討しなければならないであろう。

サンゴ礁の地形と藻類の分布

サンゴ礁の地形と藻類の分布については、調査がまだ少なく細かい点については不明な点が多いが、与論島の百合ヶ浜の例をあげると第一表のようなものを作ることが出来る。即ち、海岸部にはウミヒルモ、リュウキュウスガモ等の sea grass があり、これ等は海岸のような底質の変動のはげしい所でも根を張って群落を作っている。時にはまわりの砂が浸食されて群落だけが台状に高くなっていることがある。礁湖床 (lagoon floor) の死サンゴにはフデノホ、マガタマモ、キツネノオ、

ウミウチワ、カイメンソウなど、比較的海水の流動の弱い所でも生育できる種がついている。このあたりまでが内礁性の強い環境と思われる。サンゴ塊の上面にはスミカケモ、トゲノリ、イバラノリ等強光にさらされても生育できる種があり、側面にはイワヅタ、マユハキモ、サボテンサ、シワヤハズ、カラゴロモ、ホソバナミノハナなど直射日光には耐えられないが明るい所に生育する種が生えている。内礁斜面には礁湖床の種に少し外洋性のものが加わり、特にホンダワラ類の生物量が大である。礁面上には外洋性で強光に強い種があり、タイドプールの側面には外洋性で中光性の種、洞穴内や over hang の裏面には外洋性で弱光性のものが生育する。外礁面になると波の当る所を好むような種が多くなるが、波の影響が弱くなる水深 4 m 位の所には礁面の種が現われる。このほかに屢々礁湖床や channel や groove の底の砂上に藍藻類がベッドを形成して生えていることがある。

以上きわめて大ざっぱな分け方であるが、藻類の分布に関して、水平的には波の影響や潮流の影響などが分布に関与しており、垂直的には光の強さが関与していると考えられる。

サンゴ礁における食物連鎖における藻類

サンゴ礁に非常に多種の藻類があるということは、藻類の生育場としてサンゴ礁は夫々の種の生育に適した環境を提供しているためであろう。そしてその生物量も決して少なくない。藻類がより高次の栄養段階にどの程度転換しているだろうかと言うことはサンゴ礁の生態系を考える上で重要なことである。その一つとしてサンゴ礁の動物の胃の内容を調べる方法がある。今井・祖一はスズメダイ類の食性について調べ第 2 表のような結果を得ている。即ちスズメダイ類では藻類を食している種類が圧倒的に多いことが分る。

ソウシハギやチョウセンサザエは屢々有毒であるものであるがその毒性が胃の内容に強いことから、胃の内容物が調べられているが、第 3 表及び第 4 表のように、胃内容の殆んどは藻類であり、その中でも藍藻の比率が大きい。前にのべたスズメダイ類の場合にも藍藻が胃の主内容であった例があり、サンゴ礁の食物連鎖における藍藻の役割りについては注目して行かなければならない。

終りに

以上サンゴ礁の生態を考えるに先立って先づ地形について検討することが大切である考え色々なサンゴ礁地形についてのべ、奄美諸島のサンゴ礁についてものべてみたが、まだ不明な点も多く、又従来の類型をそのままあてはめることができない点もあると思われる。今後更に調査を行ないたいが、サンゴ礁において地形的にも生態的にももっとも重要なのは外礁部の buttress や groove、更に Seaward slope であり、従来のような歩いたり、船からのぞくだけでは不十分で、潜水調査の重要性が痛感される。

第10図 与論島ウカチのサンゴ礁断面
(原図)

第11図 与論島寺崎のサンゴ礁断面
(原図)

参 考 文 献

1. Goreau, T. F. (1959). The ecology of Jamaican coral reefs. I. Species composition and zonation. *Ecology*, 40, 69-90.
2. Harry, R. R. (1953). Ichthyological field data of Raroia Atoll, Tuamotu Archipelago. *Atoll Research Bull.* 18.
3. 今井貞彦・祖一誠 (1970) 南西諸島サンゴ礁に生息するスズメダイ類の食性. サンゴ礁に関するシンポジウム講演.
4. Kuenen, H. (1950). *Marine geology*. New York. p431.
5. Munk, W. H. and Sargent, M. C. (1954). Adjustment of Bikini Atoll to ocean waves. *Prof. Pap. U. S. geol. Surv.* 260-C, 275-280.
6. Newell, N. D. (1956). Geological reconnaissance of Raroia Atoll. Tuamotu Archipelago. *Bull. Amer. Mus. nat. Hist.* 109, 317-372.
7. Storr, J. F. (1964). *Ecology and Oceanography of the coral-reef tract, Abaco Island, Bahamas*. New York. 15-24.
8. Tracey, J. I., Cloud, P. E., and Emery, K. O. (1955). Conspicuous features of organic reefs. *Atoll Res. Bull.* 46.
9. Tracey, J. I., Ladd, H. S., and Hoffmeister, J. E. (1948). Reefs of Bikini, Marshall Islands. *Bull. geol. Soc. Amer.* 59, 861-878.
10. Wells, J. W. (1954). Recent corals of the Marshall Islands, Bikini and nearby atolls. *U. S. geol Surv. Pap.* 261-I, 385-486.
11. Wiens, H. J. (1962). *Atoll environment and ecology*. New Heaven, 251-278.

第 1 表 与論島百合ヶ浜の藻類の植生

	Beach	Lagoon floor	Lagoon slope	Reef flat	Reef front
Upper side		<u>Tydemania expeditionis</u> <u>Acanthophora orientalis</u> <u>Hypnea charoides</u>		<u>Cladophoropsis</u> <u>zollingeri</u> <u>Chlorodesmis comosa</u> <u>Dictyosphaeria cavernosa</u> <u>Tydemania</u> <u>cavernosa</u> <u>Microdictyon okamurai</u> <u>Liagora caenomyce</u> <u>Asparagopsis</u> <u>taxiformis</u> <u>Hypnea charoides</u>	<u>Dictyosphaeria</u> <u>cavernosa</u> <u>Microdictyon okamurai</u> <u>Tydemania</u> <u>expeditionis</u> <u>Turbinaria ornata</u> <u>Acanthophora</u> <u>orientalis</u> <u>Hypnea charoides</u>
lateral side		<u>Caulerpa</u> spp. <u>Chlorodesmus comosa</u> <u>Halimeda opuntia</u> <u>Dictyopteris undulata</u> <u>Vanvoorstia coccinea</u> <u>Chondrococcus hornemanni</u>		<u>Cladophora</u> sp. <u>Codium adharens</u> <u>Chondrococcus</u> <u>hornemanni</u> <u>Plocamium telfairiae</u> <u>Peyssonera caulifera</u> <u>Coelarthrum muelleri</u> <u>Acrocystis nana</u>	<u>Chlorodesmis comosa</u> <u>Halimeda opuntia</u> <u>Dictyopteris</u> <u>undulata</u> <u>Padina arborescens</u> <u>Chondrococcus</u> <u>hornemanni</u> <u>Actinotrichia</u> <u>fragilis</u>
Cavern					<u>Udotea javensis</u> <u>Zonaria diesingiana</u> <u>Rhodopeltis</u> <u>borealis</u> <u>Peyssonera caulifera</u> <u>Dasyphila plumarioides</u>
Bottom	<u>Halophila ovalis</u> <u>Thalassia hemprichii</u>	<u>Neomeris annulata</u> <u>Boergesenia forbesii</u> <u>Bornetella ovalis</u> <u>Padina arborescens</u> <u>Ceratodictyon spongiosum</u>	<u>Neomeris annulata</u> <u>Boergesenia forbesii</u> <u>Bornetella ovalis</u> <u>Codium fragile</u> <u>Padina arborescens</u> <u>Sargassum</u> sp.	<u>Pachydictyon coriaceum</u> <u>Padina arborescens</u> <u>Garaxaura fastigiata</u> <u>Actinotrichia fragilis</u> <u>Chondrococcus</u> <u>hornemanni</u> <u>Gelidiella acerosa</u>	<u>Dictyopteris undulata</u> <u>Turbinaria ornata</u> <u>Mastophora rosea</u> <u>Amansia glomerata</u>

AA	Ap	AP	aP	PP
<u>Po. nigricans</u> <u>Ci. labiatus</u> <u>A. dickii</u> <u>A. behenii</u> <u>A. leucozonus</u> <u>A. yamashinai</u> <u>A. notatus</u> <u>Cy. biocellata</u>	<u>Pa. marginatus</u> <u>Po. moluccensis</u> <u>Po. dorsalis</u> <u>Po. flavicauda</u> <u>Po. bankanensis</u> <u>Po. melanopterus</u> <u>Po. lepisogenys</u> <u>A. iwasakii</u> <u>A. lacrymatus</u> <u>A. sordidus</u> <u>A. curacao</u> <u>Cy. assimilis</u> <u>Cy. hollisi</u> <u>Cy. glauca</u> <u>Cy. rex</u>	<u>T. aruanus</u> <u>A. vaigiensis</u> <u>A. sexfasciatus</u> <u>Cy. melas</u>	<u>Co. notatus</u> <u>Co. caeruleus</u> <u>T. trimaculatum</u>	<u>Co. analis</u> <u>S. lepidostethicus</u> <u>A. richardsoni</u>

Po.: Pomacentrus
Ci.: Cheiloprion
A.: Abudefduf
Cy.: Chrysiptera

Pa.: Parapomacentrus
T.: Tetradrachmum
Co.: Chromis
S.: Siphonochromis

AA: はとんど藻類
Ap: 藻類と少量の動物プランクトン
AP: 藻類と動物プランクトンが半々
aP: 動物プランクトンと少量の藻類
PP: はとんど動物プランクトン

第2表 スズメダイ類の食性(胃内容物)による分類

第3表 ソウシバギの胃内容物

Cyanophyta	Rhodophyta
<u>Calothrix</u>	<u>Acrochaetium</u>
<u>Microcoleus</u>	<u>Ceramium</u>
<u>Lyngbia</u>	<u>Herposiphonia</u>
<u>Oscillatoria</u>	<u>Hypoglossum</u>
	<u>Jania</u>
Chlorophyta	<u>Lophosiphonia</u>
<u>Chlorodesmis</u>	<u>Polysiphonia</u>
<u>Cladophora</u>	<u>Griffithsia</u>
<u>Derbesia</u>	<u>Centroceras</u>
<u>Enteromorpha</u>	<u>Melobesioid</u>
<u>Chaetophora</u>	
Phaeophyta	Diatoms
<u>Dictyota</u>	
<u>Ectocarpus</u>	
<u>Sphacelaria</u>	

第4表 チョウセンサザエの胃内容物

Cyanophyta	
<u>Microcoleus lyngbyaceus</u>	11%, 25%
<u>M. vaginatus</u>	17%
<u>Calothrix confervicola</u>	5%
<u>Entophysalis deusta</u>	
<u>Gomphosphaeria aponina</u>	
<u>Schizothrix calcicola</u>	35%
<u>Spirulina subsalsa</u>	
<u>Schizothrix mexicana</u>	
Chlorophyta	
<u>Cladophora sp.</u>	3%
<u>Acetabularia parvata</u>	
<u>Caulerpa anbigua</u>	4%
<u>Enteromorpha sp.</u>	
Phaeophyta	
<u>Pocockiella variegata</u>	7%
<u>Sphacelaria tribuloides</u>	5%
<u>Dictyota sp.</u>	
<u>Turbinaria ornata</u>	
Rhodophyta	
<u>Jania spp.</u>	5%
<u>Pterocladia sp.</u>	
<u>Centroceras clavulatum</u>	2%
<u>Laurencia sp.</u>	3%
<u>Polysiphonia spp.</u>	1%
<u>Ceramium sp.</u>	