1PB009

光依存的に PYP と相互作用する蛋白質

○三原憲一¹、今元泰¹、徳永史生²、片岡幹雄¹(奈良先端大・物質創成¹、大阪大・院理・宇宙地球²)

好塩光合成細菌 *Ectothiorhodospira halophila* に存在する水溶性の光受容蛋白質 Photoactive yellow protein (PYP) は、負の走光性に関与する光レセプターであると考えられている。しかし、PYP の構造や光反応については詳細に調べられているが、その生理的役割に関する研究はあまり進んでおらず、PYP が受容した光シグナルの細胞内伝達経路は全くわかっていない。光活性化状態の PYP と相互作用する蛋白質を発見できれば、シグナル伝達経路の解明への手がかりになるばかりでなく、光によるトリガー及び高分解能立体構造に立脚した解析が可能な蛋白質-蛋白質間相互作用の研究モデルになると我々は考え、*E. halophila* の細胞内成分に対して検索を行った。

まず、PYP をリガンドとしたアフィニティーカラムクロマトグラフィーによる検索を行った。アフィニティーカラム Hi-Trap NHS-activated (Pharmacia) 5mL に PYP 50mg を固定化し、光照射状態 (430nm) でそのカラム (PYP カラム) に *E. halophila* の水溶性分画を添加し、暗状態で溶出する成分 (光により PYP カラムに吸着する成分; 光吸着成分) の有無を調べた。光反応中間体 PYP_M を多く蓄積するため、pH4.1 の溶液条件で行った。全水溶性分画を用いた場合は光吸着成分の溶出ピークが微小であったが、DEAE-Sepharose CL-6B (Pharmacia) により全水溶性分画を細分画し、それぞれ PYP カラムへ添加したところ、200~500mM NaCl で DEAE カラムから溶出する分画において、溶出ピークが明確に検出され、PYP カラムに光吸着する成分が存在することが判明した。また、pH7.4 の場合でも微小ではあるが同様の溶出ピークが観測された。しかし、光吸着成分に含まれる蛋白質は単一ではなく、バックグラウンドとなる蛋白質が多数含まれており、再び PYP カラムに光吸着させても、バックグラウンドを完全に除去することは困難であった。そこで次に二次元ポリアクリルアミドゲル電気泳動を行った。前出の光吸着成分に PYP を混合して泳動サンプルとし、光以外は全く同じ条件で、光照射状態で一次元目の、暗状態で二次元目の電気泳動を行い、銀染色を行った。その結果、一次元目と二次元目では移動度が異なる蛋白質のスポットが1個だけ観測され、PYP と光依存的に相互作用する蛋白質を特定することができた。現在はこの蛋白質の単離を試みている。

K. Mihara, Y. Imamoto, F. Tokunaga, M. Kataoka : A protein interact light-dependently with photoactive yellow protein.

1PB011

Photoactive Yellow Protein 発色団の吸収スペクトル、及び pKa の連続誘電体近似を用いた量子化学的解析

○依田 真樹、北條 博彦、浅川 直紀、井上 義夫、櫻井 実
東工大院 (生命理工)

Photoactive Yellow Protein (PYP) は紅色光合成細菌の細胞質中に存在し、負の走光性を司る光受容タンパク質である。本研究では、PYP 発色団の吸収波長シフト及び pKa シフトの起源となっている発色団-タンパク質相互作用についての知見を得るために、まず発色団周辺のタンパク環境が誘電媒質としての性質を持つと仮定したときに、発色団の吸収波長シフト及び pKa シフトがどの程度説明できるかを明らかにすることを試みた。

当研究室で開発された励起状態まで拡張された溶媒効果理論では、溶媒は静的誘電率 ϵ と光学的誘電率 n^2 (n : 屈折率) で特徴づけられる。誘電媒質との相互作用を評価するために、この理論の組み込まれた INDO/S 分子軌道法プログラムにより、発色団のモデル化合物の吸収波長の溶媒シフトを評価した。また実験では、約20種の非プロトン性溶媒における発色団のモデル化合物の吸収波長の溶媒シフトを測定し、計算の信頼性を確認した。この結果、発色団の吸収波長は光学的誘電率に大きく影響を受けることがわかった。このことは、タンパク質内部においても発色団周囲の電子分極能が吸収波長シフトに寄与していることを示唆している。さらに、我々は発色団周辺の平均的な (ϵ, n) を見積もり、誘電媒質としてタンパク環境の性質を考慮した吸収波長計算を行った。当日は、この結果と共にタンパク環境の誘電応答の効果が発色団の pKa に与える影響についても報告する予定である。

M. Yoda, H. Houjou, N. Asakawa, Y. Inoue, M. Sakurai: Quantum chemical analysis of medium effects on spectral and pKa shift in Photoactive Yellow Protein chromophore.

1PB010

水溶液試料を用いた赤外分光法によるイエロープロテインの光反応の解析

○今元 泰、三原 憲一、片岡 幹雄

(奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科)

紅色光合成細菌 *Ectothiorhodospira halophila* の負の走光性のための光受容蛋白質・Photoactive yellow protein (PYP) は、高次構造が明らかにされていることから、受容体の光吸収から鞭毛回転の制御に至る一連の信号伝達システムを、原子レベルで明らかにできる系であると期待されている。われわれは、その基礎となる PYP の構造や光吸収時の構造変化を、振動分光法や X 線溶液散乱法などを用いて研究してきた。X 線溶液散乱法の結果では、水溶液中で PYP が M 中間体に変化したときには、慣性半径の増大をもたらすような大きな構造変化が起こることが明らかとなっている。しかし、これまでの赤外分光法の結果では、これに対応するようなアミドバンドの大きな変化は観測されていない。赤外分光法では、水分子の赤外域での吸収が大きいことから、蛋白質の乾燥フィルムを用いた測定が行われている。しかし、乾燥フィルム上では蛋白質の自由度が制限されているために、本来の構造変化が抑制されている可能性があると考えられた。そこで今回は、水溶液中での PYP の本来の光反応に対して赤外分光法を応用するため、PYP の水溶液試料を用いた測定を試みた。

高濃度の試料を短い光路長で測定するため、試料として 30mg/mL (100 au/cm, 2mM) の PYP 溶液を調製した。また、10μm マイラ膜のスペーサと2枚のフッ化カルシウム板で試料セルを作成した。フーリエ変換赤外分光光度計を用い、試料の赤外吸収スペクトルを 274K で暗黒と黄色光照射下で測定し、その差スペクトルから PYP と M 中間体の差スペクトルを求めた。この差スペクトルを乾燥フィルム中のものと比較したところ、発色団由来のバンドは両者でほぼ同じであったが、アミドバンド領域では、水溶液中のほうがより大きな吸収変化が観測された。以上のことは、水溶液中と乾燥フィルム中の M 中間体では、発色団まわりの構造はほぼ同じであるが、蛋白質部分の構造変化は水溶液中の方が大きいことを示唆している。今回の水溶液を用いた測定法では、pH や塩等の緩衝液条件を自由に変えることができるので、PYP の水溶液中での本来の構造変化過程をより詳細に明らかにできると期待される。

Y. Imamoto, K. Mihara, M. Kataoka : The photoreaction of photoactive yellow protein studied by infrared spectroscopy using water solution

1PB012

バクテリオロドプシンの光サイクル中間体 M の光化学

○柴崎 千枝、大谷 弘之 (東工大院・生命理工)

序論 *all-trans* レチナールを発色団として持つ蛋白質バクテリオロドプシン (bR) は *all-trans* 体から 13-*cis* 体へ光異性化し、吸収波長の異なる中間体を経て再び bR に戻るサイクルを形成する。今までの研究より M 中間体の減衰は寿命の異なる 3 成分 (Mf, Mm, Ms) から成り、Mf, Ms は通常の一連のサイクル上に存在し Mm は強い光ではじめて駆動するサイクル上に位置することが明らかになった。本研究では吸収分光法を用いてこれらの M 中間体をその光反応生成物の違いから識別することを目的とした。

方法 bR の光サイクル駆動光として 532 nm のパルス光を使用し、M 中間体の励起光として 396 nm のパルス光 (メチルシクロヘキサンによる 355 nm の誘導ラマン) を用いた。光定常状態をつくりだすための定常光および検索光として Xe ランプを用いた。また、M をより多く蓄積させるために塩酸グアニジン (Gdn) を添加し M の寿命を延ばした。

結果・考察 定常光照射して蓄積させた M 中間体を励起した結果、bR とよく似た吸収極大を持つ長波長吸収種 (Y) を生成し、多成分の減衰時定数で再び M に緩和することがわかった。さらに定常光を切り Mm, Ms の残存している任意の時刻に 396 nm の光を照射した。その結果 Y の減衰は 2 成分 (Ym, Ys) から成り、2 つの M の残存量変化と 2 つの Y の生成量変化の比較より、Mm, Ms の光生成物はそれぞれ Ym, Ys であることがわかった。以上のことより、3 つの M 中間体のうち Mm, Ms は光反応生成物の寿命の違いから区別できることが明らかになった。

<Fig.2> Gdn 添加紫膜懸濁液における Y の生成と減衰

C. Shibasaki, H. Ohtani : Photochemistry of M intermediates formed in the photocycle of bacteriorhodopsin.