3G1015

金属イオン結合ループを導入したミオグロビンの設計とその機能

○西山 敦子、伊原 正喜、高橋 聡、石森 浩一郎、森島 績（京大・院工・分子工）

既存の蛋白質を基に新機能を持つ人工蛋白質を設計する場合、野生型蛋白質に数個のアミノ酸の置換や相同性の高い部分間の置換を施す手法は、野生型の構造や機能を改変しても新機能の付与までには至らない場合が多い。本研究では、アミノ酸の欠失・挿入に比較的寛容であると考えられている蛋白質中のループ構造に注目し、そこへ他の蛋白質の構造単位を導入することによって、既存の蛋白質に新機能を付与することを試みた。今回、酸素結合ヘム蛋白質であるミオグロビン（Mb）のヘム近傍のCDコーナ部分に、Mbとは全く相同性のないCa²⁺結合蛋白質であるトロポニンCのCa²⁺結合ループを導入した。ヘム近傍に金属イオン結合部位が導入できれば、金属イオンの添加による酸素親和性の制御が期待できる。この変異Mbは、ループの挿入により、アミノ酸7残基の挿入と9残基の置換が施されたにも関わらず、大腸菌内で、安定にヘムを含んだ状態で発現した。変異MbへのCa²⁺の結合を確認するため、Ca²⁺添加によるNMRスペクトルの変化を追跡したところ、変異Mbにおいてのみ、ヘムの環電流効果を受けるVal68のシグナルがシフトし、Ca²⁺のループ部位への結合が示唆された。しかし、この変化は約100倍当量のCa²⁺を加えて初めて観測されたことから、ループへの特異的な結合であることを確認するため、Ca²⁺と同様にループに結合し、その結合により特徴的な常磁性NMRシグナルを与えるYb³⁺を加え、そのNMRを測定した。その結果、Yb³⁺のループへの結合に伴う鋭い常磁性シグナルと共に、Val68のシグナルのシフトが観測された。つまり、Ca²⁺もYb³⁺同様、ループに結合することで、ヘム近傍構造を変化させたものと考えられる。今後はこのようなヘム近傍構造の変化による酸素親和性の制御の可能性を検討していく予定である。

A.Nishiyama, M.Ihara, S.Takahashi, K.Ishimori and I.Morishima : Design of a New Myoglobin by Introducing a Metal Binding Loop

3G1045

異種蛋白質間モジュール置換による新規人工蛋白質の作成に関する研究

○伊原 正喜、高橋 聡、石森 浩一郎、森島 績（京大・院工・分子工学）

我々は以前より、蛋白質中の十数残基のアミノ酸からなるモジュールと呼ばれるコンパクトな構造単位に注目した蛋白質の機能変換を検討してきた。これまでに、相同性の高いグロビン蛋白質間でモジュール置換を行い、会合特異性の変換などに成功してきたが、相同性の高い蛋白質間だけでなく、様々な蛋白質間でモジュール置換が可能となれば、蛋白質により自由に新しい機能を付与できるようになると考えられる。このような異種蛋白質間モジュール置換法は、部位特異的なアミノ酸置換やランダム変異の導入によって目的機能を少しずつ進化させる方法では困難な大きな機能変換を可能とする点で、画期的な手法である。今回我々は、異種蛋白質間モジュール置換として、酸素結合蛋白質であるグロビン蛋白質や電子伝達蛋白質であるシトクロムb₅という2種のヘム蛋白質のヘム結合モジュール（HBM）に注目した。これまでの我々の研究から、これらのHBMはヘムの取り込みやヘムの電子状態の制御という機能を担っていることが示唆されている。そこで、ヘモグロビンα鎖のHBMをシトクロムb₅に、またシトクロムb₅のHBMをミオグロビンに導入した2つのキメラ蛋白質を作成し、HBMが異種蛋白質内においてそのヘム結合能を保持できるかについて検討した。2つのキメラ蛋白質のヘム滴定実験はいずれも、ヘムと蛋白質が1：1の複合体を形成することを示し、HBMは異種蛋白質内であっても、特異的なヘム結合サイトを形成することが示唆された。しかし、CD、NMRスペクトルから、HBMの導入は蛋白質構造に大きな不安定化を引き起すことも明かとなり、このような構造の不安定化は異種間モジュール置換において、大きな問題となると予想される。現在我々はランダム変異法により、この不安定化を解消しようと試みており、本学会ではその経過もあわせて発表する予定である。

M. Ihara, S. Takahashi, K. Ishimori and I. Morishima : Studies for the design of artificial proteins by the module substitution between heterogenous proteins

3G1030

AFMによるボルフィリンとオリゴペプチドの相互作用の測定

○伊藤 美由紀¹、武田 晴治¹、中村 史¹、関澤 和子²、杉本 直己³、三宅 淳¹（¹工技院・融合研、²日大理工、³甲南大理）

我々の研究グループでは、オリゴペプチドを結合子として用いた低分子物質検出システムの構築を目的とし研究を行っている。我々は単分子ペプチドのαヘリックス伸展破壊にかかる力学的エネルギーを原子間力顕微鏡（AFM）を用いて測定することに成功しており¹⁾、AFMを用いることでより高感度の検出が可能であると考えた。本研究では、AFMを用いてボルフィリンとボルフィリン認識ペプチドの相互作用の力を測定することを目的とした。AFMにはNanoScope IIIa（Digital Instruments 社）を使用し、液中セルを用いて測定を行った。探針（Si₃N₄ 製）およびマイカ基板に金を蒸着し、ペプチドの自己集合単分子膜（SAM膜）を作製することによって認識ペプチドを固定化した。測定はPBS緩衝液中にて行った。ボルフィリンは2分子以上の認識ペプチドによって挟み込み形で相互作用すると考えられている。探針移動距離に対し、探針にかかる力の変化をプロットしたフォースカーブを測定することにより、ペプチドによるボルフィリン挟み込み構造の相互作用の力を求めた。ボルフィリン溶液濃度は0～1 μg/mlに調製し、コンタクトモードを用いて測定した。それぞれの濃度におけるフォースカーブから、ボルフィリンと認識ペプチドの相互作用エネルギーのボルフィリン濃度依存性の検討を行った。

1)Mark A.Lanz *et al.* Chem.Phys.Lett.315(1999)61-68

M.Itoh,S.Takeda,T.Nakamura,K.Sekizawa,N.sugimoto,J.Miyake : Measurement of interaction between porphyrin and oligopeptide by AFM

3G1100

種間ハイブリッドシトクロムcの立体構造安定性

○山本 栄治、柴山 修哉、西郷 敏（自治医大・物理）

真核生物のシトクロムc（Cytc）は、大幅にアミノ酸配列が変化している場合でも、立体構造はよく似ている。例えば、ウマとパン酵母のCytcでは、46箇所配列が異なっているが、X線結晶構造の主鎖原子の位置は、ターン構造や末端部分で約0.1nm、その他の部分で0.04nm程度しかずれていない。これらのずれは実験誤差を含んでいるが、微妙なずれは実際にあると思われる。分子進化の過程で起こるアミノ酸置換により、原子単位、残基単位、セグメント単位などの種々の階層で、構造変化がおり得るが、これらがどの程度、タンパク質自体の構造の柔らかさに吸収され、あるいはその後に起こるアミノ酸置換により解消されるかは、分子進化と立体構造・機能の関係を考えるうえで注目すべき問題である。

ウマCytcの天然体を臭化シアン切断して得た1-65断片とペプチド合成した66-104断片をインキュベートすることにより得た半合成ウマCytcは、天然体と等しい立体構造の安定性を持っている（昨年度年会で報告）。今回、臭化シアン切断を10℃、70%トリフルオロ酢酸中で行い、Met65部位での切断効率を上げた。この生成物を高塩濃度条件下のゲル過クロマトグラフィーで分離し、1-65断片を効率よく大量に精製する方法を確立した。これを利用し、ウマとパン酵母の種間ハイブリッドCytcを調製した。ハイブリッド分子でペプチド結合が再生されていることは、SDSゲル電気泳動により確認した。さらに、ハイブリッドCytcとその親分子の性質を分光学的、物理化学的に測定する。具体的には、グアニジン塩酸による変性曲線から立体構造の安定性を、リガンド交換反応の起こりやすさからヘム・クレバス構造の安定性を求める。これらの測定により、種間ハイブリッド分子と親分子の性質の系統的な比較を行い、上述の問題にアプローチする。

E.Yamamoto, N.Shibayama and S.Saigo : Structural stability of interspecies hybrid cytochrome c