S2C3

膜小胞の開閉・閉口現象は理論的に定量化できる

○末崎 幸生（佐賀医大物理）

膜小胞の開閉・閉口現象は理論的に定量化できる末崎幸生（佐賀医大物理）脂質分子は水中に溶かすと、その両親媒性によって自発的に2分子膜を形成する。名古屋大の宝谷らはこの系にタリン（蛋白質）を微量添加して、カップ状に孔の空いたベシクルが生成されたことを観測した。力学的には、膜は曲げ弾性を持っていて、カップになって曲げ弾性エネルギーをリリースしようとし、縁にかかるラインテンションは縁のサイズを小さくしようとし、その釣り合いで縁のサイズが決まる。そのラインテンションが吸着平衡で決まっていると推測される。筆者らはカップの形を平面で球を切り取った割球とみなして、吸着平衡を統計力学によって計算して定性的にその振る舞いを説明した（文献1, 2）。さらに濃度の増加により観測されているカップと共存するシート型のベシクルも解析してその両者が共存することが自由エネルギーから確認できた。さらに局所的な力の釣り合いを満たすように、モンテカルロ法による数値計算も実行した。割球近似は明らかに力学的な釣り合いを満たしていないが、エネルギー値はモンテカルロ法とさほど変わらない。胆汁酸と脂質の系の会合体への拡張についても報告する。参考文献1. Y. Suezaki, H. Ichinose and H. Hotani, A Theory for the shape change of liposomal membranes due to adsorption of protein, Information 4, 127-131, 2001. 2. 末崎幸生、一ノ瀬浩幸、宝谷統一、分子吸着によるマイクロシャボン玉の形態変化、日本物理学会誌 55,(NO.4) 273-276, 2000

Y. Suezaki : Opening-up of spherical lipid vesicle can be theoretically explained

S2C5

膜小胞がもつ万能のトポロジー変換能を見る

○野村 典正、滝口 金吾（名大・院理・生命理学）

生体膜がもっている融合能や分裂能は、様々な細胞内小器官の形成や解体、小器官の間での膜小胞を介した輸送など、細胞活動の中で重要な働きを担っている。本研究は、融合や分裂をはじめとする膜小胞のトポロジー変換機構の解明を目指し、光学顕微鏡で観察可能な大きさを持つ人工膜小胞（リボソーム）を用い、暗視野光学顕微鏡によるリアルタイム観察によって、トポロジー変換現象の可視化を試みている。その結果、両親媒性ペプチドによる膜融合過程の可視化に成功した。また、膜小胞は、融合や分裂に加え、多様なトポロジー変換能を持つことを発見した。例えば、界面活性剤で膜小胞からその構成成分である脂質を徐々に除去すると、内部小胞の直接放出や周期的揺動、膜小胞の表裏反転が起こる。また、ある種の実験条件では、膜小胞が断片化し、これらの断片化した膜が表裏反転して再び閉じる現象などが見られた（下図）。我々の実験系は、膜系に一種類あるいは二種類の脂質からなるリボソームを用い、膜に作用させる分子には、界面活性剤や単一のペプチド、あるいはタンパク質を用いているため、実験結果の解釈やシミュレーションが容易である。

F.Nomura and K.Takiguchi : Membrane vesicles possess amazing capabilities for topological transformation

S2C4

脂質分子を酵素的に変化させて、膜小胞を変形させる

谷口 幸範、大木 和夫、○宮田 英威（東北大・院理・物理）

生物が産生する酵素には、脂質分子を合成・分解するものがある。これらの酵素を膜に作用させることにより、構成分子の形を変え、膜全体の表面積や自発曲率等膜のトポロジーに関する量を変化させよう。細胞をスフィンゴミエリナーゼ (SMase) で処理すると、ATPを枯渇させた状態でも細胞膜の内側に小胞が誘発されるという報告 (Zhaら, J.Cell.Biol(1998)) もあり、膜の外葉におけるスフィンゴミエリンからセラミドへの分子形状の変化がこの小胞形成の一因である可能性が示唆されている。

我々は、酵素により脂質分子を変換させたとき、膜が物理的にどう変化するのかを探るべく、静置水相法で作成したジャイアントリボソームに、SMaseを顕微鏡下で作用させた。最初ぶよぶよだったリボソームはまず球形になり、多重膜の場合には膜が一枚づつ剥がれていき、最後に破裂した。リボソームを利用して酵素による膜トポロジー変換の本質を理解できるかもしれない。

図：SMase処理により、剥離、破裂する二枚膜(bi-lamellar)リボソーム(POPC:EggSM:BODIPY-SM 75:24:1 wt%)。上図は蛍光画像。下グラフは上図の矢印部分の蛍光強度の時間変化。蛍光強度は膜の枚数を反映し、断片化に変化する。

Y.Taniguchi, K.Ohki and H.Miyata : Morphological change of giant liposomes induced by enzymatic degradation of lipid molecules

S2C6

膜小胞の突起形成と周期的揺動を理論的に解明する

○梅田 民樹（神戸商船大）

脂質2分子膜からなる膜小胞は水溶液中で、球形、赤血球型、ピーナツ型、チューブ型など様々な形態をとり、浸透圧など外部条件の変化に伴って互いに形態変換を起こすことが知られている。これらの形態変化は、膜の曲げ弾性と膜面の表裏または小胞内外の溶液の性質の違いを考慮した理論モデルによりうまく説明できることが分かっている。膜小胞は、内部で微細管やアクチン繊維を伸長させたときにも、レモン型から管部の突出にいたる特徴的な形態変化を起こすが、その要因を調べるため、上記の理論モデルを用いて平衡における膜小胞の形を計算した。その結果、タンパク質の重合により生じる力で観察されるような管部の突出が起こりうることを、膜内外の性質の差に起因する自発曲率の効果で、微細管の伸長に伴って生じる管部とアクチン繊維の伸長に伴う管部の形態の違いが説明できることが分かった。

一方、膜小胞の形は、細かく見ると平衡状態の周りで常に熱的にゆらいている。中性脂質からなる膜小胞に非イオン性界面活性剤を加えたとき、膜小胞が周期的に揺動を起こしながら収縮する現象が見られることがあるが、この揺動も熱的な揺動であると考えられる。この仮説を検証するため、計算機を用いてビデオ画像を詳しく解析するとともに上記の理論モデルと統計力学を組み合わせ、膜の熱揺動と膜小胞の体積変化との関係を理論的に調べた。その結果、膜面に開いた穴から水が排出されることで膜小胞の体積が減少し、余剰分の膜が熱的に揺動していると考えられること、界面活性剤の効果により膜の余剰面積が減少すると熱揺動が抑えられることが分かった。逆に膜面に穴が開いたとき膜の熱揺動に伴って生じる力により水が排出されと考えれば、膜小胞の体積減少を定量的に説明することができる。

T. Umeda : Theoretical analysis of shape transformation and cyclic fluctuation of vesicles