2I1515

Photoactive yellow protein のアミノ酸配列の単純化の試み

○白井 久美子、山崎 洋一、上久保 裕生、今元 泰、片岡 幹雄 (奈良先端大・物質)

蛋白質は、固有の高次構造を形成することにより生体内で機能を果たしている。蛋白質の構造と機能とは密接な関係にあるため、機能を理解するためには構造に関する知見が不可欠となる。蛋白質の高次構造形成に関する情報は、アミノ酸配列中に含まれている。しかし、すべてのアミノ酸が等しくその情報を担うわけではない。そこで、我々は、構造形成に関するアミノ酸情報の配列中における分布を、情報を減らした単純化蛋白質を作成することにより解明しようとしている。モデル蛋白質に Photoactive yellow protein (PYP) を用いた。PYP はアミノ酸 125 残基と発色団である p-クマル酸から成る水溶性光受容蛋白質で、正しく折り畳まれると黄色を呈する。配列単純化にあたって、20 種類のアミノ酸を側鎖の性質から疎水性、親水性、酸性、塩基性、芳香族の 5 つに分類し、それぞれのグループにおいて側鎖の小さい残基に置換することにより、構造形成に関する情報を減らした。ただし、6 種類の PYP 様蛋白質のうち 5 種類以上で相同性があり、構造形成・機能発現に重要であると考えられる残基、側鎖が特有の性質を有する Pro と Gly、発色団を結合する Cys は保存した。最も配列を単純化した PYP (sPYP I) は、発現量が少なく呈色もしなかった。そこで単純化を緩和した PYP (sPYP II, sPYP III) を作成した。sPYP II は親水性残基を、sPYP III は疎水性残基を野生型に戻した配列である。共に発現量は、sPYP I より増加したものの、呈色しなかった。それらの紫外可視吸収測定から会合体を形成していることが、また、円偏光二色測定から何らかの構造を形成しているが非天然構造であることが示された。そこで、野生型と sPYP III 間でキメラ蛋白質を作成し、部分的な配列単純化の構造形成に与える効果を検討したので報告する。

K.Shirai, Y.Yamazaki, H.Kamikubo, Y.Imamoto and M.Kataoka : Simplification of amino acid sequences of photoactive yellow protein

2I1600

ラフト様脂質環境における膜活性型 β アミロイド蛋白の形成

垣尾 敦子¹、西本 清一¹、小堤 保則²、○松崎 勝巳² (¹ 京大院・工、² 京大院・生命科学)

【目的】アルツハイマー病発症のキーステップは、可溶性アミロイド β 蛋白 (A β) から神経毒性を持つ A β 凝集体の形成過程であると考えられている。我々は、ガングリオンドクラスターを含む脂質ラフトにおいて二次構造を獲得した A β が形成され、これが凝集核となって凝集体形成が促進されるモデルを提唱している [1, 2]。本研究では、このラフト様膜に結合して二次構造を獲得した A β の特性解析を行った。【実験】N 末端を蛍光色素 diethylaminocoumarin (DAC) でラベルしたヒト A β (1-40) (0.5 μ M) を、ラフト様膜 GM1/コレステロール/スフィンゴミエリン (1/1/1) リポソーム (500 μ M) および BODIPY ラベルホスファチジルコリン (PC) リポソーム (500 μ M) と混合し、DAC-BODIPY 間の蛍光エネルギー移動を利用して、A β の PC 結合性を調べた。また、膜中での A β の自己凝集・線維化能は fluorescein ラベル A β の自己消光およびチオフラビン T アッセイで評価した。A β の二次構造は CD スペクトルで調べた。【結果と考察】A β はラフト様膜に結合したが、PC 膜には結合しなかった。しかし、いったんラフト様脂質膜に結合して β シート構造を獲得した A β は、PC 膜に対し親和性を獲得し、ラフト様膜から PC 膜へ移動した。一方、PC 膜へ移動した A β は自己凝集・線維化能が低下した。これは、A β が PC 膜上で希釈されたためであると考えられる。以上の結果は、ラフト様膜が膜活性型 A β 形成のシャペロンの役割を果たすことおよび凝集核の形成には膜中でのオリゴマー化が必要であることを示唆している。【文献】1) Kakio et al., JBC 276, 24985 (2001). 2) Kakio et al., Biochemistry 41, 7385 (2002).

A. Kakio, S. Nishimoto, Y. Kozutsumi and K. Matsuzaki : Formation of a membrane-active form of amyloid-beta protein in raft-like lipid environments

2I1545

Staphylococcal Nuclease の Ω ループ改変による機能及び構造安定性の評価

○平岡 聡、上久保 裕生、中川 洋、平野 聡、山崎 洋一、今元 泰、片岡 幹雄 (奈良先端大・物質)

アミノ酸 149 残基からなる Staphylococcal Nuclease (SNase) は、Ca²⁺ イオン存在下で核酸を加水分解する蛋白質である。この蛋白質は Glu43-Glu52 からなる特徴的なループ構造 (Ω ループ) を持ち、その Ω ループは分子表面に露出して水溶液中で揺らいでいることが示唆されている。また、この Ω ループは活性部位の 1 つである Glu43 を含むため、機能発現に重要な役割を担っていると考えられている。そこで我々は、SNase の構造形成及び機能発現に対する Ω ループの寄与を明らかにするために、Thr44-Lys49 を欠損させた変異体 Δ 44-49 を作成し、機能及び構造安定性を検証してきた。この結果、 Δ 44-49 の変性中点温度 (T_m) は野生型に比べ約 5℃ 上昇し、 Ω ループ欠損により構造が安定化する結果を得た。一方、基質との結合が確認されたにも関わらず、活性は野生型に比べほとんど持たないことが明らかとなった [1]。

引き続き、我々は構造安定性、機能に対する Ω ループの役割を明らかにするため、 Ω ループの鎖長に注目し、Ala1 から 6 残基をそれぞれ Δ 44-49 の Ω ループ欠損部位に挿入した変異体を作成した。各変異体の熱安定性を測定した結果、 Ω ループの鎖長が長くなるに従い蛋白質全体の安定性の低下がみられた。しかしながら、これらの変異体はすべて活性を失ったままであった。野生型の 44-49 残基の領域には Lys 残基が 3 つ存在していることから、活性には正電荷の存在が必要であると考えた。そこで、 Ω ループの鎖長と安定性・活性の相関を明らかにするために、現在 Δ 44-49 に Lys 残基を挿入した変異体の作成及び測定を試みている。当日は、この結果をふまえ議論する予定である。[1] M. KATAOKA *et al.* Old and New Views of Protein Folding pp205-214, 1999

S.Hiraoka, H.Kamikubo, H.Nakagawa, S.Hirano, Y.Yamazaki, Y.Imamoto and M.Kataoka : Evaluation of function and stability with modification of Ω -loop region in Staphylococcal Nuclease

2I1615

多次元 NMR によるアミロイド線維高次構造の解析

○星野 大¹、加藤 秀典¹、大橋 祐美子¹、萩原 義久^{1,2}、長谷川 一浩³、内木 宏延³、後藤 祐児¹ (¹ 阪大・蛋白質・溶液、² 産総研・人間系特別研究体、³ 福井医大・第二病理)

これまで、蛋白質の天然構造は熱力学的に最も安定な構造であり、生体内に安定に存在する唯一の構造状態であると考えられてきた。しかしながら、近年、いくつかの蛋白質において「アミロイド線維」と呼ばれる線維状構造体が生体内において形成・蓄積する例が報告されている。これらの線維は共通した形状をもつが、その形成ならびに安定化の分子機構は明らかにされていない。我々は、透析アミロイドーシスの原因蛋白質である β 2 ミクログロブリンについて、そのアミロイド線維の高次構造を多次元 NMR を用いて解析することを試みた。

アミロイド線維は多数の分子からなる高分子体であり、そのままだは溶液 NMR による解析は不可能である。我々はアミロイド線維がいくつかの有機溶媒によりもとの単量体分子へと解離する事を見い出した。そこで、アミロイド線維について重水素交換反応を行った後に、有機溶媒中で NMR を測定し、残存するアミド水素の同定を行った。その結果、N, C 両末端を除き、ほぼ全ての残基において交換反応が非常にゆっくりと進行することが明らかとなった。通常、重水素交換反応からの強い保護は、水素結合を形成している残基に限られる。本結果において、このように一様に強い交換からの保護が観測されたことから、アミロイド線維中においては、天然構造において特定の二次構造をもたないループ部位においても、水素結合すなわち β ストランドなどの二次構造が形成されている事が明らかとなった。

今回報告する手法は、これまで解析の困難であった、アミロイド線維のような非結晶性の巨大分子重合体において、重合体内部での蛋白質の水素結合すなわち二次構造の形成を残基分解能で明らかにする手法として蛋白質の種類を問わず適用可能なものである。発表では他のアミロイド線維について適用した例も併せて報告する。

M.Hoshino, H. Katou, Y. Ohhashi, Y. Hagihara, K. Hasegawa, H. Naiki, Y. Goto : Conformation of amyloid fibrils studied by nuclear magnetic resonance