3O1400

ペースメーカ細胞を含む遅延のある側抑制神経回路網の双安定性

○立野 勝巳、石塚 智、林 初男（九工大院・生命体・脳情報）

神経伝達は軸索の太さやシナプス遅延に依存し、その伝達速度は様々である。小規模の神経回路では、神経活動の伝達時間に依存して多安定状態が存在することが知られている。したがって、外部からの刺激により、振動パターンを交互に切替えることが可能である。典型的な例は、フィードバック抑制回路の神経活動である。フィードバック抑制回路を持つ神経細胞は、遅延時間を調整すると、同じパラメタ領域で複数の異なる振動パターンを持つ。どの振動パターンが選択されるかは、初期値に依存する。バースト放電型神経細胞のフィードバック抑制回路でも、双安定状態が調べられている。また、遅延時間によっては、カオス振動を示す。さらに、2個の神経細胞を相互に抑制するように結合した回路でも、多安定な神経活動が報告されている。軟体動物の神経節に限らず、脳内には自発放電する神経細胞が存在する。これらをペースメーカ細胞と呼ぶ。イソアワモチのペースメーカ細胞は、過分極性の直流バイアス電流でバースト放電を示す。したがって、イソアワモチペースメーカ細胞は抑制性シナプス入力により、バースト放電を示すと考えられる。このペースメーカ細胞で側抑制性回路を形成することにより、単離された神経細胞ではみられない放電パターンが期待できる。本研究では、2個のイソアワモチペースメーカ細胞モデルを介在神経細胞モデルを介して互いに抑制する側抑制回路を用いた。抑制性シナプス結合を強くするに従い、ビート放電は準周期振動から周期3、そしてカオス的な振動へ分岐する。しかも、抑制性シナプス結合が強い場合、逆相バースト放電と同相ビート放電の双安定状態が存在する。介在神経細胞への興奮性刺激によって、これらの振動パターンを切替えることが可能である。同相ビート放電は、伝達遅延を長くすると消失するが、その安定性は位相反応曲線を用いて説明できる。

K.Tateno, S.Ishizuka and H.Hayashi : Bistability in a small neural network model with delayed lateral inhibition

3O1430

一次元配列した培養心筋細胞の拍動リズム同期ダイナミクスの解析

○小島 健介、高橋 一憲、服部 明弘、金子 智行、安田 賢二（東大院・総合文化）

【目的】 新生ラットから単離した心筋細胞は自律拍動能を持ち、最初は個々の細胞が固有の周期で拍動している。培養日数が経つにつれ隣接する細胞同士がギャップ結合を形成し、引き込み現象により拍動の同期を起こすが、この集団としての拍動周期と細胞間相互作用については様々な研究がなされている。しかし、従来の研究では集団として同期した細胞各々が最初に持っていた自律拍動周期という記憶が、その後どのように変化するか十分に研究されていない。本研究では、培養後同期化した心筋細胞集団が、このギャップ結合を閉じることで可逆的に各々の固有の拍動周期に戻るのか、あるいは全く異なった拍動を行うのか調べることで、細胞が持つダイナミックな記憶のメカニズムを解明することを目的とした。

【方法】 まず、ギャップ結合の形成を一次元方向にのみ制御することで実験系をシンプルにするため、マイクロ加工技術を用いて、ガラス基板上に作成した一次元配列の矩形マイクロチャンバー内に心筋細胞を一次元に配列させ培養し、これら心筋細胞集団が同期振動するところまで培養を行った。次に、細胞同士のギャップ結合を阻害剤を用いて薬理的に阻害し、孤立化させた細胞がそれぞれどのような固有の拍動リズムを有して拍動しているのか、あるいは過去の履歴を踏まえながら拍動しているのかを調べた。拍動周期は、CCDカメラで取り込んだ画像をコンピューターで解析し、独自に作成した画像処理プログラムを用いて、拍動による細胞のサイズの経時変化から求めた。

【結果・考察】 マイクロ加工技術を用いて作成した一次元配列のチャンバー内で心筋細胞を培養したところ、細胞が長軸方向に結合して同期拍動している状態が観察できた。同期していた心筋細胞を阻害剤で孤立化した後の詳細については本会にて報告する。

K.kojima,K.takahashi,A.hatori,T.kaneko and K.yasuda : Analysis on pulse rhythm dynamics of one-dimensional arrangemented cardiac muscle cells in culture

3O1415

周期的閃光刺激に対する α 波の時空応答の刺激照度依存性

○西藤 聖二、田中 正吾（山口大・工・電気電子工）

脳波の中でも代表的なリズムである α 波(8~13Hz)の発現メカニズムには不明な点が多い。 α 波の基本特性の内、発現メカニズムを考える上で有力なものに、周期的な閃光刺激に対する引き込みがある。我々は前回、低照度刺激(0.1~10lx)の照度上昇時に刺激駆動成分が増大することを報告した。しかし揺らぎの照度依存性など、動特性に関して検討すべき点は多い。今回は、刺激照度を広い範囲内(1~170lx)で増減させたときの α 波の時間・空間的な応答依存性を調べたので報告する。20~24歳の健常者14名を対象として、10Hzの閃光刺激を10段階の照度で30sずつ照射した。図1に示すように、後頭部 α 波の振幅比は刺激照度が低い場合に1(安静時)より小さく、刺激照度の上昇により増加する。一方、揺らぎの激しさを表す位相ジャンプ頻度比

図1 (a)振幅実効値比(刺激時/安静時)の被験者平均と(b)位相ジャンプ頻度比の被験者(14名)平均

は、低照度刺激では安静時より大幅に増加するが、照度上昇時に低下し、最終的に安静時以下のレベルまで落ち込む。空間的にも同様の依存性が見られた。以上より、 α 波は低照度刺激に対して不安定化し、刺激照度の増加に伴って安定化すると考えられる。この結果は、 α 波の非線形振動系の刺激強度依存性を示し、特に低照度刺激に対する不安定化現象は、振動子系を同定する上で示唆的である。

S.Nishifuji and S.Tanaka : Light intensity dependence of spatiotemporal response of alpha wave to flicker stimuli

3O1445

観察者の外部をどう表現するか?: 動的インフォモルフィズムによるモデル構成

○郡司 ベギオー幸夫¹、高橋 達二¹、青野 真士¹ (¹神戸大・理・地球惑星科学、²神戸大・自然科学・情報メディア)

生物をシステムとして構成するとは、記述されたシステムの外部を考慮して、対象を記述することである。それは観察者による世界とシステムの区別に留保を与えることだ。「いかにシステムをうまく定義しても、その定義から漏れる何かが存在する」、という表現のみが、形式化されたシステムにおいて、システムの外部環境に言及する方法となる。したがって外部環境は、形式世界の中でシステム・環境に分節された環境ではなく、形式世界の中のシステム・環境という分節が可能ではあるが、その混同も起こりえるという形式で表される。システム・環境の区別をうまく定義した或る形式=記述とは、その両者の区別によって完全な記述としされるものだから、区別の混同も考慮することが、不完全な記述=留保付きの記述となる。システムの内部と、システムと形式化された環境との間とをうまく区別しながら混同するとき、一般には矛盾が帰結される。したがってシステムとして生物を構成する目的とは、両者を混同しながら矛盾を帰結せず、何らかの動的変化を作り出す数理的定義を与えることとなる。我々はこのようなシステムを、Infomorphismを用いて構築した。1つの系は2集合と二項関係のトリプレットで表現され、2系間の関係は、双対性を満たす関数対(Infomorphism)で表現される。このとき二項関係が系内、関数対が系間となる。Infomorphismが成立するとき、2系間の関係を静的にうまく定義できたと言える。我々はここで、二項関係と関数対が混同されることで、2系の2項関係が共に変化し、かつ新たにできた2系間に新たな関数対が必ず存在する(矛盾に出会わない)変化様式を構成できた。このとき、潜在する外部性がシステムの頑健性に直接関与している点を議論する。

Y-P.Gunji, T.Takahashi and M.Aono : How can one express a universe involving an observer: construction of dynamic infomorphism