B405

Cys374 ラベルによるアクチンフィラメントの機能阻害

○星野 雄樹¹、三浦 洋敬¹、石渡 信一² (¹ 早大院・生命理工、² 早大院・理工・物理)

in vitro 滑り運動系におけるアクチンフィラメントの蛍光顕微鏡観察は、通常アクチンフィラメントに結合する環状ペプチド phalloidin を介しての蛍光ラベルによって行なわれる。しかしアクチンフィラメントの顕微解析において、他のラベル方法としてアクチンの Cys374 を蛍光色素で直接ラベルすることも有用とされている。そこで本研究ではウサギ骨格筋アクチンを用いて、TMR-5MA 蛍光色素を直接アクチンの Cys374 に標識し、そのラベル率を変え、さらにアクチンフィラメントを安定化する無蛍光 phalloidin の加える割合を変えて、ミオシン II (HMM) による滑り運動を計測した。TMR-5MA ラベルはアクチンの重合能を低下させるために、遊離した蛍光 G アクチンの濃度が高くなる。そこで、エバネッセント照明法を用いて観察・記録した。その結果、Cys374 ラベルがアクチンの幾つかの機能を低下させることが見出された。まず、phalloidin 存在下でも TMR-5MA ラベルがアクチンフィラメントの全長を短くする傾向があった。加えて、無蛍光 phalloidin 存在下での滑り速度は、Cys374 に対する TMR-5MA へのラベル率が上がるにつれて、逆 S 字状に大きく低下した。これは、アクチンの機能に協同性が存在することを示唆している。さらに、無蛍光 phalloidin の量を変化させて、滑り速度を測定した。すると、phalloidin の量を増やすにつれて、フィラメントは長くなったが、滑り速度は変化しなかった。すなわち、滑り速度はフィラメントの長さや phalloidin の有無には依存しない。現在、蛍光ラベルアクチンとラベルなしアクチンの間のコポリマー（ランダムあるいはブロック）の性質など、フィラメントの協同性を検出できる実験系での計測を進めている。

Y.Hoshino,H.Miura,S.ishiwata : Functional disorder of actin filaments with labeling of Cys374

B407

ヒト筋肉アクチン発現系の構築

○岩佐 充貞¹、佐野 健一²、前田 佳代¹、前田 雄一郎¹ (¹ 理研播磨・構造生物化学、² 癌研究所・蛋白創製研究部)

アクチンフィラメントの構造変化と機能発現の関係を深く理解するためには、アクチンを組換え蛋白質として大量に得ることが不可欠である。現在までに、粘菌や出芽酵母などを用いたアクチン発現系の報告はあるが、粘菌では粘菌由来のアクチン発現系しか確立されておらず、また出芽酵母では収量が少ないため、いずれの発現系も骨格筋由来アクチンの構造生物学研究には適していない。そこで本研究では、昆虫細胞を用いた系で、骨格筋由来アクチンを大量かつ高効率に得るための発現系の構築を試みている。従来の市販されているベクターを用いた場合では、組換えアクチンの発現はほとんど認められなかったが、アクチン遺伝子の翻訳開始点の上流に、ロブスター・トロポミオシン由来の発現促進因子 (L21) を挿入することにより、組換えアクチンの発現量が飛躍的に向上することを確認した (1)。さらに、組換えアクチンと昆虫細胞由来アクチンを容易に分離するため、アクチンの C 末側にアフィニティータグである (His)x6 を付加した組換えアクチンを発現させ、アフィニティー精製した。この組換えアクチンの N 末側および His73 が正しく翻訳後修飾されているか調べるため、プロテアーゼにより断片化した組換えアクチンを質量分析計により解析した。その結果、N 末側は完全には修飾がなされておらず、アセチル化システインが付加されたままの状態であること、His73 は一部がメチル化されていることが示唆された。また、組換えアクチンの重合および脱重合活性を調べたところ、ある重合条件では組換えアクチンが重合し難い現象が見られた。この原因が、N 末側のアセチル化システインの付加、あるいは C 末側の (His)x6 の付加、もしくはその両者に起因するのかは現時点では不明である。本年度では、この組換えアクチンの機能解析結果について報告する。(1) Sano et al. FEBS Lett., 532, 143-146 (2002)

M. Iwasa, KI. Sano, K. Maeda, Y. Maeda : An establishment of human muscle actin expression system.

B406

蛍光性 ATP アナログによる F-actin のイメージングとその機能解析

○下澤 東吾、石渡 信一（早大院・生命理工）

[目的] 近年、アクトミオシン分子モーター系の運動メカニズムについて、単なるルールと考えられてきた F-Actin(FA) 側の構造変化や、その協同性が注目されている。我々は、FA の構造変化をラベル色素の発光特性変化によりプローブすることを目的として、適切な色素やラベル位置を探索している。今回は、アクチンの分子構造上、大きな構造変化が期待できる ATP 結合部位へのラベルを行った。

[方法] 何種類かの蛍光性 ATP アナログについて検討した結果、赤色領域で発光する BODIPY TR ATP (Bodipy ATP) が適当であることを見出した。G-actin の状態で染色し、ゲルろ過によって余剰色素を除去したのち重合させ FA とした。エバネッセント照明法と ICCD カメラによる観察により、Bodipy ATP で染色した FA 1 本のイメージングに成功した。これまで、e-ATP による同様の研究が一例あるが (文献 1)、励起波長が紫外領域でありイメージングは困難であった。今回用いた蛍光色素は可視領域発光であるため、通常の光学顕微鏡を使ってイメージングできる。

[結果] 非蛍光性の ATP:1mM 存在下での in vitro 滑り運動系の実験により、Bodipy ATP をラベルした FA の滑り運動速度を 25℃ で調べたところ、 $3.56 \pm 0.49 \text{ um/s}$ (n=20) であり、Rhodamine-Phalloidin ラベルの場合 $3.49 \pm 0.51 \text{ um/s}$ (n=20) と違いは無く、ATP 結合部位への蛍光ラベルの導入による影響は見られなかった。今後は、様々な条件下で Bodipy ATP の交換能や、蛍光スペクトル変化を調べることによって、多角的に FA の構造変化を追究したい。

(文献 1) Nakayama, H. and Yamaga, T.:Biophys. Chem. 1998 75:1-6.

T.Shimozawa and S.Ishiwata : Single-molecular imaging and functional analysis of F-actin by labeling with a fluorescent ATP analogue

B408

骨格筋 HMM の溶液中での圧力応答

○桑本 滋生¹、藤澤 哲郎¹、秋山 修志¹、前田 雄一郎¹、岡本 洋² (¹ 理研・播磨・構造生物化学、² 室蘭工大・応用科学)

我々は静水圧により状態平衡をシフトさせ、どのような形態変化を起こすのかについて高圧小角 X 線散乱 (HP-SAXS) を用いて研究している。今回の研究では、ウサギ骨格筋ミオシンからキモトリブシンを用いて調製した HMM を高圧サンプルとして使用した。Geeves らは 200 気圧で S1 モータードメインの構造が変化 (蛍光測定) ことを報告しており (Geeves et al.,2001)、圧力により ATP 結合に伴う構造変化と同様な変化が起こることを考察している。HMM では、モータードメインの構造変化がレバーアームの構造変化として小角散乱により顕著に検出できると期待される。この HMM の圧力応答について SPring-8/BL45XU SAXS において HP-SAXS 測定を行った。その際のカメラ長は 3.6 m、波長 0.9 Å、最小小角分解能 1200 Å、露光時間 1 秒から 10 秒であった。

HMM が経時的に安定で、放射線損傷が起こらない条件を検索し、最適条件下 (40mM MOPS pH7.0, 0.3M KCl, 2.5% glycerol) では常圧 HMM の回転半径は 119 Å、最大長 400 Å となり Trewhella らの中性子散乱の結果と一致した (Trewhella et al.,2003)。このことは X 線溶液散乱においても問題なく測定できることを示す。さらに最適条件下で高圧測定を行った結果、1~2000 気圧では散乱曲線に変化はなく、HMM の構造変化は観察されなかった。このことから Geeves らの報告した 200 気圧での S1 モータードメインの蛍光変化が HMM のレバーアーム運動に反映されないと考えられる。3500 気圧以上になると HMM の会合により散乱曲線が急激に変化した。しかし、2000~3000 気圧の間で、散乱曲線に “ 会合前の微小な変化 ” が存在することが分かった。我々はこの “ 会合前の微小な変化 ” に注目し、今回の発表ではこの散乱曲線の変化に基づいた HMM の構造変化のシミュレーション結果について報告する。

S.Kuwamoto, T.Fujisawa, S.Akiyama, Y.Maeda and Y.Okamoto : Pressure response of heavy meromyosin in solution