1SC04

分節時計 Hes7 の発現振動の分子機構

○影山 龍一郎 (京大ウイルス研)

体節形成はマウスでは2時間毎に起こることから、2時間を刻む生物時計(分節時計)の存在が示唆されていた。我々は、抑制性bHLH型転写因子Hes7の発現が2時間周期でオシレーションすること、このオシレーションはネガティブ・フィードバックにより起こること、Hes7を欠損すると体節が癒合することを示してきた。このことは、Hes7が分節時計の本体であることを強く示唆した。もし、Hes7が分節時計の本体であるならばその蛋白の不安定性が必須である。Hes7蛋白の半減期は約20分であるが、30分になるとHes7の発現オシレーションがなくなることがシミュレーション・モデルから予想された。本研究ではこの予想について検証を行った。Hes7蛋白の安定性を変えるためにアミノ酸置換を行ったところ、14番目のLysをArgに置換したもの(K14R)が転写抑制能は野生型と同じだが、半減期は30分であった。次に、野生型Hes7の代わりにK14Rを発現するマウスを作製した。このマウスでは、初めはHes7の発現はオシレーションし、最初の3~4体節は正常に分節した。しかし、それ以降Hes7の発現オシレーションは起こらなくなり、体節も癒合した。以上の結果は分節時計が働き続けるにはHes7蛋白の不安定性が必須であることを示し、シミュレーション・モデルで予想されたことが検証された。

R. Kageyama : Molecular mechanism of oscillatory expression of the somite segmentation clock

1SC06

微小スケールでの時空間構造の特異性

○北畑 裕之 (京大院理)

生物を作りあげている細胞はマイクロメートルという特徴的なスケールを持っている。一方で、酵素反応など生化学反応の実験は、mlから μ l程度の溶液で行うことが多い。 1μ lは一辺が1mmの立方体の体積であり、細胞と比べると非常に大きなスケールである。

化学反応が受けるスケールによる影響は大きく分けて次の二つがあげられる。一つは、表面・体積比の違いによる表面効果が原因となるものである。典型的なスケールを r とすると、体積は r の3乗に比例し、面積は r の2乗に比例する。そのため、表面が化学反応に影響すると考えるとスケールが小さくなるほど表面の影響が大きくなる。

次に考えられるのは揺らぎの効果である。例えば、DNA分子と関係する化学反応においては、分子数の揺らぎが非常に大きくなる。すなわち、一般的に、細胞中で、ある遺伝子はDNA上の単一の部位に限られ、数揺らぎが大きくなるのに対して、試験管内で特定の部位と制御因子との相互作用を調べる実験においては、多数の分子(数千~数万分子)が存在し、数ゆらぎが抑えられる条件が選ばれている。これまでに、DNA一分子が、まわりの化学物質の濃度や温度によって、小さく折畳まれた状態とほどけた状態を私たちの研究グループで見出してきており[1,2]、このことが、揺らぎに対してロバストになる原因ではないかと考えられる。

本発表では、上で述べた二つのスケール効果に着目しつつ、DNAや、クエン酸回路のモデル系として開発されたBelousov-Zhabotinsky反応での実験結果を紹介し、スケールが小さくなった時に化学反応が作り出す時空間構造がどのように影響されるかについて議論する。

[1] K. Yoshikawa, *J. Biol. Phys.*, **28**, 701-712 (2002).

[2] 吉川 研一, 生物物理学とは何か? (曾我部正博・郷信広 編) 272-279 (共立出版, 2003) .

H. Kitahata : Spatio-temporal structure in micrometer-scale systems

1SC05

DNA Chips Experiments for Gene Expression Profiles and Molecular Diagnostics

○Avraham Halperin¹, Arnaud Buhot¹, Ekaterina B. Zhulina²
(¹UMR 5819 (UJF, CNRS, CEA) DRFMC/SI3M, CEA Grenoble,
²Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences)

DNA chips are a tool of choice for massive monitoring of gene expression profiles and molecular diagnostics. We discuss the quantification of such experiments under attainable conditions of thermodynamic equilibrium focusing on the role of hybridization isotherms, their modification by electrostatic interactions and the role of competitive hybridization at the surface and in the bulk. Competitive surface hybridization occurs when different targets can hybridize with the same probe. Competitive bulk hybridization takes place when the targets can hybridize with free complementary chains in the solution. The hybridization isotherms relate the equilibrium degree of the hybridization to the bulk composition. They emerge as Langmuir isotherms modified for electrostatic interactions within the probe layer. The effects considered are especially important for screening for somatic point mutations.

A. Halperin, A. Buhot and E. B. Zhulina : Quantification of DNA Chips Experiments for Gene Expression Profiles and Molecular Diagnostics

1SC07

おわりに

○吉川 研一¹、太田 隆夫² (¹京大院理、²京大基物研)

分子生物物理学の発展に伴い生体内で反応を繰り返す様々な分子の性質は明らかにされてきているが、それらが多数組み合ったシステムにおける動的状態(生物の時空間構造)が如何にして生み出されているのかは明らかではない。一方で、よりマクロな視点から、時空間パターン形成等、生命現象を再現するような数理モデルを構築する研究も盛んであるが、ミクロな分子論は、十分には考慮されていないのが現状である。そこで今回は、生物を相手にした実験に直接携わっている方から、理論研究者まで一同に会してそれぞれの思想を語ってもらいたい。本シンポジウムからこれらの立場をつなぐ新しい視点が生み出されれば幸いである。

K. Yoshikawa and T. Ohta : Summary