1P005

固体 NMR による κ -オピオイド受容体 ECL-II とダイノルフィンとの相互作用解析○宮森 丈敬¹、西村 勝之¹、吉良 敦史²、内藤 晶¹ (¹横国大院・工、²(株) アルバック)

κ -受容体は、内因性オピオイドペプチドのダイノルフィンと特異的に結合し、モルヒネ様の鎮痛作用を示す 7 回膜貫通型 G タンパク共役型受容体である。現在、 κ -受容体の大量発現系が確立されていない事から、受容体とリガンドの特異的相互作用の詳細を解明するに到っていない。本研究では、 κ -受容体リガンド結合部位とされる細胞外の第 2 ループ部位 (196-228)(ECL-II) の膜結合構造、及びダイノルフィンとの結合構造の解明を目的とした。ECL-II(1-33) とダイノルフィンは固相法により化学合成し、HPLC で精製後、ECL-II を脂質二重膜バイセル (DMPC:DHPC=3:1) と多重膜リボソームに再構成した。Gly³、Val⁶、Ala¹⁵ について ¹³C 標識を行った ECL-II をバイセルに再構成し、ダイノルフィン添加前後で ¹³C DD-MAS NMR 測定を行った。この結果、添加前後において Gly³、Val⁶ で明確な変化はないが、Ala¹⁵ において ECL-II 濃度上昇に伴う化学シフト値の高磁場シフトが観測された。これより、ECL-II はループ部位の Ala¹⁵ 近傍でダイノルフィンと結合し、より典型的な α -helix へ構造変化を起こす事が分かった。QCM 測定では、DMPC 二重膜と ECL-II に対するダイノルフィンの結合定数を求め、その親和性を調べた。その結果、結合定数は DMPC で 1.32×10^4 、ECL-II で 7.95×10^5 となり、ダイノルフィンは ECL-II に対して DMPC より約 60 倍強い結合定数を示す事が明らかとなった。当研究室では、すでに膜結合ダイノルフィンの N 端が α -helix 構造をとる事を報告している事から、本研究はダイノルフィンと ECL-II のループ部位の helix が helix-helix 相互作用により特異的に結合する事を示唆する結果となった。

T.Miyamori, K.Nishimura, A.Kira and A.Naito : Analysis of Interaction between Extracellular Loop II of the Kappa Opioid Receptor and Dynorphin by Solid-State NMR.

1P007

安定同位体標識法を用いた (6-4)photolyase の NMR 解析

○加藤 暁¹、上田 卓見^{1,2}、藤堂 剛³、寺沢 宏明¹、嶋田 一夫^{1,4} (¹東大・院薬系、²JBIRC, JBIC、³京大・放生研、⁴BIRC, AIST)

【目的】DNA に紫外線を照射すると、(6-4)photoproduct をはじめとする様々な損傷 DNA が生じる。(6-4)photolyase は分子量 60 kDa の色素蛋白質であり、(6-4)photoproduct と特異的に結合して、光と補酵素 FAD とを利用して、(6-4)photoproduct を元のピリミジン塩基に修復する。本研究では、*Xenopus laevis* 由来 (6-4)photolyase の安定性を向上させ、(6-4)photolyase の基質認識および反応メカニズムを NMR により解明することを目指した。

【結果および考察】(6-4)photolyase は、高濃度では凝集し、沈殿する。一方 (6-4)photolyase の C 末端領域は、核局在化シグナル (NLS) の相同配列を含み、高次構造を形成していないと考えられる。我々はこの C 末端領域が (6-4)photolyase の凝集に寄与していると考え、NLS 相同配列を除去して (6-4)photolyase の安定性を向上させることを試みた。全長、および NLS 相同配列を除いた (6-4)photolyase (以下 δ C) を大腸菌により大量発現させ、SDS-PAGE 上で単一のバンドになるまで精製した。得られた δ C の (6-4)photoproduct 修復活性、および結合活性は、全長 (6-4)photolyase と同等であった。一方、 δ C は全長 (6-4)photolyase に比べ、有意に溶解度が向上していた。両蛋白質の ¹H-¹⁵N HSQC スペクトルを測定した結果、 δ C では、全長 (6-4)photolyase に比べシグナル強度が均一で良好なスペクトルを得ることができた。現在、(6-4)photolyase - (6-4)photoproduct 複合体における、反応部位の NMR シグナルの解析を進めている。

A. Kato, T. Ueda, T. Todo, H. Terasawa and I Shimada : NMR analysis of (6-4)photolyase using stable isotope labeling techniques

1P006

固体 NMR によるグルカゴンの自己集合と脂質二重膜に働く相互作用の解析

○藤田 英樹¹、菊地 章恵²、西村 勝之³、内藤 晶³ (¹横浜国大院・工学府、²兵庫県立大学院・理、³横浜国大院・工学研究院)

グルカゴンは 29 個のアミノ酸残基からなるペプチドホルモンであり、膵臓のランゲルハンス島から分泌され、肝臓でグリコーゲンの分解を促し、血糖値を高める働きをする。本研究では、グルカゴンの細胞中での存在形態、及び活性構造を明らかにする事を目的とし、グルカゴンの自己集合性、脂質二重膜との相互作用、および膜結合状態でのグルカゴンの高次構造を固体 NMR を用いて解析した。脂質二重膜として DMPC を用いグルカゴン:脂質 = 1:30 (モル比) で多重膜小胞を調製した。この試料を用い ³¹P NMR スペクトルを測定した。また、同位体標識した [^{1-¹³C}]Gly4, [^{3-¹³C}]Ala19, [^{1-¹³C}]Leu14, [^{1-¹³C}]Leu26 グルカゴンを合成し、この場合は DMPC:DHPC=1:3 (モル比) で調製した bicelle にグルカゴン:脂質 = 1:400 (モル比) となるようにグルカゴンを再構成した。この試料を用い ¹³C NMR スペクトルを測定した。³¹P NMR 測定の結果、相転移点以下の温度では膜分断を起こす場合と起こさない場合が存在した。起こさない場合では膜と相互作用をする前にグルカゴン同士で線維形成を起こしたことが理由であると考えられ、30mg/ml 濃度のグルカゴン酸性水溶液を調製したところ約数分で線維形成が観測された。¹³C NMR 測定の結果、グルカゴン濃度の低い bicelle 試料では自己集合を起こさないことが判明した。化学シフト二次構造関数から Gly4、Ala19、Leu26 近傍では α ヘリックス構造、Leu14 近傍ではランダムコイル構造を取ることが明らかになった。この結果、ミセルを加えた水溶液中でのグルカゴンの二次構造と比較して脂質二重膜に結合した状態のグルカゴンにおいては、より N 末端まで α ヘリックス構造をとることが判明した。

H.Fujita, A.Kikuchi, K.Nishimura, and A.Naito : Analysis of self assembly of glucagon and interaction with lipid bilayers by solid state NMR

1P008

フラグメントが形成するアミロイド線維の構造解析

○岩田 健太郎¹、藤原 敏道¹、松木 陽^{1,2}、阿久津 秀雄¹、内木 宏延^{2,3,4}、後藤 裕児^{1,2,4} (¹阪大・蛋白研、²JST、³福井大・医、⁴CREST)

【目的】近年話題となっているプリオン病やアルツハイマー病に代表されるアミロイドーシスでは「アミロイド線維」と呼ばれる線維状の凝集体が生体内で形成・蓄積する。これらのアミロイド線維は多くの異なる種の蛋白質について共通した形状を持っているが、不溶性で結晶化できないといった特徴からその分子構造の解明は容易でない。そのため現在のところその形成・安定化の分子機構などは明らかにされていない。本研究ではアミロイド線維のモデルとして、透析アミロイドーシスの原因蛋白質である β 2 ミクログロブリン (β 2 M) を限定分解して得られる Ser20-Lys41 (K3) フラグメントのアミロイド線維を用いて、その立体構造を詳細に解析することを目的とした。

【結果と考察】大腸菌を宿主とした大量発現系を用いて β 2 M を発現させ、限定分解した後、逆相 HPLC で K3 フラグメントを精製した。線維を形成させて原子間力顕微鏡で線維の形状や太さなど調べ、CD スペクトルから β シート構造をとっているのを確認した。また遠心回収したものを乾燥させ X 線回折実験を行い、 β ストランド間の距離および β シート間の距離情報を得た。そして ¹³C ¹⁵N でラベルしたアミロイド線維を調製し、固体 NMR を用いてアミノ酸残基レベルの解析を行った。今回の実験から、K3 のアミロイド線維はクロス β シート構造の細長い線維であることが示唆された。また各モノマー分子は、ターンを挟んだ β ストランドを形成していることが示唆された。これらの結果から、アミロイド線維の構造形成の核となる部分は 1 つではなく、複数の部分が関与していることが推定される。

K.Iwata, T.Fujiwara, Y.Matsuki, H.Naiki and Y.Goto : Structural Analysis of Amyloid Fibril of Fragment