3P273

CoLBA: 相互作用比較を考慮したリガンド結合予測法の開発

○広川 貴次¹、秋山 泰² (¹産総研・生命情報・分子設計、²産総研・生命情報・大規模計算)

新薬開発の標的となる受容体タンパク質の立体構造・相互作用情報に基づいて医薬品設計を行う Structure-Based Drug Design (以下 SBDD) が構造ゲノミクスの進展により改めて注目されてきている。計算機的手法による従来の SBDD では、厳密な立体構造情報が必要な上に、効果的な構造探索や相互作用エネルギー値の精度が求められている。一方で、標的タンパク質として重要なファミリーの一つである GPCR などは、結晶構造が皆無に近いという現状があり、理論モデルによる構造の精度でどれほど信頼性のある SBDD が可能であるか課題が残っている。このような背景の中、私たちは、ドッキング計算後のエネルギー評価値と立体構造の不正確さを考慮したリガンド結合予測法の開発し、ヒスタミン H1 受容体と阻害剤の結合予測への応用を試みた。

受容体のモデリングでは、7本の膜貫通ヘリックスが安定に存在するために必要なアミノ酸残基と、ヒスタミンを受容するために必要なアミノ酸残基を配列解析からある推定し、その結果を立体構造予測に反映させる方法を用いた。次に受容体構造を構築後、代表的な阻害剤についてドッキング計算と独自のスクリーニング法 (CoLBA 法) により結合状態を予測した。CoLBA 法とは、ドッキング計算によって得られた候補構造を相互作用エネルギーだけで一意に決定せず、複数の阻害剤間の結果を利用して、受容体との原子間接触プロファイルを相互比較しながらコンセンサスのある結合状態を決定するという特徴を持つリガンド結合予測法である。これにより相互作用エネルギーのみに一存しない、柔軟でかつ直感的なスクリーニングが実現できた。今回のヒスタミン受容体およびその阻害剤結合モデルは、福井裕行教授ら (徳島大学薬学部) の実験結果とも一致し、阻害効果のメカニズムを示唆するものであった。

T.Hirokawa and Y.Akiyama : CoLBA: Comparative ligand binding analysis

3P275

SOSUI 精度向上に向けた膜貫通ヘリックス解析とミトコンドリア膜タンパク質解析

○辻 敏之、美宅 成樹 (名大院・工・マテリアル理工)

本研究室で開発された膜タンパク質予測システム SOSUI は高精度での膜タンパク質判別と膜貫通領域予測を行うことが可能であるが、いくつかの弱点があることがわかっている。シグナルペプチドを考慮した予測が行えないこと、ミトコンドリアを代表とする小胞体を経由しないでオルガネラに局在する膜タンパク質の判別精度が低いこと、トポロジー予測ができないことが挙げられる。

本研究では、第1段階として細胞膜に局在する膜タンパク質 (真核生物では小胞体を経由する膜タンパク質) と水溶性タンパク質の判別精度の向上を行った。さらに第2段階としてミトコンドリア膜タンパク質を予測した。これによって全体の精度向上と2番目の弱点克服を目指した。

第1段階では、膜貫通領域における物理的な性質の分布を詳細に解析した。このために膜貫通ヘリックスとこの付近の領域を7つの領域を定義し、立体構造既知膜タンパク質の全膜貫通領域の各領域における疎水性・両親媒性インデックスの平均値を求めた。この結果、膜貫通領域では疎水性・両親媒性ともに、特徴的な非対称な分布を持っていることがわかった。この分布を考慮し重み付けした疎水性・両親媒性にタンパク質の大きさを加えて膜タンパク質判別を行ない、精度向上を達成した。

第2段階では、ミトコンドリア内膜タンパク質予測するために、1) SOSUI signal によるシグナルペプチドを持つタンパク質の除外、2) タンパク質の大きさと予測される膜貫通領域位置の解析、3) N 末端の疎水性と正電荷残基密度の解析を行った。これらの解析結果から、ミトコンドリア内膜タンパク質をある程度予測出来ることがわかった。この2段階の膜タンパク質判別によって SOSUI の判別精度を大きく向上させることができた。さらに膜貫通領域予測精度の向上とトポロジー予測についても検討している。

T.Tsuiji, S.Mitaku : Analysis of transmembrane helices and mitochondrial membrane proteins for improving membrane protein prediction system SOSUI.

3P274

all- α 型および all- β 型タンパク質のアミノ酸配列の物理的性質に注目した周期性解析

○今井 賢一郎、美宅 成樹 (名大・理工・応用物理)

タンパク質の中には、配列の類似性が非常に低いにも関わらずよく似た立体構造を持つというアナログタンパク質が数多く存在する。このような関係にあるタンパク質は、オーファン遺伝子の中にも多く含まれていると考えられる。したがって、アミノ酸配列の物理化学的な特徴を解析することで、二次構造クラスなどの構造情報を得ることができれば、構造情報の絞り込みができ、タンパク質の立体構造予測、アナログタンパク質の予測さらには、オーファン遺伝子のアノテーションに貢献できると考えられる。

そこで、本研究は、アミノ酸配列における物理化学的な特徴を解析し、アミノ酸配列からの構造クラス分類を目的としている。そこで、まず、all- α 型タンパク質と all- β 型タンパク質について、アミノ酸の疎水性と電荷に注目したアミノ酸配列の周期性解析を行い、それぞれの構造クラスの特徴解析を行った。疎水性の周期性解析では、アミノ酸配列における n 番目と $n+j$ 番目の残基の疎水性の相関を、電荷の場合は、同じ性質の電荷同士、負電荷と正電荷、正電荷と負電荷、電荷を持たない残基同士というように組み合わせを考慮し、疎水性の解析と同様に n 番目と $n+j$ 番目の残基の相関を調べた。

その結果、疎水性と電荷の負電荷と正電荷、正電荷と負電荷、電荷を持たない残基同士の組み合わせにおいて、all- α 型と all- β 型のそれぞれの構造クラスに特徴的な周期性をアミノ酸配列上に見出すことができた。そこで、これらの特徴をとらえた式を考案し、all- α 型と all- β 型の分類を試みたところ、ほとんどすべての all- α 型と all- β 型のタンパク質を約 90 % の精度で分類することができた。これを利用して、アナログタンパク質のペアの推定や、他の構造クラスの分類も行いたいと考えている。

K.Imai, S.Mitaku : Analysis of physical properties of all- α and all- β type proteins

3P276

膜貫通ヘリックス配置予測のためのヘリックス末端側鎖の解析

○北井 祐史¹、美宅 成樹² (¹東京農工大・工・生命工、²名大・理工・応用物理)

膜タンパク質は生物にとって本質的な機能であるエネルギー変換、情報伝達などの重要な役割を担っている。しかし、膜タンパク質は水溶性タンパク質にくらべ実験による立体構造の決定が難しい。これに対して、構造予測の面では、膜タンパク質において構造的な共通性が高く、構造を予測しやすいという面もある。これは膜タンパク質が膜内という誘電率の低い環境にあるため、構造形成時に主に極性相互作用が働く相互作用となるためである。

膜タンパク質の構造予測に関しては、アミノ酸配列中の膜貫通ヘリックス (TMH) となる領域の情報から TMH の配置を予測する方法が開発されている。それぞれの TMH に対して極性相互作用領域を付き合わせるように計算するというものである。しかし、この方法ではヘリックスの端を考慮しておらず、方法として一般化できていない。

そこで、ヘリックスの端の効果を調べるために、既に構造のわかっている膜タンパク質の膜貫通ヘリックス領域を抜き出し、そのヘリックスの末端にある両親媒性の側鎖の向きを解析した。その結果、ヘリックス末端には、多くの極性残基が存在していて、脂質側に向いたものとタンパク質の内側を向いているものがあるということが分かった。また、脂質側に向いた側鎖の極性基は、脂質二層膜の極性部の方向に構造を変えていることが分かった。これらのことを考慮して、TMH の配置予測についても検討している。

Y.Kitai, S.Mitaku : Conformation of helix terminal residues at end region of transmembrane helix