理論/実験技術

立体構造比較サーバMATRASの 使い方

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
川端 猛

1. はじめに

あるタンパク質と似ている他のタンパク質を探したいとき、まず最初に試みるべきはアミノ酸配列の相同性検索であろう。しかし、同じファミリーのタンパク質の中でも、アミノ酸配列の一致度が低くなってくると、配列の類似性だけで議論するのには限界が出てくる。そんな場合、立体構造の情報を使うことをお勧めする。立体構造は進化的に保存性が高いため、より遠縁の類似性の発見や正確なアラインメントが可能になる。また、構造から機能部位が端的にわかる場合も多いため、より分子機能を意識した考察を行うこともできる。MATRASは、こうした立体構造比較が必要なと

きに役立つサーバである^{1), 2)} (Fig. 1)。他に類似のサーバとしてDALI³⁾、CE⁴⁾、VAST⁵⁾などがあり、類似性スコア、比較アルゴリズム、WEBインターフェースにそれぞれ特徴がある。

MATRASは、「マルコフ連鎖による構造変化モデルを利用した相同性と相似性の対数オッズ関数」という特殊なスコアを使って相同な構造類似性を認識するように設計されている。もちろん、背景にある理論を一切知らなくてもMATRASサーバは動くわけで、本稿では、WEBサーバの使い方と比較結果の見方を「実験技術」の1つとしてマニュアル風に紹介することにする。方法の詳細を知りたい方はMATRASの原論文^{1), 2)}や筆者の「実験医学」誌の総説の前半⁶⁾を参照していただきたい。また、タンパク質立体構造の類似性一般について関心がある方はSCOP⁷⁾やCATH⁸⁾などの構造分類データベースをチェックしてみることをお勧めする。

アドレス

<http://biunit.naist.jp/matras>

想定されるユーザー

- (1) X線結晶解析やNMRで新規の構造を決定し、既知構造との比較をしたい方
- (2) あるファミリーの進化的な関係を、広く遠縁のタンパク質まで含めて議論したい方
- (3) 系統樹の作成や残基の保存を知るために、できる

Fig. 1. A top page of MATRAS web server.

How to Use MATRAS Server?

Takeshi KAWABATA

Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology

だけ正確なアラインメントが必要な方

- (4) 立体構造とアミノ酸配列の関係, あるいは立体構造と機能との関係に興味がある方

2. おもなサービス

2.1 ペアワイズ3Dアラインメント

これは2つの構造をアラインメントする基本的な機能であり, MATRASサーバの機能はすべてこのペアワイズアラインメントをベースとして組み立てられている. 構造の入力法としては, PDB コードの入力, ユーザーのローカルマシンからの PDB ファイルのアップロードの2通りが選択できる. MATRASはPDBファイルの中の1つの鎖を単位として比較を行うので, PDBコードに加えて, A とか B とかの鎖識別子 (chain identifier) を入力する必要がある. 比較結果は, (1) 類似性の情報, (2) アラインメント, (3) 重ね合わされた構造の3種類の情報が表示される.

Fig. 2 にプラストシアニン (PDBコード: 9pcy) とアズリン (PDBコード: 4azuA 鎖) を比較した例を示す. この2つはどちらも銅を結合する電子伝達タンパク質で, キュブレドキシンというスーパーファミリーに属する. [SIMILARITY] の "Seq 17.0%" という表示は配列の同一残基率が17%であること, "CRMS 4.33 Å" は平均二乗誤差が4.33 Åであることを示す. その下の行の "Rdis" はMATRASのスコアが自分自身を比較したときの値に比べてどのくらい充足しているかを百分率で表した値である. 次の行の "[RELIABILITY] Superfamily 66.5% Fold 93.9%" は, この類似性スコア Rdis をもつ構造のペアが, SCOP の Superfamily あるいは Fold

が同じであると判定される確率である. これは事前に行ったSCOPデータベース内の構造の総当たり計算から見積もっている. "[BEGIN ALIGNMENT]" のあとに残基ごとのアラインメントが2次構造とともに表示されている. この場合, ギャップがかなり多いが, 銅に配位結合する4つの機能残基 (プラストシアニンの His37, Cys84, His87, Met92) に対応するアズリンの残基のアミノ酸種がきちんと保存されていることから, 正しいようなアラインメントであることがわかる. また画面下の "3D VIEW" は重ね合わせ構造を表示するためのリンクであり, 3通りの方法が選べる. "[3D (image)]" は画像による表示である. これはプラグインを必要としないが, 回転等の操作はできない. Chime⁹⁾ という構造を表示するプラグインをインストールしておけば, "[3D (Chime-plugin)]" を選択すると, Fig. 2 のようなボタン付きの表示が可能になる. また, UNIX系のマシンでは, しかるべき設定をすれば "[3D (rasmol)]" から rasmol¹⁰⁾ を外部アプリケーションとして起動して重ね合わせ構造を表示することも可能である.

2.2 マルチプル3Dアラインメント

これは複数の立体構造をアラインメントする機能である. 構造の入力法としては同様にPDBのコードを入力するか, ユーザーのローカルマシンから, PDB ファイルをアップロードすることができる. 計算時間の都合から, 入力できる構造の数は10個に制限してある. Fig. 3 にプラストシアニン (9pcy-), アズリン (4azuA) に加えて, シュードアズリン (8paz-) とアウラシアニン (1qhqa) を加えた計4つの構造のマルチプル3Dアラインメントの例を示す. ペアワイズと同様にアラインメ

Fig. 2. Pages for pairwise 3D alignment.

Fig. 3. Pages for multiple 3D alignment.

Fig. 4. Pages for 3D library search.

ントと重ね合わせ構造が表示される。また、構造類似性や配列類似性を樹形図として表示することもできる。

2.3 3Dライブラリ検索

これは、1つのクエリ構造に対して、構造ライブラリの中の類似構造検索を行うサービスである。立体構造版のBLAST¹¹⁾のようなものだ。このサービスは計算時間の都合から、結果を電子メールで返信する形式をとっている。構造ライブラリとしては最新のPDBの代表セットかSCOPの代表ドメインセットを選択することができる。Fig. 4にアウラシアン (1qhQA) をクエ

リ構造として最新PDBの代表セットを構造ライブラリにした場合の入力WEB画面と、電子メールで送信される結果の一部を示す。発見された類似構造が似ている順にソートされて示されるほか、1構造1行のラフな2次構造アラインメント表示、それぞれのペアワイズアラインメントなどの情報が含まれている。

2.4 アミノ酸配列とPDBの配列相同性検索

MATRASは原則的に立体構造どうしを比較するWEBサーバだが、ユーザーの要望に答えて、配列と立体構造を比較するサービスも行っている。これは、ユーザー

Fig. 5. Pages for sequence search vs PDB.

が入力したアミノ酸配列をクエリとして、最新のPDBの配列データライブラリに対して、BLASTの配列相同性検索をかけるサービスである。ただし、単なるBLASTではなく、簡易な立体構造予測として使えるように、本来のBLASTの出力に構造からの情報を追加している。

Fig. 5に例を示す。まず、クエリにアラインされたライブラリ内のタンパク質の2次構造がバーで表示される。このページでPDBコードをクリックすると、ペアワイズアラインメントが2次構造の情報付きで表示される。上の“[MODELLER]”をクリックすると、ホモロジーモデリングソフトMODELLER¹²⁾用の制御スクリプトファイルがBLASTのアラインメントを元に生成される。ユーザーが既にMODELLERを自分の計算機にインストールしてあれば、これをカットアンドペーストするだけでモデリングの計算を開始することができる。また、“[SeqReplaced 3D]”をクリックすると、予測立体構造のPDBファイルが表示される。これは、テンプレート構造の座標はそのまま、クエリのアミノ酸配列と残基番号に書き直しただけの簡易モデリング構造である。置換された側鎖原子や挿入された残基は一切モデリングされていないので分子シミュレーションには使えないが、アミノ酸の大体の空間配置を知るにはこれで十分であると思う。

3. 最後に

最近、一般公開されている立体構造比較プログラムどうしを評価する論文が、2件発表された^{13), 14)}。どちらにおいても、MATRASは最良とまではいかないまで

も、DALIなどの有名プログラムと十分比肩する性能だとされている。読者の皆さんで立体構造比較に関心のある方はぜひ使っていただき、タンパク質の進化史やその機能の多様性の考察に役立てていただければと思う。

謝 辞

このWEBサーバの開設・維持作業は、文部科学省の科学研究費特定領域研究「ゲノム情報科学」および科学技術振興調整費新興分野人材養成プログラムによって支援を受けた。

文 献

- 1) Kawabata, T. and Nishikawa, K. (2000) *Proteins* **41**, 108-122.
- 2) Kawabata, T. (2003) *Nucl. Acids Res.* **31**, 3367-3369.
- 3) <http://www.ebi.ac.uk/dali/>
- 4) <http://cl.sdsc.edu/ce.html>
- 5) <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/VAST/vast.shtml>
- 6) 川端 猛 (2000) 実験医学 (増刊) **19**, 73-81.
- 7) <http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/>
- 8) <http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath/>
- 9) <http://www.mdlchime.com/products/framework/chime/index.jsp>
- 10) <http://www.openrasmol.org>
- 11) <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/>
- 12) <http://www.salilab.org/modeller/modeller.html>
- 13) Novotny, M., Madsen, D. and Kleywegt, G. J. (2004) *Proteins* **54**, 260-270.
- 14) Sierk, M. L. and Pearson W. R. (2004) *Protein Science* **13**, 773-785.

川端 猛（かわばた たけし）

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科客員助教授

連絡先：〒630-0192 奈良県生駒市高山町 8916-5

E-mail: takawaba@is.naist.jp