脊椎動物における光周性の制御機構

名古屋大学大学院生命農学研究科応用分子生命科学専攻バイオモデリング講座

動物行動統御学研究分野 海老原史樹文, 安尾しのぶ, 吉村 崇

Although photoperiodic response has been an object of study for a long time, little is known about molecular mechanisms underlying this phenomenon. Recently, we have identified the gene (*Dio2*) which regulates photoperiodic response in gonadal growth in birds and possibly in mammals. Prolactin secretion is also regulated by photoperiod. However, the mechanisms of this response are different from those of gonadal response. Here, we overview current knowledge about vertebrate photoperiodic response, providing our recent results on molecular studies.

photoperiodic response / gonadotropin / prolactin / clock gene / Japanese quail / thyroid hormone

1. はじめに

1920年, 米国メリーランド州の農業研究所でガーナーとアラードが画期的な発見をした。彼らは, 花のつく時期が遅れるメリーランド・マンモスというタバコの変種を研究している過程で, 日の長さ(日長)^{*}が開花を左右する重要な因子であることに気がついた。この現象は光周性 (photoperiodism) とよばれ, 日長に対して生物が反応する性質のことをいう。光周性という用語は米国農務省のクックが作り, ガーナーにより引用されて今日広く用いられるようになった。秋の夕暮れに電燈をともして開花を制御する電照菊や, 産卵をコントロールするために養鶏場で用いられている光線管理技術などはこの性質を利用したものである。日長は一年を通して短くなる時期と長くなる時期があるが, 前者に対して反応する生物を短日性, 後者を長日性とよんでいる。

光周性が成立するためには日長の読み取りが必要であるが, 概日時計がそれに利用されている。概日時計はほぼ24時間の周期でリズムを刻む自律振動体で, 生体内のさまざまな生理的リズムの発振源となっている。通常の24時間明暗サイクル下では概日リズムは明暗周期に同調して正確に24時間周期を示す。概日時計がどのようにして日長を読み取るかについては不明であるが, これまでのさまざまな実験から光周性の背景に概日時計があることが明らかになっている。光周性は過酷な季節変動を生き抜くために生物が獲得してきた適

応戦略であり, 広範な生物種, さまざまな生物現象に認められている。特に植物の開花や動物の繁殖などに関連する現象は, 農業に直結することから古くから多くの研究が行われてきた。

最近, 概日時計の分子基盤が明らかになってきたが, その解明と共に光周性の分子機構についての研究も進んできた。本解説では, 脊椎動物の光周性について最近の我々の成果を交えて解説する。

2. 光周性反応

光周性と概日リズムとの関連について最初にその概念を提唱したのはドイツの植物学者のビューニングである^{1), 2)}。ビューニングは, 光周性反応は内因性の概日リズムにその基礎をもつことを植物の実験から明らかにし, 1936年にドイツ植物学会誌に投稿した。光周性を語る際に必ず引き合いに出されるビューニングのモデルはこの時に提唱されたものである。

ビューニングは, 植物にはほぼ24時間で振動する内因性のリズムが存在し, そのリズムは光に対する反応の異なる2つの相できていると考えた (Fig. 1)。この2つの相は, 親明相 (photophil), 親暗相 (scotophil) とよばれ, 12時間で周期的に交代を繰り返す。ここには明期の長さが8時間, 12時間, 16時間の例が示してあるが, 親暗相に光が当たらない8時間と12時間の光条件の場合 (Fig. 1b, 1c) には短日と認識されるが, 親暗相に光が当たる16時間明期の場合 (Fig. 1d) には長日と認識され長日反応が起きる。このモデルでは親暗

Mechanisms of Vertebrate Photoperiodism

Shizufumi EBIHARA, Shinobu YASUO and Takashi YOSHIMURA

Division of Biomodeling, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University

Fig. 1 Bunning's model for photoperiodic time measurement by circadian oscillation. (a) Free-running oscillation in constant darkness. The unshaded and the shaded portion of the curve represent the photophil (P) and the scotophil (S), respectively. (b) No light in the scotophil under short day (LD8:16, 8 hours of light and 16 hours of darkness). (c) No light in the scotophil under equinox days (LD12:12). (d) Light extends into the scotophil under long day (LD16:8). Open and solid bars below each curve represent light and dark period, respectively.

相のどの時刻に光が当たっても長日と認識されるとされていたが、その後、親暗相にも長日の反応が起きる時刻と、そうでない時刻があることがわかってきた(光によって反応が生じる相のことを光誘導相 [photoinducible phase] あるいは光感受相とよぶ)。ビュニングのモデルはその後あまり注目されることはなかったが、1960年にコールドスプリングハーバーで開かれた生物時計に関する歴史的なシンポジウムをきっかけとして注目されるようになった。このシンポジウムはそれまでの生物リズムに関する研究を集大成して開かれたもので、今日の生物リズム研究発展の原点になっている。

このシンポジウムでビュニングのモデルを知った生物リズムの泰斗ピットドリックは、それをもとに外的一致モデルと内的一致モデルという2つのモデルを思いついた (Fig. 2, 生殖腺の発達を例にして説明してある)。外的一致モデルはビュニングのモデルを基礎にしているが、違うのは光には2つの効果があるとした点である。つまり、光には光誘導相に当たった時に反応を誘起する作用と、親暗相と親明相からなる内因性リズムを明暗周期に同調させる働きがあるとしたことである。外的一致とは、概日リズムの特定の位相(光誘導相)に外界の光が当たる(光誘導相と外界の光の当たる時期が一致する)という意味である。一方、内的一致モデルは2つの振動体 (Fig. 2, 下図の実線と破線カーブ) を仮定しており、1つの振動体 (Fig. 2, 上図の実線カーブ) を仮定した外的一致モデルとは異なっている。内的一致モデルでは、日長によって2つの振動体の位相関係が変化し、それによって長日や短日反応が起きると説明する。すなわち、光は2つの振動体の同調因子として働き、日長により異なった位相関係(2つの振動体の位相が一致する場合としない場合)を

Fig. 2 External coincidence model and internal coincidence model for testicular growth of birds. External coincidence model: a circadian rhythm of photosensitivity entrains to the daily light-dark cycle. The photosensitivity phase coincides with light under long but not short days. Internal coincidence model: two separate circadian rhythms entrain to the daily light-dark cycle with different phase relationship between short and long days. Under long days, coincidence occurs, but not under short days. In both models, testicular growth occurs under long days.

Fig. 3 A circadian rhythm controls the timing of the photoperiodic response of testicular growth in birds. A 6-hour light period coupled with dark periods of 6 (6L6D, 12 h cycles), 30 (6L30D, 36 h cycles) and 54 hours (6L54D, 60 h cycles) stimulates testicular growth because light falls on photoinducible phases, but other cycles (6L18D, 24 h and 6L42D, 48 h cycles) do not.

もたりますが、反応を直接誘起することはないのである。

これらのモデルで仮定されている振動体の生理学的な実体については明らかではない。しかし、ビュニングとビットンドリックのモデルは現在でも光周性研究の理論的基礎として重要な位置を占めており、その実体が明らかになる日もそれほど遠くはないであろう。

3. 鳥類の光周性機構

3.1 概日時計の関与

脊椎動物における光周性反応が報告されたのは鳥類が最初である。カナダのアルバータ大学のローワンは、鳥の繁殖サイクルが日長により制御されていることを見つけ、1925年の*Nature*に報告している。その後、研究の進展はほとんどなかったが、1963年にハムナーが鳥の光周性反応の背景に概日時計が関係することを見いだした (Fig. 3)。ハムナーは、明期を6時間に固定して12時間、24時間、36時間、48時間、60時間のサイクルをつくり、そこで飼育した鳥の精巣を比較した。その結果、12時間、36時間、60時間のサイクルで飼われた鳥の精巣は著しく発達したが、それ以外ではほとんど発達が見られなかった (このプロトコールは最初に実験を行った研究者にちなんでNanda-Hamner共鳴実験とよばれる)。この結果を解釈するには、ビュニングのモデルにもとづいて、光誘導相と非光誘導相が12時間ごとに交代でサイクルする概日リズムを想定するとよく理解できる。つまり、光誘導相に光が当たった場合に限りて精巣が発達すると考えるのである。

我々が実験に使用しているウズラも長日性繁殖動物で、日が長くなるとメスは産卵を開始しオスは精巣が発達する。ちなみに、繁殖期に入った鳥の精巣は非繁殖期に比べて数百倍の大きさになる。このような急激

な精巣の発達は哺乳類では見られず、せいぜい数倍程度しか大きくならない。これは飛翔のための適応で、非繁殖期にはできるだけ効率よく飛翔するために精巣を小さくしておく必要があるものと考えられている。ウズラの光誘導相は明期開始から12-16時間にかけて4時間程度の時間帯にあり、その時間帯に光が当たると下垂体 (pituitary) から生殖腺刺激ホルモン (gonadotropin) が分泌されて精巣が発達する (Fig. 4)。この位相が概

Fig. 4 Light-break experiment in Japanese quail. Photoinducible phase for testicular growth is located between 12 and 16 hours after light onsets. Time 0 is light onsets. Birds are kept under short days (6L18D) and exposed to a brief light pulse (1 h) at different times. For example, light schedule (a) is 6L2D1L15D. The testicular growth occurs only in the birds with a light pulse between 12 and 16 hours after the onset of light-dark cycles (light schedule c, d, e).

日時計により支配されているのである。

3.2 光はどこで感じるか？

鳥における光周性反応に眼は必要ではない。フランスのブノアは盲目にしたアヒルが日長を認識して精巣を発達させることを発見し、その後多くの研究者により確認された。哺乳類を除くすべての脊椎動物は脳内に光受容器をもち、概日リズムの光同調や光周性反応を制御している。鳥の光周性反応にかかわる光受容の正確な部位はいまだ明らかにされていないが、脳のさまざまな場所に発光ピーズを埋め込んだり局所的に光を照射したりする実験が行われ、視床下部や前交連より上部の比較的限局した部位に光感受性があることがわかっている。ロドプシン抗体を使った免疫組織化学では側脳室近傍の外側中隔と視床下部の漏斗核 (infundibular nucleus, IN) に反応が認められ、ハトの外側中隔には網膜と同一のロドプシン遺伝子が発現していることが示されている。

3.3 生殖腺刺激ホルモンの光周性

(1) 光周性を制御する中枢部位

長日刺激を受けたウズラは視床下部-下垂体系が活性化され、下垂体前葉から生殖腺刺激ホルモンが分泌され生殖腺が発達する。光周性反応の制御中枢は視床下部内側基底部 (mediobasal hypothalamus, MBH) と考えられており、そこには IN、視床下部核 (inferior hypothalamic nucleus, IH)、正中隆起 (median eminence, ME) が含まれる。MBH が重要であることは、IN や ME を局所的に破壊すると長日条件でも生殖腺刺激ホルモンの上昇が抑えられ、精巣発達が起きないことや、IN や IH の電気刺激により生殖腺刺激ホルモンの上昇が起き、生殖腺の発達が促されることなどの理由による。また、最初期遺伝子の *c-fos* が光周性反応を起こす光刺激に対して特異的に ME と IN に発現することが知られている。

光周性における日長の計測には概日時計が用いられているが、鳥類の概日時計である松果体 (pineal) や視交叉上核 (suprachiasmatic nucleus, SCN) を破壊しても光周性反応が起きることから、これらに存在する概日時計は光周性反応に重要ではないと考えられる。そうであるとなると、MBH に概日時計が存在する可能性が高い。そこで、我々は MBH に概日時計が実際に備わっているかどうかを時計遺伝子 (*Per2*, *Per3*, *Clock*, *Bmal1*, *Cry1*, *Cry2*, *E4bp4*) の発現により調べた³⁾。その結果、これまでに知られているすべての時計遺伝子が MBH に発現していることがわかった。さらに、さまざまな光条件で発現パターンを調べたところ、長日や短日条件により位相や振幅が変化することはなく、常に安定したリズムが刻まれていることが明らかになった。光誘導相は短日条件でも長日条件でも明期開始から 12-16 時

間の時間帯に設定されている (Fig. 4)。おそらく MBH の概日時計が光誘導相の時間帯を設定していると思われるが、日長にかかわらず一定の時間帯に光誘導相が設定される仕組みは外的一致モデルから考えると理にかなっているといえる。

(2) 光周性を制御する遺伝子

MBH が光周性の中枢であるとする、日長の変化により MBH で何らかの分子レベルでの変化が生じているはずである。そこで、光誘導相に光を照射したウズラと照射しなかったウズラから MBH を取り出し、differential subtractive hybridization 法で発現誘導される遺伝子を調べた。その結果、2 型脱ヨウ素酵素をコードする遺伝子 (*Dio2*) が光誘導相に限って急激に光誘導されることを見いだした⁴⁾。同じ光を照射しても光誘導相以外の時間帯ではまったく変化がなかった。このことは、*Dio2* 遺伝子の発現が概日時計により制御されていることを示すとともに、この遺伝子が光周性に重要な役割を担っていることを表している (Fig. 5)。2 型脱ヨウ素酵素は甲状腺ホルモンであるチロキシン (T_4) をトリヨードチロニン (T_3) に変換する酵素で、MBH で局所的に生産された T_3 が生殖腺刺激ホルモンの分泌を促し精巣を発達させるものと考えられる。 T_3 は T_4 に比べて生物活性が高く、事実ウズラの脳室内に投与した T_3 と T_4 の精巣発達への効果は前者の方が有意に高い⁴⁾。

(3) 甲状腺ホルモンの作用

視床下部の神経分泌細胞は、下垂体のホルモンの分泌を促進したりあるいは抑制したりするホルモン (生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン, GnRH など) を生産し、これらのホルモンをその軸索を通して正中隆起 (ME) の毛細血管に放出する。この際、GnRH ニューロンの神経終末が毛細血管の基底膜に接することが重要とされている。放出されたホルモンは下垂体門脈血管系を経て下垂体に達し、生殖腺刺激ホルモンなどさまざまなホルモンの分泌を調節する。MBH で局所的に合成された T_3 はその受容体を介して GnRH 分泌を調節するが、その作用部位は受容体が存在する ME などと考えられる。そこで、長日と短日条件で ME の GnRH ニューロンの神経終末の形態変化について調べた⁵⁾。その結果、GnRH 神経終末と基底膜との距離は長日条件の方が短く、短日条件ではグリア細胞の終足に GnRH 終末が包まれ基底膜との接触が阻害されているものが多くみられた。これらの結果から、グリア細胞が GnRH 神経終末と基底膜の接触を調節しており、その変化は T_3 によりもたらされるものと考えられた (Fig. 5)。

3.4 プロラクチンの光周性

プロラクチンは下垂体前葉から放出されるホルモンで、哺乳類の乳腺発育や乳汁分泌などを促進し、また

Fig. 5 Model for photoperiodic response of gonadotropins in birds and mammals. IIIIV is the third ventricle.

鳥では換羽や抱卵行動などを促す。プロラクチンの血中濃度は長日で上昇し短日で減少する光周性反応を示すが、その制御機構は生殖腺刺激ホルモンの機構とは異なっている。哺乳類のプロラクチンの光周性は下垂体の隆起葉 (pars tuberalis) で制御されていると考えられており、そこには時計遺伝子が発現している。鳥類のプロラクチンも日長に応じて変化するが、視床下部から放出される血管作動性腸管ポリペプチド (VIP) がプロラクチンの放出因子であることから、光周性反応の制御は視床下部と推察されてきた。しかし、VIPニューロンが局在するMBHを破壊してもウズラの血中プロラクチン濃度は日長により変化するの、必ずしも視床下部がその制御中枢であるとはいえない。そこで、鳥類でも下垂体隆起葉がプロラクチンの光周性に関与していると考え、そこに発現する時計遺伝子について検討した⁶⁾。

その結果、*Per2* と *Cry1* 遺伝子が日周変動を伴って強く発現しており、その2つの時計遺伝子の位相関係が日長により変化することがわかった (Fig. 6)。すなわち、短日条件では明期がはじまる頃にピークをもつ *Per2*

Fig. 6 Model for photoperiodic response of prolactin in birds and mammals.

と明期後半にピークをもつ *Cry1* の発現ピークの間隔が短いのにに対して、長日条件ではその間隔が長くなる。この変化は、*Per2* のピークが変化するのではなく、*Cry1* のピークが後退するため、明期開始から12-16時間に存在する光誘導相に光が当たることにより *Cry1* の発現が誘導されてピークを示すと考えられる。実際、光誘導相以外の時に光を照射しても *Cry1* の発現は誘導されない。光誘導相に限った *Cry1* の発現は先の *Dio2* 遺伝子発現と同じように外的一致モデルに合致するが、*Cry1* と *Per2* のリズムの位相関係が日長により変化するという点では2つの振動体を仮定した内的一致モデルに合致する。*PER2* と *CRY1* タンパク質は複合体を形成して他の時計遺伝子やその下流にある時計制御遺伝子の転写を調節するため、これらのタンパク質が形成される時間関係 (細胞内で2つのタンパク質が共存する時間) がひいてはプロラクチンの変化につながるものと考えられる。しかし、その詳細な機構については不明であり、今後の課題である。

4. 哺乳類の光周性機構

4.1 松果体の役割

哺乳類においても光周性反応に概日時計がかかわっていることがNanda-Hamnerの共鳴実験などにより確かめられている。ハムスターの精巣は日長により劇的に変化し、1日の明期の長さが12時間30分を越えるとそれまで小さかった精巣が急激に発達し、それ以上明期を延ばしても大きくなることはない。つまり、精巣発達を左右する限界日長が存在し、概日時計がその長さを決めているのである。

哺乳類の光周性反応には松果体が重要で、松果体を除去された動物は長日と短日の区別ができなくなる。松果体ではメラトニンが合成されており、その合成は概日時計であるSCNの制御を受けて顕著な日周リズムを示す。メラトニンは夜間に合成され、光により抑制される。したがって、夜の長い短日では血中メラトニンは長時間高いレベルを維持し、逆に夜の短い長日条件ではそれが短い。すなわち、日長情報がメラトニンというメディエーターを介して生体内に伝達され、光周性反応を引き起こすのである。この点が鳥類と大きく異なっている (Fig. 5, 6)。

メラトニンが光周性反応に重要であることは、長日で飼育してメラトニンの分泌持続時間を短くしておいたハムスターにメラトニンを注射すると短日と同様な効果をもたらすことから明らかになった。メラトニンは日周リズムを示すが、短日条件のリズムと長日条件のリズムでは、1日に分泌されるメラトニンの総量と分泌持続時間が異なる。そこで、リズムのパラメーターのどの情報が重要であるかを定めるために松果体を除去したハムスターにメラトニンを注入する実験が行われた。その結果、光周性を引き起こす決定要因は分泌持続時間であり、同じ持続時間であれば、1日のどの時間に注入しても同様な効果が得られることがわかった。一般にホルモンは容量依存的な反応を引き起こすが、メラトニンは容量ではなく時間に依存して効果を現す特異なホルモンといえる。

4.2 生殖腺刺激ホルモンの光周性

短日性繁殖動物のヒツジやヤギは日が短くなる秋に、また長日性繁殖動物のウマは日が長くなる春から初夏にかけて繁殖活動を開始する。繁殖時期が異なるのは出産する時期を育子に適した春から初夏に設定するため、短日性繁殖動物では妊娠期間が半年ほどで、長日性繁殖動物ではほぼ1年になる。また、妊娠期間が短いハムスターなどでは育子に適した期間内に繁殖を終了させる。メラトニンは短日性繁殖動物と長日性繁殖動物では生殖腺に対して逆の作用があり、前者では、

メラトニンの持続時間が長い場合に生殖活動が活発になり、後者ではその逆になる。

メラトニンは受容体に作用して最終的に下垂体から生殖腺刺激ホルモンを放出させるが、どのような仕組みでメラトニン情報が解読されるのかはわかっていない。しかし、最近我々は、鳥類の光周性のキー遺伝子である*Dio2*の発現が、哺乳類においてメラトニンにより変化することを見いだした⁷⁾。ハムスターでは*Dio2*は視床下部の一部である脳室上衣細胞と灰白隆起漏斗溝の背側に発現しており、長日になると*Dio2*遺伝子の発現が高くなる。しかし、鳥と異なりその発現は光による直接的な誘導ではなく、メラトニンを介していることがわかった。すなわち、長日条件でメラトニンを投与すると精巣が萎縮し、*Dio2*の発現も抑制されることが明らかになった。*Dio2*の発現が抑制されるとT₃が合成されず、GnRHとそれに続く生殖腺刺激ホルモンの分泌が阻害されて精巣が萎縮すると解釈できる。メラトニンがどのように*Dio2*の発現を制御しているかは明らかではない。しかし、メラトニンの局所投与により効果が現れる部位やメラトニン受容体が存在する部位と*Dio2*の発現部位とが異なっていることから、おそらく*Dio2*の発現はメラトニン受容体からの神経性の制御を受けているものと考えられる (Fig. 5)。

4.3 プロラクチンの光周性

生殖腺刺激ホルモンの光周性は視床下部により制御されているが、プロラクチンの光周性制御部位は視床下部ではない。プロラクチンの分泌は長日条件で増加し、短日条件で減少するが、ヒツジの下垂体と視床下部の神経連絡を外科的に遮断しても長日や短日には反応し光周性は維持される。この手術を受けたヒツジは視床下部-下垂体系の機能が失われ、下垂体ホルモンの分泌が阻害される。プロラクチンに関しても分泌を一時的に引き起こす刺激 (例えば、ヒツジに犬のほえ声を聞かすなど) に対する反応は起きない。しかしメラトニンを与えるとプロラクチンは減少することから、メラトニンにより光周性反応が維持されていることがわかる。これらの結果から、プロラクチンの光周性はメラトニンの日長情報が視床下部ではなく下垂体で解読されて生じることが明らかにされた。実際、下垂体隆起葉にはメラトニン受容体が高濃度に分布していることがわかっている。

下垂体隆起葉に作用したメラトニンは時計遺伝子を介して日長情報を伝えると考えられている。ヒツジの隆起葉には時計遺伝子が発現しており、24時間リズムを示す。*Per*遺伝子は明期のはじまる頃にピークを示し、*Cry*遺伝子は暗期のはじまり近くでピークを示す。これらの遺伝子の発現リズムはメラトニンリズムと密接に

関係し、メラトニンが増加する時に *Cry* 遺伝子が、また、減少する時に *Per* 遺伝子が発現する。したがって、メラトニン分泌持続時間の長い短日と長日とでは *Per* 遺伝子と *Cry* 遺伝子とのリズムの位相関係が異なってくる。この結果は、先に示した鳥類の隆起葉と同様で、PER/CRY タンパク質複合体の形成に差が生じ、その結果下流遺伝子の発現に影響が出ると考えられる (Fig. 6)。

プロラクチンの分泌がどのように制御されているかは明らかではないが、隆起葉からチューベラリンという物質が放出されてプロラクチンの分泌が促されると考えられている。しかし、その物質の実態についてはわかっていない。

5. おわりに

「生物はどのように日長を測定しているのか?」という疑問に答えるために、古くから多くの研究者が光周性に取り組んできた。その結果、哺乳類は視交差上核で読み取った日長情報を松果体でメラトニンリズムに変換し、視床下部や下垂体隆起葉のメラトニン受容体を介して情報を解読していることがわかってきた。また、鳥ではメラトニンを介さず光を直接脳で受容し、光誘導相を利用して日長を測定していることが明らかになってきた。一方、日長情報の受容と伝達様式は哺乳類と鳥類で異なっているが、情報解読のプロセスでは

共通した分子が利用されている可能性が我々の最近の研究結果からわかってきた。光周性の本質の理解は日長測定の仕事みを明らかにすることである。哺乳類ではメラトニン情報の解読機構を、鳥では光誘導相形成機構を明らかにすることが重要である。概日リズムの分子機構の理解は時計遺伝子の発見により急速に進んだが、光周性に関しても時計遺伝子や光周性遺伝子の研究によって分子レベルでの解明が急速に進むことを期待したい。

文 献

- 1) 田澤 仁 (2003) 時間生物学 **9**(1), 34-42.
- 2) 田澤 仁 (2003) 時間生物学 **9**(2), 3-15.
- 3) Yasuo, S., Watanabe, M., Okabayashi, N., Ebihara, S. and Yoshimura, T. (2003) *Endocrinology* **144**, 3742-3748.
- 4) Yoshimura, T., Yasuo, S., Watanabe, M., Iigo, M., Yamamura, T., Hirunagi, K. and Ebihara, S. (2003) *Nature* **426**, 178-181.
- 5) Yamamura, T., Hirunagi, K., Ebihara, S. and Yoshimura, T. (2004) *Endocrinology* **145**, 4264-4267.
- 6) Yasuo, S., Watanabe, M., Tsukada, A., Takagi, T., Iigo, M., Shimada, K., Ebihara, S. and Yoshimura, T. (2003) *Endocrinology* **145**, 1612-1616.
- 7) Watanabe, M., Yasuo, S., Watanabe, T., Yamamura, T., Nakao, N., Ebihara, S. and Yoshimura, T. (2004) *Endocrinology* **145**, 1546-1549.

海老原史樹文

海老原史樹文（えびはら しずふみ）

名古屋大学大学院生命農学研究科教授

1969年名古屋大学農学部卒業。78年名古屋大学大学院農学研究科博士課程後期課程満了。78年三菱化成(株)生命科学研究所(特別研究員)。80年名古屋大学農学部助手。91年名古屋大学農学部助教授。98年より現職。この間、米国オレゴン大学神経科学研究所(83-85年)、米国NIH、ドイツマックスプランク行動生理学研究

研究所(89-90年)で研究に従事。
研究内容: (1) 概日リズム突然変異マウスを用いた行動遺伝学的研究, (2) 鳥類の概日時計および光周性の分子基盤。

趣 味: 旅行, 温泉。

連絡先: 〒464-8601 名古屋市千種区不老町

E-mail: ebihara@agr.nagoya-u.ac.jp

安尾しのぶ（やすお しのぶ）

名古屋大学大学院生命農学研究科ポスドク

1997年北海道大学理学部卒業。03年名古屋大学大学院生命農学研究科にて博士(農学)の学位取得。04年1月より同大学大学院にてポスドク、現在に至る。

研究内容: 鳥類や哺乳類の光周性制御機構を分子のレベルで研究している。

趣 味: 音楽, 読書。

連絡先: 〒464-8601 名古屋市千種区不老町

E-mail: shinobu@agr.nagoya-u.ac.jp

吉村 崇（よしむら たかし）

名古屋大学大学院生命農学研究科助手

1993年名古屋大学農学部卒業。95年名古屋大学大学院農学研究科博士前期課程修了。96年名古屋大学大学院農学研究科博士後期課程中退。95-96年日本学術振興会特別研究員(DC1)。96年より名古屋大学農学部助手。02年より生物系特定産業技術研究推進機構研究代表者。04年より名古屋大学高等研究院流動研究員(併任)。

研究内容: 脊椎動物の光周性の制御機構の解明。

趣 味: アウトドアライフ, 育児。

連絡先: 〒464-8601 名古屋市千種区不老町

E-mail: takashiy@agr.nagoya-u.ac.jp