3SE52

電顕画像の単粒子解析法の開発とイオンチャネルの構造

小椋 俊彦、三尾 和弘、○佐藤 主税（産総研・脳神経情報研究部門）

一般に神経細胞のイオンチャネルは制御タンパク質と分子複合体を形成して、制御されている。こうした複合体の構造を容易に解析する技術が電子顕微鏡画像による単粒子構造解析と考えている。本解析技術を以下のチャネルの結果を例に説明したい。神経細胞の小胞膜にはIP3とCaによって開くIP3受容体(IP3R)とよばれるイオンチャネルが存在する。その役割は小胞内に存在するCaイオンの放出を制御することである。IP3Rは生体の活動にとって重要であり、急峻かつ短期間のCa上昇をもたらす。また、このIP3Rと物理的に結合して協調して働くTRP (Transient receptor potential) C3 channelは、緩やかで長期間にわたるCa濃度上昇を引き起こす。細胞小胞内のCaイオンが枯渇すると開いて細胞外からCa流入を起こす。TRPC3とIP3Rは共に細胞膜受容体への刺激によって活性化され、協調して細胞のCa振動を起こすと考えられている。共に電圧感受性Na channelと同じく6回膜貫通型のイオンチャネルである。しかしながら、その構造と機構はこれまで謎であった。我々は京大藤吉研、東大御子柴研と共同で、He ステージクライオ電顕画像からIP3Rの三次元構造を解明した。IP3Rの内層の中心にはNaチャンネルと異なり明確な長い孔が見られる。この内部パイプはイオンの通路と思われ、パイプの間にもイオンが放出される切れ目が存在していた。そのためパイプから放出されたCaイオンは気球構造表面の多くの穴から四方八方へ放出されると思われる。さらにIP3Rに対して結合するTRPC3の構造を、京大森研との共同研究で解明した。その分子量はIP3Rの1/3しかないにもかかわらず、内部に多くの空洞を含み、全体の大きさはIP3とほぼ同じという意外な構造であった。本サイズはIP3RとTRPC3が1:1で結合し、相互の活性を調節することを強く示唆する。

T.Ogura, K.Mio and C.Sato : Channel structure reconstruction: single particle analysis from electron microscopy using ion channels

3SE54

バクテリオロドプシンのプロトンポンプ機構における水分子の役割

○神山 勉（名大院・理学研究科・物理）

バクテリオロドプシンは高度好塩菌の細胞膜に存在する膜タンパク質で、光駆動プロトンポンプの機能を有する。このタンパク質に含まれるレチナール色素が光を吸収すると、5つの反応中間体（K、L、M、N、O）で記述できる反応サイクルが開始し、この間に1個のプロトンが細胞質側から細胞外に能動輸送される。我々は、構造情報を基にしたプロトン輸送のメカニズムの解明を目指して研究を展開してきており、これまでに、膜融合法より得られる3次元結晶を用いて、バクテリオロドプシンの基底状態、K中間体、L中間体およびM中間体の構造解析を求めた。これら一連の研究を基に、「レチナールの光異性化に伴い活性部位にある水分子が細胞質側に引き釣り上げられ、この水分子が一方方向に移動することにより、（移動自由度の高い）プロトンの流れの一方方向性が保障される」という斬新なプロトン輸送機構を提唱した。

図1. バクテリオロドプシンの光誘起構造変化

T. Kouyama : Role of water in the proton pumping cycle of bacteriorhodopsin

3SE53

巨大ヘモグロビンの分子会合機構

沼本 修孝^{1,2}、中川 太郎³、喜田 昭子^{1,4}、笹山 雄一⁵、福森 義宏³、○三木 邦夫^{1,2}（¹京大院・理・化学、²理研・播磨、³金沢大院・自然・生命科学、⁴京大・原子炉、⁵金沢大・自然計測応用研・臨海）

酸素運搬を担うヘモグロビンは、哺乳類以外の生物にも広く存在し、それらは単量体で機能するものから、100以上のサブユニットからなる複合体を形成する巨大ヘモグロビンまで、分子の会合状態や、酸素との親和性の点において極めて多様な広がりを持っている。これらは、これまでに詳細な研究がなされている哺乳類ヘモグロビン4量体とは異なった複合体を形成しており、その機能との相関に興味もたれている。海産底生性の有鬚動物マシコヒゲムシ (*Oligobranchia mashikoi*) は、口や消化管を持たず、かわりに体内に共生させた独立化学栄養細菌がつくりだす有機物を栄養源にしていると考えられている。この動物は分子量約40万の巨大な細胞外ヘモグロビン複合体をその血液中に有しており、これにより酸素のみならず、共生細菌が利用する硫化水素をも同時に運搬するという、極めて特徴的な機能を発現している。われわれは、この巨大ヘモグロビン複合体の結晶構造を2.85 Åで決定した。この巨大ヘモグロビンは、4種のサブユニットからなる24量体を形成しており、内部に直径約50 Åの空洞をもつ、外径約120 Åの球状構造であった。また、12量体を形成するように、サブユニット間でのdisulfide結合が確認された。さらにこの12量体構造は、4種のサブユニットひとつずつより構成される4量体構造が3回対称によって会合したものとなす。これらの部分構造を、既報の無脊椎動物由来ヘモグロビンの四次構造と比較しつつ、24量体の巨大ヘモグロビン形成に至る分子会合の様子を議論する。また、この巨大ヘモグロビンの大きな特徴のひとつである、硫化水素結合の機構についても、特にこれまでに予想されていた結合サイトの環境とともに、今回得られた結晶構造より示唆される機構を議論する。

N. Numoto, T. Nakagawa, A. Kita, Y. Sasayama, Y. Fukumori and K.Miki : Molecular assembly of giant hemoglobin

3SE55

振動分光法によるプロトンポンプ機構の解析: チトクロムc酸化酵素

○小倉 尚志（兵庫県立大・院・生命理）

ウシ心筋チトクロムc酸化酵素のX線結晶構造解析によれば、ペクトルプロトンの通路はH-pathwayである。その中にあるAsp51は酸化還元に伴って構造変化を起こし、それがプロトンを膜間空間に放出する残基と考えられている。Asp51/Asnの変異体では、電子伝達活性はあるもののプロトンポンプ機能が損なわれる。

一方、H-pathwayにはヘムaのフォルミル基が含まれているが、そのCH=O伸縮振動数を共鳴ラマン分光法で測定することができる。その振動数が孤立したCH=Oのそれよりかなり低いことから、フォルミル基がアミノ酸残基と強く水素結合していること、その強さが酸化型と還元型で変化することがプロトンポンプの引き金になり得ること、がBabcockらにより指摘されていた。その後X線結晶構造解析により水素結合の相手がArg38であることが明らかになった。

本研究では、タンパク中におけるArg38の性質を明らかにするためフォルミル基を持つヘムaモデル化合物のCH=O伸縮振動数を、作る水素結合の強さの異なるいくつかの有機溶媒中で測定した。その結果をもとに解析したところ、タンパク中のArg38は酸化型でも還元型でもギ酸に相当する強い酸性度を示した。このことはArg38の周辺環境が酸化還元状態に依らず変化しないことを意味する。したがって、タンパク中のCH=O伸縮振動数が酸化還元に伴い40 cm⁻¹変化するのはCH=O上の電子密度の増減に依ると考えられる。CH=Oが水素結合を作らないときその変化は小さいことがわかっている。したがってArg38はフォルミル基と水素結合を作ることにより、酸化還元に伴う電子密度の変化をより大きくし、CH=O部位のプロトンに対する親和性を制御する役割を果たしていると考えられる。

T. Ogura : Vibrational Spectroscopic Study on Proton Pumping Mechanism of Cytochrome c Oxidase