1P137

昆虫細胞を用いた高効率ヒトアクチン発現系の構築と変異アクチンの機能解析

○岩佐 充貞¹、佐野 健一²、前田 佳代¹、前田 雄一郎^{1,3,4}
(¹JST・ERATO、²癌研・蛋白創製研究部、³理研播磨・前田構造生物化学、⁴名大院・理・生命理学)

アクチンは筋肉蛋白質や細胞骨格蛋白質の主要成分で、筋収縮や食胞形成などの細胞運動に重要な役割を担っている。その際のアクチンの重合・解離といったアクチンフィラメント動態は、アクチン結合蛋白質のみならずアクチン分子自身の構造変化により制御されていることが知られている。このようなアクチンフィラメント動態に伴うアクチン分子の構造変化についてより深く理解するためには、アクチンを組換え蛋白質として大量に得る系を確立し、動態に関与する部位に変異を導入した組換えアクチンを解析することが不可欠である。そこで我々は、昆虫細胞を用いた系で、ヒト由来の高等生物アクチンを大量かつ高効率に得るための発現系の構築および変異アクチンの機能解析を試みている。トランスファーベクターには、我々が開発した発現促進配列である L21 を導入したベクターと、Joel らが用いたベクターを使用した。これらのベクターを用いて、ヒト骨格筋型アクチンと、ヒト心筋型アクチンの可溶性組換えアクチン発現量を比較した。その結果、どちらのベクターを用いた場合でも発現量は同程度であった。また、骨格筋型よりも心筋型の方が高い発現量が確認された。両者のアミノ酸配列の相違は 4/377 アミノ酸であることから、心筋型を今後の解析に用いることにした。同様にヒト細胞質型アクチンも良好な発現が確認された。さらに、組換えアクチンと昆虫細胞由来アクチンを容易に分離するために、アクチンの N 末側にタグと発現後切除する配列を導入した。現在は、組換えアクチンの発現・精製・機能解析を行っている。また、アクチンフィラメント動態に関与する部位である、ATPase や重合に関与していると考えられている部位に変異を導入した種々の変異体の作製も行っている。今後はそれらの機能解析をしていく予定である。本年度ではそれらの進捗状況を報告する。

M. Iwasa, K. I. Sano, K. Maeda and Y. Maeda : An establishment and analysis of recombinant wild-type and mutant human actins.

1P139

完全無細胞翻訳系を用いたアクチンフィラメントの作製

○岡谷 実季¹、山岸 舞²、上野 太郎²、船津 高志^{1,2,3} (¹早大院・理工、²東大・院薬、³JST,CREST)

[目的] アクチンは自発的な folding をせず、正しい三次構造をとるためにはシャペロニン CCT など他の助因子が必要である。そのため folding 機構については不明な点が多い。本研究ではこの機構を明らかにするため既知の構成成分のみで作られた完全無細胞翻訳系である「PURE SYSTEM」(ポストゲノム社)を用いてアクチンの in vitro 翻訳を行い、アクチンの folding 条件を検討した。アクチンの in vitro 翻訳が可能になると、変異体アクチンを容易に作製して、アクチンの機能解析を迅速に行うことが可能となる。[方法と結果] 無細胞タンパク合成系「PURE SYSTEM」を用いてアクチンの in vitro 合成を行った。抗アクチン抗体を用いたウェスタンブロットにより約 400 nM のアクチンが合成されたことが分かった。これは重合臨界濃度 (~100 nM) よりも高いが、重合条件下においてもアクチンフィラメントは形成されなかった。次に、ウサギの網状赤血球抽出液より精製したシャペロニン CCT を「PURE SYSTEM」に、400 nM 添加し、同様に in vitro 翻訳を行った。合成したアクチンを重合条件下において蛍光顕微鏡で観察したところ、フィラメントが観察された。しかし、鶏肉より精製した同濃度のアクチンと比較するとフィラメントになっているアクチンは約 1% だった。今後はさらに最適な条件を検討し、生成したフィラメントの機能を確認していきたい。

M. Okatani, M. Yamagishi, T. Ueno and T. Funatsu : Synthesis of actin filaments using cell free transcription and translation system.

1P138

細胞性粘菌で発現した変異アクチンの機能評価

○久保 圭、小口 祐伴、久保田 寛頭、芹沢 加洋子、石渡 信一 (早大・理工・物理)

分子モーターの機能についてはミオシンの構造変化に注目した研究が多くなされている一方で、アクチンは単なるレールか?と問う研究が、限定分解アクチンや変異アクチンを用いて研究されている。このような流れの中で、本研究では、アクチンのミオシン結合部位を構成するアミノ酸を置換した変異アクチンの機能変化を調べることで、アクチン-ミオシン間の相互作用に新たな視点を与えることを目的としている。変異を導入したアミノ酸残基は、アクチンのサブドメイン 1 に位置する 352 番目のフェニルアラニンで、これをアルギニンに置換した。この point mutation が、ミオシンの ATPase cycle やアクチンフィラメントの滑り運動に影響を及ぼすか否かを検討した。変異アクチンの精製には細胞性粘菌を用いた。point mutation したベクターを粘菌細胞内に導入し発現させ、更に変異アクチンと wild-type アクチンを電荷の違いを利用して陰イオン交換カラムにより分離、精製した。変異アクチンの機能評価として、前年会においてミオシン II 及びミオシン V による in vitro motility assay の結果、アクチンの滑り運動速度には大きな影響は見られなかったこと、一分子計測においてミオシン V の速度の負荷依存性に変異アクチンと wild-type アクチンとは違うということを報告した。現在は、変異アクチンの精製方法の改善・確立に取り組みつつ、機能評価に用いるアクチンフィラメントを wild-type アクチンと変異アクチンとの配合比を変えたものにするなど、この変異アクチンの性質の詳細を検討しているのでその進行状況を報告する。

K. Kubo, Y. Oguchi, H. Kubota, K. Serizawa, S. Ishiwata : Characterization of mutant actin expressed in Dictyostelium cells

1P140

X 線繊維回折法によるアクト-ミオシン II サブフラグメント複合体の低分解能構造の復元

○岩本 裕之¹、大岩 和弘²、上田 太郎³、若山 純一⁴、田村 巧⁴、藤澤 哲郎⁴、八木 直人¹ (¹SPRING-8・JASRI、²情報通信研究機構・生体物性、³産総研・ジーンファンクション、⁴理研播磨研・構造生物化学)

伸長した骨格筋線維に各種ミオシン II サブフラグメント 1(S1) を灌流して記録した小角領域の X 線繊維回折像からアクト S1 複合体の低分解能構造の復元を試みた。最適化は簡便な最小二乗法 (RLS) に基づいている。この方法は結果が開始モデルに強く依存し、構造が無数にあるローカルな谷間にトラップされやすい欠点があるが、ここでは計算値にローパスフィルターをかけて分子全体のエンベロープを求める方法をとった。この方法を用いてニトリ砂囊平滑筋ミオシン S1 とアクチンの複合体の構造を、rigor 状態と ADP 存在下で求めた。Rigor 状態の回折像は、骨格筋 (速筋) S1 の場合と異なり、第 6 層線反射 (59 Å) がダブルピークになる特徴がある。この特徴はアクト S1 単体のいかなる構造モデルでも再現できない。最適化後に残るピークの位置は第 1 層線等のピークと同様に六方格子に index され、分子が不完全な六方格子にパックされているのがわかる。これに ADP を加えるとピークは第 1 層線のものを残して消失し、フィッティングは格段に向上する。これは ADP 結合に伴う構造変化によって分子パッキングが大幅に乱れたことを意味する。第 6 層線まで六方格子のピークがみられるのは粘菌ミオシンを含め、骨格筋 (速筋) ミオシン以外の観察した全てのミオシン II 分子種に共通の特徴である。また、ADP 結合により各アクチン層線の強度プロファイルに大幅な変化が起き、これがクライオ電顕で示された軽鎖ドメインの首振りに対応するものと考えられてきた。計算結果によると、クライオ電顕の結果よりもかなり微妙な構造変化でも強度プロファイルの大きな変化を説明できる。しかし構造変化が殆ど軽鎖ドメインだけで起こる点、また質量の移動が pointed end 方向に起こる点はクライオ電顕の結果と一致する。

H. Iwamoto, K. Oiwa, T. Uyeda, J. Wakayama, T. Tamura, T. Fujisawa and N. Yagi : Restoration of low-resolution structure of acto-myosin II subfragment-1 complexes by X-ray fiber diffraction