1P193

全反射蛍光相関分光法を用いた膜タンパク質の拡散測定

○大杉 友^{1,2}、田村 守²、金城 政孝² (¹ 北大院・理・化学、² 北大・電子研・超分子分光)

【序】細胞膜ではシグナル変換・伝達など細胞機能の決定に重要なさまざまな分子間相互作用が存在し、細胞機能を深く理解するためにはこれらの解明が求められている。そのためには細胞が生きたままの状態で細胞膜上の分子動態を直接解析できる測定法が不可欠である。我々は全反射蛍光相関分光法 (TIR-FCS) の確立とこれを用いた膜タンパク質の拡散運動の観察を目的として本研究を行った。【方法】蛍光相関分光法 (FCS) は顕微鏡視野下の一点を観測し、その微小領域でブラウン運動している蛍光分子のゆらぎから、分子数・分子の大きさといった物理量が推定出来る。しかし、通常の FCS を用いてガラス面近くの細胞膜を測定とする場合、測定領域の性質上、細胞質の背景光や散乱が測定を困難にしてしまう。そこで、エバネッセント場を励起光とする全反射蛍光顕微鏡 (TIR-FM) を基盤とする光学系を用いて FCS 測定を行う TIR-FCS が細胞膜の研究に有効と考え、その試作を行った。【結果】我々が作成した TIR-FCS 装置を用いて、まず水溶液中の緑色蛍光タンパク質 (GFP) の拡散運動を測定した。この結果と過去の報告を比較する事で、TIR-FCS 測定法の確立が確認できた。次に、TIR-FCS で膜結合性 GFP (GFP-F) の拡散を生細胞内で測定したところ、速く拡散する GFP-F と比較的遅く拡散する GFP-F の二成分が観察された。これらがそれぞれどのような動態を示しているかを検討するために他の手法を用いた次の実験を行った。まず通常の FCS 測定の結果によって、速い方の成分は細胞質中の GFP-F である事が確認できた。また、1 分子追跡法の結果によって、遅い方の成分は細胞膜上に並進拡散する GFP-F である事が示せた。さらに、シグナル伝達に重要な役割を果たす PKC の測定結果も報告する予定である。

Y.Ohsugi, M.Tamura and M.Kinjo : Lateral diffusion of membrane proteins measured using total internal reflection fluorescence correlation spectroscopy

1P195

In vitro 再構成系における上皮成長因子受容体とアダプター分子間相互作用の 1 分子可視化解析

○森松 美紀¹、太田 康友²、柳田 敏雄¹、佐甲 靖志¹ (¹ 阪大院・生命機能、² 阪大院・基礎工)

細胞膜上にある上皮成長因子受容体 (Epidermal Growth Factor Receptor, 以下 EGFR) は EGF 刺激により、自己リン酸化を引き起こす。そして細胞内では様々な分子がリン酸化された EGFR のチロシン残基を認識して結合し、細胞内に情報を伝達する。我々は情報伝達分子を 1 分子レベルで可視化し、その挙動を解析することで、個々の分子がどのように情報を伝達するのかを明らかにしようとしている。

今回我々は、部分精製した EGFR をカバーガラス上に固定し、アダプター分子 Grb2 との相互作用を観察する系を構築した。まず培養細胞 A431 を EGF で刺激した後、膜面分を精製し、カバーガラス上に固定した。そこに Cy3 標識した Grb2 を加え、結合、解離を繰り返す様子を全反射顕微鏡で観察し、結合時間と解離時間 (結合と結合の間の時間) を測定した。

その結果、Grb2 の結合時間のヒストグラムは二成分の指数関数にフィットし、得られた時定数より Grb2 の解離速度は 82% の成分が 4.0/s、18% の成分が 0.43/s となった。Grb2 の EGFR 上の結合部位は二カ所あることから、その結合部位の違いが解離速度の違いを生んでいる可能性がある。一方解離時間のヒストグラムは一成分の指数関数にフィットし、その結合速度は 45/s/μM となった。この Grb2 の結合、解離が平衡状態にあると仮定し、解離定数を算出すると、89nM と 9.6nM になる。今まで Grb2 の EGFR に対する解離定数は、EGFR リン酸化ペプチドを用い、SPR (Chook et al., JBC 1996)、やトリプトファン蛍光強度変化 (Cussac, et al., EMBO 1994) により求められていた。その解離定数は 713nM と 100nM であり、今回得られた値にそれらより低いものがあることから、EGFR に対する Grb2 の親和性は、従来考えられていたより高いものがある可能性が示唆された。

M.Morimatsu, K.Ohta, T.Yanagida and Y.Sako : Single molecule observation of interaction between EGF receptor and an adaptor protein Grb2 reconstituted in vitro

1P194

細胞膜中のコレステロールとコレステロール会合体の 1 分子追跡

○小山-本田 郁子¹、実松 史幸¹、伊藤 和則¹、嶋田 有紀子²、武田 美江¹、岩下 淑子²、楠見 明弘¹ (¹ 京大再生研/JST-ICORP 膜機構、² 東京都老人研・蛋白質生化学)

ラフトはコレステロールなどの脂質の相互作用が寄与してできる細胞膜上のドメインや分子複合体で、信号変換や膜輸送のためのプラットフォームであると考えられている。本研究ではラフトの動的構造の理解を目指し、コレステロールを 1 分子追跡した。コレステロールのプロープとして BC θ を用いた。これはコレステロール結合毒素 θ-toxin をもとに、スブチリシンによる限定分解とビオチン結合によって、コレステロール結合活性は保ちつつ細胞傷害性を失活させた分子である (Iwamoto et al., 1997)。本実験ではこれを Alexa546 で標識した ABC θ を用いた。1 分子蛍光観察では、ABC θ は、見かけの単純拡散 (ビデオレート観察なのでホップ拡散は見えない) と一時停留を繰り返しており、それぞれ平均 3.5 秒間と 0.3 秒間継続していた。拡散期の拡散係数は非ラフト性リン脂質と同程度であった。細胞膜のコレステロールを一部除去すると一時停留頻度は減少した。さらに、ABC θ の 2 つの輝点が会合してしばらく共に拡散する様子が頻繁に見られた (解離まで平均 0.5 秒、非ラフト脂質分子ではほとんど見られない)。これは、主にコレステロールの性質であることは (プロープの性質も寄与している様にみえる)、θ-toxin のコレステロール結合サイト D4 と mGFP を融合させた GFP-D4 分子も同様の挙動を示すことからわかる (会合時間は 0.3 秒程度)。一方、抗 θ-toxin 抗体を被覆した金粒子を用いて BC θ を人工的に会合させ、コレステロールの会合体を誘導すると、一時停留頻度は大きく増加した。これらの結果は、コレステロールは 10 ナノ秒レベルの複合体ばかりでなく (Subczynski et al., 1990)、0.5 秒のレベルでの会合体形成と分解を繰り返していること、これらが、ラフト形成に関わっている可能性を示唆する。

I.Koyama-Honda, F.Sanematsu, K.Ito, Y.Shimada, Y.Takeda, Y.Ohno-Iwashita and A.Kusumi : Single-molecule tracking of cholesterol monomers and clusters in the cell membrane

1P196

細胞膜上 1 分子観察による上皮成長因子と受容体の結合速度解析

○上村 武、高木 拓明、柳田 敏雄、佐甲 靖志 (阪大院・生命機能・ナノ生体)

上皮成長因子 (EGF) は細胞に Ca²⁺ 応答を引き起こす。我々はこれまでに、蛍光色素 rhodamine で標識した EGF と 1 分子蛍光顕微鏡を用いることにより、HeLa 細胞において、細胞膜に発現している EGF 受容体 (EGFR) の分子数 (50000) と比較してごく少数の EGF 分子 (300) によって Ca²⁺ 応答が引き起こされることを明らかにした。さらに、300 分子の EGF しか結合していない状態でも、180 分子の EGF が数分子の EGF からなる会合体に含まれていることが分かった。この結果は、EGF と EGFR の結合の種類が単一であるような単純なモデルで説明することはできない。

EGFR は二量体化することで活性化すると考えられているため、EGF 会合体の形成部位では EGF と結合した二量体 EGFR が形成されていると考えられる。そこで我々は、EGF と結合した二量体 EGFR の形成機構を明らかにするために、細胞に与えた EGF 濃度と、細胞膜における EGF 分子の会合体形成との関係を解析した。その結果、EGF 濃度の増加に伴って、単量体よりも会合体として結合している EGF の分子数が顕著に増加することが分かった。この結果は、単量体と二量体の EGFR が細胞膜に存在し、さらに、EGFR と EGF の間には、単量体 EGFR と EGF 分子 (結合速度 k_1)、二量体 EGFR と最初に結合する EGF 分子 (k_2)、そして、その次に結合する EGF 分子 (k_3)、以上 3 種類の異なる結合が存在するとしたモデルとよく一致し、 $k_1=7.1 \times 10^5$ 、 $k_2=5.5 \times 10^7$ 、 $k_3=2.1 \times 10^8$ /M/s を得た。以上の結果 ($k_1 < k_2 < k_3$) より、二量体 EGFR をあらかじめ細胞膜に形成し、EGFR を効率よく活性化することにより、細胞はごく少数の EGF 分子によって Ca²⁺ 応答を引き起こすことができるものと考えられる。

T. Uyemura, H. Takagi, T. Yanagida and Y. Sako : Single-molecule analysis of the association between epidermal growth factor and its receptor on the living cells