1P289

蛋白質 alpha-helix のヘリックスパラメータ

○Enhkbayar Purejav¹、大崎 満²、松嶋 範男³ (¹ 国立モンゴル大・生物学部・生物物理、² 北大院・農学系・作物栄養、³ 札幌医大・保健医療学部・生物物理)

蛋白質の二次構造として alpha-helix、3(10)-helix、2.27-helix、4.314-helix、pi-helix、gamma-helix のヘリックス構造が提案されている。このうち alpha-helix、3(10)-helix、pi-helix が蛋白質に存在する。alpha-helix は i 番目の残基のカルボニル酸素と i + 4 番目の残基のアミドプロトンとの水素結合により安定化する。一方、3(10)-helix は (i - i + 3) 水素結合により安定化する。alpha-helix は蛋白質に残基数の 32% に存在し、一方 3(10)-helix は 3 % に存在することが知られている。また、3(10)-helix とは異なり、非常に長いヘリックスが存在する。さらに、alpha-helix は、linear, curved, kink の 3 種類のグループに分けられている。最近、我々は、3 次元の座標データからヘリックスパラメータ (handedness, ヘリックスピッチ P、1 回転当たりの残基数 n、ヘリックス半径 r) を同時に決定するプログラム HELFIT を開発している。この方法を、蛋白質 3(10)-helix に適用しそのヘリックスパラメータをとめた。その結果、3(10)-helix はヘリックスが長くなるにつれ円柱としてみた場合細くなることが示された。本研究では蛋白質 alpha-helix のヘリックスパラメータを求め、ideal な alpha-helix の値と比較した。解析データは、2005 年 7 月現在での 1.6 オングストローム以下の高分解能の X 線結晶構造解析 PDB ファイルからの non-redundant な 886 蛋白質の原子座標データを用いた。また、蛋白質の二次構造はプログラム DSSP を用いて検出し、5,412 個の alpha-helix を同定した。予備的な解析結果として、ideal な alpha-helix の値とは有意に異なることを得ている。現在、さらに詳しい解析を進めている。

P.Enhkbayar, M. Osaki and N. Matsushima : Helical parameters of alpha-helices in proteins

1P291

低分解能生体超分子像からの原子構造構築技法の開発—知識ベースによるアプローチ—

○由良 敬^{1,2}、石田 恒^{2,3}、岩崎 憲治^{2,4}、川端 猛^{2,5}、堤 遊²、松本 淳^{1,2}、真柳 浩太^{2,6} (¹ 原研・計算科学セ・量子生命、² JST・CREST、³ 原研・中性子セ・生体物質、⁴ 阪大・蛋白研、⁵ 奈良先端大・情報、⁶ BERI)

生体中で実際に機能しているタンパク質は、非常に大きな複合体 (生体超分子) である場合が多い。そのため生命現象を物質にもとづいて理解するためには、生体超分子を構成する全原子の座標情報が重要となる。生体超分子の構造は電子顕微鏡で明らかにされる場合が多いが、電子顕微鏡では一般的には解像度が 1.2nm 程度までしか得られない。原子レベルの構造との間には解像度に 10 倍程度の差がある。このような状況においてなすべきことは、生体超分子を構成する要素タンパク質の立体構造を X 線結晶解析によって明らかにし、各要素分子を電子顕微鏡で得られている全体構造にあてはめ、生体超分子の原子構造を作り出すことであると考えられる。電子顕微鏡でえられる生体超分子の全体構造に、生体超分子を構成する各要素タンパク質の原子構造をあてはめる方法の開発は、世界的にも活発になってきている。それらの研究によって、少なくとも次のふたつの問題点が明らかになってきた。1) X 線結晶構造解析で判明している要素タンパク質の立体構造と、生体超分子を構成している時の要素タンパク質の立体構造との間には大きな構造変化が起こっている場合がある。2) 電子顕微鏡像に要素タンパク質の構造をあてはめたときに、あてはめ結果を一意的に決定することができない場合がある。そこで、どのような情報を導入すればこれらの問題を克服できるかを検討するために、立体構造既知の生体超分子と要素タンパク質の組み合わせが明確になるデータベースを構築し、生体超分子構造と要素タンパク質構造とを比較した。本データベースにもとづき、生体超分子形成時に要素タンパク質はどのような構造変化を起こし、要素タンパク質のどのような部位が相互作用部位になっているかを議論する。

K.Yura, H.Ishida, K.Iwasaki, T.Kawabata, Y.Tsutsumi, A.Matsumoto and K.Mayanagi : A knowledge-based trial to gain information for atomic resolution structures of supra-molecules out of their images by electron microscopy

1P290

G タンパク質共役型受容体がオリゴマー化する際のインターフェイス予測手法の開発とその適用例

○根本 航^{1,2}、藤 博幸³ (¹ NAIST・情報科学・情報生命、² 京大・化研・バイオインフォマティクスセンター、³ 九大・生体防御)

G タンパク質共役型受容体 (GPCRs) は、市販薬物の 3 割以上を占める創薬における重要な標的の一つである。ホモ/ヘテロのオリゴマーとしても機能し、その際のリガンドの選択性・親和性、下流へ伝達されるシグナル、発現量やリサイクリング過程などがモノマーの場合とは異なるとの報告例が蓄積してきている。また、疾患との関連性が指摘されている報告例もあり、その相互作用のためのインターフェイスが予測されれば、オリゴマー化を制御する低分子設計の指針となるため、オリゴマー化メカニズムの解明が重要となってきている。これまでに多くのインターフェイス予測手法が提案されているが、それらの予測精度は高くない。また、GPCRs は膜タンパク質であることから、既存の予測手法を適用しても良い結果を期待できないと予想される。実際、機能部位予測の方法として広く用いられている Evolutionary Trace 法を用いて GPCRs のインターフェイスを予測した先行研究における予測結果は、実験によって確かめられている予測結果とは必ずしも一致していない。そこで、我々は保存残基の分布を利用して、分子表面のどこにインターフェイスが位置するかを予測する手法を開発した。ロドプシン、D 2 ドーパミン受容体、β 2 アドレナリン受容体など、インターフェイスが実験により確かめられているクラス A GPCRs に適用したところ、予測された領域は実験で確認されている領域と一致した。このことから、我々が開発した方法はクラス A GPCRs がオリゴマー化する際のインターフェイスを検出する方法として有用であると考えられる。現在、インターフェイスが未知のクラス A GPCRs へ本方法を適用し予測結果をデータベース上で公開している。本年会では、疾患のメカニズムに GPCRs のオリゴマー化が関わることを示唆されているクラス A GPCRs について行った予測結果についても報告する予定である。

W.Nemoto and H.Toh : Prediction of interfaces for oligomerizations of G-protein coupled receptors

1P292

立体構造に基づくタンパク質と糖鎖の分子間相互作用の分類と解析

○塩生 くらら¹、木下 賢吾²、木寺 詔紀³、中村 春木¹ (¹ 阪大蛋白研、² 東大医科研、³ 横浜市・国際総合科学)

生体内に存在する糖鎖は重要な疾患の発現や免疫機構などの様々な生命現象に関与している。多くの場合、糖鎖の機能発現の過程にはタンパク質による糖鎖の認識が大きな役割を果たしている。よってタンパク質の糖鎖認識機構を分子レベルで理解することは、糖鎖の構造や機能を解明するのに非常に重要である。タンパク質の糖鎖を認識する機構、つまりタンパク質と糖鎖の分子間相互作用を分子レベルで理解するには PDB の立体構造を解析するのが有効である。本研究では、タンパク質と糖鎖の分子間相互作用についての知見を得るため、PDB に含まれているタンパク質の糖鎖結合部位の解析をおこなった。まずは糖鎖の分子形状に基づいて分類したデータベースを利用して、糖鎖の分子形状がどれほど多様なかを把握し、糖鎖の立体構造の分類とタンパク質糖結合表面構造の分類の対応関係を観察した。つぎに、データベースから単糖リガンド結合部位を収集、タンパク質表面に対する糖の配置の様子にもとづいた分類を行った。“タンパク質表面に対する糖の配置の様子”とは、単糖がタンパク質の表面に突き刺さったように結合している様子、又は、張り付いたように結合している様子を指し、単糖の C2,C3,C5,O5 原子で形成される基準平面に対する法線ベクトルとタンパク質の糖結合表面に対する法線ベクトルの内積からそのパターンを判別する。そして、二糖リガンド結合部位についても同様の分類を行い、単糖リガンド結合部位の分類結果と比較。二糖リガンド結合部位が単糖リガンド結合部位の線形結合で表すことができるか検討した。

C.Shionyu-Mitsuyama,K.Kinoshita,A.Kidera,H.Nakamura : Structural based analysis and classification of protein-carbohydrate interactions