1P349

人工核酸を用いた生きた細胞内における特定の mRNA のリアルタイムイメージング

○岡部 弘基¹、池田 壽文^{2,3}、原田 慶恵³、船津 高志^{1,4} (¹東大・院薬、²阪大院薬、³都臨床研、⁴JST・CREST)

mRNA の一生には、転写、プロセッシング、輸送、局在、分解等の過程があり、複雑かつ多様な遺伝子発現を可能としている。しかし、mRNA を直接観察する方法が確立されていないため、mRNA の一生には不明な点が多い。そこで、生きた細胞内における特定の mRNA の可視化技術を確立することを本研究の目的とした。特定の mRNA を可視化するために、蛍光標識したアンチセンス人工核酸を細胞内にてハイブリダイズさせる方法を考案した。さらに、未結合のプロープ由来の蛍光と区別するために、2 種類の人工核酸をそれぞれ異なる蛍光団で標識し、蛍光共鳴エネルギー移動 (FRET) 法を用いて検出する。人工核酸としては、核酸分解酵素耐性であり、細胞内で安定な 2' O-methyl RNA とペプチド核酸 (PNA) を選択した。

まず、蛍光分光光度計を用いて、Cy3、Cy5 で蛍光標識した核酸プロープと、*in vitro* 転写系により合成した Human *c-fos* mRNA との配列特異的な結合を確認した。その結合速度定数は $172,000 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (2' O-methyl RNA)、 $33,600 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (PNA) であり、プロープと mRNA との結合は速やかに進行した。続いて、*c-fos* mRNA を発現している Cos 7 細胞の細胞質にマイクロインジェクションによりアンチセンス人工核酸を導入し、その動態を蛍光顕微鏡で観察した。ターゲット mRNA を発現している細胞では、プロープの大部分が細胞質に分布するのに対し、ターゲット mRNA を発現していない細胞、もしくはセンス配列を有するプロープを導入した細胞では、プロープは速やかに (5 分程度) 核内へと移行し、細胞質への分布は観察されなかった。このことから、細胞質に導入した核酸プロープがターゲット mRNA を認識し、結合することが示された。現在、2 種の人工核酸を細胞に導入し、ターゲット mRNA と結合した 2 種のプロープ間の FRET により生じる mRNA 特異的な蛍光の観察を行なっている。

K. Okabe, H. Ikeda, Y. Harada and T. Funatsu : Real time imaging of specific messenger RNA in a living cell using artificial antisense nucleic acids

1P350

Quantum dot を用いたマウス腫瘍内での in vivo 単粒子イメージング

○多田 寛¹、樋口 秀男²、渡邊 朋信²、大内 憲明¹ (¹東北大院・医学系・腫瘍外科、²東北大・先進医工)

蛍光ナノ粒子 (Quantum dot: Qdot) は、従来の有機系蛍光色素と比較して、蛍光強度が高く、耐光性が強い。そのため、Qdot は生体内イメージング、特に生体内での単粒子イメージングに用いるプロープとして適している。今回我々は、抗癌剤を結合させた Qdot を、3 次元生体内顕微鏡を用いて、担癌マウスの生体腫瘍内で追跡することに成功した。Qdot に、転移性乳癌に対する抗癌剤である抗 HER2 モノクローナル抗体 (トラスツズマブ) を約 3 分子結合させ、in vivo での生体内単分子イメージングに用いた。Qdot-抗体を静脈注射後、HER2 発現乳癌担癌マウスの腫瘍内に集積した様子を、背部皮膚窓 (DSFC) を通してイメージングできた。さらに、生体腫瘍内での Qdot-抗体の生体内単分子追跡を行った。結果、Qdot-抗体の生体腫瘍内での、腫瘍間質内の数 $\mu \text{ m/sec}$ 程度の早い動き、及び細胞内をモーター蛋白に乗っていると思われる 600 nm/sec 程度の動きを追跡することができた。本研究は、in vivo で蛍光法による高分解能での薬物追跡の方法が可能であることを示唆する。

H.Tada, H.Higuchi, T.Watanabe, N.Ohuchi : In vivo single molecule tracking with Quantum dot in mouse tumor model