2P185

ダイニン分子内の微小管結合部位とATP加水分解部位との間のストークコイルドコイルを介した情報伝達機構

○昆 隆英、今村 謙士、大倉 玲子、須藤 和夫（東大院・総合文化・生命環境）

細胞骨格系の分子モーターは運動活性を発揮する際に、ATP加水分解部位と細胞骨格結合部位との間で、双方向の情報伝達を必要とする。ATP加水分解サイクルの情報は細胞骨格結合部位に伝わり、細胞骨格に対する親和性を変化させることでその結合解離を引き起こす。一方、細胞骨格との結合情報はATP加水分解部位に伝わり、その加水分解活性を数倍から100倍程度活性化させる。これらの分子内情報伝達メカニズムを明らかにすることは、分子モーターの運動機構を理解する上で重要な課題のひとつである。

微小管モーターのひとつであるダイニンの場合、ATP加水分解部位はAAAリングから形成される頭部内に存在する。一方、微小管結合部位はストークヘッドと呼ばれる球状構造内にあり、この部位は頭部から飛び出した、10-15 nmの長さのコイルドコイル（ストークコイルドコイル）の先端に位置する。ATP加水分解部位と微小管結合部位との間の情報伝達はこのストークコイルドコイルを介して伝えられると考えられているが、そのメカニズムは不明である。

本研究では、双方向の情報伝達メカニズムを明らかにする目的でストークヘッドあるいはストークコイルドコイルへの変異導入を行った。その結果、微小管非存在下にも関わらず、ATP加水分解活性が活性化状態にある一連の変異ダイニンの作成に成功した。本会ではこれらの変異ダイニンの生化学的特性をもとに、ストークコイルドコイルを介した情報伝達、特に微小管結合部位からATP加水分解部位への伝達メカニズムがどのようなものであるかを議論したい。

T.Kon, K.Imamura, R.Ohkura and K.Sutoh : The dissection of intramolecular communications between the ATPase site and microtubule-binding site in the dynein heavy chain

2P187

SH 1ヘリックスに変異を導入したミオシンの運動機能解析

○花元 大輔¹、岩井 草介¹、須藤 和夫²、茶園 茂¹（¹日本大・文理・物理生命システム、²東大院・総合文化・生命環境）

ヒトの非筋細胞のミオシンIIでは、SH1ヘリックスに存在する705番目のアルギニンがヒスチジンに置換されたR705H変異は遺伝性難聴DFNA17の原因となることが知られている。そこでその分子機構を解明するために、細胞性粘菌ミオシンIIの相当するアルギニンをヒスチジンに置換したR689H変異体を、遺伝子工学を用いて作成し、運動機能の解析を行った。滑り運動活性を測定したところ、野生型に比べてR689HはFアクチンの滑り運動速度が約4分の1に低下することが判明した。S1を用いてATP加水分解活性を測定したところ、S1単独のATP加水分解活性はR689Hの方が野生型よりも高いが、アクチン存在下ではほぼ同程度であった。モータードメインの構造変化を検出するために、モータードメインのN末端とC末端にそれぞれGFPとBFPを融合し、2種類の蛍光色素間の蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)を調べた。ヌクレオチドの無い状態とATPを加えた状態のFRET効率を測定したところ、野生型に比べてR689HのFRET効率の変化は少なく、R689Hの方が構造変化の距離が減少している可能性が示唆された。以上の結果から、SH 1ヘリックスの変異体であるR689Hは運動速度が低下し、その原因はモータードメインの構造変化が影響を受けたためと考えられる。

現在はR689H変異体についてより詳細な機能解析を行うために、光ピンセット法による1分子力学応答測定を行っている。

D. Hanamoto, S. Iwai, K. Sutoh and S. Chaen : Characterization of an SH1 helix mutant of myosin.

2P186

細胞質ダイニンと微小管との親和性のヌクレオチド依存的変化

○今村 謙士、昆 隆英、大倉 玲子、須藤 和夫（東大院・総合文化・生命環境）

モータータンパク質は、ヌクレオチド依存的に細胞骨格との結合の親和性を変化させる。ミオシンやキネシンでは、様々なヌクレオチド条件下で細胞骨格との親和性を定量的に測定する研究がこれまでに数多く報告されているが、ダイニンに関してはこの種の実験はほとんど行われてこなかった。

我々は今回、モーター活性を保持していることが確認されているC末端側380 kDa細胞質ダイニン重鎖に緑色蛍光タンパク質(GFP)を融合したコンストラクトを用いて、微小管結合実験を行った。細胞質ダイニン重鎖は全長では二量体を形成するが、このコンストラクトは単量体で発現するため、ダイニンと微小管の結合を一对一の相互作用に単純化して観測することが可能である。様々な微小管濃度において、ダイニンと微小管の共沈降を行い、微小管と結合したダイニンの割合を求めた。この際、GFPの蛍光強度測定によりダイニンを定量したため、精度の高いデータを得ることが出来た。

この結果、細胞質ダイニンと微小管との結合の解離定数(K_d)は、ヌクレオチド非存在下において 10^{-7} M程度と求められた。これまで、ダイニンの微小管結合部位とされるストークヘッドとその周辺のみからなるコンストラクトなどを用いた実験から、ダイニンと微小管の結合の解離定数は 10^{-6} M程度であると考えられていた(Mizuno et al, *EMBO J.*, 2004; Gibbons et al., *J. Biol. Chem.*, 2005)が、活性を保持したモータードメインを持つコンストラクトでは、両者の結合はこの10倍も強いものとなることが示された。また、様々なヌクレオチドやヌクレオチドアナログを用いることで、ヌクレオチド依存的な親和性の変化を検出することに成功した。

K Imamura, T Kon, R Ohkura, K Sutoh : Nucleotide dependent microtubule affinity of cytoplasmic dynein.

2P188

ミオシン変異体G680Vとアクチンの協同的結合

○黒木 梨加¹、上田 太郎²、徳楽 清孝¹（¹都城工業高等専門学校物質工学専攻科、²産業総合研究所・ジーン）

ミオシンのATP分解サイクルにおいて、A・M・ADP・Pi状態は力発生に重要であることが報告されている(Dantzigら, 1992)。また、ミオシン変異体G680VはPiの解離を遅らせ、A・M・ADP・Pi状態を安定化することが明らかにされている(Uyedaら, 2002)。我々は、G680VとF-アクチンの結合を観察することで、力発生に関連したA・M・ADP・Pi状態のミオシンがアクチンとどのように相互作用するのか明らかにできると考えた。

本実験ではローダミンで蛍光ラベルしたF-アクチンに、YFPを融合したHMM(G680V)が結合する様子を蛍光顕微鏡で観察した。ATP存在および非存在下で、Ca、Mgアクチンに対する結合の様子をそれぞれ観察した。全ての条件において、少量のG680Vをアクチンに加えるとフィラメント全体に一樣に結合するのではなく、局所的に点状に結合する様子が観察された。この結果より、G680Vはアクチンフィラメントと協同的に結合することが明らかになった。しかしATP存在、非存在によって、またCa、Mgアクチンによって、それぞれの結合の様子に多少の違いが見られた。

その違いを明確にするため、アクチンに結合しているG680Vの蛍光の範囲とその強度を測定し、G680Vの協同的結合を定量化した。まず、ATP非存在下においてG680Vの量を減らしていったところ、G680Vの結合範囲は狭くなっていき、蛍光強度も徐々に弱くなっていった。次に、アクチンとG680Vの濃度の割合を一定にし、ATPの濃度を上げていったところ、ATP濃度が高くなるにつれて結合範囲は狭くなっていったが、蛍光強度はほとんど変わらなかった。また、Ca、Mgアクチンへの結合を比較してみたところ、結合範囲は同様に狭くなっていったが、Caアクチンの方がMgアクチンよりも蛍光強度が強かった。

R.kurogi,T.Ueda and K.Tokuraku : Cooperative binding between myosin mutant G680V and actin