2P237

コラーゲン会合体の高次構造変化に起因する好中球細胞の新奇な運動性

○國井 沙織¹、齋藤 卓也^{1,2}、柴野 三智子³、森本 康一² (¹近畿大院・生物理工・生物工、²近畿大・生物理工・生物工、³近畿大・医・細菌)

【目的】好中球は細菌等の感染初期に活躍する単球で、コラーゲナーゼ(MMP-8)を産生する。一方、コラーゲンは細胞接着に関与するRGD配列などをもち、細胞の増殖・分化に関係することが知られる。これまでに好中球はコラーゲンに接着することが報告されているが、コラーゲン高次構造との相互作用には不明な点が多い。本研究の目的は、アクチニダインでテロペプチド領域を加水分解したニワトリI型コラーゲン会合体と好中球との相互作用を走査型電子顕微鏡(SEM)等で解析することである。【方法】常法により、ニワトリ皮部からペプシン処理にてアテロコラーゲン(A)、アクチニダイン処理にてAP-コラーゲン(B)を得た[1]。AまたはBをセルディスクに塗布して風乾後、マウス腹腔から調製した好中球(10% FCS含有MEM培地)を播種して培養した。培養後、セルディスクをグルタルアルデヒドで固定し、好中球の形態と運動性を位相差顕微鏡とSEMにて観察した。また抗コラーゲン抗体を用いた免疫電子顕微鏡法により、AとB会合体の抗原性の差異を観察した。【結果】好中球は、Aの線維会合体とBの3次元微細網目構造の会合体で著しく異なる接着挙動を示し、細胞移動性に変化が現れた。また、好中球は時間経過とともにB会合体内部に深く浸潤し、2時間後には細胞表面の特定が困難であった。さらに興味深いことに、好中球はB会合体内部で互いに集まる傾向が観察された。免疫電子顕微鏡法により、抗コラーゲン抗体の反応性はAとB会合体で異なり、分子レベルでの構造変化が示された。よって、コラーゲン会合体の線維構造から3次元微細網目構造への変異は、コラーゲン会合体の分子レベルでの構造変化のみならず好中球のコラーゲン会合体への相互作用に大きな影響を及ぼすことが示された。[1] Morimoto, et al., Biosci. Biotechnol. Biochem, 68 (2004).

S.Kunii, T.Saito, M.Shibano and K.Morimoto : Microscopic analysis of neutrophil cell mobility in novel 3-D network collagen matrix lacking telopeptides

2P239

飽和/不飽和リン脂質二分子膜に結合した副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の固体NMRによる立体構造の解析

○明賀 博樹¹、西村 勝之¹、成田 宗外¹、吉良 敦史²、内藤 晶¹ (¹横浜国大院・工、²(株)アルバック・技術開発部)

ACTHは生体膜と相互作用して特定の両親媒性構造を形成し、引き続く目的受容体に結合する膜触媒モデルが提唱されている。本研究ではACTHの生理活性機構を解明するために、モデル生体膜と結合したACTH(1-24)[SYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYP](各動物種間で共通)の立体構造の解析を行った。モデル生体膜として飽和リン脂質DMPG/DMPC膜を使用した。また他の臓器に比べヒト副腎皮質に多く存在するPIの寄与を調べるため不飽和リン脂質を用いたPI/POPC膜、さらにより生体条件に近づけたヒト副腎皮質のリン脂質混合比を用いて混合膜リポソームを調製した。これらのリポソームにペプチドを再構成させ¹³C NMR測定を行った。

DMPG/DMPC膜- DMPG/DMPC モル比を変化させると、Phe7では常にランダムコイルをとったが、Val13ではDMPG割合の減少につれβストランドからαヘリックスへの構造変化が見られた。DMPG100%において疎水性の強いC、N両末端はランダムコイルであった。親水性の強い中間部はGly14以降で4~5残基のαヘリックスをとり、酸性脂質膜と静電相互作用で強く結合していることがわかった。DMPG:DMPC=1:3においてACTH(1-24)の中間部は親水性アミノ酸・疎水性アミノ酸の両方を含む長いαヘリックス構造をとり、混合脂質膜と静電相互作用・疎水性相互作用の両方で強く結合し、安定化していると考えられる。

PI/POPC膜・ヒト副腎皮質混合膜-飽和膜よりペプチドのC、N両末端はランダムコイルをとることが確認されたため、中間部の構造を解析した。発表では飽和膜との構造や結合様式の相違を詳しく検討する。

H.Myoga, K.Nishimura, M.Narita, A.Kira and A.Naito : Conformational analysis of adrenocorticotrophic hormone (ACTH) bound to un- and saturated phospholipid bilayers using solid state NMR

2P238

細胞性粘菌の多細胞化に伴うエネルギー代謝量の変化

○野村 竜文¹、日臺 智明²、中林 誠一郎¹ (¹埼玉大理、²日大医)

【序論】単細胞生物から始まった進化の歴史の中で、多細胞生物の出現は大きな変換点であることに間違いはないが、どのような理由により多細胞化が起きたのかは未だ解明されていない。細胞性粘菌の一種であるDictyostelium discoideumは、通常アメーバ様の単細胞生物としてバクテリアを捕食して分裂・増殖を行っている。しかし、飢餓状態に陥ると細胞同士が集合し始め多細胞体である集合体を形成する。本研究では、飢餓にさらされた細胞にとって多細胞化がエネルギー代謝上どのような意味を持つかを解明することを目的とする。エネルギー代謝の変化を定量的に解析するため、ATP生成に携わる電子伝達体のNADH活性量を測定した。【方法】テトラゾリウム塩(桃色)はミトコンドリア内のNADHとの選択的な酸化還元反応により、ホルマザン色素(黄色)へ還元されることから、各種動物由来の細胞系において、培養容器内の総NADH脱水素酵素活性の半定量に使用される。そこで、我々はこの測定法を用いて、粘菌の飢餓直後から集合体形成までのNADH活性量の変化を観察した。【結果】飢餓直後の粘菌はアメーバ状であるが、時間の経過とともに形を細長く変化させてから、集合体を形成する。これに伴いNADH活性量は、細胞が細長い形状に変化するあたりから減少し始め集合体に近づくにつれてさらに減少した。また細胞密度を小さくして集合体形成を阻害すると、NADH活性量の減少が抑制されることがわかった。このことから、多細胞化は個々の粘菌のNADH活性量を減少させている可能性がある。また、他の測定法からもエネルギー代謝の変化を検証したので、本大会では併せて報告したい。

T.Nomura, C.Hidai and S.Nakabayashi : The changes of energy metabolism during the formation of multicellular structure in Dictyostelium discoideum

2P240

固体NMRを用いたモデル生体脂質膜に結合したα-MSH主鎖の立体構造解析

○武田 英輔¹、西村 勝之¹、吉良 敦史²、内藤 晶¹ (¹横浜国大院・工、²(株)アルバック・技術開発部)

メラニン細胞刺激ホルモンα-MSHは13アミノ酸残基からなるペプチドであり、色素細胞刺激作用を持つことが知られている。これら生理活性ペプチドホルモンは生体膜に結合して特定の構造をとり、拡散して膜タンパク質受容体に結合する膜触媒モデルが提唱されている。本研究は固体NMRによりα-MSHとリン脂質二重膜の相互作用およびリン脂質結合状態でのα-MSHの立体構造を解析し、α-MSHの生理作用機構を明らかにすることを目的として行った。7残基目のPheを[¹³C]標識したα-MSHを固相法で合成し、逆相HPLCにより精製した。α-MSHと混合比の異なる5種類のDMPC/DMPG混合脂質を1:20のモル比で、100 mM NaCl、20 mM pH7.5 Tris緩衝液を用い水比率(V/W)95%のリポソームの調製をした。CMX Infinity400固体NMR分光器を用いて³¹P 静止および¹³C DD MAS-NMR測定を行った。QCM法より、DMPC:DMPG=3:1の脂質膜においてα-MSHは結合定数に極大値を持つことが判明した。³¹P-NMR測定より、相転移点以下でDMPC:DMPG=1:0膜およびDMPC:DMPG=0:1膜で等方成分が観測され、膜分断の可能性が示唆された。¹³C-NMR測定の等方化学シフト値の考察から、DMPC:DMPG=1:0、0:1両膜に結合した状態ではランダムコイル状態であることが判明した。一方、DMPC:DMPG=3:1混合膜試料ではα-ヘリックスの信号のみが、DMPC:DMPG=1:1混合膜試料ではα-ヘリックスとランダムコイルを示す信号が共存していることが観測された。

E.Takeda, K.Nishimura, A.Kira and A.Naito : Conformational analysis of alpha-MSH bound to phospholipids bilayers using solid state NMR