3P265

コルチコステロンがマウス脳海馬におけるカルシウム信号に与える影響 (III)

○小山内 裕美¹、堀 史雄¹、荒川 齊仙¹、小松崎 良将¹、川戸 佳²、斎藤 稔¹ (¹ 日大院・総合基礎科学・相関理化学、² 東大院・総合文化・広域科学)

我々はこれまでにマウスの海馬スライスを用い、コルチコステロン (CORT) が CA1 領域において NMDA 刺激による細胞内 Ca^{2+} 流入を急性的に抑制することを示した (第 41 回年会講演予稿集 B862)。しかしながら、この Ca^{2+} 流入が NMDA 受容体を介した直接的なものであるか、または電位依存性 Ca^{2+} チャネルを介した間接的なものであるのか、そして CORT がどちらの Ca^{2+} 流入成分に影響を与えるかを明らかにすることはできなかった。本研究ではこれらの点を明らかにする為、nicardipine で電位依存性 Ca^{2+} チャネルを阻害した上で細胞内 Ca^{2+} 流入に対する CORT の影響を調べた。実験には 7 週齢の ddY クリーンマウスより調整した厚さ 300 μm の海馬スライスを用いた。このスライスを 30 分間 CORT でインキュベーションした後、1 mM の NMDA で刺激した時の細胞内 Ca^{2+} 信号を Fura-2/AM を用いた Ca^{2+} イメージングで測定した。その際、測定 20 分前から nicardipine でインキュベーションすることにより電位依存性 Ca^{2+} チャネルを阻害しておいた。結果として、CA1 領域では control (CORT・nicardipine インキュベーション無し) と比較して、nicardipine により電位依存性 Ca^{2+} チャネルを阻害した場合には Ca^{2+} 信号が約 40% 減少した。このことから、CA1 領域では NMDA 刺激による細胞内 Ca^{2+} 流入の約 6 割が NMDA 受容体を介する直接的なものであることが分かった。次に nicardipine により電位依存性 Ca^{2+} チャネルを阻害した上で、細胞内 Ca^{2+} 流入に対する CORT (1.0 μM) の影響を調べたところ、 Ca^{2+} 信号が約 20% 増加した。このことから、CORT は NMDA 受容体を介する細胞内 Ca^{2+} 流入をむしろ増加させることが分かった。そして、細胞内 Ca^{2+} 流入に対する CORT の抑制作用は、電位依存性 Ca^{2+} チャネルへの作用によるものであることが示唆された。

H.Osanai, F.Hori, Y.Arakawa, Y.Komatsuzaki, S.Kawato and M.Saito : Acute effect of corticosterone on *N*-methyl-D-aspartate receptor-mediated Ca^{2+} elevation in mouse hippocampal slices

3P267

女性ホルモンは海馬神経細胞スパイン形態を変化させる

○釣木澤 朋和^{1,2}、田辺 伸聡^{1,2}、三橋 賢司^{1,3}、川戸 佳^{1,2,3} (¹ 東大院・総合文化・広域科学、² 科技団・CREST、³ 東大院・理学系)

海馬神経細胞において樹上突起およびスパインの新規形成・伸縮等の形態変化は神経間ネットワークの発生・維持に密接な関わりを持っていると考えられている。海馬 CA1 錐体神経細胞では長期増強が発生すると CA1 領域錐体神経細胞のスパイン密度が増加する事が明らかにされている。性ホルモンである testosterone や estradiol は末梢器官だけでなく、脳内で新規に合成される事が川戸研究室の研究で明らかにされつつある。さらに、estradiol は CA1 で長期抑圧効果に影響を及ぼすことも電気生理学的研究により明らかにされている。そこで私は estradiol による急性の効果に着目し、estradiol 投与後 2 時間以内に発生する神経細胞の形態変化を測定した。薬理刺激をした海馬スライスを固定し、その後蛍光物質 Lucifer Yellow を注入して単一神経細胞解析した。その結果、CA1 領域では、細長いタイプのスパイン密度が増加することがわかった。また、この形態変化は NMDA 受容体を介していることも阻害実験により分かった。以上より、estradiol は細いタイプのスパイン密度を急性的に (2 時間以内に) 増加させることで、シナプス可塑性を調節していると考えられる。

T.Tsurugizawa, N.Tanabe, K.Mitsuhashi, S.Kawato : Female hormone changes the morphology of spines on hippocampal neurons

3P266

ラット海馬シナプスにおけるエストロゲン受容体の局在解析

○向井 秀夫^{1,2}、村上 元¹、小南 思郎³、William Janssen⁴、John Morrison⁴、川戸 佳^{1,2} (¹CREST・科学技術振興機構、² 東大院・総合文化・広域科学、³ 広島大学・総合科学部、⁴ Mount Sinai School of Medicine)

【目的】環境ホルモンの記憶・学習に与える効果はエストロゲンの作用経路を攪乱して起きるという可能性が考えられている。エストロゲンは記憶・学習の中核である海馬の構造・機能に効果を及ぼすことが知られているが、主要な受容体の一つであるエストロゲン受容体 α (ER α) タンパク質の海馬における分布に関しては現在まで一致を見ていない。我々は新規に作成した抗 ER α 抗体を用い、1 2 週齢オスウィスターラットラット海馬における ER α の分布をウェスタンブロットと光学顕微鏡・電子顕微鏡による免疫組織化学で調べた。【結果と考察】従来用いられてきた抗体と異なり、新規に作成した抗 ER α 抗体 RC-19 は 67kDa の全長 ER α をラット海馬で認識することがウェスタンブロットより明らかになった。さらに海馬を超遠心分画によって核・PSD・細胞質画分等に分画調製した結果、ER α は PSD (Post Synaptic Density) 画分に局在を示すことが明らかになった。また 4 %パラホルムアルデヒド液で灌流固定した後、20 μm 厚の全脳凍結切片を作成し RC-19 を用いて免疫組織化学を行った結果、免疫組織化学反応は CA3、CA1 の錐体神経細胞、歯状回の顆粒細胞で層状に見られ、CA3 がやや強い染色を示した。これは従来の知見と異なる結果であり、海馬において ER α がインターニューロンのみならず多くの神経細胞で発現していることを示す。さらに核のみならず細胞体・樹状突起、シナプスにも受容体が存在していることを発見した。ウェスタンブロットの結果を考え合わせると、エストロゲンはシナプス後部に局在する ER α を通じてシナプス伝達を修飾していることが示唆される。

H.Mukai, G.Murakami, S.Kominami, W.G.M.Janssen, J.H.Morrison, and S.Kawato : Analysis of synaptic localization of estrogen receptor in the rat hippocampus

3P268

アクチビン A は海馬で樹状突起スパインを調節する

○三橋 賢司¹、向井 秀夫³、北條 泰嗣³、浅島 誠²、福井 彰雅²、川戸 佳^{2,3} (¹ 東大院・理学系・物理、² 東大院・総合文化・広域、³ 科技機構・CREST)

アクチビン A は、TGF β スーパーファミリーに属する細胞の成長分化因子である。哺乳類においては性ホルモンとして知られ、視床下部-脳下垂体-性腺系で調節作用を担っている。記憶中枢である海馬においても、アクチビン mRNA の存在が確認されているが、その高次脳機能における役割は全く分かっていない。本研究では、アクチビンの神経スパインに対する影響を調べた。ここで、スパインとは、神経シナプスの後細胞であり、短期記憶の貯蔵庫と考えられる部位である。

実験にはラット海馬の急性スライスを用いた。アクチビンの効果を調べる部位は、電気生理学の実験などでよく研究されている CA1 領域の放射層とした。海馬スライスに 10 ng/mL のアクチビン を 2 時間作用させた後、単一神経細胞に蛍光色素 Lucifer Yellow を注入してその形態を可視化し、樹状突起やスパインのトレースングを行って、スパインの形態変化を定量的に測定した。その結果、CA1 領域の放射層では、アクチビンの投与によって、全スパイン密度が 1.07 spines/ μm から、1.44 spines/ μm へと増加した。スパインの形態を詳しく調べたところ、増加していたのは thin タイプスパインと呼ばれる未成熟型の細長いスパインであった。この増加は、アクチビンの阻害剤であるフォリスタチンの同時投与によって、完全に抑制された。以上の結果から、アクチビンが海馬 CA1 領域の放射層でスパインを新生させ、シナプスとして働かせる部位を増加させることが示唆された。

我々は、本研究に付随してスパインの自動検出・計数システムの開発を進めており、これまでのところ良好な結果を得ている。

K. Mitsuhashi, H. Mukai, Y. Hojo, M. Asashima, A. Fukui, S. Kawato : Activin A modulates dendritic spines in rat hippocampus