解説

粗視化生体分子シミュレーション法

高田彰二 京都大学大学院理学研究科生物物理学教室

Towards cellular-scale structural modeling, multiscale biomolecular simulation is gaining much attention. Here, I review methodological aspects of coarse-grained (CG) biomolecular simulations. I begin with conceptual argument of coarse graining for proteins where the idea behind Gō models is discussed. Then, statistical physics and theories of coarse graining are described. I then exemplify a class of CG models for proteins, nucleic acids, and lipids, where about 10 non-hydrogen atoms are grouped into one CG particles. Finally, I discuss three sources of speeding up by coarse graining.

coarse-grained models / molecular dynamics simulations / biomolecules / Gō models

1.

はじめに

分子動力学 (Molecular Dynamics: MD) シミュレーションは、生体分子の構造・動態を分析する手法として、今日、重要な役割を担っている。そこでの基本は、全原子を明示的に扱った「全原子 (All-Atom: AA) モデル」である。スーパーコンピュータ「富岳」が稼働し始めた今日、その適用範囲は著しく拡大した。しかし生命現象は分子、細胞、個体レベルにわたり階層的であり、AA モデルによって解析できない範囲もまた膨大である。その場合、対象系の規模に応じてモデルを粗視化する「マルチスケールモデリング」が求められる。近年、様々な階層のシミュレーションが人気を博している。本稿では、粗視化の概念から始めて、粗視化の基礎理論、全原子モデルから約 1 桁粒度を落とした粗視化 (Coarse-Grained: CG) モデルを解説する。ここでは粗視化シミュレーションの方法論に焦点を絞り、具体的な適用例は参考文献に譲る。

2.

生体分子の物性と粗視化

物理・化学の世界における至高の粗視化モデルといえば、理想気体モデルとイジングモデルが挙げられるであろう。簡潔で、それでいて対象とする物性の本質を見事に捉えている。逆に、粗視化モデルを真に有益なものにするためには、対象の基礎的物性をよく理解し、それをうまく捉えることが鍵となる。

蛋白質の基礎的物性として、a) 生理的条件下にお

いて、多くの蛋白質はそのアミノ酸配列によって一意的に決まる 3 次元構造 (天然構造) に自発的に折れたたまる (フォールディングすること、b) 非生理的条件下では、蛋白質は変性する (アンフォールディングすること、c) フォールディング・アンフォールディング遷移は、相転移様の協同性を示すこと、が挙げられる。また、X 線結晶構造解析等の構造生物学研究や蛋白質工学研究から、d) 天然構造において、 α ヘリックスや β シートの 2 次構造安定性、アミノ酸側鎖同士の静電相互作用、ファンデルワールス相互作用等の効果が絶妙に実現されていること、e) それらはそれぞれの蛋白質固有のアミノ酸配列によるところが大きいことがよく知られている。ランダムなアミノ酸配列をもつポリペプチドはこのような物性を示さない。従って、これら蛋白質の基礎的物性は、進化の所産として獲得されたそのアミノ酸配列にコードされ、実現されている。

郷信広らは、1970 年代に蛋白質フォールディングの格子モデルを初めて提案し、モンテカルロ (Monte Carlo: MC) シミュレーションによって、そのモデル蛋白質のフォールディング反応を研究した^{1),2)}。その中で、仮定した天然構造において接触しているアミノ酸対にだけ特異的に引力が働き、それ以外のアミノ酸対には引力が働かない、という強い特異的相互作用 (今日、郷モデルと呼ばれるモデル^{3),4)}) を導入すると、そのモデル蛋白質が上記の基本的物性 a) ~ c) をもちうることを示した。これらシミュレーションからの知見と、構造生物学的知見 d), e) とを合わせて、

郷信広は「蛋白質は、進化の所産として、天然構造においてその局所構造と非局所相互作用（i.e., 配列上離れたアミノ酸間の相互作用）の両方を整合的に安定にするようなアミノ酸配列をもっている」と考え、これを蛋白質の整合性原理と名付けた。80年代後半、Wolynesらはこの考え方を発展させて、統計物理学的理論（エネルギー地形理論）を構築し、フォールディング能が、天然構造の特異的相互作用と非天然構造における非特異的相互作用（フラストレーション）との比によることを見出した（フラストレーション最小の原理と呼ぶ）⁵⁾。さらにOnuchicらは、格子モデルシミュレーションから、変性状態から天然状態へ至る状態ネットワークの構造に着目し、変性状態から天然状態に向けて、エネルギー地形が滑らかにスロープを描き、漏斗（ファネル）状になっているときにフォールディング能が高いことを見出した。

翻って、与えられた天然構造をエネルギー最小とし、それに向かってファネル状のエネルギー地形をもつ簡潔な粗視化モデルが郷モデルである、と言うことができる。1970年代の郷自身による郷モデルは格子型MCシミュレーションモデルであったが、2000年になってClementi, Onuchicらはこの考え方を非格子型モデル（アミノ酸1個を1つの粗視化粒子（1CG粒子）で表現し、粒子をCaの位置に置くCa粗視化モデル）に拡張した。これにより、実験的に天然構造既知の蛋白質についてフォールディングのMD計算が可能になった。つまり、原理を探索するためのコンセプトモデルとしてだけでなく、個々の蛋白質のフォールディング機構を調べる粗視化シミュレーションモデルとして有益なものとなった。

それでは、優れた蛋白質の粗視化モデルを作るためには、郷モデルのように天然構造情報を明示的に利用して特異性を導入することは避けて通れないのだろうか。そもそも、郷モデルの仮定「所与の天然構造に含まれるアミノ酸対にだけ引力が働き、それ以外のアミノ酸対の引力は無視する」という考え方は一見して物理化学とは相いれない。従って、避けられるのならば避けたいであろう。ここで、多くの蛋白質3次元構造においてアミノ酸側鎖の原子同士が絶妙な相互作用でその安定性に寄与していることを思い出してみよう。ところが、Ca粗視化モデルにはそもそも側鎖構造が無い。粒度を落として粗視化した結果、側鎖の原子同士の相互作用を物理化学的に精度よく再現することは不可能である。本来特異性を生み出している原因である側鎖を削ぎ落としてしまった結果、失われた特異性を補うのが、郷モデルの役割である。従って、蛋白質

のモデル化において、アミノ酸側鎖を粗視化することと、（部分的にでも）郷モデルを導入することは、表裏一体の関係にあると考えられる。

次に、蛋白質以外の生体分子に目を向けてみよう。RNAは、一本鎖が折れたたまって特定の3次元構造をとる場合が多く、その特性は蛋白質と相通じるものである。従って、郷モデルの考え方はRNAの粗視化モデルにも適用されている。しかし、塩基は基本的に4種類であり、その相互作用の多様性もアミノ酸程ではないと感じられるかもしれない。一方で、RNAのフォールディングには2価イオン Mg^{2+} の特異的な配位が必須であり、その粗視化モデルはより繊細なものとなる。2本鎖DNAは、基本的にB型2重らせん構造をとる。これを天然構造とする郷モデルも提案されているが、構造の多様性が低いため、相互作用を物理化学的に表現することが可能であり、郷モデルは必ずしも必要でない。生体膜成分であるリン脂質は、生理活性な状態で流動性をもち、定まった天然構造をもたないため、郷モデルの考え方と相いれない。実際、リン脂質に対して郷モデルが適用されることはない。

3.

粗視化の方法論

基礎理論

原子レベルの複雑分子系には、平衡状態への緩和が速い自由度と遅い自由度が混在しているものとしよう。そのうち、遅い時間スケールの動態に興味がある。その時、速い緩和を起こす自由度のみについて熱平均をとれば、遅い時間スケールの動態を扱う方程式を得ることができる。つまり複雑な問題を遅い自由度だけの問題に簡約化する。このような手続きを、統計力学において一般に「粗視化」と呼ぶ。また、遅い自由度のみで書かれるモデルを粗視化（CG）モデルと呼ぶ。

ここではまず、全原子モデルのポテンシャルエネルギー関数（力場ともいう） $v(\mathbf{r})$ から粗視化ポテンシャル $V_{CG}(\mathbf{R})$ を、形式的に導こう。系全体のAA座標 $\mathbf{r}_\mu$ ($\mu = 1, 2, \dots, n$)を、簡単のため $\mathbf{r}$ と書く。このAA座標の関数として遅い緩和を示す自由度（CG粒子）の座標 $\mathbf{R}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$)を、次のように定義する：

$$\mathbf{R}_i = \hat{\mathbf{R}}_i(\mathbf{r})$$

以下CG座標 $\mathbf{R}_i$ をまとめて $\mathbf{R}$ と書く（図1）。

粗視化ポテンシャル $V_{CG}(\mathbf{R})$ は、 $v(\mathbf{r})$ で与えられた系を速い緩和を起こす自由度のみについて熱平均する

図 1
粗視化ポテンシャル構築の流れ.

ことで定義できる⁶⁾.

$$e^{-V_{CG}(\mathbf{R})/k_B T} = \int d\mathbf{r} e^{-v(\mathbf{r})/k_B T} \delta(\hat{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) - \mathbf{R}) \quad (1)$$

ここで k_B はボルツマン定数, T は温度である. δ はディラックの δ 関数であり, 全原子モデル $\mathbf{r}$ の配置空間のうち, 粗視化モデル座標 $\mathbf{R}$ に対応するところだけを切り取ることを表す. これは近似ではなく, $V_{CG}(\mathbf{R})$ は完全な粗視化ポテンシャルである. もとの複雑分子系の自由エネルギー F は,

$$\exp(-F/k_B T) = \int d\mathbf{R} \exp(-V_{CG}(\mathbf{R})/k_B T) \quad (2)$$

によって, “近似なし” に求められる. しかし現実的には, $V_{CG}(\mathbf{R})$ は, もとの複雑分子系のポテンシャル $v(\mathbf{r})$ よりも複雑で取り扱いづらいものとなる. 例えば, 原子レベルの AA 力場が 2 体関数のみで表せる系であっても, 完全な粗視化ポテンシャルには超多体相関が入り込むことになる.

初期モデル構築

より実践的にはどうすればよいであろうか. (1) 式と (2) 式から導ける次式が有用である.

$$P(\mathbf{R}) = \langle \delta(\hat{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) - \mathbf{R}) \rangle_{AA} = e^{-V_{CG}(\mathbf{R})/k_B T + F/k_B T}$$

ここで, $P(\mathbf{R})$ は, 粗視化モデルの等温平衡確率分布である. $\langle \rangle_{AA}$ は, AA モデルによる熱平均を表す. これから, 粗視化ポテンシャルが ($\mathbf{R}$ に依存しない項 F を除いて) 求められる;

$$V_{CG}(\mathbf{R}) = -k_B T \ln P(\mathbf{R}) + F$$

仮に, もとの複雑分子系の AA モデルを用いて, 等温で十分に長い時間の AAMD シミュレーションが実行できれば, そこから平衡確率分布 $P(\mathbf{R})$ を求めることができ, 直ちに粗視化ポテンシャル (1) が得られる. しかし実際には, (1) 式は超多次元ポテンシャルであり, それを簡単に表現することが難しいばかりでなく, AAMD シミュレーションからそれを精度よく求めることは困難である.

近似的に確率分布 $P(\mathbf{R})$ が独立な成分の確率分布の積で書けるとみなすと, 全体の粗視化ポテンシャルは, 「各成分の確率分布から求められるその成分についての粗視化ポテンシャル」の和で表せる. 実際には分子系の内部座標 Ω の運動はしばしば互いに相関しているため, 「独立な成分の確率分布の積」というのは近似でしかない. また, 座標 $\mathbf{R}$ から分子系の内部座標 Ω に変換する際に変数変換に起因するヤコビアンが必要になる.

$$P(\mathbf{R}) d\mathbf{R} = P(\mathbf{R}) \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \Omega} d\Omega = \left[P_\Omega(\Omega) \frac{\partial \Omega}{\partial \mathbf{R}} \right] d\mathbf{R} = P_\Omega(\Omega) d\Omega$$

角括弧部分の対数の $-k_B T$ 倍が内部座標による粗視化ポテンシャルである. 例えば, 粒子間距離の成分 R_{ij} では,

$$P(\mathbf{R}) = P_\Omega(\Omega) \frac{\partial \Omega}{\partial \mathbf{R}} = \cdots P_{R_{ij}}(R_{ij}) \cdots R_{ij}^{-2}$$

ここで, 右辺では各成分の独立性を仮定している. これの対数をとってから, 定数項を除いて, 粒子間距離に関する粗視化ポテンシャルを

$$V_{R_{ij}}(R_{ij}) = -k_B T \ln \frac{P_{R_{ij}}(R_{ij})}{4\pi R_{ij}^2} \quad (3)$$

と書くことができる. 例えば, 水溶液中の蛋白質の Ca 粗視化モデルを考える. 近接しているアミノ酸対距離には相互作用が働くものと期待できる. そこで, そのような対について AAMD シミュレーションから粒子間距離の平衡確率分布 $P_{R_{ij}}^{AA}(R_{ij})$ を求めることができれば, (3) 式から, アミノ酸対距離に働く粗視化ポテンシャルを得ることができる. このように, 等温

条件の確率分布からポテンシャルを導くことを一般に逆ボルツマン法と呼ぶ。

以上、粗視化ポテンシャルを AAMD シミュレーションデータから導く、という設定で説明したが、同じ方法は、実験データを用いて粗視化ポテンシャルを構築するためにも適用できる。すなわち、何らかの実験で観測される確率分布が等温平衡分布からのものであると仮定すれば、それを AAMD の分布の代わりに用いることができる。特に蛋白質については豊富な立体構造情報があり、これらを用いて粗視化ポテンシャルを作ることは 1970 年代から行われてきた。知識依拠ポテンシャルとか統計ポテンシャルなどと呼ばれる^{7),8)}。宮澤-Jernigan 接触ポテンシャルはその古典である。

最後に、実際的には、以上の系統的な導出を経ずに、対象分子の物理化学的先験知識に基づいて粗視化ポテンシャルを書き下す場合も多い。

繰り返しモデル最適化

以上の方法で初期の粗視化ポテンシャルが得られる。しかしこれはモデル開発の出発点であって完成形ではない。得られた粗視化ポテンシャルを用いて CGMD を行いその結果をもとに粗視化ポテンシャルを改良する、という操作を繰り返す。

例えば逆ボルツマン法の場合、逆ボルツマン法のポテンシャル $V_{Rij}(R_{ij})$ を用いて等温過程の CGMD を行ったとしよう。そこで得られた CG 構造アンサンブルから改めて分布 $P_{Rij}^{CG}(R_{ij})$ を求めたとしよう。これは、ポテンシャルを作るもとデータ $P_{Rij}^{AA}(R_{ij})$ と一致するだろうか？ 残念ながら一般にそうはならない。そのずれは主に、厳密には多次元相関した粗視化ポテンシャルを、独立な項の和に近似してしまったことからくる。「ずれ」が無視できない場合には、例えば繰り返し逆ボルツマン法⁹⁾と呼ばれる方法を用いる：

$$V^{newCG}(\mathbf{R}) = V^{oldCG}(\mathbf{R}) + ck_B T \ln \frac{P^{oldCGMD}(\mathbf{R})}{P^{ref}(\mathbf{R})} \quad (4)$$

ここで $0 < c < 1$ は、収束性を決める経験的なパラメータである。 $V^{oldCG}(\mathbf{R})$ を用いて CGMD を行い、得られた CG 構造アンサンブルから確率分布 $P^{oldCGMD}(\mathbf{R})$ を求める。これを (AAMD または実験データから得られる) 参照分布 $P^{ref}(\mathbf{R})$ と比較して (4) 式を用いて新しい粗視化ポテンシャル $V^{newCG}(\mathbf{R})$ を構築する。これにより次世代の CGMD を行う。これを $P^{oldCGMD}(\mathbf{R})$ と $P^{ref}(\mathbf{R})$ の差異が無視できるまで繰り返す。詳細は原著に譲るが、他にも、力マッチング法、ゆらぎマッ

チング法、分子繰り込み群的アプローチ等の繰り返し改良の方法論がある。

4.

動態シミュレーション法

次にシミュレーション法に簡単に触れる。基本的な方法は、MD シミュレーションと MC シミュレーションに大別される。MD 法の長所は、MC 法と対比して、時間発展を解析できること、1 ステップで全粒子が（棄却されることなく）動くこと等である。逆に MC 法の長所は、ポテンシャルの微分（力）計算を必要としないこと、離散的な変数の動きや人為的な構造変化をモデル化できる自由度があること等である。混雑環境の分子シミュレーションでは、MD 法の長所が勝るであろう。

AAMD の基礎方程式（ニュートンの運動方程式等）から速い緩和を起こす自由度を熱平均することで CGMD の基礎方程式を導くことができる。しかし実際には、通常もっと素朴な方法を使う。よく使われているのは Langevin 方程式

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{R}_i}{dt^2} = - \frac{\partial V_{total}}{\partial \mathbf{R}_i} - m_i \gamma_i \frac{d \mathbf{R}_i}{dt} + \boldsymbol{\xi}_i$$

である。ここで、 m_i は CG 粒子の質量、 γ_i は摩擦係数、 $\boldsymbol{\xi}_i$ はランダム力をそれぞれ表す。ランダム力は、ガウスの、白色ノイズであるとする。流体力学的効果は、高分子において無視できない寄与をもつが、高い計算コストのために、実際にはほとんどいつも無視されている。動力学の取り扱いがかなり素朴で荒いものであっても、それは自由エネルギー論には影響がない、ということが荒い取扱いを許す根拠である。

MD 法と MC 法のハイブリッドシミュレーションも、時折、用いられる。蛋白質の分子構造変化を追跡するために MD 法を用いつつ、離散的な状態変化を MC 法によって行う^{10),11)}。後者として、(脱) プロトン化、リガンド結合（解離）、化学反応等、通常の MD 法では扱えない現象を経験的にモデル化することができる点が魅力である。

5.

蛋白質、核酸、リン脂質の粗視化モデル

次に、具体的な粗視化生体分子モデルを見ていこう。粗視化分子モデルには唯一性はなく、対象系・目的に応じて多様な粒度の粗視化が可能である。粒度の細かいものから順に、全原子の中で非極性の水素原子を省略するだけの融合原子モデル、約 4 つの非水素原

図2 粗視化生体分子モデルの例. 約10個の非水素原子を1CG粒子とする粗視化モデルの例.

子を1CG粒子とする MARTINI 等のモデル, 約10個の非水素原子を1CG粒子とする C α 粗視化モデル等のモデル, 1蛋白質を1CG粒子とするモデルなど多岐にわたる. また, 溶媒分子を明示的に扱う陽溶媒モデルと, 扱わない陰溶媒モデルに分けることもできる. 網羅の説明は困難なので, ここでは約10個の非水素原子を1CG粒子とする陰溶媒モデルを紹介する(図2).

蛋白質モデル

まず Tirion によって最初に提案された非常に簡単な弾性ネットワークモデルから始めよう¹²⁾. ポテンシャルエネルギーは

$$V = \sum_{ij \text{ s.t. } R_{ij} < R_c} k(R_{ij} - R_{ij,0})^2$$

で定義される. ここで, R_{ij} は CG 粒子 i と j の距離である. 通常, アミノ酸の α 炭素の位置に CG 粒子をおく. $R_{ij,0}$ は, 対応する粒子間の天然構造における距離を表すパラメータである. k はばね定数であり, 簡単のためアミノ酸番号によらない一つの値をとる. 和は, 天然構造で物理的に“接触している”と判定できるアミノ酸対についてとる. 例えば, アミノ酸間の距離がある閾値 R_c 以下であるものを接触と定義する. 弾性ネットワークモデルは, その極端な簡単さにもかかわらず, 天然構造周りのゆらぎや巨大分子の構造変化をよく予測することができ, 広く応用されてきた. 前節で述べた粗視化の方法論によって, ばね定数 k をより精密に決定する等の多くの拡張もなされている.

弾性ネットワークモデルの一つの明らかな限界は, その調和性のために, 局所的あるいは大域的なアンフォールディングを伴うような大振幅振動を扱えないことである. それを解決したのが, 先述の Clementi らの非格子型郷モデルである¹³⁾. そのポテンシャル関数は

$$V = \sum_i k_b (R_{i,i+1} - R_{i,i+1,0})^2 + \sum_i k_\theta (\theta_i - \theta_{i,0})^2 + \sum_i \left\{ k_{\varphi_1} [1 - \cos(\varphi_i - \varphi_{i,0})] + k_{\varphi_3} [1 - \cos 3(\varphi_i - \varphi_{i,0})] \right\} + \sum_{i < j-3}^{\text{天然接触対}} \varepsilon_{Go} \left[5 \left(\frac{R_{ij,0}}{R_{ij}} \right)^{12} - 6 \left(\frac{R_{ij,0}}{R_{ij}} \right)^{10} \right] + \sum_{i < j-3}^{\text{非天然接触対}} \varepsilon_v \left(\frac{d}{R_{ij}} \right)^{12}$$

で与えられる. ここで, 第1項は隣接するアミノ酸間の結合長 $R_{i,i+1}$ についてのばね, 第2項は, 二つの結合の間のなす結合角 θ_i についての調和ポテンシャル, 第3項は, 二面角 φ_i についてのポテンシャルである. 第4項(これが郷モデルの鍵)は, 鎖に沿わない(非局所)接触アミノ酸対を安定化するレナードジョーンズ型の相互作用である. ここでの和は, 天然構造で接触しているアミノ酸対(天然接触対)に対してだけとる. 最後の項は, 一般的な近距離斥力を表す. また式の中で, 添字0がつくものは定数であり, 対応する変数の天然構造における値をとる. k や ε はそのエネルギー項の強さを表す定数である.

Clementi らの郷モデルは蛋白質フォールディングから機能的シミュレーションまで幅広く適用されてきた. このモデルの一つの欠点は, 鎖に沿った局所ポテンシャル(結合角と2面角の項)が天然構造からのずれに対して硬すぎることである. 実際には, 結合角と2面角はそれぞれ α ヘリックスと β ストランドに対応する2つの安定点をもつ2重井戸型をとるべきである. この欠点を解消するために私たちは, 繰り返し逆ボルツマン法を用いて flexible local potential を構築した¹⁴⁾.

$$V_{loc}^{fp}(\mathbf{R}) = -k_B T \sum_i \ln \frac{P_\theta(\theta_i | i)}{\sin \theta_i} - k_B T \sum_i \ln P_\varphi(\varphi_i | i)$$

蛋白質立体構造データベース protein data bank から, 多くのループ構造断片データを取り, それが等温平衡分布からの分布であると仮定して粗視化ポテンシャルとした. ここで, $P_\theta(\theta_i | i)$ ($P_\varphi(\varphi_i | i)$) は, i 番目のアミノ酸の種類に依存する結合角(2面角)の確率分布である.

Clementi らの郷モデルのもう一つの限界は, 接触エ

エネルギー係数 ε_{Go} などが部位によらず一つの定数になっていることである。疎水性の強いアミノ酸:トリプトファンとロイシンが接触するときの引力と、微かに疎水的なアミノ酸:アラニン同士の引力が同じわけではない。これらを区別するために、私たちは、接触エネルギー係数が、アミノ酸対の種類、その対のおかれた環境によって異なる値をとれるように拡張した。この一般化と、先の flexible local potential を組み合わせ、私たちは AICG2+ モデルを構築した¹⁵⁾。

核酸モデル

DNA についての粗視化モデルの開発は遅れていたが、約 10 年前から開発が進んだ。現在、有用で、よく使われているモデルとして、3SPN モデルと OxDNA モデルがある。前者は 1 ヌクレオチドを 3 粒子で、後者は 2 粒子で表現する。ここでは、de Pablo らが開発を続けてきた 3SPN モデルの最新版 3SPN.2C について紹介する¹⁶⁾。

3SPN.2C モデルは 1 ヌクレオチドあたり 3 か所:糖、リン酸、塩基にそれぞれ CG 粒子をおく (図 2)。この粒度は、蛋白質をアミノ酸あたり 1 個の粒子で表すことと相性が良い。ポテンシャルエネルギーは、

$$V_{\text{3SPN.2C}} = V_{\text{bond}} + V_{\text{angle}} + V_{\text{dihedral}} + V_{\text{bstk}} + V_{\text{cstk}} + V_{\text{bp}} + V_{\text{cle}} + V_{\text{ev}}$$

と書ける。結合長と結合角についてのばね (第 1, 2 項)、2 面角について B 型 DNA の角度を安定にするポテンシャル (第 3 項) に加えて、5 つの非局所相互作用 (第 4 から 8 項) を含む。特に重要なものが 3 つの塩基-塩基間の相互作用である:塩基スタッキング (第 4 項、同じ鎖の隣の塩基との相互作用)、交差スタッキング (第 5 項、相補鎖の一つずれた塩基との相互作用)、塩基対 (第 6 項、相補鎖の塩基対をつくる相互作用) である。加えて、リン酸同士の静電相互作用 (第 7 項) と全粒子間の一般的な近距離斥力 (第 8 項) を含む。

DNA を粗視化するときの難しさの一つは、平板状の構造をもつ塩基を質点で近似することにある。質点間の距離では平板の向きを表現できない。それを解決するための 3SPN.2C モデルの特徴は、この 3 つの塩基間相互作用が、塩基間の距離だけではなく、関連する粒子のなす角度にも依存することである。例えば、交差スタッキング相互作用 V_{bstk} は、次の形をとる;

$$V_{\text{bstk}} = \sum (u_{ij}^{\text{rep}}(r_{ij}) + f_{\text{filter}} u_{ij}^{\text{attr}}(r_{ij}))$$

ここで、 $u_{ij}^{\text{rep}}(r_{ij})$ と $u_{ij}^{\text{attr}}(r_{ij})$ は、Morse 関数の斥力部分と引力部分とをそれぞれ表す。引力部分には係数 f_{filter} が掛かっており、このフィルターが関連する角度に依存する。具体的には、 f_{filter} は、角度が B 型 2 重らせんの理想的値に近いときに $f_{\text{filter}} = 1$ をとり、一定以上ずれると小さくなるような関数である。このような角度依存性は、相互作用の敏感性を上げる。角度が、B 型 2 重らせんのときの値に近いときは強い引力をもつが、そこからずれたときに、より鋭敏に弱くなる。角度依存性は塩基の向きを表現するための手法である。この導入により、2 重らせん構造と一本鎖 DNA の物性の差異を初めてうまく表現できるようになった。

3SPN.2C モデルには、数十にものぼるパラメータが含まれる。これらは、系統的なマルチスケール技法を用いることなく、経験的にチューニングされた。DNA についての多くの実験データ (配列依存の 2 重らせん DNA の融解温度、2 重らせん DNA の曲げ弾性、一本鎖 DNA の物性等) を参照し、CGMD の結果がそれらとつじつまが合うように繰り返しモデル最適化を行い、チューニングされた。非常に泥臭い方法である。試行錯誤によるため大変な時間と労力がかかる。しかし、実際に得られた粗視化モデルは、有益で、広く適用されるものになった。粗視化モデルをチューニングする際に、よりミクロな原子モデルシミュレーションに依拠するのではなく、複数の実験データを駆動力としてチューニングを行って成功した、ということ注目すべきである。

RNA について、詳しく述べないが、Thirumalai らが同じ粒度の粗視化モデルを開発、応用している¹⁷⁾。

リン脂質モデル

リン脂質の粗視化モデルは、MARTINI を始めとして約 4 つの非水素原子を 1CG 粒子とするモデルが最も成功してきた¹⁸⁾ (詳しくは最近の総説を参照のこと¹⁹⁾)。約 10 原子を 1CG 粒子とする粗視化モデルは少ない。その難しさの一因は、生体膜のリン脂質が 2 本のアルキル鎖をもつものに対して、この粒度ではそれを 1 本でモデル化せざるを得ないことにある。我々は最近、典型的なリン脂質 POPC を 5 粒子で近似したモデルを提案した (図 2)²⁰⁾。3 粒子が疎水的なアルキル鎖を、2 粒子が親水的な頭部をそれぞれ表現する。分子内のポテンシャルは逆ボルツマン法により導出した。一方、分子間相互作用については、繰り返しモデル最適化によりパラメータを決定した。

以上、紹介してきた約 10 個の非水素原子を 1CG 粒子とする粗視化モデル群は、粗視化生体分子シミュ

レータ CafeMol (www.cafemol.org)²¹⁾ に実装されており、誰でも利用可能である。適用例の参考文献を挙げる^{11), 22)-24)}。

6. 逆マッピング

粗視化モデルで CGMD によって生体分子複合系の動態解析を行った後、得られた CG モデルから AA モデルに戻す (逆マッピング) ことができるか否か、は応用上、重要な問題である。戻すことができれば、CGMD で得られた荒削りな構造を出発点として、AAMD によって構造精密化を行うことができるからである。本稿で紹介した CG モデルは、AA モデルとは粒度にかなり隔たりがあるものの、逆マッピングが可能である。 α 炭素のみで表現された蛋白質 CG モデルから AA モデルへ逆マッピングする方法は、すでに幾つか提案されている。Kolinski らが開発した BBQ では、ターゲット蛋白質 CG 構造の 4 つの連続する α 炭素座標とよく重なり合う 4 アミノ酸構造断片を protein data bank 中の AA 構造から探索し、よく合致した AA 構造断片を CG 構造と入れ替える²⁵⁾。これを N 末端から順番に繰り返して、主鎖全長の AA モデルを得る。側鎖については、例えば Dunbrack らの SCWRL がこの問題の業界標準ソフトウェアである²⁶⁾。

7. 粗視化シミュレーションによる高速化

粗視化するメリットはひとえに「高速化」である。高速化には少なくとも 3 つの要因が関わる²⁷⁾。

1 つ目は、1 回の力計算の高速化である。大きな系の場合 MD の計算時間は概ね、力計算の時間で決まる。粒子数が十分大きいとき、力計算の計算量は粒子数に比例する。例として、3, 4 節で説明した CGMD を陽溶媒の AAMD と比較した場合、まず溶媒分子を陽に含めないことによって粒子数は 10 分の 1 に、また分子の粒度も約 10 分の 1 になる。合わせると、粒子数、そして力計算の計算量も、100 分の 1 程度になる。

2 つ目は、MD に用いる時間ステップ幅の増大である。時間ステップ幅は、分子系に含まれる 1 番短い特徴時間によって決まる。通常それは結合長の伸縮である。AAMD の場合、一番軽い水素原子とその隣の原子との共有結合長の伸縮が最も速い (振動周期は 10 fs のオーダー)。粒度が約 10 分の 1 の CGMD では、CG 粒子の質量は水素原子の 100 倍程度である。従って、質量の 1/2 乗に比例する振動周期は概ね 10 倍程

度長くなる。

3 つ目は、動力学の変化による効果である。大規模生体分子系の計算では、Langevin 方程式の摩擦係数 γ について、水の粘性係数と粒子の大きさを Einstein-Stokes の式に代入して得られるものより小さいものにする事が多い。摩擦係数が小さければ大規模な運動は加速される。例えば摩擦係数を 1/100 倍にスケールすると、大規模運動は 100 倍程度速くなる。さらに、粒度が変わることによりエネルギー地形の細かい凸凹が消えて、よりスムーズになりそれが動力学を加速するという要因がある。これについては、定量化は難しいものの、経験的には 1-100 倍程度、動力学が高速化される。

合算すると、粒度が約 10 分の 1 の陰溶媒 CGMD は陽溶媒 AAMD と比較して、実質的に (やや問題を含む点も含めて) 10^5 - 10^7 倍程度高速化される。粗視化による高速化は、粒度の差異をみたときの読者の第一印象よりも大きいのではないだろうか。

8. 今後の展望

生体分子の CGMD シミュレーションは、AAMD に比べ格段に高速であり、大規模系・長時間現象への適用に優位性がある。シグナル伝達系やクロマチンなど多分子が絡み合う大規模生体系、アミロイド線維形成や液液相分離等の複雑生命現象など、細胞スケールあるいは多細胞系への適用に向けて今後益々 CGMD の必要性は増していくものと思われる。

CGMD は高速であるが、その有効性は粗視化モデル (ポテンシャル) の精度に強く依存する。全原子モデルからのボトムアップアプローチおよび実験データを用いたモデル最適化による相互作用モデルの精密化が重要である。特に、蛋白質、核酸、リン脂質それぞれに開発されてきたモデル間の統合は残された大きな課題である。また、より粒度の粗い 1 蛋白質を 1CG 粒子とするメソスコピックモデルの開発は勃興期であり、これからの挑戦的課題である。

文 献

- 1) Taketomi, H. *et al.* (1975) *Int. J. Pep. Prot. Res.* **7**, 445-459. DOI: 10.1111/j.1399-3011.1975.tb02465.x.
- 2) Gō, N. (1983) *Annu. Rev. Biophys. Bioeng.* **12**, 183-210. DOI: 10.1146/annurev.bb.12.060183.001151.
- 3) 高田彰二 (2010) *生物物理* **50**, 158-159, DOI: 10.2142/biophys.50.158.
- 4) Takada, S. (2019) *Biophys. Physicobiol.* **16**, 248-255. DOI: 10.2142/biophysico.16.0_248.
- 5) Bryngelson, J. D. *et al.* (1995) *Proteins* **21**, 167-195. DOI:

- 10.1002/prot.340210302.
- 6) Noid, W. C. *et al.* (2008) *J. Chem. Phys.* **128**, 244114. DOI: 10.1063/1.2938860.
 - 7) Miyazawa, S., Jernigan, R. L. (1985) *Macromolecules* **18**, 534-552. DOI: 10.1021/ma00145a039.
 - 8) Shen, M., Sali, A. (2009) *Protein Sci.* **15**, 2507-2524. DOI: 10.1110/ps.062416606.
 - 9) Reith, D. *et al.* (2003) *J. Comput. Chem.* **24**, 1624-1636. DOI: 10.1002/jcc.10307.
 - 10) Okazaki, K., Takada, S. (2008) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **105**, 11182-11187. DOI: 10.1073/pnas.0802524105.
 - 11) Kubo, S. *et al.* (2020) *Sci. Rep.* **10**, 8225. DOI: 10.1038/s41598-020-65004-1.
 - 12) Tirion, M. M. (1996) *Phys. Rev. Lett.* **77**, 1905-1908. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.1905.
 - 13) Clementi, C. *et al.* (2000) *J. Mol. Biol.* **298**, 937-953. DOI: 10.1006/jmbi.2000.3693.
 - 14) Terakawa, T., Takada, S. (2011) *Biophys. J.* **101**, 1450-1458. DOI: 10.1016/j.bpj.2011.08.003.
 - 15) Li, W. *et al.* (2012) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **109**, 17789-17794. DOI: 10.1073/pnas.1201807109.
 - 16) Freeman, G. S. *et al.* (2014) *J. Chem. Phys.* **141**, 165103. DOI: 10.1063/1.4897649.
 - 17) Denesyuk, N. A. *et al.* (2018) *J. Phys. Chem. B* **122**, 11860-11867. DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b08142.
 - 18) Marrink, S. J., Tieleman, D. P. (2013) *Chem. Soc. Rev.* **42**, 6801-6822. DOI: 10.1039/C3CS60093A.
 - 19) 篠田 渉 (2020) *生物物理* **60**, 157-161. DOI: 10.2142/biophys.60.157.
 - 20) Ugarte, D. R., Takada, S. (2020) *bioRxiv*, DOI: 10.1101/2020.09.20.305060.
 - 21) Kenzaki, H. *et al.* (2011) *J. Chem. Theor. Comp.* **7**, 1979-1989. DOI: 10.1021/ct2001045.
 - 22) Brandani, G. B. *et al.* (2018) *Nucleic Acids Res.* **46**, 2788-2801. DOI: 10.1093/nar/gky158.
 - 23) Kanada, R. *et al.* (2018) *Biophys. J.* **116**, 2285-2295. DOI: 10.1016/j.bpj.2019.05.007.
 - 24) Tan, C., Takada, S. (2020) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **117**, 20586-20596. DOI: 10.1073/pnas.2005500117.
 - 25) Gront, D. *et al.* (2007) *J. Comput. Chem.* **28**, 1593-1597. DOI: 10.1002/jcc.20624.
 - 26) Canutescu, A. A. *et al.* (2003) *Protein Sci.* **12**, 2001-2014. DOI: 10.1110/ps.03154503.
 - 27) Takada, S. (2012) *Curr. Opin. Struct. Biol.* **22**, 130-137. DOI: 10.1016/j.sbi.2012.01.010.

高田彰二

高田彰二 (たかだ しょうじ)

京都大学大学院理学研究科教授

京都大学大学院理学研究科化学専攻修士修了, 神戸大学理学部講師, 助教授を経て現職. 総合研究大学院大学博士 (理学)

研究内容: 計算生物物理学

連絡先: 〒 606-8502 京都市左京区北白川追分町 1-1

E-mail: takada@biophys.kyoto-u.ac.jp

URL: <http://theory.biophys.kyoto-u.ac.jp>