酵母におけるビタミンの膜輸送

京都府立医科大学
生化学教室 岩島 昭夫

はじめに

近年細胞機能において生体膜の演ずる多くの役割が注目されるようになり、中でも膜を介する物質の能動輸送については、微生物殊に大腸菌をはじめとする原核細胞を用いて多くの研究が行なわれ、一定の成果があげられてきているが、酵母を含め下等な真核生物についてのこの分野の仕事は、これらの生物が実験素材として種々の利点をもつ割合に少なく、えられた知見も限られたものである。

本稿ではかつて酵母の未知増殖因子として見いだされ、その増殖や代謝生理と密接な関係をもつビタミンの中から、筆者らの携ってきたビタミン B_1 をはじめ、二三のB群ビタミンについて、酵母における膜輸送の問題をとり扱った最近の研究を紹介し、読者の参考に供したいと思う。

1 ビタミン B_1 (チアミン) の膜輸送

酵母がその培養時にメジウム中のチアミンを細胞内に集積することは、かなり古くから知られて居り¹⁾、たとえば *Kloeckera apiculata* などは菌体乾燥重量の10%にもおよぶチアミンを蓄積しうることが報告されている²⁾。酵母によるこのようなチアミンの異常とも思える多量蓄積の生理的意義については不明であるが、この現象を定量的にとり扱い、その能動輸送としての性質をはじめて報告したのは Suzuki³⁾ である。彼はグルコースの存在下で baker's yeast が、15分の lag time 後チアミンを好氣的又は嫌氣的に細胞内にとり込むことを明らかにし、このとり込みが種々の代謝阻害剤により阻害されることより、代謝エネルギーの供給を必要とする能動的な過程により起こることを示した。一方筆者ら⁴⁾はチアミンのアナログの一つであるアミノチアミンの抗チアミン作用を検討し、この物質が酵母によるチアミンのとり込みを著しく阻害するが、チアミンピロホスホキナーゼに対しては、はるかに弱い阻害しか示さないことから両過程が区別され、チアミンのとり込みに関与するエネルギーが、少

なくとも ATP としてチアミンのピロリン酸化に使われるそれとは異なることを推定した。その後筆者ら⁵⁾は測定法を ^{14}C -チアミンを用いるメンブランフィルター法に変え、あらためて酵母のチアミン輸送系の一般的性質を詳しく検討した。

1. チアミン輸送系の一般的性質

本輸送系はグルコースやエチルアルコールなどをエネルギー源として、至適 pH 4.5, 至適温度 37°C でチアミンを遊離型のまま uphill にとり込み、そのさい細胞内外のチアミンの濃度比はほぼ 10,000 にも達しうる。至適条件でのチアミンに対する K_m は 0.18 μM と測定されたが、輸送系の基質特異性については、ビリチアミンやジメチアリウムなどのチアミンのチアゾール部を修飾したアナログが強い阻害を示し、一方ビリミジン部の修飾体であるオキシチアミンや2-ノルチアミンなどには阻害作用がほとんど認められないことから、チアミン分子のビリミジン部の構造に高い特異性をもつことが示唆された⁵⁾。

2. チアミン輸送変異酵母菌

上記のアナログのうちビリチアミンはチアミンのとり込みを拮抗阻害し、かつチアミンのように酵母細胞内によくとり込まれることが特徴的であるが、とり込まれたビリチアミンはチアミンピロホスホキナーゼに対しても強い阻害を示すので、酵母の培養培地中にビリチアミンが存在すると、増殖が著しく抑制される。筆者ら⁶⁾は市販の圧搾パン酵母から分離した一菌株を親株とし、これをニトロソグアニジン処理して変異を誘起したのち、ビリチアミンを含む合成培地(チアミン欠除)中で培養を繰り返し、その中でほぼ正常に発育しうる2種の耐性変異株 R_1 , R_2 を分離した。これらの変異株はビリチアミンに対して、それぞれ親株の約70倍および1,000倍の耐性を示したが、細胞内チアミン量やチアミンピロホスホキナーゼの性質はいずれも親株と変わらず、耐性が細胞内チアミン代謝系の変化にもとづくものではないことを示した。しかし変異株のビリチアミンのとり込み能は、それぞれ親株の7.0%, 1.3% にまで減少し、さらにチアミンのとり

込みもこれとほぼ並行して著しく低下していることが証明された。したがって酵母のこれらのピリチアミン耐性変異株は、おそらくピリチアミンとチアミンとともに輸送するチアミン輸送系の共通の担体が、遺伝的にそれぞれ部分的およびほぼ完全に欠損したチアミンの輸送変異株であることが推定された。

3. チアミンの膜輸送と細胞エネルギー

筆者ら⁷⁾はさきに酵母におけるチアミンの能動輸送に供給されるエネルギーの性質を明らかにする目的で、酵母細胞が発酵でのみエネルギーを生成する嫌気条件下でのチアミンのとり込みについて検討した。市販の圧搾パン酵母はエネルギー源なしにはほとんどチアミンをとり込まないが、グルコースとともに嫌氣的に予温し、洗滌した細胞はもはやエネルギー源が共存しなくてもチアミンを急速に細胞内にとり込み、その初期速度は予温時間にほぼ比例して上昇する。しかし一旦獲得したとり込みのためのエネルギーは、細胞をグルコースぬきでさらに温置すると間もなく消失する。一方細胞内 ATP レベルは、このようなとり込みのエネルギーの獲得および消失とは無関係にほぼ一定の定常状態を保っているが、予温のさいにモノ沃度酢酸や 2, 4-ジニトロフェノールなどの代謝阻害剤を加えると、細胞内 ATP レベルの低下と並行してチアミンのとり込みも減少した。これらの結果は嫌気条件下でのチアミンのとり込みには、発酵により新たに *de novo* に合成される ATP が必要であることを暗示している。この他短鎖脂肪酸が酵母のチアミンの膜輸送を著しく阻害するが⁵⁾この場合は ATP レベルに対する影響はわずかで、さきの代謝阻害剤でみられたようなとり込み阻害との間に必ずしも相関関係が見いだされなかった。短鎖脂肪酸の中で阻害作用の最も強いカプロン酸には、予温によるとり込みのエネルギーの獲得のみならず、えられたエネルギー状態の消失をも阻害する作用があり、この物質が ATP の生成過程よりむしろ ATP とチアミン輸送系との間のエネルギー共役機構そのものにはたらいっている可能性が示唆された。

4. チアミンの膜輸送の調節

チアミンの膜輸送に直接関与すると考えられる担体は、その量や機能が酵母を培養する条件により変動することが予想されるが、事実酵母のチアミンのとり込み能は増殖培地中のチアミンにより著しく影響をうける⁸⁾。たとえば $0.5 \mu\text{M}$ のチアミンを含む培地中で増殖した酵母の静止菌によるチアミンのとり込みはほぼ完全に抑えられているが、一方チアミン非添加で増殖した酵母を、増殖後あらためてチアミンと接触させ細

胞内に負荷しても、未処理の対照に比べチアミンの初期とり込み速度がわずかに減少するにすぎず、このことは酵母が増殖時に培地中に存在するチアミンによって、その輸送にあずかる成分の抑制的な調節をうけることを示唆するものと思われる。

5. チアミンの膜輸送とチアミン結合タンパク

酵母のチアミンの膜輸送に関与する成分は、現在まで単離されてはいないが、筆者らは最近酵母を超音波破碎してえた可溶画分⁸⁾と膜画分⁹⁾にそれぞれ平衡透析法でチアミンを特異的に結合する活性が存在し、もとにとり込みでみられたように培地チアミンにより調節をうけることを見いだした。このうち可溶画分のチアミン結合活性は親株と、透過変異株 R_2 についてほぼ等しいが⁸⁾ R_2 には膜結合性チアミン結合活性がほとんど検出されない。また結合反応でのチアミンに対する K_D やアナログによる特異的な阻害様式についても可溶画分と膜画分の間に差異が認められ、後者の方が *in vivo* での輸送活性をよりよく反映しているようにみえる⁹⁾。今後これらのチアミン結合成分の分離精製と、その担体としての可能性が輸送系への再構成の実験などをもとに追求されるべきであろうと考える。

I ビタミン B_2 (リボフラビン) の膜輸送

微生物におけるリボフラビンの膜透過にかんする研究は従来ほとんどみられなかったが、最近になって *Saccharomyces cerevisiae* のリボフラビン要求性変異株にリボフラビンに特異的な輸送系の存在することが、Perlら¹⁰⁾により明らかにされた。すなわち本酵母によるリボフラビンのとり込みは、高い pH 依存性 (至適 pH = 7.5) と温度依存性 (活性化エネルギー = $23,100 \text{ cal/mol}$) を示し、リボフラビンによる飽和性 ($K_m = 15 \mu\text{M}$) が認められる。また K^+ や Rb^+ などの一価陽イオンが透過を促進し、リボフラビンのリビチル基の側鎖を置換した多くのリボフラビンアナログは拮抗阻害した。これらの性質は本酵母におけるリボフラビンの透過が、このビタミンに特異的な担体を介して行なわれることを示し、また定常状態において細胞内外に遊離型リボフラビンについて数倍の濃度勾配を生じること、この過程が能動輸送型式で起こることを示唆しているが、とり込みのエネルギー依存性は証明されていない。たとえばグルコースの添加はとり込みには無影響で、むしろ細胞内リボフラビンのメジウムへの排出を促進する。このような排出の過程は糖に対する依存性のみならず K_m ($48 \mu\text{M}$)、活性化エネルギー ($6,650 \text{ cal/mol}$) および至適 pH (5.0)

などいくつかの性質においてとり込みにはたらく系との間に違いが認められるので、本酵母にはリボフラビンのとり込みと排出の輸送系が存在し、それぞれ別の担体が機能することが推定されている。両輸送系の活性はこの他酵母の種類やその増殖期によっても異なり、例えばとり込みの有意義な活性はリボフラビン要求株を嫌氣的に培養して、その対数増殖初期から中期にかけて主に認められるのに対し、排出の方はとり込みがほとんど認められない野生株や圧搾パン酵母にも観察され、増殖期による活性の変動も認められない。要求株において菌のリボフラビンのとり込み能が発現する対数増殖初期にシクロヘキシミドを培地に加えると、リボフラビンのとり込み系の活性の増加がそれ以後停止するが、培地からグルコースやリボフラビンをぬいて増殖を抑制しても活性にはほとんど変化がみられないことから、シクロヘキシミドの作用点が酵母によるリボフラビンの輸送担体の *de novo* の合成過程にあること、一方リボフラビンを自由に生合成しうる野性株や、要求株でも増殖後期におけるとり込み能の欠陥は、これらの菌の比較的高い細胞内フラビンヌクレオチドレベルが、担体の合成に対して抑制的にはたらくことによると推定している¹⁰⁾。

Ⅲ ビタミン B₆ (ピリドキシン,

ピリドキサル, ピリドキサミン) の膜輸送

Saccharomyces carlsbergensis 4228 は一般にビタミン B₆ の微生物定量に用いられる酵母の一菌種であるが、本酵母の静止菌がビタミン B₆ を能動輸送することが知られ¹¹⁾、Shanes ら¹²⁾ によると増殖に至適な条件である pH 4.5, 30°C でピリドキシンのとり込みの Km は 0.36 μ M である。とり込みの pH 依存性をしらべると興味あることに pH 3.5 と 6.0 に 2 つの至適 pH が認められ、それぞれの pH で透過するビタミン B₆ の型が異なる。たとえばピリドキサルは主に pH 3.5 の系により、またピリドキサミンは pH 6.0 の系によりとり込まれるが、ピリドキシンは両系によりよくとり込まれ、一方ピリドキサルリン酸などのリン酸エステルは両系とも輸送しえない。これらの事実は普通 pH 4.5 付近での本酵母の増殖維持に、しばしばピリドキサミンがピリドキサルに比べ活性が低いことや、ピリドキサルリン酸が増殖因子として代用しえないことをよく説明する。また pH 3.5 でのピリドキシンの輸送が 10 ~ 50 mM の K⁺ により数倍促進され、pH 6.0 でも若干促進をうける傾向がみられるが、とり込みに K⁺ の共存が必要であるかどうかについて

は K⁺ 欠乏酵母での実験で確かめられていないので結論は下せない。

とり込まれたピリドキシンはその細胞内レベルが一定量に達すると overshoot する。ピリドキシンの排出機構の解析はその細胞内における代謝や再吸収が関係するため複雑ではあるが、メジウムのピリドキシンやそのアナログとの exchange により排出が促進されるので、この場合も担体が関与すると考えられ、その機構についても overshoot の間および前後においてピリドキシンの初期とり込み速度に変化が認められないにもかかわらず、exchange により測定した排出速度は overshoot の間および後で、むしろ明らかに促進している。細胞内ピリドキシンレベルの上昇が排出系を何らかの機構で活性化すると考えられる。このようなピリドキシンの overshoot は環境条件の変化する中で、酵母が細胞内ビタミン B₆ を一定濃度に維持するための速かな調節機構としてはたらいっているであろう。

酵母のピリドキシンの輸送系でみられる変わった性質に高温におけるその挙動がある。すなわちとり込みは 40°C まで能動的過程に典型的で 30°C ~ 35°C で最高となるが、それ以上の温度では一旦低下したとり込みの活性が 50°C で再び上昇し第 2 の至適温度を示す。排出の方は 50°C でも活撥に起こるので、この温度ではとり込みそのものが活性化されていることを示している。また 50°C でも 30°C の場合のように pH 3.5 と 6.0 に 2 つの至適 pH をもつことには変わりはないが、3 種のビタミン B₆ に対する親和性は約 $\frac{1}{2}$ に低下し、overshoot もわずかしき起こらない。*S. carlsbergensis* の膜脂質は 30°C で相転移を起こすが¹²⁾、このことが高温でのビタミン B₆ の輸送系のこのような性質の変化に影響を与えているものと思われる。酵母細胞にビタミン B₆ を供給する上に、至適 pH と基質特異性を異にする 2 つの輸送系が存在し、ともに上述のような二相性の温度依存性を示すことは、両系の間に共通の要素が介在することを示唆しているのかもしれない。

Ⅳ ビオチンの膜輸送

S. cerevisiae におけるビオチンの輸送系の性質をはじめて明らかにしたのは Rogers ら¹³⁾ で、彼らは先ず細胞内に存在する遊離および結合型ビオチンを、それぞれ熱水と 6 N 硫酸で抽出して分別定量することにより、細胞外ビオチンが温度 (至適温度 = 30°C)、pH (至適 pH = 4.0) およびエネルギーに依存してそのままの形でとり込まれ、細胞内外に遊離型ビオチ

ンとして大きな濃度勾配を生じることを証明した。とり込みの K_m は $0.323 \mu M$ でホモビオチン、デスチオビオチンなどの多くのビオチンアナログによる阻害がみられた。酵母によるこのようなビオチンのとり込みは生菌のみならず osmotic shock 処理した細胞や、細胞壁を除いたスフェロプラストについてもしらべられたが¹⁴⁾、いずれも生菌とほぼ同様のとり込みを示し、ビオチンの輸送に必要な成分が細胞膜に固く結合して存在し、conventional な方法では容易にはなれないことを示した。一方 Becker ら¹⁵⁾ は反応性にとむビオチンのエステル誘導体の中で、biotinyl-p-nitrophenyl ester (BNP) が酵母のビオチン輸送系を不活性化することを見だし、この不活性化が $0.1 \mu M$ 程度の低い濃度で経時的に起こり、またアミノ酸や糖の輸送とは無関係でビオチンの輸送系に特異的であること、さらにこの阻害が遊離型ビオチンの共存で部分的に除かれることなどを明らかにしている。一旦不活性化された細胞はチオール化合物で処理するとビオチンのとり込み能を完全に回復するので、BNP が輸送系のある成分に必須の SH 基と共有結合することによりビオチンの輸送を阻害するものと考えられている¹⁶⁾。

Bayer¹⁷⁾ はさらに種々の長さの側鎖をもつ BNP 誘導体を化学的に合成し、それらのビオチン輸送系におよぼす阻害効果をしらべているが、それによると一般に側鎖の短い分子の方が長いものより有効な阻害剤として作用し、中でも BNP が最も効果的で、biotinyl- γ -aminobutyl-p-nitrophenyl ester より側鎖の長い誘導体はビオチンのとり込みをほとんど阻害しない。このような BNP 誘導体による酵母のビオチン輸送系の親和標識法による研究は、今後このビタミンの膜輸送機構を明らかにしてゆく上に新たな手がかりを与えるものと期待してよい。

酵母におけるビオチンの膜輸送の調節には2つの異なった機構がはたっていることが示摘されている。一つは Becker ら¹⁸⁾ により明らかにされたが、*S. cerevisiae* (JB112) の静止菌にみられる overshoot で、この場合は先のリボフラビンやピリドキシンとは異なり、排出が温度や pH に無関係の一次反応にしたがう過程であることが証明された。他方 Cicmanec ら¹⁴⁾ は *S. cerevisiae* (ATCC 9689) のビオチン過剰培地で増殖した細胞によるビオチンのとり込みを、制限培地で増殖したそれと比較したところ、ビオチンに対する K_m には差がないが V_{max} が著しく低下していることをみだした。ビオチン過剰培地でも avidin を同時添加すればとり込み能の低下を防ぐことができるが、¹⁹⁾

細胞をあらかじめシクロヘキシミドで処理した場合には avidin による予防効果は現われず、このことは avidin により細胞外ビオチンが除去されてからビオチンのとり込み能の発現するまでに、細胞によるタンパクの生合成が必要であることを意味している。またこの菌株では細胞内ビオチンプールの上昇が、ビオチンの輸送活性に影響を与えないのでフィードバック阻害はないと考えられ、これらの実験事実をもとにして Cicmanec ら¹⁴⁾ は、ビオチン過剰培地での培養酵母によるビオチンのとり込みの低下の原因は、主にその増殖過程でこのビタミンの輸送系の成分の turnover や生合成が適応的に抑制をうけることによると結論している。

むすび

以上限られた紙面ではあるが、酵母におけるいくつかの B 群ビタミンの膜輸送にかんする最近の知見をまとめてみた。酵母は大部分のビタミンを *de novo* に合成することができるが、一方では環境より多くのビタミンを活撥にとり込む能力もそなえて居り、そのためにそれぞれに特異的な輸送系をもち、独自の調節機構がはたっていると考えてよい。しかしここでとりあげた研究の多くは、酵母におけるビタミンの輸送反応の基本的な性質についての現象面の解析が主であり、エネルギー共役の機序をはじめ膜輸送機構そのものについてえられた知見はきわめて乏しく、未解決の問題が多く残されていると云わねばならない。酵母のもつ厚い細胞壁はしばしば実験に適した細胞膜その他のオルガネラを調製する上で障害となつてはいるが、他方培養をはじめとり扱いの簡便さ、経済性さらに遺伝学的解析が可能であるなど多くの利点もそなえて居り、酵母が今後真核生物の単純なモデル系として、ビタミンをはじめ広く物質の膜輸送の分子機構研究の対象に益々活用され、この分野の進展に役立つことを期待したい。

文 献

- 1) 高田亮平：醸造学誌 11, 563 (1933)
- 2) 川崎近太郎、篠田純男、小野照代：ビタミン, 36, 535 (1967)
- 3) J. Suzuoki: J. Biochem. 42, 27 (1955)
- 4) 岩島昭夫、植松寿樹、増田亨：ビタミン, 34, 490 (1966)
- 5) A. Iwashima, H. Nishino, Y. Nose: Biochim. Biophys. Acta 330, 222 (1973)
- 6) A. Iwashima, Y. Wakabayashi, Y. Nose: Biochim.

- Biophys. Acta 413, 243 (1975)
- 7) A. Iwashima, Y. Nose: Biochim. Biophys. Acta 399, 375 (1975)
- 8) A. Iwashima, Y. Nose: J. Bacteriol. 128, 855 (1976)
- 9) A. Iwashima: 準備中.
- 10) M. Perl, E. B. Kearney, T. P. Singer: J. Biol. Chem. 251, 3221 (1976)
- 11) V. P. Cirrilo: Annu. Rev. Microbiol. 15, 197 (1961)
- 12) B. Shane, E. E. Snell: J. Biol. Chem. 251, 1042 (1976)
- 13) T. O. Rogers, H. C. Lichstein: J. Bacteriol. 100, 557 (1969)
- 14) J. F. Cicmanec, H. C. Lichstein: J. Bacteriol. 119, 718 (1974)
- 15) J. M. Becker, M. Wilchek, E. Katchalski: Proc. Natl. Acad. Sci. 68, 2604 (1971)
- 16) T. Viswanatha, E. Bayer, M. Wilchek: Biochim. Biophys. Acta 401, 152 (1975)
- 17) E. A. Bayer, T. Viswanatha, M. Wilchek: FEBS Letters 60, 309 (1975)
- 18) J. M. Becker, H. C. Lichstein: Biochim. Biophys. Acta 282, 409 (1972)
- 19) T. O. Rogers, H. C. Lichstein: J. Bacteriol. 100, 565 (1969)
- (1977年5月2日受理)

ABSTRACT

Membrane transport of vitamins in yeast

Akio IWASHIMA

Department of Biochemistry, Kyoto Prefectural University of Medicine

General characteristics of the transport of several vitamins such as thiamine, riboflavin, pyridoxine and biotin in yeast are described.

These vitamins were taken up by resting yeast cells and retained against concentration gradients, and their transports were dependent on energy, pH, temperature and also displayed structural specificity and saturation kinetics.

It was shown that yeast cells contain, besides a specific system for the uptake of each vitamin, one for its efflux from the cells. The addition of vitamin such as thiamine, riboflavin, and biotin in the medium appeared to repress the synthesis of their transport components during growth. On the other hand, overshoot observed in the transports of pyridoxine and biotin was considered a fast regulatory mechanism by which cells prevent the accumulation of excessive vitamins.