ウイルス粒子の形態学の当面する諸問題

大阪大学 微生物病研究所 保坂 康弘※

最近、生物学の多くの分野でめざましい進歩がとげられたが、ウイルス粒子の形態学の進歩は、その中でも目立ったものであった。しかし大きな飛躍のあとには、小休止があるのが常であるように、現在それは一つの調整期にあるといってもよいかも知れない。この小論は、最近のウイルス粒子の形態学の進歩のあとをふり振り返り、現在の問題点や当面する課題を整理しようと試みたものである。

A. ネガティブ染色法の応用とウイルス粒子の形態学の進歩

1958年、ベルリンで開かれた第4回国際電子顕微鏡学会で、イギリス・キャベンディッシュ研究所の Horne と Brenner が始めてリンタンゲステン酸によるネガティブ染色法を用いて T2 フェージの微細構造を発表した。たまたま、このときの座長を日本の東昇博士がつとめていたが、この発表は参加者一同に強い感動を与えたと述べている。これが、ウイルス粒子の subunits レベルでの微細構造の時代の幕あけとなったのである。それ以来、この方法を用いてアデノ・ウイルス、ヘルペス・ウイルス、パポバ・ウイルス、ミクソ・ウイルス等の動物ウイルス、また多くの植物ウイルスや昆虫ウイルス、細菌ウイルスの微細構造が、次々に明らかにされてきた。この方法を用いれば 5 Å 前後の分解能を比較的容易に得ることが出来るので、ウイルス粒子の微細構造の研究にとどまらず、広く生体高分子の微細構造の研究にこの方法が用いられるようになった。

現在までにネガティブ染色法を用いて達成されたウイルス粒子形態学の成果は、次のようなものである。

① ウイルスの蛋白殻 (capsid) は、ウイルス蛋白質 subunits の正 20 面体様或いはらせん様配列から成り、また或種のウイルスでは

capsid の外側に更に lipoprotein coat (envelope) があることがわかった。これによってウイルス分類の基準が厳密になった。

② ウイルス粒子構成の理論が発展した。

③ ウイルス粒子やその附属産物、分解産物の構造と機能の関係が一層明らかになってきた。

④ ウイルス粒子の形態形成の過程にも有力な示唆を与えた。

いわばウイルス粒子の解剖学とも称すべき、生物物理学と密接な関係にある新しい一分野が、物理学のすぐれた伝統をもつ、イギリス・キャベンディッシュの地に誕生したということは、いろいろ考えさせられるものをもっている。

B. ウイルス粒子の微細構造とその構成論

1959年から1960年にかけて、キャベンディッシュの研究グループは、ネガティブ染色法を用いて、今まで球形或いは六角形の輪廓をもつ粒子として知られてきたアデノ・ウイルス、ヘルペス・ウイルス、ポリオマ・ウイルスは正 20 面体様 capsid をもち、その上に subunits が規則正しく配列していることを発見した。図 1 は Horne 等によるアデノ・ウイルス粒子と、それに対応する正 20 面体モデルを示す。ここで見られるような形態学的単位を capsomere と称する。そして

図1. アデノ・ウイルス capsid の capsomeres 配列とそれに対応する正 20 面体モデル。

頂点位置の capsomere は 5 個の隣の capsomeres に囲まれ、他の位置の capsomere は 6 個の隣の capsomeres に囲まれている。隣り合う頂点 capsomeres の間、つまり一稜上には 6 個の capsomeres があり、全体で計 252 個の capsomeres がある。

Problems of Virus Morphology;

※ Yasuhiro HOSAKA: The Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University

核酸を含んだ capsid をさして nucleo-capsid という。

その後多くの研究者により, その他の球形ウイルスの多くも正20面体様 capsid をもっていることが明らかとなった。図2は正20面体様ウイルス・capsid⁷⁾の形態学的モデルである。

図1, 2からわかるように, 5回対称軸頂点 capsomere は5個の隣の capsomeres で囲まれており, その他の位置の capsomere は6個の隣の capsomeres で囲まれている。この性質を利用して始めて頂点 capsomere の位置を同定できるのである。正20面体 capsid の capsomere 配列様式を求めるには, ①少なくとも隣り合う二つの頂点 capsomeres が同定され, ②頂点 capsomeres の近くの capsomeres は6個の隣の capsomeres で囲まれていることがはっきり認められなければならない。このようにすれば, 正20面体 capsid の5回対称軸頂点間を結ぶ一稜上の capsomeres 配列がきまり, 従って全体の capsomeres 配列とその数がきまってくる。例えば, アデノ・ウイルスでは, その正20面体 capsid の一稜を5—6—6—6—6—5, ヘルペス・ウイルスでは5—6—6—6—5, ヒトのイボ・ウイルスでは5—6—6—5, カブラ黄斑ウイルス (TYMV) では5—6—5 と表わすことができる (5, 6 は, それぞれ隣りに5乃至6個の capsomeres をもつ capsomere を表わす)。現在ま

図2. 正20面体様 capsid の形態学的モデル。⁷⁾

それぞれのモデルの5回対称軸位置の頂点を結ぶ一稜を次のように表わすことが出来る。a. 5—6—6—6—6—5, b. 5—6—6—6—5, c. 5—6—6—5, d. 5—6—5, e. 5—5, f. 5—5。 (但し, 5, 6 は, それぞれ5乃至6個の隣の capsomeres で囲まれている capsomere を指す)。この中, a, b, e, f はそれぞれアデノ, ヘルペス, φX174, カブラ黄斑ウイルス (TYMV) の capsid に対応しているが, c, d はまだ対応するウイルスが確定していない。正常の正20面体 capsid の場合 (a~e) 正20面体の capsomeres 総数は次式で簡単に算出できる。

$$N = 10(n-1)^2 + 2 \quad (\text{但, } n \text{ は一稜上の capsomeres 数})$$

f の場合は $N = 30(n-1)^2 + 2$ (f の場合 n は2と数える)。

すことができる (5, 6 は, それぞれ隣りに5乃至6個の capsomeres をもつ capsomere を表わす)。現在ま

で capsomere 配列様式の確定しているウイルスは, アデノ・グループ^{4,8)}, ヘルペス・グループ^{5,9)}, TYMV^{10,11)}。

パポバ・グループ¹²⁻¹⁴⁾である。それぞれの capsomeres 数は 252, 162, 32, 72 である。蚕の細胞質多角体病ウイルスの capsid も正常な正20面体で、その各頂点に capsomere がある (計12個) が、頂点以外の部分には、以上述べた正20面体ウイルス・capsid と違って capsomere がなく膜様構造物におおわれている。また ϕX 174 の場合も正20面体 capsid 頂点に capsomere 様構造が計12個みられる場合のほか、もっと小さい subunits 構造の見える場合¹⁷⁾ もあって、なお若干の未解決点が残っている。従ってこの2つの capsids の構造は、以上のべたような正20面体 capsids の構造と少し違っているわけである。

capsomere 自体の構造も、ヘルペス・ウイルスや TYMV、蚕の細胞質多角体病ウイルスについて、5 回対称軸頂点位置の capsomere は中空の5角柱、他の位置の capsomere は中空の6角柱であることが示された。

らせん様 capsid の構造は、軸方向から見た断面構造から、らせん一回転当りの subunits 数が数えられ、軸と直角方向から見た桿状或いは紐状構造から、らせん巾、ピッチ、長さがわかる。またほどけたらせん糸から、らせん方向をきめることも出来る。らせん一回転当りの subunits 数は、タバコ・モザイク・ウイルス (TMV) では16個¹⁸⁾、HVJ では15乃至16個¹⁹⁾、はしかウイルスでは12乃至13個である。

らせん様 capsid の場合は、らせん断面に配列する subunits は structure units (化学的にきめられる蛋白質分子と同義) そのものであると考えられ、正20面体 capsid にみられるような capsomere 様構造——数個の structure units の集合構造物と推定されている——は観察されていない。

現在までに知られているウイルス capsid は、一部のファージを除いて、いずれも、正20面体様或いはらせん様に subunits の配列したものである。この問題について Caspar と Klug は、理論的な考察を加えた。彼等は、Crick と Watson の理論を發展させて、正20面体様或いはらせん様の subunits 配列は、多数の identical な structure units が相互に同じ結合をしながら、最小エネルギー状態の capsid を組立てるという原理に、最も適したものであることを示した。そして更に正20面体様 capsid 構成に可能な様式を検討した。彼等は、正20面体様対称配列をした多数の正三角形で球面を分割し、正20面体の一面を占める正三角形数を T とした。structure units がこのような球面

に、対称的に配列するものとすれば、一つの正三角形に 3 個おかれることになり、従って正20面体の一面には 3 T 個、全体では $20 \times 3 T = 60 T$ 個の structure units が必要になる。

T は次の式で表わされる。

$$T = H^2 + HK + K^2$$

(但し、 H, K は任意の自然数または 0),

従って $T = 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 21, 25 \dots$

T の数の種類 (= 正20面体様対称配列に必要な structure units の数の種類) が、そのまま正20面体様 capsid 構成様式に可能な種類に一致する。図 3 は、このうちの 8 例を示す。

図 3 の正20面体を構成する正三角形格子の交点のうち 5 回対称軸位置 (5 で表わす) では、周りの 5 個の structure units が集まり、他の交点位置 (6 で表わす) では、周りの 6 個の structure units が集まって、それぞれ一つの集合構造物をつくるとすると、その総数は、一つの正20面体について $M = 10T + 2$ となる。この数は、電子顕微鏡で観察される形態学的単位、いわゆる capsomere の数に対応するものである。図 3 a ~ h までの正20面体の各々の 5 回対称軸間の稜の關係、 T や M の数は次のように表わされる。

a	5—5,	$T = 1,$	$M = 12$
b	5—6—5,	$T = 4,$	$M = 42$
c	5—6—5,	$T = 3,$	$M = 32$
d	5—6—6—6—5,	$T = 12,$	$M = 122$
e	5—6—6—5,	$T = 7,$	$M = 72$
f	5—6—3—6—5,	$T = 13,$	$M = 132$
g	5—6—6—6—6—5,	$T = 19,$	$M = 192$
h	5—6—6—6—6—6—5,	$T = 21,$	$M = 212$

現在までに、実際に確認されている capsid の種類は、 $T = 1$ (ϕX 174), $T = 3$ (TYMV), $T = 7$ (パポバ・グループ), $T = 16$ (ヘルペス・グループ), $T = 25$ (テデノ・グループ) である。

$T = 7, 13, 21 \dots$ の系列は skew class (斜系) と称されており、一種類について二つの左右体がある。例えば $T = 7$ では left-hand の 5—6—6—5 と right-hand の 5—6—6—5 の二種類の正20面体があり、パポバ・グループ中の兎パピローマ・ウイルス capsid は前者であり、ヒトのイボ・ウイルス等は後者である。

図3. 正三角形格子より組立てられた正20面体。²⁰⁾

それぞれ 72¹⁾, 72^{d)} として表わす。

C. 微細構造解釈に疑義のあった 2, 3 のウイルス

ウイルス粒子の形態学の急速な発展の中で、現在、訂正や再検討を要するものが若干出てきているが、これらの問題についてふれてみたい。

1. パポバ・グループの capsomeres の数

パポバ・グループには、ポリオーマ・ウイルス、SV 40、ヒトのイボ・ウイルス、ショープのパピローマ・ウイルス、K ウイルス等が属しているが、1960年 Wildy⁶⁾等が、始めてポリオーマ・ウイルスについて、その capsomeres 数が42であると報告した。続いて Williams²⁴⁾等(1961)がヒトのイボ・ウイルス、Mayor 等(1963)²⁵⁾が SV40、Parson (1963)²⁶⁾がK ウイルスについて、同様の 42 capsomeres のモデルを提出した。然し以上の研究者の示したウイルス粒子の電子顕微鏡写真で、少なくとも一個の頂点 capsomere は同定されてはいたが、もう一つの頂点 capsomere の同定は必ずしも説得力のあるものではなかった。Williams 等²⁴⁾以後の成績は、おそらく Wildy 等の解釈を踏襲したものであろう。

兎のパピローマ・ウイルスについて、Williams 等²⁷⁾(1960)や Breedis 等²⁸⁾(1962)は電子顕微鏡写真でウイルス粒子上に数えられる capsomeres 数が約30個

或いはそれ以上あることから、一粒子の capsomeres 総数は、その2倍、60~70個であろうと推定した。しかし彼等は、この数にあてはまる capsomeres 配列のモデルを考えることは出来なかった。

Mattern (1962)²⁹⁾は 92 capsomeres の方が、より可能性が強いと主張し、後になって実際 92 capsomeres のモデルに一致していると称する写真を発表した。³⁰⁾しかし 72 capsomeres の可能性も除外できないことを附加えていた。保坂も³¹⁾92個説、もし、斜・正20面体が許されるとすると 72 capsomeres かも知れないと述べた。

1965年になり Klug と Finch¹²⁾は鮮明な片面像をもつ多数のヒトのイボ・ウイルス粒子について、丹念に個々の capsomeres 配列をモデルと対比した。また、複雑な capsomeres 配列を示す多数の粒子についても粒子の両面のうつつている重複像としてモデルと対比した。こうして、始めてヒトのイボ・ウイルス粒子は 72 capsomeres の配列する斜・正20面体粒子であることを明確に示した。Klug は更に、42或いは 92 capsomeres 説の根拠となった他の研究者の電顕写真についても自分の解釈に従って、72個モデルに一致する妥当な頂点 capsomeres の位置を同定している。更に彼等²³⁾は図4に示すように兎のパピローマ・ウイルスの capsomeres の配列も 72 capsomeres の斜・正20面体モデルに一致することを報告した。³²⁾

また Howatson と Crawford (1963) は壊れたパポ

(i)

(ii)

(iii)

(c)

バ・ウイルス capsid から遊離した一団の capsomeres 数をかぞえ、その分布の平均数が約40だということから、パポバ・capsid の capsomeres 数は42であるという結論をみちびき出した。しかし壊れた capsid から全 capsomeres が遊離して支持膜上に、はっきり数えられる場合は、寧ろ少ないと考えられ、従って分布の平均数ではなく、分布の最大数をもって capsomeres 数の近似値とすべきものであろう。^{12,31)}

こうしてパポバ・グループの capsomeres 数も Klug 等の労作によって結論が出されたわけであるが、何故長い間にわたって capsomeres 数について混乱があったのか、その理由を考えることは、今後のためにもなることと思われる。

まず第一に、正20面体ウイルスの対称性には、skew class (斜系) が存在しないかのような予断があった。パポバ・ウイルスの capsomeres に関する Wildy 等の最初の仕事にしても、おそらく、252 (アデノ・ウイルス)、162 (ヘルペス・ウイルス)、92、42という普通の正20面体系列の capsomeres 数の中に、真理を期待したのであろう。また実際問題として、たとえあるウイルス粒子の capsomeres 配列が、普通の正20面体系列に一致しないことがわかって、若し有能な結晶学者や物理学者の積極的な協力がなければ、多くの生物学者は、capsomeres 配列を解析する方法を見出すことは出来なかったと思われる。

第二に、ネガティブ染色法の原理について、¹²⁾ 明確なところがあった。これも Klug と Finch によってつい最近明らかにされたことであるが、ネガティブ染色法で観察される粒子は、粒子の片面ばかりでなく、両面が重複してうつることが多いということである。従って整然とした capsomeres 配列をもつ capsid でも非常に複雑で解析しにくい姿を示すことがあるので、この点を心得ていなければならない。

第三は、解析された粒子の数が少なかった。斜

- 23) 図4. (a) 少なくとも二つの5回対称軸位置の capsomeres のはっきり見える兎・パピローマ・ウイルス粒子
(b) aと同じウイルス粒子で5回対称軸位置の capsomere に×印がつけてある。×印の間を結び capsomeres 配列は常に5-6-6⁵で、従って兎パピローマ capsomeres 配列は 72¹ 型となる。
(c) 72¹ 型 capsomere 配列モデルの異なった方向からの観察写真
(i) 5回対称軸方向 (ii) 2回対称軸方向、(iii) 5回対称軸の中間方向

・正20面体ということで、解析しにくかったことも一因と思われるが、あるウイルス粒子の構造解釈にあたって、少なくとも数個のウイルス粒子についてモデルとの正確な対比は必要である。

2. ミキソ・ウイルスのらせん性 capsid の多重性

1960年、Horne と Waterson³³⁾ は Sendai virus (日本では HVJ と公称されている) の nucleocapsid が二重らせん構造より成ることを発表した。その後、多くの研究者がミキソ・ウイルスの nucleocapsid 二重らせん構造について報告しているが、必らずしも、そう解釈しなくてもよい nucleocapsid も同時にみられている。Choppin と Stockenius (1964)³⁴⁾ はパラインフルエンザ・ウイルス SV5 のほどけた nucleocapsid の写真から、これが一重らせん構造をしていることを明示した。我々も HVJ について、同様の一重らせん様のほどけた nucleocapsid を観察している (図5)。多重らせんに見えたのは、恐らく、nucleocapsid の支持膜と接する部分のらせんが、リンタングステン酸乾燥時に断裂して、切れた断端部分の方向がずれて、恰も支持膜から遠い部分のらせんと交叉するようになったためであろう。このことを図6に説明する。またミキソ・ウイルス RNA が、単糸 RNA であることも^{36,37)} capsid らせんが一重らせんであることを支持している。

らせんの多重性を決定するには、細菌の鞭毛にみられるように、正常な桿状構造上に、連続した明瞭な幾本かの糸を観察するか、³⁸⁾ ほどけたらせんが確かに一定数のらせん糸より成っていることを見出さなければならぬ。^{34,35)}

3. その他

正20面体ウイルスの中で、構造の似通った一グループとして、いずれも複糸核酸を含む、レオ・ウイルス、wound tumor virus、稲の萎縮病ウイルスの三ウイルスがある。これ等ウイルスの capsid は普通の正20面体で、92個の capsomeres より成るという報告が^{39~42)} 出されているが、いずれも正確に2つの頂点 capsomeres が同定されているわけではない。従って、この成績についても再検討が必要である。

今迄知られている中で、最大数の capsomeres を含むウイルスは、Tipura iridescence virus であるが、812 capsomeres という成績は学会報告だけで正式論文には⁴³⁾ なっていない。しかもこの成績自身も一個の empty particle から強引に結論されたもので説得力に乏しい。

図5. HVJ の nucleocapsid のほどけたらせん。一重らせんで右巻きである。画面上では左巻きに見えるが、この場合、電顕フィルム膜面を下にして引伸機にかけ焼付けたので実際はその反対となる (電子線の方は画面に垂直に下から上へ向う)。

図6. 一重らせんが二重らせんに見える場合の説明図。支持膜に接するらせん部分に断裂があり、切れたらせん断端の方向にずれがおこったのを示す。

- a) 正常な一重らせん
- b) 一重らせんが二重らせんに見える場合

D. ネガティブ染色法の原理と観察像の解釈

ネガティブ染色のウイルス粒子像を正しく解釈するためには、ネガティブ染色法の原理を正確に知らねばならない。1960年 Williams²⁶⁾等は、兎のパピローマ・ウイルスの shadowing 粒子表面に約30個の小突起を観察し、ネガティブ染色法でも、同様の配列をしたほぼ同数の小単位を見出した。このことから彼等は、ネガティブ染色法では、ウイルス粒子の片面像のコントラストが映っているのではと結論した。しかし粒子の支持膜に接する片面か、或いは支持膜から遠い片面が映っているのかは論じていない。目的の検体が対称的構造をもつ粒子で、正面から見た場合と裏面から見た場合と、その構造が等しいときには特に問題はないわけであるが、例えば、らせん構造や斜・正20面体の右巻きか左巻きかをきめる場合には、粒子のどちらの面が見えているのかを知る必要がある。

1965年 Klug と Finch¹²⁾は、電子顕微鏡中で試料面を傾けて、ヒトのイボ・ウイルス粒子を観察し、同一粒子を異なった角度から撮影した二枚の写真から、ウイルス粒子とリンタングステン酸の立体的な関係像を眺めて、支持膜に近い方の粒子片面のコントラストが高いことを示した。

従って、写真上でそのまま、らせんや斜・正20面体の方向をきめようとすれば、リンタングステン酸、その他でネガティブ染色した試料面を下にして、電子顕微鏡中で撮影する。次いで撮影フィルムの膜面を上にして引伸機で、印画紙に焼つける。こうすれば最後の写真は電子線の方から眺めた像と一致する(図7)。図5に示した HVJ の nucleocapsid の方向は右巻きである。

図7. ネガティブ染色粒子の支持膜に近い側と、遠い側と、両方の構造が映ることを示す模式図。一般に近い側のコントラストが高く、或場合には遠い側が殆どうつらない。

上述のように、ネガティブ染色法では、支持膜に近い粒子片面構造のコントラストが高いが、遠い側の一面も程度の差はあれ、重複して映っている場合が多い。正常な正20面体 capsid の場合、2回対称軸の方向に位置する粒子は表・裏どちらから見ても同一の構造で、従ってこの場合は粒子両面の構造の重複によって却ってコントラストが強調される。正常な正20面体の場合、図1のアデノ・ウイルスにみられるように、2回対称軸方向の粒子が構造解析のモデルとしてよく用いられるのも、このような要因が働いているものと思われる。しかし斜・正20面体 capsid の場合は、上下両面構造が一致する対称軸方向はなく、従って粒子片面のコントラストの高い粒子を選んで、その5回対称軸位置の capsomeres を少なくとも二つ同定しなければならない。モデルと対比して根気よく丹念な構造解析が必要である。正常な正20面体 capsid の場合に比べて、手間もかかりむづかしい。

E. ウイルス粒子の形態学の当面する諸課題

以上のべてきたように、主なウイルス粒子の微細構造が明らかにされ、微細構造研究の方法論が確立された現在の段階に立って今後の課題をあげてみたい。

1. 微細構造の未解決のウイルス粒子

① ポリオ・ウイルス⁴⁴⁾やメンゴ・ウイルス⁴⁵⁾の小型 RNA 動物ウイルスの球形 capsid の表面には、小さい subunits が配列され、capsomere 様構造物はみられない。少なくとも、ポリオの小単位の配列に関しては5回対称性が含まれていて、おそらく正20面体様配列をしているものと考えられる。他のエンテロ・ウイルス、メンゴ・ウイルス、RNA フェージ等の capsid も同様の正20面体様配列をした小さい subunits から成るものと推定される。しかし、此等の小型球形 RNA ウイルスの capsid が何故 capsomere 様構造をもたないのかその理由は、今後の研究課題として残されている。

② Sindbis virus⁴⁶⁾、ヴェネゼラ馬脳炎ウイルス⁴⁷⁾、日本脳炎ウイルス等のアルボ・ウイルス粒子表面には、突起の配列した envelope 様構造がある。しかし envelope 内部にあると考えられる nucleocapsid の構造は今なお不明である。Klimenko 等は、ヴェネゼラ馬脳炎ウイルスの半精製試料中に遊離のラセン構造物を見出しているが、これが同ウイルスの nucleocapsid かどうかは、にわかには断定できない。アルボ・ウイルス nucleocapsid の微細構造の研究がおくれている理由の

一つは、同ウイルスが非常に不安定であることである。

③ ボックス・ウイルス粒子の超薄切片像やネガティブ染色像の研究は、かなりよくやられているが、粒子内のどの部分が nucleocapsid に対応するのか、まだわかっていない。いわゆる core の中に、三折りになった管状構造物と DNA が含まれているが、普通の大きさのウイルス粒子に比べて、構造が複雑である。

④ T 偶数ファージの head の subunits の配列について最近有力な仮説が出された。今まで T 偶数系ファージ head のモデルとして、両端に六角錐のついた六角柱が考えられてきた。このモデルは、1) head の輪廓が、細長い六角形であること、2) 尾端の角板が六角形なので、尾と結合する頭端が 6 回対称性をもつ筈であるということから、厳密な検討なしに一般的にうけ入れられてきた。しかし最近見つかった種々の変型ファージの中に、複数の尾をもつ粒子があり、ファージ head の各頂点は、等しい構造をもつと考えなければならなくなった。この見地に立って Moody (1965) や Boy de la Tour と Kellenberger (1965) は、ファージ head を、延長型正 20 面体と解釈し、Kellenberger (1966) は図 8 に示すようなモデルを最も妥当なものとして提出した。

このモデルは、今後更に多くのデータにより吟味されなければならないが、今後の研究の一応の基礎モデルになり得るものと考えられる。

2. ウイルス試料中の随伴産物

半精製ウイルス試料中には、屢々ウイルス粒子以外のウイルス性構造物が含まれている。

例えば、はしかウイルスでは large hemagglutinin と呼ばれるウイルス粒子のほかに、small hemagglutinin が産生される。この small hemagglutinin は、形態学的には envelope の小片に相当するもので蔗糖や CsCl の density gradient centrifugation で large hemagglutinin と分離出来る。アデノ・ウイルスでは、ウイルス粒子以外に抗原的に異なる 3 種の物質が知られているが、その中一つは、遊離の capsomere と同じもの、他の二つは、正 20 面体頂点部位にある突起またはその一部と同じものである。

一般に正 20 面体ウイルスの半精製試料中には、正常な nucleocapsid に混って、核酸の抜けた capsid のみの粒子が産生されてくる。ポリオ・ウイルスでは更に capsid に組込まれない structure units もみられる。以上の随伴粒子は、いずれも正常ウイルス粒子の構成素として、形態学的に或いはその他の方法で同定されたものである。

パポバ・ウイルスの半精製試料中には、普通の大きさのウイルス粒子（直径・約 $55\text{m}\mu$ ）の他に、直径約 $38\text{m}\mu$ の球形粒子がある。表面には、ウイルス粒子にあるのと、同じ大きさの capsomeres が配列している。この粒子が、パポバウイルス structure units の abnormal arrangement によって出来たのか或いは cap-

図8. a. T4 ファージの実際の電子顕微鏡写真の一つを、そのまま画いたもの。

b. T4 ファージ head に適合する延長型正 20 面体モデルの組立て。全部で 30 面の正 3 角形より成り、赤道面にある頂点を除いて全頂点は等しい構造をもつ。最初の普通の正 20 面体は short head にあたり、更に長い head は polyhead にあたる。

sid の内側にある inner shell のようなものか不明である。このほか、ウイルス粒子や小型粒子と同様の直径、同様の capsomeres 配列を持つ管状構造物がみられる。^{23,27,28)}

アデノ・ウイルスやタバコ・ネクロジス・ウイルスの半精製試料中には、それ自身では増殖出来ないが此等ウイルスの増殖に支えられて始めて増殖出来る随伴ウイルスがある。この随伴ウイルスは、支持ウイルスと抗原性も違ふし、支持ウイルスの構成要素でもない。アデノ随伴ウイルスに関しては、12個の capsomeres をもつ正20面体モデルが出されているが、^{61~66)}その生物学的意義に関しては今後の研究を待たなければならない。⁶³⁾

3. ウィルス粒子の形態形成

ウィルスの capsid の形成一少なくともその構造が比較的単純なウイルスに関しては self-assembly の方式で行なわれるのではないかという説が、かなり広く受け入れられてきた。²⁰⁾その主な理由をあげてみると、

- ① Caspar と Klug が提唱する単純なウイルス capsid の構成の原理によれば capsid は identical units の equivalent な配列によって組立てられる。
- ② タバコ・モザイク・ウイルス蛋白分子の自家凝集による桿状構造物の再形成の実例がある。^{67,68)}
- ③ ウィルス 核酸合成阻害剤の存在下で、ウィルス 核酸を含まない capsid が形成される。^{69,70)}

しかし最近ファージの遺伝・形態学的研究によって、ファージ capsid の形成は self-assembly のような単

純な方法によらないことがわかってきた。T4 ファージの conditional lethal mutant として分離されたものの中に tail sheath や head を正常に組立てることは出来ないが、より単純な型式で、いわゆる poly-head や polysheath をつくるものが見つかっている。此等構造物は、正常のものと同じ直径をもっているが、^{71,72)}長さの様々な管状構造物である。そしてファージ蛋白を支配する gene は平常であるが、その assembly を支配する gene に変異があったために、変型産物としてつくられたものである。このような遺伝的変異株は、ファージの各構成部分について得られており、各構成部分の形成に複数の genes が働いていることが明らかとなってきた。しかし、以上のような方法で、ウィルス capsid の形態形成の過程を追及するのは、遺伝子地図が完成し、容易に変異株のとれるファージに限って可能である。Edgar と Wood は、この系を用いて、尾、尾線維や頭等の各部分だけが正常な変異ファージを混ぜて、正常ファージ形成に成功している。従ってこれ等構成部分の間では self-assembly が起こるようである。

動物性ウイルスでは、envelope をもつウイルスが細胞表面で、発芽状にウイルス粒子に形成されていくことが知られている(ミクソ・ウイルス、^{74~77)}アルボ・ウイルス、^{78,79)}乳癌・白血病ウイルス。^{79~86)}中には核膜を envelope に組込むような、ヘルペスウイルスも^{87,88)}ある。このとき膜上にウイルス抗原物質が蓄積して、

c. 正常の正20面体は 5:3:2 の回転対称性をもつが、このモデルは 5:2 回転対称性をもつ。

膜がウイルス性 envelope に変型して nucleocapsid を包み込んでいく。⁷⁶⁾そして包み込む nucleocapsid の長さが2単位以上あれば、大型粒子が形成され pleomorphism^{77, 89)}の原因となる。

む す び

ウイルス粒子の形態学の将来の方向を、筆者なりに考えてみたとき、その一つは、物理学・化学と結びついて生体高分子の形態形成の機構をさぐることであり、もう一つは、生物学とより結びついて、生体高分子の構造と機能の関係を、明らかにすることであるように思われる。

(註 文献 (7, 20, 90~93) はウイルス粒子形態学の一般的な参考文献である)

追 記

① 微細構造の未解決のウイルス粒子

マウス白血病ウイルスやマウス乳癌ウイルス粒子の微細構造はミキソ・ウイルス粒子に近いという考えが支配的であったが、最近 Padgett と Levine は (Virology, 30, 623, 1966) マウス Rauscher 白血病ウイルス粒子の capsid が、ヘルペスのそれに似た cubic symmetry をもつことを見出した。この他の白血病ウイルス、乳癌ウイルス、肉腫ウイルス等の微細構造の多くはなお未解決ではあるが、上記の Rauscher virus の成績に近いと考えるのが妥当であろう。この点に関して興味深いのは、Dmochowski が腫瘍ウイルス国際シンポジウム (1966, 名古屋) で、ヒトの白血病患者からヘルペス様粒子が見出されると報告したことである。

② ファージ head の形態

図8に示した Kellenberger の T4 ファージ粒子のモデルは T4 変異株のあるものが polyshead や short head 粒子を生産するという現象も旨く説明できるものである。

③ ウイルス粒子の構造と機能

この問題もウイルス粒子の形態学の当面する諸課題の中に含まれる。この中には(1)ウイルス核酸の uncoating や(2)ウイルス envelope の役割等の問題がある。

1. uncoating の過程は、ウイルス粒子の morphogenesis の全く逆の過程であって uncoating はウイルス核酸とウイルス蛋白殻の相互作用の一面をあらわす現象であると共に、あるウイルス—宿主細胞系の感受性、非感受性を決定する条件にも関連がある。envelope のないウイルスはウイルス核酸が capsid

から放出される一段階 uncoating を行ない、envelope のあるウイルスは、このほかに nucleocapsid が envelope より出る段階と二段階 uncoating を行なう。

2. ミキソ・ウイルスの envelope を変化させるような有機溶媒で処理すると、ミキソ・ウイルス粒子は感染性を失うと共に、envelope 活性としてしられる溶血能や細胞融合能も失う (保坂, 岡田・未発表)。ミキソ・envelope はウイルス抗原をとり込んだ変型細胞膜であるが nucleocapsid との間に親和性がある nucleocapsid を包み込んで成熟粒子に生長する。しかし必ずしも nucleocapsid を包み込まなくても non-infectious hemagglutinin として細胞から発芽できる。

また RSV は envelope を生産できないという点で defective であるが (Hanafusa, H. & Hanafusa, T. (1966) Proc. N. A. S. 55, 532) 同時感染した RAV から envelope をかりることが出来れば、感染性をもつようになる。しかしミキソ・ウイルスの envelope を利用することは出来ない (Hanafusa et al, (1963), Proc. N. A. S. 49, 572)。

ウイルスの envelope がどのようにして形成され、どのように nucleocapsid と結合するのか、そしてその成熟の各段階でウイルス活性がどのように変わっていくかという構造と機能に関する研究は、envelope の生物学的意義を明らかにしてくれるものと思われる。

文 献

- 1) R. W. Horne, S. Brenner: 4th International Conf. E. M. 625 (1958)
- 2) 東 昇: ウイルス, p. 58, 講談社 ブルーバックス (1964)
- 3) D. L. D. Caspar, R. Dulbecco, A. Klug, A. Lwoff, M. G. P. Stoker, P. Tournier, P. Wildy: Cold Spr. Harb. Symp. Quant. Biol., 27, 49 (1962)
- 4) R. W. Horne, S. Brenner, A. P. Waterson, P. Wildy: J. Mol. Biol., 1, 84 (1959)
- 5) P. Wildy, W. C. Russel, R. W. Horne: Virology, 12, 202 (1960)
- 6) P. Wildy, M. G. P. Stoker, I. A. Macpherson, R. W. Horne: Virology, 11, 444 (1960)
- 7) R. W. Horne, P. Wildy: Virology, 15, 348 (1961)
- 8) M. C. Davies, M. E. Englert, M. R. Stebbins, V. J. Cabasso: Virology, 15, 87 (1960)
- 9) J. D. Almeida, A. F. Howatson, M. G. Williams: Virology, 16, 353 (1962)
- 10) H. E. Huxley, G. Zubay: J. Mol. Biol., 2, 189 (1960)
- 11) H. L. Nixon, A. J. Gibbs: J. Mol. Biol., 2, 197 (1960)
- 12) A. Klug, J. T. Finch: J. Mol. Biol., 11, 403 (1965)
- 13) A. Klug: J. Mol. Biol., 11, 424 (1965)
- 14) J. T. Finch, A. Klug: J. Mol. Biol., 15, 344 (1966)
- 15) Y. Hosaka, K. Aizawa: J. Insect Pathol., 6, 53 (1964)
- 16) M. T. Tromans, R. W. Horne: Virology, 15, 1

- (1961)
- 17) R. W. Horne: *Scientific American*, 208, 48 (1963)
 - 18) H. L. Nixon, R. D. Wood: *Virology*, 10, 157 (1960)
 - 19) 保坂康弘, 舟橋修之, 横関秀子: 第12回日本ウイルス学会総会 (東京, 1964年10月)
 - 20) D. L. D. Caspar, A. Klug: *Cold Spr. Harb. Symp. Quant. Biol.*, 27, 1 (1962)
 - 21) F. H. C. Crick, J. D. Watson: *Nature*, 177, 473 (1956)
 - 22) F. H. C. Crick, J. D. Watson: *The Nature of Viruses* (eds. G. E. W. Wolstenholme and E. C. P. Millar) 5, Churchill, London (1957)
 - 23) J. T. Finch, A. Klug: *J. Mol. Biol.*, 13, 1 (1966)
 - 24) M. G. Williams, A. F. Howatson, J. D. Almeida: *Nature*, 189, 895 (1961)
 - 25) H. D. Mayor, A. M. Jamison, L. E. Jordan: *Virology*, 19, 359 (1963)
 - 26) D. F. Parsons: *Virology*, 20, 385 (1963)
 - 27) R. C. Williams, S. J. Kass, C. A. Knight: *Virology*, 12, 48 (1960)
 - 28) C. Breedis, L. Berwick and T. F. Anderson: *Virology*, 17, 84 (1962)
 - 29) C. F. T. Mattern: *Science*, 137, 612 (1962)
 - 30) C. F. T. Mattern, C. A. Allison, W. P. Rowe: *Virology*, 20, 413 (1963)
 - 31) Y. Hosaka: *Biochim. Biophys. Acta*, 104, 261 (1965)
 - 32) A. F. Howatson, L. V. Crawford: *Virology*, 21, 1 (1963)
 - 33) R. W. Horne, A. P. Waterson: *J. Mol. Biol.*, 2, 75 (1960)
 - 34) P. W. Choppin, W. Stockenius: *Virology*, 23, 195 (1964)
 - 35) Y. Hosaka: unpublished data
 - 36) Y. Iwai, M. Iwai, M. Okumoto, Y. Hosokawa, T. Asai: *Biken J.*, 9, 241 (1966)
 - 37) D. W. Kingsbury: *J. Mol. Biol.*, 18, 195 (1966)
 - 38) J. Lowy, J. Hanson: *J. Mol. Biol.*, 11, 293 (1965)
 - 39) C. Vasques, P. Tournier: *Virology*, 17, 503 (1962)
 - 40) L. E. Jordan, H. D. Mayor: *Virology*, 17, 597 (1962)
 - 41) R. F. Bils, C. E. Hall: *Virology*, 17, 123 (1962)
 - 42) I. Kimura, S. Toyoda, N. Suzuki: *Ann. Phytopathol. Soc. Jap.*, 28, 85 (1963)
 - 43) K. M. Smith, G. J. Hills: *Proc. 7th International Congr. Entomol.*, Vienna, 823, (1960)
 - 44) J. Nagington, R. W. Horne: *J. Mol. Biol.*, 3, 333 (1960)
 - 45) S. Dales, R. M. Franklin: *J. Cell Biol.*, 14, 281 (1962)
 - 46) M. Mussgay, R. Rott: *Virology*, 23, 573 (1964)
 - 47) S. M. Klimenko, F. I. Yershov, V. P. Gofman, A. P. Nabatonikov, V. M. Zhdanov: *Virology*, 27, 125 (1965)
 - 48) K. Fukai, H. Kitano, T. Fukunaga: 6th Intern. Congr. E. M., 2, 167 (1966)
 - 49) 西村千昭, 野村正子, 名倉正子, 北岡正見: 第14回日本ウイルス学会総会 (京都, 1966年11月)
 - 50) D. Peters: 4th Intern. Conf. E. M. 2, 552 (1958)
 - 51) D. Peters, G. Müller: *Virology*, 21, 266 (1963)
 - 52) D. Peters, D. Büttner: *Proc. III Eur. Reg. Conf. E. M.*, B, 377 (1964)
 - 53) D. Peters: 6th Intern. Congr. E. M., 2, 195 (1966)
 - 54) S. Dales, R. Kajioaka: *Virology*, 24, 278 (1964)
 - 55) M. F. Moody: *Virology*, 26, 567 (1965)
 - 56) E. Boy de la Tour, E. Kellenberger: *Virology*, 27, 222 (1965)
 - 57) E. Kellenberger: *Scientific American*, 215, 32 (1966)
 - 58) E. C. J. Norrby: *Virology*, 19, 147 (1964)
 - 59) R. C. Valentine, H. C. Pereira: *J. Mol. Biol.*, 13, 13 (1965)
 - 60) Y. Watanabe, K. Watanabe, Y. Hinuma: *Biochim. Biophys. Acta*, 61, 642 (1962)
 - 61) I. Archetti, D. Steve Bocciarelli: *Proc. IV Congr. Italiano di Microscopia Electronica*, 25 (1963)
 - 62) I. Archetti, D. Steve Bocciarelli: 3rd Eur. Reg. Conf. E. M., B, 343 (1964)
 - 63) H. D. Mayor, R. M. Jamison, L. E. Jordan, J. L. Melnick: *J. Bacteriol.* 90, 235 (1965)
 - 64) R. W. Atchison, B. C. Castro, W. McD. Hammon: *Science*, 149, 754 (1965)
 - 65) M. E. Reichman: *J. Biol. Chem.*, 235, 2959 (1960)
 - 66) B. Kassanis, H. L. Nixon: *J. Gen. Microbiol.*, 25, 459 (1962)
 - 67) G. Schramm: *Z. Naturforschg.*, 2b, 249 (1947)
 - 68) M. A. Lauffer, N. T. Ansevin, T. E. Cartwright: *Nature*, 181, 1338 (1958)
 - 69) N. Ledinko: *Virology*, 6, 512 (1958)
 - 70) M. Reissig, A. S. Kaplan: *Virology*, 16, 1 (1962)
 - 71) R. Farve, E. Boy de la Tour, N. Segré, E. Kellenberger: *J. Ultrastructure Res.*, 13, 318 (1965)
 - 72) E. Kellenberger, E. Boy de la Tour: *J. Ultrastructure Res.*, 11, 545 (1964)
 - 73) R. S. Edgar, W. B. Wood: *Proc. N. A. S.*, 55, 498 (1966)
 - 74) K. V. Holmes, P. W. Choppin: *J. Exp. Med.*, 124, 501 (1966)
 - 75) H. Duc-Nguyen, H. M. Rose, C. Morgan: *Virology*, 28, 404 (1966)
 - 76) C. Morgan, C. Howe: 6th Intern. Congr. E. M. 2, 177 (1966)
 - 77) R. W. Compans, K. V. Holmes, S. Dales, P. W. Choppin: *Virology* 30, 411 (1966)
 - 78) Z. Ota, *Virology*, 25, 372 (1965)
 - 79) 東 昇, 松本 明, 田畑恭二, 藤原栄一, 伊藤利根太郎, 緒方隆幸, 清水 明: 第14回日本ウイルス学会 (京都, 1966年11月)
 - 80) A. Goldfeder: *Radiation Res.*, 16, 61 (1962)
 - 81) D. F. Gelber: *J. Natl. Cancer Inst.*, 3, 517 (1963)
 - 82) H. Tanaka, D. H. Moore: 6th Intern. Congr. E. M., 2, 223 (1966)
 - 83) K. Murayama, S. Oboshi: 6th Intern. Congr. E. M., 2, 217 (1966)
 - 84) M. Kajima, M. Pollard: *J. Bact.*, 90, 1448 (1965)
 - 85) T. Imai, H. Okano, A. Matsumoto, A. Horie: *Cancer Res.*, 26, 443 (1966)
 - 86) E. Y. Lasfargues, N. Pillsburg, D. H. Moore: 6th Intern. Congr. E. M., 2, 207 (1966)
 - 87) S. Nii, C. Morgan, H. M. Rose, H. S. Rosenkranz: 6th Intern. Congr. E. M., 2, 201 (1966)
 - 88) C. Morgan, H. M. Rose, M. Holden, F. P. Jones: *J. Exp. Med.*, 110, 643 (1959)
 - 89) Y. Hosaka, H. Kitano, S. Ikeguchi: *Virology*, 29, 205 (1966)
 - 90) R. W. Horne: *Prespect. Virology* (ed. M. Pollard) 3, 43, Hoeber., N. Y. (1963)
 - 91) R. W. Horne: *Advances in Virus Res.*, (eds. K. M. Smith, M. A. Lauffer) 10, 101, Academic Press, Inc., New York (1963)
 - 92) S. Dales: *Prog. med. Virol.*, 7, 1 (1965)
 - 93) 保坂康弘: ウイルス (川喜田・野島・東・渡辺編) 1, 共立出版, 東京 (1966) ウイルスの生物学 (川喜田編) 241, 岩波書店, 東京 (1965)