報 文

β -ジケトンと Schiff 塩基による亜鉛(II) の抽出挙動と ユウロピウム(III) の抽出と蛍光に及ぼす亜鉛(II) の効果

玉城沙弥香¹, 伊藤 優一¹, 井上 正之¹, 矢島 博文¹, 長谷川佑子^{®1}

蛍光体として優れた機能を発現する複核錯体を協同効果を利用した溶媒抽出法で調製するための条件設定の基礎データを得ることを目的として、亜鉛(II) とユウロピウム(III) を含む水溶液と Hpta (ピバロイルトリフルオロアセトン, HA) と $H_2(\text{salchn})$ {ビス(サリチリデン)シクロヘキシルジアミン, H_2B } を含む $CHCl_3$ 溶液とを振り混ぜたときに起こる素平衡を詳細に解析した。その結果、① H_2B は EuA_3 とだけでなく、 ZnA_2 と錯体を作る、② ZnB は EuA_3 と H_2B よりずっと安定な錯体を作る、③ ZnB は ZnA_2 よりずっと抽出されにくい、水溶液中に Zn イオンがあると、 EuA_3ZnB 、複核錯体が主抽出種となることが分かった。水溶液に十分な量の亜鉛(II) を共存させると $Eu(III)$ は Hpta と $H_2(\text{salchn})$ によってほぼ定量的に抽出され EuA_3ZnB を調製することができる。 ZnA_2H_2B は 470 nm に弱い蛍光ピークをもつ。 ZnB は 450 nm 付近にピークをもち、青色蛍光を示すが、 EuA_3ZnB が生成すると ZnB の蛍光は減少し、612 nm の赤色の強い蛍光は増大する。 $Eu(III)$ と $Zn(II)$ を抽出した $CHCl_3$ 相の蛍光スペクトルでは ZnB が事実上存在しないことを反映して 450 nm 付近に蛍光はないが、612 nm の蛍光強度は水相に亜鉛(II) を含まないときに比べ著しく増大した。

1 緒 言

金属(II) が導入された Schiff 塩基、たとえばビスサリチリデンエチレンジアミン銅(II), $Cu(\text{salen})$, はランタノイド(III) の β -ジケトンとのキレートと安定な錯体を作る¹⁾。また、亜鉛(II) とランタノイド(III) を導入した Schiff 塩基錯体は強い蛍光を示すことがしばしば観測される^{2)~4)}。 $Cu(\text{salen})$ をルイス塩基とみなすと、この複核錯体はランタノイド(III) を β -ジケトンとルイス塩基で協同抽出する際の抽出種として得られる可能性がある。そこで Schiff 塩基の金属錯体をルイス塩基として、溶媒抽出することを試みたが、水と振り混ぜると Schiff 塩基から金属(II) が速やかに脱離する^{5)~7)}。

そこで亜鉛(II) と $Eu(III)$ を含む水溶液と β -ジケトンと Schiff 塩基を含む有機溶媒を振り混ぜて複核錯体を調製する可能性を考えた。しかしながら亜鉛(II) も $Eu(III)$ も β -ジケトンで抽出され、また、Schiff 塩基もこれらと相互作用するというように、この系はいくつもの平衡が組み合わさっている。そこで、まず、亜鉛(II) と $Eu(III)$ のそれぞれの β -ジケトンと Schiff 塩基による抽出を詳細に調べた。更に、 β -ジケトンと Schiff 塩基によって $Eu(III)$ と亜鉛(II) を抽出したときの有機相の蛍光スペクトルを測定して蛍光

強度が増大するかどうかを考察する目的で実験を行った。

2 実 験

2.1 試 薬

亜鉛(II) は純度 98% の過塩素酸亜鉛(II) の 6 水塩を Aldrich から購入し、必要量を精秤しイオン交換水で溶解させた。ユウロピウム(III) は酸化^{ひょう}物 (Eu_2O_3 , 純度 99.99%, 三津和化学) を化学量論の $HClO_4$ で溶解させて調製した。両金属の正確な濃度はキシレノールオレンジを指示薬として用い、エチレンジアミン四酢酸 (EDTA) により標定した。ピバロイルトリフルオロアセトン (Hpta) は Aldrich から、ビスサリチリデンシクロヘキシルジアミン [$H_2(\text{salchn})$] は島田化学研究所から購入し、精製することなく使用した。クロロホルムは安定剤除去のため、使用する直前にイオン交換水で洗浄した。

2.2 操 作

主な実験は 25℃ の恒温室中で行った。水溶液の総電解質濃度は $NaClO_4$ で 0.1 M ($1\text{ M} = 1\text{ mol dm}^{-3}$) に調製した。平衡時の水素イオン濃度は $1.00 \times 10^{-2}\text{ M}$ の過塩素酸を含む 0.1 M (Na, H) ClO_4 を $pC_H 2.00$ ($pC_H = -\log[H^+]$) の基準として電位差計 (Corning pH Meter 445) で測定した。

2.2.1 $H_2(\text{salchn})$ の水相と有機相間の分配比

¹ 東京理科大学理学部化学科：東京都新宿区神楽坂 1-3

H₂(salchn) のクロロホルム溶液と、種々の pC_H に調整した同体積の水溶液を 15 分間激しく振り混ぜた後、両相を取り分けた。水相を NaOH 水溶液で塩基性にし、水相中の H₂(salchn) をクロロホルムに再抽出させた。H₂(salchn) の濃度は紫外可視分光光度計（日立 U-4000）で定量した。有機相の高濃度の H₂(salchn)（有機相）は 408.0 nm での吸光度から（モル吸光係数：1.50 × 10²），低濃度（水相）は 256.0 nm（モル吸光係数：2.16 × 10⁴）から算出した。

2・2・2 H₂(salchn) と Hpta による亜鉛(II) 及びユウロピウム(III) の抽出 亜鉛(II) もしくは Eu(III) を含む水溶液と同体積の H₂(salchn) と Hpta, それぞれを含むクロロホルム溶液あるいは両者を種々のモル比で含む溶液を平衡に達するまで振り混ぜた後、両相を取り分けた。有機相に抽出された金属イオンは 0.1 M の HClO₄ に逆抽出させてから、水相に残った金属イオンは 0.1 M HClO₄ で適宜希釈後誘導結合プラズマ発光分析法（ICP/AES）（Horiba JY70C）で定量した。

2・2・3 抽出種の蛍光スペクトル測定 亜鉛(II) もしくは Eu(III) が抽出された有機相の蛍光スペクトル，合成した Zn(pta)₂ もしくは Eu(pta)₃ の CHCl₃ 溶液と H₂(salchn) 溶液の混合溶液，更に Zn(salchn) と Hpta の混合溶液並びに Eu(pta)₃ と Zn(salchn) の混合溶液の蛍光スペクトルを蛍光光度計（日立 F4500）で測定した。

また，Eu(III) と亜鉛(II) を抽出した CHCl₃ 相の蛍光スペクトルを測定した。

3 結果と考察

3・1 H₂(salchn) の 2 相間分配定数

2 つのフェノール性 OH 基と 2 つのアミンをもつ H₂(salchn) は pC_H が高くなると前者の解離により，また pC_H の低いところでは後者のプロトン会合により水相に移る量が増える。したがって，両相の H₂(salchn) の全濃度比を表わす分配比，*D*，は pC_H の高い領域及び低い領域では減少するが，プロトンの解離も会合も起こらない領域では pC_H によらず一定となる。そのときの *D* は H₂(salchn) の 2 相間分配定数 *K_d* {*K_d* = [H₂(salchn)]_o/[H₂(salchn)]} を表わすはずである（式中の下付の“o”は有機相を，下付なしは水相を表わす）。事実，pC_H 4 以下また，6 を超えると log*D* は減少したが，少なくとも pC_H 4～5 の範囲で一定値，4.60 ± 0.03 を示した。この値を 2 相間分配定数 log*K_d* とした。pC_H 6 であっても log*D* は 4 以上であったので，本実験条件下では H₂(salchn) は実質的に水相に分配することはないものとした。

3・2 亜鉛(II) とユウロピウム(III) の溶媒抽出

3・2・1 亜鉛(II) の H₂(salchn) による抽出 亜鉛(II) の H₂(salchn)，H₂B，による水相から有機相への抽出が

によると仮定すると有機相中の亜鉛(II) の全濃度は [ZnB]_o，水相の亜鉛(II) の全濃度は [Zn²⁺] となるので，亜鉛(II) の分配比 *D* は *D* = [ZnB]_o[Zn²⁺]⁻¹ となり，

$$\log D = \log K_{\text{exZnB}} + \log [\text{H}_2\text{B}]_o + 2 \text{pC}_H$$

が成り立つ。ここで，*K_{exZnB}* は式(1) の抽出定数，

$$K_{\text{exZnB}} = \frac{[\text{ZnB}]_o [\text{H}^+]^2}{[\text{Zn}^{2+}] [\text{H}_2\text{B}]_o} \quad \text{である。}$$

Fig. 1 Distribution ratio of zinc(II) as a function of pC_H
org. phase : CHCl₃ solution containing 5.0 × 10⁻³ M H₂(salchn); aq. phase : 0.1 M (Na,H)ClO₄ containing 2.5 × 10⁻⁴ M Zn(ClO₄)₂

Fig. 1 に 5.0 × 10⁻³ M H₂B クロロホルム溶液に亜鉛(II) を抽出したときの log *D* を pC_H の関数として示す。Fig. 1 から分かるように pC_H の増加と共に log *D* は直線的に増大し，その傾きは 2 である。このデータから log*K_{exZnB}* = -12.1 ± 0.1 が得られた。

3・2・2 亜鉛(II) の Hpta による抽出 0.05 M の Hpta，HA，で亜鉛(II) をクロロホルムへ抽出したときの亜鉛(II) の log *D* は平衡時の pC_H が高くなるに従って増大し，傾き 2 の直線を示した。したがって，

で表される平衡の抽出定数は log*K_{exZnA}* として -9.55 ± 0.09

Fig. 2 The extraction enhancement of zinc(II) as a function of the total concentration of added $H_2(\text{salchn})$ in the extraction of zinc(II) with 0.05 M Hpta and $H_2(\text{salchn})$

The solid curve: $Y = -9.55 + \log(1 + 10^{2.85}X)$; The dotted line: $Y (\log K_{\text{exZnB}}) = -9.55 \pm 0.09$

が算出された。

3・2・3 亜鉛(II) の Hpta と $H_2(\text{salchn})$ による抽出 亜鉛(II) を pC_H 4.3~5.3 で, 0.05 M の HA と種々の濃度の H_2B を含む $CHCl_3$ 溶液へ抽出したときの分配比の増加を H_2B 濃度の関数として Fig. 2 に示した。 H_2B 濃度が 5×10^{-3} M では, 亜鉛(II) の抽出は H_2B が共存しない場合と比べ 4 倍以上よい。この抽出の増加が ZnA_2H_2B の生成によるものと仮定すると, 亜鉛(II) の分配比 D は,

$$D = \frac{[ZnA_2]_o + [ZnB]_o + [ZnA_2H_2B]_o}{[Zn^{2+}]} \quad (3)$$

となる。

3・2・1 と 3・2・2 で算出したそれぞれの抽出定数から $[ZnB]_o/[ZnA_2]_o$ は

$$\frac{[ZnB]_o}{[ZnA_2]_o} = \frac{K_{\text{exZnB}}}{K_{\text{exZnA}}} \times \frac{[H_2B]_o}{[HA]_o^2} = 10^{-2.6} \times \frac{[H_2B]_o}{[HA]_o^2} \quad (4)$$

で表され, pC_H にはよらない。本実験では $[HA]_o$ として 0.05 M を用いており, H_2B は最大 5×10^{-3} M であるので, 最大でも ZnB は ZnA_2 の 0.5% に過ぎない。したがって有機相の亜鉛(II) は実質的に ZnA_2 と ZnA_2H_2B だけで, ZnB は無視できる。

3・2・1 に示したように, pC_H 4.3~5.3 では H_2B はプロトンと解離したり会合したりしないので, 次式で定義され

る ZnA_2H_2B の安定度定数, β_{Zn} ,

$$\begin{aligned} ZnA_{2(o)} + H_2B_{(o)} &\rightleftharpoons ZnA_2H_2B_{(o)} \\ \beta_{Zn} &= \frac{[ZnA_2H_2B]_o}{[ZnA_2]_o[H_2B]_o} \end{aligned} \quad (5)$$

と ZnA_2 の抽出定数を式(3)に代入すると,

$$D = K_{\text{exZnA}}[HA]_o^2[H^+]^{-2}(1 + \beta_{Zn}[H_2B]_o) \quad (6)$$

が得られる。式(6)に基づいて安定度定数を求めるには関連する化学種の濃度は平衡時のものを使わなくてはならない。

有機相の亜鉛(II) の全濃度 $Zn_{o,T}$ は

$$Zn_{o,T} = [ZnA_2]_o + [ZnB]_o + [ZnA_2H_2B]_o \quad (7)$$

H_2B のマスバランスは

$$B_T = [H_2B]_o + [ZnB]_o + [ZnA_2H_2B]_o \quad (8)$$

である。したがって,

$$[H_2B]_o = K_{\text{exZnA}}[Zn^{2+}][HA]_o^2[H^+]^{-2} - Zn_{o,T} + B_T \quad (9)$$

本実験で用いた B_T は $5 \times 10^{-3} \sim 10^{-4}$ M であるのに対し, 有機相に抽出された亜鉛(II) は最大でも 10^{-5} M 程度にすぎないので, $[H_2B]_o$ は B_T とみなして差し支えない。Fig. 2 のデータを逐次近似法で解析して $\log \beta_{Zn} = 2.85 \pm 0.07$ を得た。最も汎用性の高いキレート抽出剤である 2-テノイルトリフルオロアセトンと亜鉛(II) が作るキレートにリン酸トリブチル (TBP) が配位した錯体の第一安定度定数がクロロホルムの中で $10^{2.69}$ と報告された例がある⁸⁾。したがって, シッフ塩基である $H_2(\text{salchn})$ は亜鉛(II) の β -ジケトンキレートに対して, TBP に匹敵する強いルイス塩基であると言える。

3・2・4 ユウロピウム(III) の Hpta と $H_2(\text{salchn})$ による抽出に与える亜鉛(II) の効果 以上述べたように亜鉛(II) を HA と H_2B で抽出したとき, 亜鉛(II) の抽出種は ZnA_2 , ZnB と ZnA_2H_2B である。本研究の実験で使われた HA は 0.05 M, H_2B の最大濃度 5×10^{-3} M で, それぞれの抽出種の割合はほぼ, $ZnA_2 : ZnA_2H_2B : ZnB = 1 : 3.5 : 0.005$ である。

つぎにこの二つの抽出剤による Eu(III) の抽出を Zn(II) の抽出と比べた。Fig. 3 に●で Eu(III) を pC_H 4.4~5.1 で 0.05 M HA と種々の濃度の H_2B を含む $CHCl_3$ 相へ抽出したときの分配比の増加を H_2B の関数として示した。 H_2B

Fig. 3 The extraction enhancement of Eu(III) from 0.1 M NaClO₄ (pC_H 4.4~4.6) with 0.05 M Hpta and various amounts of H₂(salchn) and the effect of zinc(II) added into the aqueous phase on the extractability of Eu(III)

● in the absence of Zn²⁺; △ in the presence of 5.6×10^{-3} M Zn²⁺

の濃度の増加と共に Eu(III) の抽出はよくなっている。この抽出の増加が EuA₃ に H₂B が配位した EuA₃H₂B が生成したことによると仮定すると有機相に抽出される化学種は EuA₃ と EuA₃H₂B である。したがって、Eu(III) の分配比 D は式(3) 同様に EuA₃H₂B の安定度定数、 β 、と EuA₃ の抽出定数を分配比に代入すると、

$$D = K_{\text{exEuA}} [\text{HA}]_0^3 [\text{H}^+]^{-3} (1 + \beta [\text{H}_2\text{B}]_0)$$

となる。式中の β は次式で表される EuA₃H₂B 錯体の安定度定数である。

$$\beta = \frac{[\text{EuA}_3\text{H}_2\text{B}]_0}{[\text{EuA}_3]_0 [\text{H}_2\text{B}]_0}$$

Fig. 3 のデータを逐次近似法で解析して $\log \beta = 2.65 \pm 0.09$ を得た。Fig. 3 には水相に 5.6×10^{-3} M の Zn イオンを共存させて HA と H₂B で Eu(III) を抽出したときの Eu(III) の抽出の増加も示してある (△印)。Zn イオンが共存すると、Zn イオンが共存しないときよりも 2 倍以上抽出がよい。

すでに述べたように平衡時のクロロホルム相中の ZnB の割合は極めて低いので、水相に Zn イオンの共存によって抽出が増加するのは ZnA₂ は EuA₃ に配位しないことより、

で表される複核錯体が安定であることを示唆する。

式(10) の平衡定数である複核錯体の安定度定数 $\bar{\beta}$ はつぎのように決定した。

有機相のユウロピウム(III) の全濃度、Eu_{o,T}、は

$$\text{Eu}_{\text{o,T}} = [\text{EuA}_3]_0 + [\text{EuA}_3\text{H}_2\text{B}]_0 + [\text{EuA}_3\text{ZnB}]_0 \quad (11)$$

この式に本研究で得られた、EuA₃H₂B の安定度定数 β と EuA₃ の抽出定数 $K_{\text{exEuA}} (= 10^{-10.5})$ を代入して変形すると

$$\bar{\beta} = \{ (D_{\text{Eu}} [\text{HA}]_0^{-3} [\text{H}^+]^3 / K_{\text{exEuA}}) - (1 + 10^{2.65} [\text{H}_2\text{B}]_0) \} / (K_{\text{exZnB}} [\text{Zn}^{2+}] [\text{H}_2\text{B}]_0 [\text{H}^+]^{-2}) \quad (12)$$

が得られる。この式に基づいて抽出データを解析し、複核錯体の安定度定数は $\log \bar{\beta}$ として 7.45 ± 0.05 を得た。

これらの結果から亜鉛(II) はシッフ塩基である H₂B よりも β -ジケトンである HA との親和性の方が強く、平衡時のクロロホルム相には ZnB は ZnA₂ に比べると無視できるほど少ないが、ZnA₂ は EuA₃ と錯体を生成しないのに対して ZnB は EuA₃ と安定な錯体を作る。つまり、水相に十分な量の Zn イオンがあればこれが有機相にある H₂B と反応して、EuA₃ と錯体を作るのに必要な ZnB を常に提供するので複核錯体の抽出生成が可能となったと結論できる。

以上述べたように、本溶媒抽出系で得られる有機相には EuA₃ZnB、EuA₃H₂B、EuA₃、ZnA₂、ZnA₂H₂B 等の抽出種のほかに、未反応の抽出剤も共存する。このように種々の化学種が共存するときに複核錯体の蛍光が受ける影響を調べるために抽出相の蛍光スペクトルを測定した。

3・3 亜鉛(II) 錯体の蛍光特性と Eu(pta)₃ の蛍光に与える Zn(salchn) の効果

3・3・1 Zn(pta)₂ キレートとその H₂(salchn) 錯体の蛍光スペクトル HA と H₂B を含む CHCl₃ へ Eu(III) と亜鉛(II) が抽出されるとき、亜鉛(II) が Eu(III) の蛍光に与える影響を解析する前に、本実験条件下での亜鉛(II) の蛍光スペクトルを調べた。

Fig. 4a に励起波長 370 nm で測定した一定濃度の ZnB にいくつかの濃度の HA を加えたクロロホルム溶液の蛍光スペクトルを示す。ZnB は 450 nm 付近にピークをもち、青色蛍光を示すが、ZnA₂ は 1.1×10^{-3} M であっても測定した全波長にわたって蛍光を示さなかった。ZnB 溶液に種々の HA を加えると、加えた HA 濃度が高くなるにつれて蛍光強度は減少する。これは前述のように有機相中の [ZnA₂] と [ZnB] の濃度比を一定に保つために、

Fig. 4 The fluorescence spectra of Zn(II) complexes at the excited wavelength of 370 nm

a. The effect of Hpta on the fluorescence of 3.0×10^{-5} M Zn(salchn). From the top to the bottom, [Hpta]: 0.0 M, 3.0×10^{-5} M, 1.2×10^{-4} M, and 2.4×10^{-4} M. The broken line shows the spectrum of 1×10^{-3} M Zn(pta)₂. b. The fluorescence spectrum of a mixed solution between H₂(salchn) and Zn(pta)₂ at 1 : 1 molar ratio (2.7×10^{-4} M)

Fig. 5 Fluorescence spectra of CHCl₃ solutions containing ① 1×10^{-4} M Eu(pta)₃, ② 1×10^{-4} M Zn(salchn), and ③ 1×10^{-4} M Eu(pta)₃ and Zn(salchn) (molar ratio 1 : 1)

All the solutions were prepared by dissolving the complexes synthesized into CHCl₃.

の置換反応が起こるためである。

Fig. 4b はモル比 1 : 1 で ZnA₂ と H₂B を混合した溶液の蛍光スペクトルを示す。ZnA₂ 同様、H₂B も測定した波長範囲に蛍光は観察できないが、ZnA₂ と H₂B の混合溶液は 470 nm 付近に顕著な蛍光を示す。これは溶媒抽出の際、

ZnA₂ に H₂B が配位した錯体が生成したことに対応しており、H₂B の増感作用のために ZnA₂ の蛍光が増したと説明できる。したがって、式(13)に基づいて ZnA₂ と H₂B が生成すると両者間に配位錯体ができ、Fig. 4b に示したようにこの錯体は蛍光をもつ可能性がある。ZnB が ZnA₂ に変化すると蛍光強度が減少するが、配位錯体の生成によって蛍光強度が増大するはずである。定量的に説明するには更にデータを収集し詳細に解析しなければならない。

3.3.2 抽出種の蛍光に与える亜鉛(II) の影響 Fig. 5 に合成した EuA₃ (①) と ZnB (②), それぞれの 1×10^{-4} M CHCl₃ 溶液と、両者を 1×10^{-4} M ずつ含む CHCl₃ 溶液 (③) の蛍光スペクトルを示す。Fig. 4a でも示したように、ZnB は 450 nm 付近に蛍光ピークをもつが、ZnB の濃度が同じでも EuA₃ が同濃度共存すると 450 nm の亜鉛(II) の蛍光は消え (Fig. 5 のスペクトル ② と ③ の比較), 612 nm の Eu(III) の蛍光が増感された (Fig. 5 のスペクトル ③ と ① のピーク波長での強度を比較すると、蛍光強度は 14 倍になっている)。Fig. 6 は亜鉛(II) と Eu(III) を含む水溶液を pC_H 4.6 で 0.05 M の HA と 2×10^{-3} M の H₂B を含む CHCl₃ を振り混ぜて抽出平衡に達した後の有機相の蛍光スペクトルを示す。スペクトルの形は、Fig. 5 の蛍光スペクトルの ③ とよく似ているが蛍光強度は混合溶液に比べ小さい。EuA₃ を抽出した CHCl₃ 相のスペクトルは形状だけでなく、強度もよく一致していた。つまり、共存する HA は EuA₃ の蛍光スペクトルに影響しない。しかしながら、Eu(III) と亜鉛(II) を Hpta と H₂(salchn) で抽出すると、抽出種には複核錯体だけでなく、EuA₃H₂B と EuA₃

Fig. 6 Fluorescence spectra of CHCl_3 extracted Eu(III) of $2 \times 10^{-5} \text{ M}$ and Zn(II) of $2 \times 10^{-6} \text{ M}$ with 0.05 M Hpta and $2 \times 10^{-3} \text{ M}$ $\text{H}_2(\text{salchn})$ at pC_H 4.6 (solid line) and Eu(III) of $2 \times 10^{-5} \text{ M}$ with 0.05 M Hpta (dotted line)

も加わる。Fig. 6 は $1.5 \times 10^{-3} \text{ M}$ の亜鉛(II) を含む水溶液から抽出したもののなので、有機相に抽出された全 Eu(III) の濃度 ($2.5 \times 10^{-5} \text{ M}$) の約 8% が複核錯体を形成しているにすぎない。そのため、蛍光強度の増大はあまり大きくないが、もし水相の亜鉛(II) 濃度と pC_H をもっと高く調整すると、Eu(III) をほぼ定量的に複核錯体として抽出可能となり、Fig. 6 に示す強度を大きく改良することができる。したがって、溶媒抽出によって EuA_3ZnB が調製でき、その蛍光強度も他の共存化学種の蛍光も影響を受けないといえる。

4 結 論

亜鉛イオンの共存する水溶液から Eu(III) を Hpta (HA) と $\text{H}_2(\text{salchn})$ (H_2B) で抽出すると、亜鉛イオンが共存しない溶液からより Eu(III) はよく抽出された。これは ZnA_2 , ZnB , $\text{ZnA}_2\text{H}_2\text{B}$ としての抽出、特に ZnB の抽出は悪いが EuA_3ZnB 型の複核錯体が安定なために、 $\text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\text{B}_{(\text{o})} + \text{Eu}^{3+} + 3\text{HA}_{(\text{o})} \rightleftharpoons \text{EuA}_3\text{ZnB}_{(\text{o})} + 5\text{H}^+$ が主な抽出となっており、複核錯体が生成し、有機相に抽出されるためであると結論された。この抽出平衡定数は $\beta_1 K_{\text{exEuA}} K_{\text{exZnB}} = 10^{-15.15}$ であるので 0.05 M Hpta, $5 \times 10^{-3} \text{ M}$ $\text{H}_2(\text{salchn})$, pC_H 6.0 で抽出し、水相に 0.01 M の亜鉛(II) を共存させると極めて有効に複核錯体を調製することができる。

本研究は文科省科研費基盤研究 (C) 19550096 の助成を受けた。

文 献

- 1) I. Ramade, O. Kahn, Y. Jeannin, F. Robert : *Inorg. Chem.*, **36**, 930 (1997).
- 2) K. Hanaoka, K. Kikuchi, H. Kojima, Y. Urano, T. Nagano : *Angew. Chem. Int. Ed.*, **42**, 2996 (2003).
- 3) K. Hanaoka, K. Kikuchi, H. Kojima, Y. Urano, T. Nagano : *J. Am. Chem. Soc.*, **126**, 12470 (2004).
- 4) K. Dhara, S. Karan, J. Ratha, P. Roy, G. Chandra, M. Manassero, B. Mallik, P. Banerjee : *Chem. Asian J.*, **2**, 1091 (2007).
- 5) Y. Hasegawa, S. Kumaki, K. Tanaka : *Proceedings of ISEC' 05*, 252-258 (2005), (Beijing).
- 6) 齊藤周平, 熊木聡志, 長谷川佑子 : *分析化学 (Bunseki Kagaku)*, **54**, 1027 (2005).
- 7) Y. Hasegawa, S. Saito, D. Nagaoka, H. Yjima, M. Kanosato : *J. Alloy Compounds*, **451**, 320 (2008).
- 8) T. Sekine, Y. Hasegawa : *"Solvent Extraction Chemistry"*, (1978), (Marcel Dekker, New York).

Extraction Behavior of Zinc(II) with β -Diketone and Schiff Base, and the Effects of Zinc(II) on Extraction and Fluorescence of Tris(β -diketonato)europium(III)

Sayaka TAMAKI¹, Yuichi ITO¹, Masayuki INOUE¹, Hirofumi YAJIMA¹ and Yuko HASEGAWA¹

¹ Department of Chemistry, Faculty of Science, Science University of Tokyo, 1-3, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8601

(Received 15 April 2008, Accepted 20 June 2008)

In the present study, all equilibria occurred upon shaking an aqueous solution containing Zn(II) and Eu(III) with an equal volume of chloroform containing Hpta (pivaloyltrifluoroacetone, HA), and H₂(salchn) {bis(salicylidene)cyclohexyldiamine, H₂B} were measured and analyzed in order to accumulate fundamental data to prepare a binuclear complex consisting of EuA₃ and ZnB. The results showed that H₂B formed a complex with ZnA₂ as well as EuA₃, but ZnB formed a more stable complex with EuA₃ than does H₂B. Although ZnB is less extractable than ZnA₂ in the presence of Zn(II) the dominant extracted species is EuA₃ZnB, because EuA₃ZnB is stable. From all of the constants determined, such as the extraction constants and the stability constants, it was estimated that the binuclear complex can be prepared when Eu(III) is extracted with Hpta and H₂(salchn) from an aqueous solution containing a sufficient amount of Zn(II) at a high pH; *e.g.*, at pH 5. The complex, ZnA₂H₂B, gives a weak fluorescence at around 470 nm, and ZnB shows blue fluorescence at 450 nm. When solutions of EuA₃ and ZnB were mixed, the blue fluorescence disappeared, and the red fluorescence at 612 nm was remarkably sensitized. When the fluorescence spectrum of the mixed solution dissolved, synthesized EuA₃ and ZnB were compared with that of the CHCl₃ extracted EuA₃ZnB at a similar composition and concentration of Eu(III) and Zn(II), the spectra were similar to each other.

Keywords : Eu(III), Zn(II); phosphor ; synergistic extraction ; β -diketone ; binuclear complex.