報 文

鉛同位体比測定に基づく遺跡から出土した 朱（水銀朱）の産地の解析

南 武 志¹, 今津 節生², 北川 路子³, 牧田 碧夏³,
西川 恵祐^{3,4}, 永 松 剛^{3,4}, 田中 龍彦⁴, 卜部 達也³,
木寺 正憲³, 石塚 香織⁵, 高久 雄一⁶, 高橋 和也^{®3}

考古学において、化学分析や同位体分析に基づいた遺跡出土品の産地などの解析は非常に有効な手法となっている。近年、弥生後期から古墳時代にかけて遺跡から出土する朱（水銀朱）が注目されるようになっていく。著者らは、朱に含まれる微量の鉛の同位体比の分析を行い、産地同定を試みた。まず、朱の起源となる辰砂鉱石について鉛同位体の分析を行った。その結果、幾つかのグループ、例えば、近畿産、揚子江中流域といった地域ごとに、鉛同位体から識別ができることを示した。同時に、幾つかの遺跡から出土した朱について鉛同位体分析を行い、その産地の推定を試みた。天神山古墳など三つの古墳から出土した朱は近畿産であることが強く示唆されるとともに、大風呂南遺跡や西谷墳丘墓等のから出土した朱は大陸産であることを示す結果が得られた。以上のことより、鉛同位体比分析は遺跡出土の朱の産地解析に非常に有効であることが明らかになった。

1 序 論

古代遺跡からの出土品の化学的な分析は、その時代における文物の流通や起源を探る上で非常に重要である。考古学においては、遺構から出土した陶器、建築材などの実用品や武具、あるいは墳墓から出土した副葬品（鏡、宝飾品、武器）などが分析対象となり、めざましい成果をあげている。近年、遺跡から出土する顔料の中でも朱（水銀朱、硫化第二水銀）も少なからず注目されるようになってきた。朱は鮮やかな赤色、深紅色をしており、遺跡から様々な形で出土することが知られている。朱の原材料となる天然の鉱石を一般に辰砂と呼ぶが、辰砂は中国（貴州省、^{せん}陝西省、雲南省など）で産出するほか、日本においては中央構造線沿いの各地（三重、奈良、徳島、大分など）や北海道等にも鉱山が有り、その幾つかは縄文時代よりすでに採掘が行われていたと考えられている。辰砂と朱（水銀朱）は言葉上の使い分けにすぎず、本質的に同じもので、古代人も採

掘した辰砂を他の鉱物や土砂とより分け、選鉱して、朱として用いていたものと思われる。本田（1988 及び1995）¹⁾²⁾によると古代日本において葬祭儀式に朱を用いられたと考えられており、墳墓における出土形態から、被葬者の権力誇示に使用されていた可能性が示唆されている。また、日本において多量の朱が出土する遺構の年代が古代統一国家成立過程の時期（2～6世紀）に相当することを考えると、朱の産地同定により、当時の日本国内における権力体制の推移を推し量る有力な情報になると考えられる。

朱の産地同定のための化学的な分析手法としては、微量元素分析、同位体分析が考えられる。南（2008）³⁾によれば、幾つかの微量元素（Ca, Cr, Mn, Fe, As, Sr, Ba）の存在度に鉱山ごとに違いはあるものの、明確に産地を識別するまでにはいたらず、微量元素存在度のみでの産地同定は困難である。さらに、朱（辰砂）鉱石中の硫黄の同位体組成を基にした産地同定の試みもなされており⁴⁾、それによると、辰砂鉱石の硫黄の同位体組成が中国産と日本産で異なることが報告されており、大まかな識別が可能であることが判明した。しかしながら、さらに細かく、例えば、日本産ならばどの鉱山（奈良産か徳島産かなど）から採掘されたものかまでを識別するには至っていない。

そこで、著者らは、鉛同位体に着目した。遺跡から出土する青銅製品（鏡、銅鐸、銅剣、銅矛）の鉛同位体比に関しては、かなりのデータの蓄積がある。馬淵（2007）⁵⁾に総括されているように、鉛同位体による原材料の産地推定が

[®] E-mail: kazuyat@riken.jp

¹ 近畿大学理工学部生命科学科: 577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1

² 九州国立博物館: 818-0118 福岡県太宰府市石坂 4-7-2

³ 独立行政法人理化学研究所仁科加速器研究センター: 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1

⁴ 東京理科大学工学部工業化学科: 162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3

⁵ 株式会社エンテックス: 277-0852 千葉県柏市旭町 1-2-8

⁶ 公益財団法人環境科学技術研究所: 039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾鯨字家ノ前 1-7

Fig. 1 Elution curve of lead in anion exchange

The vertical axis exhibits the relative abundance to the original Pb amount (see text).

非常に有名である。青銅は古代においては実用材料として広く流通しており、恐らくはリサイクルもあったと推測される。鉛同位体比による産地推定は、同位体地学の知見と組み合わせて、華北、華南、朝鮮半島、日本、といったやや大きめのスケールでの産地推定を行っている。これはあくまで、「原材料の産地推定」であり、例えば、ある青銅製品中の鉛同位体組成において、中国のある地域の鉛鉱山のそれと近い結果が得られたとしても、その製品そのものが中国から直接もたらされたと言えない可能性は十分にある。

これに対して、朱（辰砂）の場合、材料としての実用性はほとんど無く、もっぱら「威信財」としての限られた流通であるため、直接的に採掘鉱山と結びつける産地同定も可能であり、産地が当時における地域間の交易状況だけでは無く、直接的に権力体制同士の交流状態を示唆する情報となる可能性も強いのではないかと考えた。

本研究においては、朱（辰砂）中の鉛同位体比の分析手順を確立するとともに、鉱山ごとに鉛同位体比の差異を検証し、同時に幾つかの遺跡出土の朱に適用を試みた。

2 辰砂（朱）試料の化学処理及び鉛同位体分析法

朱（辰砂）の化学組成は HgS で表されるが、ここから微量の鉛を分離抽出する必要がある。予備的に、一部の試料に関して誘導結合プラズマ（ICP）質量分析装置により鉛の濃度を分析したところ、中国貴州省銅仁の朱で 49 ppb、三重県丹生水銀鉱山の朱で 99 ppb、奈良県大和水銀の朱で 401 ppb、とおおむね 50 ppb から 0.5 ppm 程度であり、鉛は水銀と同じ親銅元素として硫化鉱物に含まれやすい性質の割には低い濃度であることが判明した。また、鉛は汚染

を招きやすい元素であるので、汚染を避けるため、なるべく試料の化学処理は簡単である方が好ましい。そこで、試料処理は以下の手順で行った。まず、試料約 50～100 mg 程度をテフロンビーカーに秤取りし、逆王水 5 mL で加熱分解した。蒸発乾固後、1M 塩酸に溶解させ、陰イオン交換樹脂（Dowex1x8：200～400 メッシュ）を 5 mL 程度充填したカラムに通して、水銀を吸着させた。その後、1M 塩酸 10 mL を通した後、1M 塩酸 10 mL 及び 6M 塩酸 20 mL で鉛を回収した。この方法の根拠となる、分離曲線を Fig. 1 に示す。この Fig. 1 は以下の様な手順で作成した。鉛を 10 ppm 含む溶液 0.5 mL を調整後、試薬の硫化水銀 0.1 g に加えて模擬試料とした。次に、前述の実際の試料の処理と同じ手順で分解、1M 塩酸溶液に調製したカラムに吸着させ、以降、1M 塩酸 20 mL、引き続いて 6M 塩酸 30 mL を流し、溶出液を 10 mL ずつ ICP 質量分析装置で分析し、各フラクションの鉛の存在度を計測し、使用した模擬試料中の全鉛に対する相対量をプロットしたものが Fig. 1 である。水銀はほとんどブランクレベルで検出されず、プロットを描くことができなかった。すなわち、水銀はカラムに吸着されたままであると考えられるが、本研究においては鉛の分離回収が重要であるので、水銀の回収に関しては解析を行わなかった。Fig. 1 から推測されるように、この条件で水銀はほとんど溶出しないが、鉛は 1M 塩酸 10 mL を流した後の 1M 塩酸 10 mL と 6M 塩酸 20 mL の溶出液で 90 % 回収されている。そこで、上記の方法により鉛の回収を行った。

回収した鉛を含む溶液に硝酸を加えて再度蒸発乾固した後、表面電離型質量分析計での測定用試料とした。わずかに水銀も残るが、表面電離のイオン源において、水銀はイオン化しないので、測定の妨害にはならない。なお、イオン交換樹脂は 1 試料ごとに交換しており、再生しての使用は行っていない。質量分析装置に導入する際の手順は以下のとおりである。長さ数ミリ、幅 1 ミリのレニウムのフィラメントに水溶液として塗布し、フィラメントに通電を行い、加熱、乾燥させる。さらに、5 % 程度のリン酸溶液及び、シリカゲルを MilliQ 水に懸濁させた溶液を 1 滴ほどかぶせるように塗布し、通電、乾燥させたものを質量分析用とした。用いた表面電離型質量分析装置（TIMS）は VG SECTOR-54（7 コレクター）であり、4 個のファラデーカップを用いて、 ^{204}Pb 、 ^{206}Pb 、 ^{207}Pb 、 ^{208}Pb を同時に検出し、測定を行った。試料中の鉛同位体比の測定は ^{208}Pb のイオン強度が、おおむね 5×10^{-13} アンペア程度になる条件で行った。又、鉛同位体測定について、装置の安定性を確認するとともに、鉛の含有量の違いによるブランクの影響を吟味するため、硫化水銀試薬（高純度化学研究所）100 mg に NIST981 鉛同位体標準試薬を 5 ng、20 ng、100 ng それぞれ添加した 3 種類の疑似試料を作成し、前記の実試料に

Fig. 2 Vermilion sample from a Yamato-Tenjinyama ancient tomb

おける化学処理と同様な操作を加えて処理したものを数試料ごとに、試料と同レベルのシグナル強度での測定を行った。

さらに、一部の試料に関しては磁場型の ICP-質量分析装置 (MC-ICP-MS, Nu instrument 製 Nu Plasma HR) での測定も行った。その場合の試料の前処理は基本的に上記と同じであるが、水銀の同重体干渉 (^{204}Hg が ^{204}Pb に干渉する。) を避けるために、2 回繰り返してイオン交換を行い、回収した溶液を蒸発乾固した後、硝酸溶液として測定に供した。この磁場型の ICP-質量分析装置による鉛同位体測定における質量差別効果については NIST981 鉛同位体標準試料及び NIST997 Tl 同位体標準試料による補正を行った⁶⁾。

3 試料について

天然の辰砂鉱石として分析したのは、日本産として、奈良県大和水銀鉱山、三重県丹生水銀鉱山、徳島県水井鉱山、中国産として、湖南 (Hunan) 省辰溪、貴州 (Guizhou) 省銅仁、陝西 (Shaanxi) 省旬陽の各産出辰砂鉱石である。幾つかの辰砂鉱石は複数入手し、それぞれ別個に処理し同位体分析に供した。これらの鉱山はいずれも 1~4 世紀にかけて採掘されていた可能性が強いとされている。一方、遺跡出土の朱の分析も行ったが、対象となった遺跡は以下のとおりである。1~3 世紀にかけての遺構として、西谷墳丘墓 (出雲地方)、榑築墳丘墓 (吉備地方)、大風呂南遺跡 (丹後地方)、さらに 3~4 世紀頃の前古墳として大和天神山古墳、桜井茶臼山古墳、黒塚古墳 (いずれも奈良県) から出土した朱に関して鉛同位体比分析を行った。これらの遺跡の選定においては古代日本における王権の成立過程期の遺跡、と言う以外に特段の考古学的な意味合いは無いが、いずれも相当量の水銀朱が出土している。硫黄同位体比による解析³⁾⁴⁾⁷⁾において、大和天神山古墳、桜井茶臼山古墳、

黒塚古墳の朱は日本産、西谷墳丘墓、大風呂南遺跡の朱は中国 (恐らく陝西省産) と言う結果が出されている。Fig. 2 に前処理前の朱試料の一例 (大和天神山古墳出土の朱) を示す。

4 分析結果及び考察

すべての試料に関して鉛同位体比の測定結果を Table 1 にまとめて示す。Table 1 には前述のように硫化水銀試薬に NIST981 鉛同位体標準試薬を 5 ng, 20 ng, 100 ng それぞれ添加した 3 種類の疑似試料 NIST (5 ng), NIST (20 ng), NIST (100 ng) の分析結果もあわせて示した。これら疑似試料の分析結果の分布範囲が同位体測定の確度を示す指標になりうると思われる。この結果より、 ^{206}Pb を分母にした同位体比においては 0.1~0.3 %, ^{204}Pb を分母とした同位体比においては 0.3~0.6 % の確度を加味した誤差を考慮の必要がある。なお、ブランクの影響については、NIST (5 ng) の値が他より軽い同位体がわずかに少なめに出ているが、誤差を考えるとほとんど無視できると見なすことができる。

また、中国陝西省旬陽及び日本の徳島水井鉱山の辰砂鉱石に関しては表面電離型質量分析装置 (TIMS) と磁場型 ICP 質量分析装置 (MC-ICP-MS) の両方で測定を行っている。 ^{206}Pb を分母にした同位体比においては 1 % 弱程度、 ^{204}Pb を分母とした同位体比においては 1 % を若干越える差異が認められる。分析の誤差を考えると、この差は無視できない。この差が、分析手法による差であるか、それとも試料における不均一性が現れているのかを吟味する必要がある。例えば大和水銀及び丹生水銀については TIMS で 2 試料ずつ測定しているが、 ^{204}Pb を分母とした同位体比においても最大 0.2 % 程度しか差が認められない。これを演繹^{えき}すると、異機種により分析結果が異なる可能性は否定できない。今後、測定試料を増やす中で、異機種間の差異について検討を進める必要がある。一方で、例えば MC-ICP-MS による中国陝西省旬陽の鉛同位体比測定結果が他の地域のそれと重なるほどにはならない。したがって、1 % レベルの不確かさを前提としながら、後述のように、TIMS と MC-ICP-MS による測定結果を併記し、各試料の鉛同位体組成の差の検討を行うことは可能であると考えられる。

4.1 天然の辰砂鉱石について

Fig. 3 に、天然の辰砂鉱石の鉛同位体比を $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ - $^{208}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ の 3 同位体系にて示す。このような図は簡便に同位体比をグループ分けするのによく用いられる図である。ほとんどの試料について、測定誤差は図中のシンボル内に収まっている。また、一か所の鉱山について複数個の試料を測定しているが、同じ鉱山であればある程度そろった鉛同位体比を示すことが分かる。さらに重要なことは、

Table 1 Lead isotope ratios obtained in this study

	Sample type	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	Uncertainty	$^{208}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	Uncertainty	$^{200}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$	Uncertainty	$^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$	Uncertainty	$^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$	Uncertainty
Nara(Yamato)1	Cinnabar ore	0.84428 ± 0.00016		2.0902 ± 0.0004		18.421 ± 0.035		15.554 ± 0.030		38.50 ± 0.07	
Nara(Yamato)2	Cinnabar ore	0.84515 ± 0.00010		2.1011 ± 0.0002		18.389 ± 0.017		15.540 ± 0.015		38.64 ± 0.04	
Mie(Nyu)1	Cinnabar ore	0.84554 ± 0.00010		2.0925 ± 0.0002		18.382 ± 0.038		15.555 ± 0.032		38.63 ± 0.08	
Mie(Nyu)2	Cinnabar ore	0.84350 ± 0.00009		2.0910 ± 0.0002		18.443 ± 0.019		15.559 ± 0.015		38.56 ± 0.04	
Tokushima1	Cinnabar ore	0.79735 ± 0.00009		1.9511 ± 0.0001		20.024 ± 0.028		15.963 ± 0.021		39.07 ± 0.05	
Tokushima2 ^{a)}	Cinnabar ore	0.79119 ± 0.00017		1.9470 ± 0.0002		19.909 ± 0.035		15.753 ± 0.028		38.77 ± 0.07	
Shaanxi1	Cinnabar ore	0.83921 ± 0.00005		2.0491 ± 0.0011		18.843 ± 0.013		15.812 ± 0.011		38.62 ± 0.27	
Shaanxi2 ^{a)}	Cinnabar ore	0.83658 ± 0.00014		2.0466 ± 0.0003		18.732 ± 0.014		15.670 ± 0.014		38.34 ± 0.03	
Shaanxi3 ^{a)}	Cinnabar ore	0.83589 ± 0.00051		2.0458 ± 0.0002		18.95 ± 0.15		15.84 ± 0.12		38.76 ± 0.30	
Guizhou	Cinnabar ore	0.85688 ± 0.00088		2.0919 ± 0.0013		18.40 ± 0.12		15.767 ± 0.041		38.49 ± 0.20	
Hunan	Cinnabar ore	0.85608 ± 0.00052		2.0830 ± 0.0009		18.41 ± 0.15		15.84 ± 0.12		38.58 ± 0.30	
Ohburo-minami ^{a)}	Burial vermilion	0.85693 ± 0.00017		2.1026 ± 0.0008		18.330 ± 0.006		15.709 ± 0.007		38.61 ± 0.02	
Nishidani	Burial vermilion	0.89014 ± 0.00431		2.1683 ± 0.0071		17.41 ± 0.16		15.50 ± 0.13		37.75 ± 0.36	
Kurozuka	Burial vermilion	0.83791 ± 0.00012		2.0921 ± 0.0003		18.791 ± 0.011		15.745 ± 0.011		39.32 ± 0.02	
Yamato-Tenjinyama	Burial vermilion	0.84562 ± 0.00010		2.0906 ± 0.0002		18.42 ± 0.12		15.567 ± 0.097		38.50 ± 0.24	
Tatetsuki	Burial vermilion	0.88613 ± 0.00010		2.1798 ± 0.0002		17.610 ± 0.021		15.601 ± 0.018		38.37 ± 0.05	
Sakuraichausuyama	Burial vermilion	0.84422 ± 0.00056		2.0941 ± 0.0012		18.437 ± 0.094		15.574 ± 0.080		38.51 ± 0.20	
NIST981 (5 ng)	Standard	0.91464 ± 0.00141		2.1681 ± 0.0047		16.937 ± 0.086		15.49 ± 0.10		36.72 ± 0.12	
NIST981 (20 ng)-1	Standard	0.91443 ± 0.00022		2.1648 ± 0.0019		16.914 ± 0.017		15.467 ± 0.018		36.62 ± 0.04	
NIST981 (20 ng)-2	Standard	0.91381 ± 0.00019		2.1610 ± 0.0017		16.893 ± 0.014		15.429 ± 0.015		36.51 ± 0.04	
NIST981 (100 ng)-1	Standard	0.91347 ± 0.00002		2.1614 ± 0.0004		16.901 ± 0.003		15.439 ± 0.003		36.53 ± 0.01	
NIST981 (100 ng)-2	Standard	0.91410 ± 0.00002		2.1629 ± 0.0003		16.895 ± 0.002		15.440 ± 0.002		36.54 ± 0.01	
NIST981 (100 ng)-3	Standard	0.91424 ± 0.00002		2.1645 ± 0.0005		16.901 ± 0.003		15.452 ± 0.003		36.58 ± 0.01	

^{a)} Data measured with MC-ICP-MS (The others were measured with TIMS).

Fig. 3 Lead isotope plots of $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ vs. $^{208}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ for cinnabar ore samples

辰砂鉱石の鉛同位体比にはある程度の地域差が認められる, ということである. すなわち, 近畿産(大和水銀鉱山, 丹生水銀鉱山), 徳島水井鉱山, 中国貴州省南東部周辺(貴州省銅仁, 湖南省辰溪), 中国陝西省旬陽というグループ分けが可能である. 大和水銀鉱山と丹生水銀鉱山, 貴州省銅仁と湖南省辰溪を鉛同位体比から識別することは困難であるが, 地域的に近接しており, 地質的な差異を認めたい可能性があり, より精密な識別には, 微量元素存在度などを組み合わせた工夫が必要と考えられる. また, Fig. 4に $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ - $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ の3同位体系で表したものを示す. この図はウランから壊変して生成する同位体(^{207}Pb と ^{206}Pb)と放射壊変による変動が無い ^{204}Pb との比を見ているもので, 同位体地質上の意味を加味したプロットであるが, 存在度の少ない ^{204}Pb をベースにした数値であるため測定誤差が大きくなっている. この図においても Fig. 3と同様な地域差がある程度は認められるが, 測定誤差をより小さくしていく必要がある. 同時に地質学的な意味を勘案した地球年代線を点線で示した. すなわち, 始原鉛の同位体組成(地球形成時に地球を形成した始原物質が保持していたと見なされる鉛同位体組成)から様々な鉛/ウラン比に応じて成長した現在の鉛同位体組成が示すライン, 地球年代線(Geochron)である. 自然界の物質中の鉛同位体比($^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$)は45.5億年前の地球形成以来, その鉛/ウラン比に応じて成長していく. ある時点で火成活動をうけて, 例えば辰砂鉱石が生成すると, ウラン

はほとんどその鉱物には含まれない場合, 鉛同位体の成長は停止する. Fig. 4において地球年代線よりも左やや下方に位置する鉛同位体組成を示す鉱物が形成され, その形成年代が古いほど地球年代線から左下方向にはずれる. 無論, すべての鉱物が始原物質からただ一回の単純な生成過程を経て形成されているわけでは無く, 地球内部の物質変動で化学組成(鉛/ウラン比)を変化させつつ何段階かの火成活動を経て形成されており, その結果, Fig. 4のように地球年代線のむしろ右側に位置する鉱物試料も存在する. 鉛鉱石の鉛同位体組成に基づいた鉱物中の鉛同位体進化など同位体地質学のデータ⁶⁾によると, 日本産や中国の揚子江域の鉛鉱石は一般に地球年代線付近か, その右側に位置し, 大陸の特に北方域のそれは左側の比較的古い時代を示唆する同位体を示すとされている. 鉛鉱石と辰砂鉱石の違いはあるが, 2 辰砂(朱)試料の化学処理及び鉛同位体分析法の項目において述べたように, 辰砂鉱石中に鉛は50 ppb から1 ppm 程度含まれている. 一方, ウランは検出限界以下(試料中の濃度として0.1 ppb 以下)であった. 鉛の同位体進化において良く用いられるパラメーター($^{208}\text{U}/^{204}\text{Pb}$)に換算すると, 多めに見積もって0.2 以下という値となる. この値は, 仮に中国の鉱床の生成年代としては相当古い先カンブリア代後期, 10 億年程度の年代を適用した場合, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 比を鉱床生成から現在までに0.03~0.04 程度進化させることになる. Table 1 の測定結果と比べると, この程度の変化は測定誤差内か, 試料によっては測定誤差を超

Fig. 4 Lead isotope plots of $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ vs. $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ for cinnabar ore samples

えている程度である。このことを加味した上での定性的な議論ではあるが、著者らの測定結果に関しても鉛鉱石とおおむね同様な結果を示していると言えよう。辰砂鉱石の鉛同位体比もおおむね鉛鉱石から推測される地質的特徴を反映していると考えられる。このように、Fig. 3 の方式と Fig. 4 の方式を組み合わせると多角的に鉛同位体組成を吟味することで、地域差を細かく識別することが可能であることが分かる。

4・2 遺跡出土の朱の鉛同位体比

Fig. 3, 4 に遺跡出土の朱の鉛同位体比のデータを重ねたものがそれぞれ Fig. 5, 6 である。この図より各遺跡出土の朱の産地について、以下の様に考えることが可能である。

大和天神山古墳、桜井茶臼山古墳、黒塚古墳：近畿産（大和もしくは丹生）

大風呂南遺跡：貴州省南東部（貴州省銅仁もしくは湖南省辰溪）

すなわち、今回分析した、3 世紀後半から 4 世紀初めにかけての奈良県の三つの古墳は大和ないし丹生の辰砂鉱石とほぼ同じ鉛同位体比であることから、この地域の辰砂を用いており、前述した硫黄同位体比分析の結果（日本産）とも符合する。大風呂南遺跡の朱は揚子江上流域（湖南省もしくは貴州省）に近い鉱山由来の朱が使われていると推

定できるが、硫黄同位体比分析の結果からは同じ中国産でも陝西省産ではないかと推測されており、この微妙な相違に関してはさらなる解析が必要である。

弥生時代後期にあたる楯築墳丘墓や西谷墳丘墓の朱は今回分析した辰砂鉱石のいずれとも異なった未知の鉛同位体比を示しており、天然の鉱石についてさらに探索を進める必要がある。なお、馬淵らにより蓄積された青銅器にかかわる鉛同位体比のデータ⁵⁾と比較すると、楯築墳丘墓や西谷墳丘墓の朱の鉛同位体比は三角縁神獣鏡や後漢鏡が示すデータ領域に入る。しかしながら、これらの遺跡からは銅鏡などは出土していないため、青銅器のさびなどからのコンタミネーションの可能性はきわめて低い。

次に、Fig. 6 の $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ - $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 同位体系で見ると、大風呂南遺跡の朱は、地球年代線の左側の貴州省や湖南省産の辰砂鉱石と同じ領域に位置しているので、鉛同位体比からは陝西省というよりは湖南省もしくは貴州省の辰砂鉱石由来と見なす方が自然だと考えられる。また、楯築墳丘墓や西谷墳丘墓の朱の鉛同位体比も地球年代線のさらに左下側に位置し、大陸側の古い地質年代の鉱物に由来すると見なせる。馬淵 (2007)⁵⁾によると、このような同位体的特徴は揚子江流域よりも華北域の鉛鉱石に見られるとされている。したがって、現時点では場所は特定できないが、中国の現在の地域名で述べると、河北省や山西省あた

Fig. 5 Lead isotope plots of $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ vs. $^{208}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ for cinnabar ore samples and burial vermillion samples from ancient tombs

◆, cinnabar ore; ◇, burial vermillion.

Fig. 6 Lead isotope plots of $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ vs. $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ for cinnabar ore samples and vermillion samples from ancient tombs

◆, cinnabar ore; ◇, burial vermillion.

りから北東域に楯築墳丘墓や西谷墳丘墓の朱の起源となる辰砂鉱石を産する鉱山があったものと推測される。ただし、Fig. 4やFig. 6の ^{204}Pb をベースにした同位体比のデータは、 ^{204}Pb の存在度自体が低いことにより、測定誤差が大きくなりがちであるため、測定精度をさらに向上させる必要がある。そのためには限られた試料の化学処理における鉛の回収率をさらに向上させる必要があるため、今後はイオン交換時における鉛の回収をより幅広く設定する予定である。

5 結 言

考古学における鉛同位体比分析に基づいた産地解析は、これまで青銅製品が主であったが、今回、水銀朱においても非常に有効であることが明らかになった。また、鉛鉱石から推測された産地の同位体地学上の特徴を辰砂鉱石も有しており、産地として未知の鉱山を予測する一助となり得ることも判明した。今後の課題として、まず、分析感度と精度を向上させる必要がある。特に、 $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ – $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 同位体系の解析を精密に行うために、試料の前処理における鉛の回収率をさらに上げる必要があろう。今回は、遺跡として特に考古学的な観点からの系統的な解析は行わなかったが、今後はより、系統的な分析を行っていく予定である。

謝 辞

本研究は、環境省国立水俣病研究総合センターの総合的水銀研究推進事業（我が国における歴史的な水銀産生および利用等に関する実証的研究）助成金を用いて行いました。また、鉛同位体分析においては、JSPS科研費24340139の補助を受けて行いました。深謝いたします。また、遺跡朱試料については以下の様に、各研究機関、行政機関よりいただくことができました。深く感謝申し上げます。（西谷墳丘墓：島根大学考古学研究室、大風呂南遺跡：京都府岩滝町教育委員会、楯築墳丘墓：岡山大学考古学研究室、桜井茶臼山古墳、黒塚古墳、大和天神山古墳：橿原考古学研究所）

文 献

- 1) 本田光子：九州考古学，**62**, 39 (1988).
- 2) 本田光子：考古学と自然科学，**31**, 63 (1995).
- 3) 南 武志：地学雑誌，**117**, 948 (2008).
- 4) 南 武志，岩橋孝典，大庭俊次，伊藤 智，柴崎晶子，坂本豊治，今津節生，渡辺貞幸：考古学と自然科学，**62**, 65 (2011).
- 5) 馬淵久夫：考古学と自然科学，**55**, 1 (2007).
- 6) 服部道成，高久雄一，島村 匡：分析化学 (*Bunseki Kagaku*)，**57**, 113 (2008).
- 7) 寺沢 薫，南 武志，武内章記，高橋和也，東 影悠：青陵，**136**, 1 (2012).

Sources of Vermilion Collected from Ancient Japanese Tombs Determined by the Measurements of Lead Isotopes

Takeshi MINAMI¹, Setsuo IMAZU², Michiko KITAGAWA³, Mika MAKITA³,
Keisuke NISHIKAWA^{3,4}, Tsuyoshi NAGAMATSU^{3,4}, Tatsuhiko TANAKA⁴, Tatsuya URABE³,
Masanori KIDERA³, Kaori ISHIZUKA⁵, Yuichi TAKAKU⁶ and Kazuya TAKAHASHI^{®3}

[®] E-mail : kazuyat@riken.jp

¹ Department of Life Science, Faculty of Science and Technology, Kinki University, 3-4-1, Kowakae, Higashiosaka-shi, Osaka 577-8502

² Kyushu National Museum, 4-7-2, Ishizaka, Dazaifu-shi, Fukuoka 818-0118

³ Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN, 2-1, Hirosawa, Wako-shi, Saitama 351-0198

⁴ Department of Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Tokyo University of Science, 1-3, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8601

⁵ Entex, 1-2-8, Asahi-machi, Kashiwa-shi, Chiba 277-0852

⁶ Institute of Environmental Sciences, 1-7, Ienomae, Obuchi, Rokkasho-mura, Kamikita-gun, Aomori 039-3212

(Received January 24, 2013; Accepted March 14, 2013)

Archaeological finds from ancient tombs provide very important information about the ancient world. Vermilion (mercury sulfide, HgS) has often been found in grave burialsites, which was used not only to preserve dead bodies, but also to represent the authority of the buried persons. It is considered that the origin of burial vermilion may reveal information about the culture, civilization, political status and so forth in an ancient society. To elucidate the origin of burial vermilion, we have been analyzing the lead isotope ratios in natural ore (cinnabar ore) samples from several mines (Japan: Nara, Mie and Tokushima prefectures. China: Guizhou, Hunan and Shaanxi) and burial vermilion from several ancient Japanese burial mounds built in the 2nd to 4th centuries for a comparison. For isotopic measurements of lead, we employed TIMS (thermal ionization mass spectrometry) and MC-ICP-MS (high-resolution ICP-MS equipped with a multi-collector). The lead isotopes in cinnabar ore exhibited clear local characteristics, and the origin of the cinnabar ore could be distinguished from the lead isotope compositions. Furthermore, it was deduced that three of the vermilion samples in ancient tombs built around the 4th century originated from the Kinki region, and that the vermilion sample from the Ohburo-minami remains originated from Hunan or Guizhou. For two samples (Nishidani and Tatetsuki ancient tombs), the origin was unclear. However, the lead isotope compositions imply that they may have originated from north-east China. The results of this study show that isotopic measurements of lead can be a powerful tool to distinguish the sources of vermilion from remains. We will additionally perform systematic isotopic analyses of lead for several cinnabar ore samples in order to establish a distribution map of lead isotopes, and also measure the lead isotopes for vermilion from other ancient tombs to determine the source of vermilion.

Keywords: lead isotope; vermilion; ancient tomb; cinnabar.