plate has, among others, a very superior reproducibility of separation.

The welding mechanism of these silica gel and alumina sintered plates was clarified by means of scanning electron microscopic method. Although the heterogeneous systems made from such as silica gel or alumina ($\alpha=5.4$ and 8.0×10^{-7} cm/cm/°C) as adsorbent, lead silicate or soda-lime powdered glass ($\alpha=95$ and 92×10^{-7} cm/cm/°C) as binder, and quartz or aluminum ($\alpha=5.5$ and 207×10^{-7} cm/cm/°C) as base plate are not expected to weld well each other, the welding among these three materials did occur. As

shown in photo. 1~2 (surface view of the plate) and photo. 3~5 (cross sectional view of the plate) obtained by the scanning electron microscopic method, the adsorbents are fixed among the three dimensional space formed by the sintered powdered glass and the glass or metal base plates without loss of their original surface structures. Thus, the sintered powdered glass does play a role of binder fixing adsorbents on the surface of the glass or metal plates even when these three materials are heterogeneous and very much different each other in their physical properties.

(Received Sept. 13, 1972)

均一溶液からの沈殿法および常法によるカドミウム および亜鉛 8-ヒドロキシキノレート沈殿

滝山 一善, 幸前 照美*

(1972 年 9 月 14 日受理)

カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートについて分析化学的ならびに結晶化学的立場から検討した。1~30 mg のカドミウムを pH 5.5 以上で 8-アセトキシキノリンを用いて均一溶液から定量的に沈殿できる。カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの溶解度を原子吸光法によって求め、それぞれの溶解度積を計算すると $10^{-26.24}$ および $10^{-27.68}$ となった。沈殿生成の誘導期間を測定することからカドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレート沈殿の結晶核は 4 分子から成ると推定できた。カドミウム 8-ヒドロキシキノレートは均一溶液から沈殿させると最初針状結晶が生じ、その結晶系は正方晶系で、格子定数は $a_0=b_0=10.3$, $c_0=13.9$ である。針状結晶はしだいに長めの六角板状結晶へと変化する。この結晶は単斜晶系で格子定数は $a_0=13.74$, $b_0=5.28$, $c_0=11.36$, $\beta=116^\circ 18'$ であり、亜鉛 8-ヒドロキシキノレートと同型である。亜鉛 8-ヒドロキシキノレートは長めの六角板状結晶となり、長軸が b 軸、短軸が c 軸であり、a 軸は板状結晶に垂直である。

1 緒 言

カドミウムおよび亜鉛の 8-ヒドロキシキノレートは従来からカドミウムおよび亜鉛の定量分析に広く用いられてきた。前者は pH 5.4 以上、後者は pH 4.58 以上で定量的に沈殿し¹⁾、130°C で乾燥していずれも $M(C_9H_6NO)_2$ として重量分析しうる²⁾。これらの沈殿生成に対して 8-アセトキシキノリンを用いる均一溶液からの沈殿法 (PFHS 法) を応用すれば汙過しやすい純度の高い沈殿が得られるはずであり、亜鉛についてはその定量的条件がすでに求められている³⁾ ので、本報では

カドミウムについての定量的条件を述べる。溶液中で生成した亜鉛 8-ヒドロキシキノレート結晶は単斜晶系に属し、空間群 C_{2h}^5 である⁴⁾。カドミウム 8-ヒドロキシキノレート結晶は 2 形態を有し、立方晶系の針状結晶と単斜晶系の板状結晶である⁵⁾。これらの結晶について沈殿生成条件と形態および結晶構造との関係、さらに結晶核の発生および結晶成長に関する問題について述べる。

2 実 験

2.1 試 薬

試薬はすべて特級品を使用した。金属塩水溶液は重量分析法または EDTA 滴定法により正確な濃度を求めた。8-ヒドロキシキノリンはアルコールに溶かして 2% 溶液とし、8-アセトキシキノリンは 8-ヒドロキシキノ

* 武庫川女子大学家政学部: 兵庫県西宮市池開町

リンから合成したもの⁶⁾、および市販品をアセトンに溶かして 2% 溶液とした。その他の試薬は適当な濃度の水溶液とした。

2.2 カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレート の一般的生成法

PFHS 法による場合は次のようにする。1~30 mg のカドミウムまたは亜鉛を含む溶液 200 ml にクエン酸ナトリウム 2 g を加え、酢酸または水酸化ナトリウム溶液で pH 7~9 とし、2% 8-アセトキシキノリンアセトン溶液 10 ml を添加し、混合溶液を 1 夜放置する。重量分析を目的とする場合にはこの混合溶液を 60°C で約 2 時間保ったのち室温になるまで放冷してもよい。いずれの場合にもつば型ガラス濾過器で濾過後少量の水で洗浄し、重量分析の目的には 130°C で乾燥ひょう量する。

常法による沈殿生成は PFHS 法における 8-アセトキシキノリンの代わりに 8-ヒドロキシキノリン 2% アルコール溶液を用いればよい。

2.3 カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの溶解度測定

カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートを PFHS 法または常法でつくり、濾過洗浄後純水あるいは種々の pH に調節したイオン強度約 0.5 の緩衝液中に懸濁し、数日放置後濾過し、原子吸光度法で濾液中のカドミウムおよび亜鉛の濃度を測定する。また濾液の pH を測定する。原子吸光分析装置は日本ジャーレルアッシュ社製 AA-1 型を、pH メーターは東亜電波 HM5A を使用した。

2.4 カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレート 沈殿の結晶核

柳本製作所製光度滴定装置 PT 2 型のピーカーに pH 10 の緩衝液 5 ml、0.0010M カドミウムまたは亜鉛 1~6 ml、水 43~48 ml を加え、光度滴定装置に入れマグネチックスターラーでかき混ぜる。ピーカー上部にガラス製じゃ管を入れ恒温浴から 25°C の水を循環させる⁷⁾。450 nm のフィルターを用いて吸光度を 0 としたのち、ピーカー中に 0.0100M 8-ヒドロキシキノリン希酢酸溶液 1 ml を急速に加えて吸光度の変化を 5 秒ごとに記録する。吸光度~時間曲線の折点で 8-ヒドロキシキノレート沈殿が生成しはじめたものとし、それまでの時間を沈殿発生の誘導期間 T_α とした。また 8-ヒドロキシキノレートの初濃度 C_0 としてはイオン積の 3 乗根 $\sqrt[3]{[M^{2+}][Q^{-}]^2}$ を用いた。

2.5 沈殿粒子の形態および結晶学的観測

室温で生成した沈殿について濾過洗浄後、電子顕微鏡用試料または X 線回折用試料とする。電子顕微鏡は明石 Tronscope TRS 80 WDC 特、加速電圧 100 kV、X 線回折は島津製作所製 GX2B または日本電子製 JDX-7S を用いた。

3 結果および考察

3.1 PFHS 法による沈殿生成反応の pH および定量 範囲

常法によればカドミウムは pH 5.4 以上、亜鉛は pH 4.58~13.4 の範囲で定量的に沈殿する¹⁾。PFHS 法による場合には亜鉛については pH 4.5 で 5~50 mg の亜鉛が定量的に沈殿することが知られている²⁾。カドミウムについては 2.2 に従って種々の pH で沈殿を生成させ、重量分析した結果、Table I に示すように pH 5.5 以上で定量的に沈殿して重量分析できることがわかった。

Table I Precipitation of cadmium 8-hydroxyquinolate from homogeneous solution at various pH values

Cd taken (mg)	pH	Cd found (mg)	Difference (mg)
20.2	4.5	11.7	-8.5
20.2	5.0	19.3	-0.9
20.2	5.5	20.0	-0.2
20.2	6.0	20.3	+0.1
20.2	6.5	20.3	+0.1
20.2	7.0	20.2	0
20.2	8.0	20.2	0
20.2	9.0	20.3	+0.1
20.2	10.0	20.2	0
20.2	11.0	20.3	+0.1
20.2	12.0	20.1	-0.1
20.2	13.0	20.1	-0.1

次に 2.2 の方法により pH 7 で種々の量のカドミウムについて重量分析した結果を Table II に示す。すなわち、PFHS 法によって 2.2 に示した方法によれば 1~30 mg のカドミウムが定量しうることになる。カドミウムを 30 mg 以上とすると沈殿生成時の溶液の体積を増大し、8-アセトキシキノリンを増加させれば同様に定量しうる。しかし有機試薬による定量分析は元来大量の試料に対して行なうものではない。またこのような定量的な沈殿に対してアルカリ金属、カルシウム、マグネシウムなどはまったく影響しない。銅に関してはすでに発表したように⁸⁾、pH 3.5 で銅のみを 8-ヒドロキシキノレ-

Table II Determination of cadmium as 8-hydroxyquinolate by the precipitation from homogeneous solution at pH 7

Cd taken (mg)	Cd found (mg)	Difference (mg)
1.0	0.9	-0.1
2.0	2.1	+0.1
5.0	5.2	+0.2
10.0	10.2	+0.2
20.0	20.2	+0.2
25.0	25.1	+0.1
30.0	30.1	+0.1
35.0	33.1	-1.9
40.0	36.8	-3.2

トとしてカドミウムから分離沈殿できる。鉛に関してはカドミウム8-ヒドロキシキノレートに対する鉛の共沈殿の研究⁹⁾において述べたように、pH 6.0においてもカドミウムに対して鉛は対数分配して共沈殿し、対数分配係数 0.037 となっているので鉛の存在量によってはカドミウムの定量を妨害する。なお、カドミウム10または20mg に対して鉛 1~20 mg 共存させ、PFHS 法によってカドミウム 8-ヒドロキシキノレートを沈殿させ、沈殿中の鉛を測定した実験結果を Table III に示す。Table III には常法による結果も同時に示してあり、明らかに PFHS 法によれば共沈殿量が著しく減少することがわかるとともに、カドミウムに対して鉛の共存量が 1/10 以下であれば鉛がカドミウム沈殿を不純化しないことがわかる。

亜鉛に関してはカドミウムとの共沈殿として別に述べるが¹⁰⁾、定量的に沈殿する pH 範囲は亜鉛がやや酸性側からではあるがほとんど同一であるため、8-ヒドロキシキノレートとして両者を定量的に分離することは不可能である。スズ、アンチモンなどもカドミウム 8-ヒドロキシキノレートの定量的沈殿を妨害する。

3.2 カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの溶解度

亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの溶解度積は $10^{-27.13}$ と求められているが¹¹⁾、カドミウム 8-ヒドロキシキノレートについては求められていない。ここでは両化合物の純水中の溶解度を求めて溶解度積を計算するとともに、種々の pH における溶解度を実験的に求め、溶解度積からの理論値と比較した。

溶解度は原子吸光法によって求めたが、この際金属と共存する 8-ヒドロキシキノレートは金属の定量を妨害しないことをあらかじめ確認したのち常法どおり行なった。結果を Table IV に示す。アルカリ性側では溶解

Table III Content of lead in cadmium 8-hydroxyquinolate precipitated in the presence of lead

Method of precipitation	pH	Cd taken (mg)	Pb taken (mg)	Pb found (mg)
Conventional	7.0	20.0	20.0	4.7
"	7.0	20.0	20.0	4.2
PFHS	7.0	20.0	20.0	0.8
"	7.0	20.0	20.0	0.8
Conventional	6.0	20.0	20.0	9.6
"	6.0	20.0	20.0	7.5
PFHS	6.0	20.0	20.0	0.7
"	6.0	20.0	20.0	0.7
Conventional	5.5	20.0	20.0	1.3
"	5.5	20.0	20.0	1.4
PFHS	5.5	20.0	20.0	0.5
"	5.5	20.0	20.0	0.5
Conventional	6.0	22.0	4.0	0.2
PFHS	6.0	22.0	4.0	0.08
Conventional	6.0	22.0	2.0	0.2
PFHS	6.0	22.0	2.0	0.07
Conventional	6.0	22.0	10.0	0.3
"	6.0	22.0	10.0	0.4
PFHS	6.0	10.0	10.0	0.2
"	6.0	10.0	10.0	0.2
Conventional	6.0	10.0	5.0	0.2
"	6.0	10.0	5.0	0.2
PFHS	6.0	10.0	5.0	0.09
"	6.0	10.0	5.0	0.1
Conventional	6.0	10.0	2.0	0.1
"	6.0	10.0	2.0	0.1
PFHS	6.0	10.0	2.0	0
"	6.0	10.0	2.0	0
Conventional	6.0	10.0	1.0	0.1
"	6.0	10.0	1.0	0.1
PFHS	6.0	10.0	1.0	0
"	6.0	10.0	1.0	0
Conventional	5.5	22.0	4	0.2
"	5.5	22.0	4	0.09

Table IV Solubility of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolate at various pH

pH	Cd(C ₉ H ₅ NO) ₂ ·2H ₂ O (mol/l)	pH	Zn(C ₉ H ₅ NO) ₂ ·2H ₂ O (mol/l)
in pure water (7.50)	4.5×10^{-8}	in pure water (7.50)	1.5×10^{-8}
5.06	1.25×10^{-5}	5.02	3.8×10^{-6}
6.00	3.0×10^{-6}	6.01	4.2×10^{-7}
7.18	1.0×10^{-6}	7.10	4.5×10^{-7}
7.82	1.5×10^{-8}	7.81	8.5×10^{-8}
9.28	2.0×10^{-8}	9.18	1.5×10^{-7}
9.70	2.0×10^{-8}	9.71	8.0×10^{-8}
10.60	2.5×10^{-7}	10.40	2.7×10^{-7}
11.88	8.0×10^{-8}	11.88	2.2×10^{-7}

度がほぼ一定になり、pH と測定値の間にある不均衡は測定誤差と考えられる。

純水中におけるカドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの溶解度 C_{Cd} , C_{Zn} より次のようにして溶解

度積 K_{spCdQ} , K_{spZnQ_2} を求めた.

$$K_{\text{spCdQ}_2} = [\text{Cd}^{2+}][\text{Q}^-]^2 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$[\text{Q}^-]$ は 8-ヒドロキシキノレートイオンの濃度とする.

$$[\text{Q}^-] = \alpha_2 \cdot C_Q \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\alpha_2 = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} \quad \dots\dots\dots (3)$$

C_Q は 8-ヒドロキシキノリンの全濃度, K_{a1} , K_{a2} は 8-ヒドロキシキノリンの酸解離定数である.

$$[\text{Cd}^{2+}] = \beta C_{\text{Cd}} \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$\frac{1}{\beta} = 1 + k_1[\text{Q}^-] + k_1 \cdot k_2[\text{Q}^-]^2 \quad \dots\dots\dots (5)$$

k_1 , k_2 はカドミウム 8-ヒドロキシキノレートの生成定数である.

これらの式に実験値を代入すると

$$K_{\text{spCdQ}_2} = 10^{-26.24} \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$K_{\text{spZnQ}_2} = 10^{-27.68} \quad \dots\dots\dots (7)$$

を得た. ただし $K_{a1} = 10^{-5.13}$, $K_{a2} = 10^{-9.89}$ を用い¹¹⁾, カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの生成定数はそれぞれ $k_1 = 10^{7.8}$, $k_2 = 10^{6.8}$ および $k_1 = 10^{8.5}$, $k_2 = 10^{7.5}$ を用いた¹²⁾. ここに得た亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの溶解度積はさきの文献値によく一致するので, カドミウム 8-ヒドロキシキノレートの溶解度積とともに妥当な値と考えられる.

さて, 上記の溶解度積より種々の pH における溶解度, 各溶存イオンまたは分子種の濃度および種々の pH において種々の 8-ヒドロキシキノリン濃度に対して溶存すべきイオンまたは分子種の濃度を次のようにして求めた.

$$\text{溶解度 } S = C_{\text{Cd}} \quad \dots\dots\dots (8)$$

$$[\text{Q}^-] = \alpha_2 C_Q = 2\alpha_2 S \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$K_{\text{spCdQ}_2} = [\text{Cd}^{2+}][\text{Q}^-]^2 \\ = 4\alpha_2^2 \beta S^3 \quad \dots\dots\dots (10)$$

$$K_{\text{spCdQ}_2} = \frac{4\alpha_2^2 S^3}{1 + 2k_1\alpha_2 S + 4k_1k_2\alpha_2^2 S^2} \quad \dots\dots\dots (11)$$

$$4\alpha_2^2 S^3 - 4K_{\text{spCdQ}_2}k_1\alpha_2 S - 2K_{\text{spCdQ}_2}k_1k_2\alpha_2^2 S^2 = 0 \quad \dots\dots\dots (12)$$

$$C_{\text{Cd}} = [\text{Cd}^{2+}] + [\text{CdQ}^+] + [\text{CdQ}_2] \quad \dots\dots\dots (13)$$

$$[\text{CdQ}^+] = k_1[\text{Cd}^{2+}][\text{Q}^-] \quad \dots\dots\dots (14)$$

$$[\text{CdQ}_2] = k_2[\text{CdQ}^+][\text{Q}^-] = k_1k_2[\text{Cd}^{2+}][\text{Q}^-]^2 \\ = k_1k_2K_{\text{spCdQ}_2} \quad \dots\dots\dots (15)$$

式 (12) より種々の pH における溶解度積 S を求め, 式 (4), (14) および (15) よりそれぞれの pH に対する $[\text{Cd}^{2+}]$, $[\text{CdQ}^+]$ および $[\text{CdQ}_2]$ を求める. この結果を Fig. 1 に示す.

Fig. 1 Solubility curves of various species of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates calculated from the solubility product and the formation constants and the experimental values of solubility

Solid line: Solubility of various species of cadmium compound; Dotted line: Solubility of various species of zinc compound; O: Experimental values of solubility of cadmium 8-hydroxyquinolate; x: Experimental values of solubility of zinc 8-hydroxyquinolate

Fig. 1 に示したように, 8-ヒドロキシキノレートの溶解度 S は金属イオンの溶存濃度 $[\text{Cd}^{2+}]$, $[\text{Zn}^{2+}]$ に等しいとすることができる. 実験から得られた溶解度は Fig. 1 に示したように, 溶解度積から計算によって求めた値とほぼ同様の傾向を有し, 数値はやや高いが, これは緩衝液に由来する塩類効果のためと考えられる.

次に一定 pH で種々の C_Q に対して式 (2) より $[\text{Q}^-]$ を求め, これを式 (1) に代入して $[\text{Cd}^{2+}]$ を求め, さらに式 (14), (15) より $[\text{CdQ}^+]$ および $[\text{CdQ}_2]$ を求める. 種々の pH において同様の操作をして種々の 8-ヒドロキシキノリン濃度に対する各イオンおよび分子種の溶存濃度を Fig. 2 および 3 に示す.

Fig. 2 および 3 を比較すると各イオンおよび分子種の濃度は各 pH において亜鉛 8-ヒドロキシキノレートのほうがやや小さいが, カドミウムおよび亜鉛化合物の間にはほとんど差がないことがわかり, カドミウムと亜鉛の混合物より 8-ヒドロキシキノレートとして両者を分離することはほとんど不可能であることが理解される.

Fig. 2 Concentration of $[Cd^{2+}]$, $[CdQ^+]$ and $[CdQ_2]$ at various concentrations of 8-hydroxyquinoline

3, 4, 12: pH of the precipitation medium;
— $[Cd^{2+}]$; ---- $[CdQ^+]$; - - - $[CdQ_2]$

Fig. 3 Concentration of $[Zn^{2+}]$, $[ZnQ^+]$ and $[ZnQ_2]$ at various concentrations of 8-hydroxyquinoline

3, 4, 12: pH of the precipitation medium;
— $[Zn^{2+}]$; ---- $[ZnQ^+]$; - - - $[ZnQ_2]$

3.3 カドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレート沈殿の結晶核

一般に沈殿が溶液中で発生する場合には沈殿構成成分の単量体が何個か集合して結晶核ができる。結晶核発生速度はその結晶の初期過飽和濃度の p 乗に比例すると考え、積分した形を示すと次のようになる¹³⁾。

$$T_\alpha C_0^{p-1} = K_\alpha \quad \dots\dots\dots (16)$$

T_α は溶質が一定割合析出するまでの時間と考えられ、沈殿生成の誘導期間と同一である。 C_0 は目的沈殿が発生する前の初濃度で一般に初期過飽和濃度と呼ばれる。式 (16) の対数をとれば次式を得る。

$$\log T_\alpha = \log K_\alpha - (p-1) \log C_0 \quad \dots\dots\dots (17)$$

したがって沈殿すべき化合物の初濃度の対数と誘導期間の対数との間には直線関係が成立し、 p の値を求めることができ、これから結晶核の大きさを推定しうる¹⁴⁾。

2.4 に示したようにしてカドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートについて実験した結果を Fig. 4 に示

Fig. 4 Plots of logarithms of induction periods vs. logarithms of initial concentrations of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates

す。 $\log T_\alpha$ と $\log C_0$ の間に直線関係が成立しその傾斜はカドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの場

合それぞれ 2.8 および 2.9 となった。したがって式 (16) 中の $p-1$ は 3 とみなすことができ $p=4$ とするのが妥当と考えられる。そこでカドミウムおよび亜鉛 8-ヒドロキシキノレート沈殿の結晶核はそれぞれ 8-ヒドロキシキノレート 4 分子の集合体であると考えられる。

カドミウム 8-ヒドロキシキノレートは正方晶系に属する針状結晶でも単斜晶系に属する板状結晶でも単位格子中に 2 個の分子を含む⁶⁾。亜鉛 8-ヒドロキシキノレートは単斜晶系に属し、やはり単位格子中に 2 個の分子を含む。結晶核の大きさとしては従来の研究から単位格子中の分子数もしくはそれより少し大きな値と考えられるので、上に得られた値は妥当なものと考えられる。

PFHS 法によれば上述のような方法では結晶核の大きさは求められない。しかし沈殿の出現には次に示すように規則性がみられた。

8-アセトキシキノリンは次式に従って加水分解することが判明している⁷⁾。

$$-\frac{d[AQ]}{dt} = 3.16 \times 10^{-5} [H^+]^{-0.395} [AQ] \dots (18)$$

すなわち、一定 pH のもとでは 8-アセトキシキノリン濃度に関して一次反応である。この加水分解反応をカドミウムイオンを共存させて行なうと、ある時間反応後 8-ヒドロキシキノリンがある濃度に達したときカドミウム 8-ヒドロキシキノレートが沈殿しはじめるはずであるので、この時点の条件を求めた。

光度滴定用 ビーカーに 緩衝液 40 ml (酢酸-酢酸ナトリウム, 塩化アンモニウム-アンモニア水を用いて調製, pH 4.9, 6.0, 8.4, 8.9), 0.0100M カドミウム 溶液 0.2~5 ml および 水を加えたのち, 0.1000M 8-アセトキシキノリンアセトン溶液 0.2~5 ml を加え全量 50 ml として光度滴定装置により $25 \pm 0.5^\circ\text{C}$ の水を循環しながら吸光度の変化を記録した。

結果の 1 例として pH 4.9 の場合を Fig. 5 に示す。8-アセトキシキノリン単独の場合には吸光度は時間とともに増加しているが、カドミウムが共存する場合にはある時間反応後吸光度が急上昇しこの点で沈殿が出現していることがわかる。8-アセトキシキノリンを混合してから沈殿出現までの時間をこの場合の誘導期間とする。沈

Fig. 5 Change of absorbance during the hydrolysis of 8-acetoxyquinoline in the presence of various quantities of cadmium at pH 4.9

Initial concentration of cadmium—0: 0, 1: $2 \times 10^{-4} M$, 2: $4 \times 10^{-4} M$, 3: $6 \times 10^{-4} M$, 4: $8 \times 10^{-4} M$, 5: $10 \times 10^{-4} M$

Table V Relation between the induction periods and the concentration of cadmium 8-hydroxyquinolate precipitated from homogeneous solution

pH	0.1M AQ† added (ml)	0.01M Cd added (ml)	Induction period (sec)	[HQ]††	[Q-]†††	$\sqrt[3]{[Cd^+][Q^-]^2}$
4.9	5.0	5.0	945	5.7×10^{-4}	4.3×10^{-9}	2.7×10^{-7}
"	"	4.0	1110	6.3×10^{-4}	4.8×10^{-9}	2.7×10^{-7}
"	"	3.0	1290	7.1×10^{-4}	5.4×10^{-9}	2.6×10^{-7}
"	"	2.0	2000	10.8×10^{-4}	8.2×10^{-9}	3.0×10^{-7}
"	"	1.0	3150	14.5×10^{-4}	11.0×10^{-9}	2.8×10^{-7}
6.0	5.0	5.0	120	1.8×10^{-4}	2.3×10^{-8}	8.1×10^{-7}
"	"	4.0	165	2.0×10^{-4}	2.6×10^{-8}	8.2×10^{-7}
"	"	2.0	272	2.2×10^{-4}	2.9×10^{-8}	7.0×10^{-7}
"	"	1.0	410	2.5×10^{-4}	3.3×10^{-8}	6.0×10^{-7}
"	"	0.5	582	4.0×10^{-4}	5.2×10^{-8}	6.5×10^{-7}
8.4	1.0	1.0	95	2.2×10^{-4}	7.1×10^{-6}	2.1×10^{-5}
"	0.75	"	100	1.7×10^{-4}	5.5×10^{-6}	1.8×10^{-5}
"	0.5	"	140	1.7×10^{-4}	5.5×10^{-6}	1.8×10^{-5}
"	0.25	"	236	1.5×10^{-4}	4.9×10^{-6}	1.7×10^{-5}
8.9	1.0	0.6	30	1.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}	2.3×10^{-5}
"	"	0.5	55	1.5×10^{-4}	1.5×10^{-4}	3.0×10^{-5}
"	"	0.3	60	1.7×10^{-4}	1.7×10^{-4}	2.6×10^{-5}
"	"	0.2	85	2.1×10^{-4}	2.1×10^{-4}	2.6×10^{-5}

† AQ: 8-Acetoxyquinoline; †† [HQ]: The concentration of 8-hydroxyquinoline at the end of the induction period; ††† [Q-]: Calculated from the equation (2)

殿出現時の 8-ヒドロキシキノリンの濃度を, あらかじめ求めた検量線より求め, そのときの pH よりその時点における 8-ヒドロキシキノリンイオンの濃度 $[Q^-]$ を求めた. これから沈殿出現時のカドミウムと 8-ヒドロキシキノリンのイオン積の 3 乗根を求めた. これらの結果を Table V に示す. この結果 PFHS 法によるカドミウム 8-ヒドロキシキノレート沈殿は一定 pH では一

定過飽和濃度に達したときに出現していることが明らかになった. すなわち, PFHS 法は沈殿生成にきわめてよい再現性を与えることがわかる.

3.4 亜鉛 8-ヒドロキシキノレート沈殿の形態および結晶化学

亜鉛溶液に 中性もしくは 微アルカリ性で 8-アセトキ

Fig. 6 Electron micrographs of zinc 8-hydroxyquinolate precipitated by the conventional method (a) and by the PFHS method (b)

Fig. 7 An electron micrograph and its electron diffraction diagram of zinc 8-hydroxyquinolate

シキノリン溶液を加えると黄白色の亜鉛 8-ヒドロキシキノレート $\text{Zn}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ を沈殿し、その個々の粒子は Fig. 6 a のように長い六角板状か、同じような形の小さな薄片粒子が集合したような形態を示す。大きさは生成条件によって多少異なるが、長さ $2 \sim 10 \mu$ 程度

である。PFHS 法で生成すると Fig. 6 b に示すように六角形の形態がいっそう明確になり、よく成長した結晶であることがわかる。pH の変化は粒子の形態にほとんど影響を与えない。なお、PFHS 法により沈殿生成の初期における粒子を観測したところ、同形の微細粒子から

Fig. 8 Electron micrographs of cadmium 8-hydroxyquinolate precipitated from homogeneous solution at pH 5.6 (a) and at pH 11 (b)

Fig. 9 Cadmium 8-hydroxyquinolate precipitated at various intervals during the precipitation from homogeneous solution at pH 9
a : 15 min; b : 2 hr; c : 5 hr; d : 24 hr

成長していることが判明した。

亜鉛 8-ヒドロキシキノレート沈殿粒子 1 個の電子回折像を求め Fig. 7 に示した。亜鉛 8-ヒドロキシキノレートの結晶構造はすでに解析され⁴⁾、単斜晶系の C_{2h}^2 に属することがわかっている。また X 線回折による水和物から無水物への変化について検討されている¹⁵⁾。さて、これらの結果を電子顕微鏡観測の結果と比較検討すると Fig. 7 に示したように六角形の結晶の長軸が *b*、短軸が *c*、板状結晶に垂直方向が *a* 軸であると結論できる。

3.5 カドミウム 8-ヒドロキシキノレート沈殿の形態および結晶化学

カドミウム 8-ヒドロキシキノレートの形態および結晶構造については一部分すでに述べた⁵⁾。常法によって生成する沈殿の形態は亜鉛 8-ヒドロキシキノレートと等しく同型であると考えられる。ところが PFHS 法によれば微酸性および中性溶液からは Fig. 8a のように六角板状の亜鉛と同様の粒子を生成するが、微アルカリ性溶液からは Fig. 8b のように細い針状結晶が混在する沈殿が生成する。

8-ヒドロキシキノレートの針状結晶は銅、鉛、白金、パラジウムなどで生成するが、これらはむしろ糸状ともいえるほど細長い結晶できわめて安定であるが、カドミウム 8-ヒドロキシキノレートはこれらに比較するとはるかに短い針状結晶であり、また不安定で、母液中で熟

成すると 24 時間以内に板状結晶へ変化する。pH 9 で PFHS 法により種々の時間経過後生成した沈殿を Fig. 9 に示す。この沈殿は約 5 時間後にはほぼ完全に析出しおわっており、熟成中に針状結晶から板状結晶へ変化するものである。この変化は不安定な針状結晶が母液中に溶解し安定な板状結晶として析出すると考えられ、母液中のカドミウムの濃度をポーログラフ法で測定すると Fig. 10 のようになり、明らかに一度濃度が大きくなったのち、徐々に低下して平衡状態になっていることから理解される。

カドミウム 8-ヒドロキシキノレートの結晶構造についてはすでに述べたように⁵⁾、針状結晶は正方晶系に属

Fig. 10 Change of concentration of cadmium in the mother liquor during the formation of cadmium 8-hydroxyquinolate shown in Fig. 9

Fig. 11 Needle crystal and its electron diffraction diagram of cadmium 8-hydroxyquinolate

Fig. 12 Hexagonal plate crystal and its electron diffraction diagram of cadmium 8-hydroxyquinolate

し $a_0=b_0=10.3$, $c_0=13.9$ であり, 六角板状結晶は亜鉛 8-ヒドロキシキノレートと同型で単斜晶系に属し, $a_0=13.74$, $b_0=5.28$, $c_0=11.36$, $\beta=106^\circ 18'$ である。なお, 針状結晶は c 軸方向に成長したものであり, 長い六角板状結晶は亜鉛化合物と同様に長軸が b , 短軸が c , 板状体の垂直方向が a 軸である (Fig. 11, 12)。

文 献

- 1) 日本分析化学会編: “新分析化学講座”, 6 (有機試薬による分離分析法, 下), p. 10 (1959), (共立出版)。
- 2) R. Berg: *Z. anal. Chem.*, **71**, 171 (1927)。
- 3) J. P. Jones, O. E. Hileman, Jr., L. Gordon: *Talanta*, **10**, 111 (1963)。
- 4) L. L. Merritt, Jr., R. T. Cady, B. W. Mundy: *Acta Cryst.*, **7**, 473 (1954)。
- 5) K. Takiyama, K. Odake: *J. Electron Microscopy*, **20**, 1 (1971)。
- 6) E. D. Salesin, L. Gordon: *Talanta*, **4**, 75 (1960)。
- 7) 滝山一善, 沢田美穂子, 大谷信子: 本誌, **19**, 687 (1970)。
- 8) 谷川八千代, 南 智子, 滝山一善: 同上, **14**, 1055 (1965)。
- 9) 滝山一善, 山田ゆきえ: 同上, **18**, 122 (1969)。
- 10) 滝山一善, 幸前照美: 同上, **22**, 301 (1973)。
- 11) H. Freiser, Q. Fernando (藤永太郎, 関戸栄一訳): “イオン平衡—分析化学における—”, p. 154 (1967), (化学同人)。
- 12) H. Freiser, Q. Fernando (藤永太郎, 関戸栄一訳): 同上, p. 258 (1967), (化学同人)。
- 13) J. A. Christiansen, A. E. Nielsen: *Acta Chem. Scand.*, **5**, 673, 674 (1951)。

14) 滝山一善, 山田ユキエ, 古川治美: 本誌, **18**, 728 (1969)。

15) 関戸栄一: 日化, **80**, 379 (1959)。

☆

Cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates precipitated from homogeneous solution and by the conventional method. Kazuyoshi TAKIYAMA and Terumi KOZEN (Department of Home Science, Mukogawa Women's University, Ikebiraki-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo-ken)

Cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates precipitate quantitatively in the range of pH above 5.4 and 4.58 respectively and they are determined as $\text{Me}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_2$ by drying at 130°C . These compounds were prepared as pure and easily filterable precipitates by the precipitation from homogeneous solution using 8-acetoxyquinoline. The quantitative treatment of cadmium 8-hydroxyquinolate precipitated from homogeneous solution, the solubilities and the properties of the crystals of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates are discussed in this paper.

An aqueous solution of 200 ml containing 1 to 30 mg of cadmium was added by 8-acetoxyquinoline solution in acetone at pH 7 to 9 and the solution was kept over night at room temperature. The precipitate was filtered and weighed after drying at 130°C for the gravimetric determination.

The concentration of saturated solution of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates in the pure water and in various buffer solutions was measured by the atomic absorption method and the results are shown in Table IV. The solubility products of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates were calculated as $10^{-26.24}$ and $10^{-27.68}$, respectively. The solubility curves of various

species of 8-hydroxyquinolate (e. g. $[\text{Cd}^{2+}]$, $[\text{CdQ}^+]$, $[\text{CdQ}_2]$) at various pHs and at various concentrations of 8-hydroxyquinoline are shown in Fig. 1 to 3.

The induction periods for the precipitation at various initial concentrations were measured and the crystalline nuclei of the precipitates of cadmium and zinc 8-hydroxyquinolates were recognized to be composed of 4 molecules by applying equations 16 and 17.

The crystal structure of zinc 8-hydroxyquinolate was analyzed by Merritt etc.⁴⁾ and it belonged to the monoclinic system. The each particle of this precipitate was long hexagonal lamella and the long and short axes were b- and c-axes and a-axis was perpendicular to the lamellar crystal as shown in Fig. 6 and 7.

Cadmium 8-hydroxyquinolate precipitated from homogeneous solution has the dimorphism. It deposited as the precipitate containing long hexagonal lamel-

lar crystals in the acidic medium, but in the basic medium it deposited as the precipitate composed of needle crystals at first and these needle crystals changed gradually to long hexagonal lamellar crystals in the mother liquor as shown in Fig. 8 and 9. It seems that the transformation occurred by the dissolution of the needle crystals and the deposition as the stable hexagonal crystals as shown in Fig. 10. The crystal structure of these crystals were analyzed. The needle crystal belonged to the tetragonal system whose lattice constants were such as $a_0=b_0=10.3$ and $c_0=13.9$ and the long axis was c-axis as shown in Fig. 11. The long hexagonal lamellar crystal belonged to the monoclinic system whose lattice constants were such as $a_0=13.74$, $b_0=5.28$, $c_0=11.36$ and $\beta=116^\circ 18'$. This crystal was the isomorphous with zinc 8-hydroxyquinolate as shown in Fig. 12.

(Received Sept. 14, 1972)

亜鉛およびカドミウム 8-ヒドロキシキノレートの共沈殿*

滝山 一善, 幸前 照美**

(1972 年 9 月 14 日受理)

亜鉛およびカドミウム 8-ヒドロキシキノレートという, 化学組成は類似しているが, 結晶系が等しい場合と異なった場合とがある両化合物間の共沈殿現象を研究した. 亜鉛とカドミウムの等モル混合溶液に, 種々の pH で 8-アセトキシキノリンを作用させて均一溶液からの沈殿法によって 8-ヒドロキシキノレート沈殿を生成させた. 共沈殿は一般に対数分配法則に支配されたが, その結果は反応溶液の pH に関係し, pH 8 付近では対数分配係数は 1 となり, 亜鉛とカドミウムは 8-ヒドロキシキノレートとして等速度で沈殿し, 反応溶液の pH がこれよりも酸性でも塩基性でも亜鉛が優先して沈殿した.

亜鉛 8-ヒドロキシキノレートは六角板状の単斜晶系に属する結晶であり, カドミウム 8-ヒドロキシキノレートは酸性で沈殿したものは亜鉛 8-ヒドロキシキノレートと同様であるが, 塩基性で沈殿させると, 最初正方晶系の針状結晶を生じ, のちに単斜晶系の六角板状結晶に移行する. 両者を共沈殿させると, 針状結晶はまったく見られず, 板状結晶のみから成る沈殿を生ずる. X線回折の結果と考え合わせて, いずれの pH で生成した沈殿においても, 亜鉛とカドミウム 8-ヒドロキシキノレートの両者が固溶体をなしていることが判明した.

1 緒 言

8-ヒドロキシキノリンはきわめて多くの金属と沈殿をつくるため, 金属相互の分離という点には問題がある.

* 均一溶液からの共沈殿の研究 (第 10 報); 電子顕微鏡および回折法による共沈殿の研究 (第 8 報).

前報は滝山一善, 幸前照美: 本誌, **19**, 1651(1970)

** 武庫川女子大学家政学部: 兵庫県西宮市池開町

ことに亜鉛とカドミウムは 8-ヒドロキシキノレート沈殿の性質が結晶学的な一点を除いてきわめてよく類似している. すなわち沈殿組成は $\text{Me}(\text{C}_8\text{H}_6\text{NO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ で, 130°C で結晶水を失う^{1) 3)}. 亜鉛 8-ヒドロキシキノレートは pH 5 以上で, カドミウム 8-ヒドロキシキノレートは pH 5.5 以上で定量的に沈殿し, 溶解度積はそれぞれ $10^{-27.68}$ および $10^{-26.24}$ である³⁾. 沈殿粒子は亜鉛 8-ヒドロキシキノレートは六角板状³⁾ で単斜晶系である⁴⁾. カドミウム 8-ヒドロキシキノレートは常法によ