as follows: Transfer the sample solution containing up to 74 μg of tungsten(VI) to a 25 ml volumetric flask. Add 3 ml of 2.0×10^{-3} M BDAS solution. Adjust the pH to 3.0 with monochloroacetic acid solution and sodium acetate solution. Add 3.5 ml of 0.01 M CTMAC solution and dilute the solution to the mark with water. Measure the absorbance at 490 nm against the reagent blank. A linear calibration curve was obtained over the concentration range 0~74 $\mu\text{g}/25$ ml of tungsten(VI). The apparent molar absorptivity is $4.26 \times 10^4 \text{ cm}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ l at 490 nm and the sensitivity of the reaction is $4.4 \times 10^{-3} \mu\text{g cm}^{-2}$. The precision expressed in terms of coefficient of variation is 0.9 % at the sample containing 37 μg of tungsten(VI). Molybdenum(VI) interfered seriously with the

determination. However, the preliminary reduction procedure with 4 % hydroxylamine hydrochloride in the presence of 2.0×10^{-3} M EDTA at pH 3.0 was found to be quite effective in eliminating the interference. The interference from metal ions such as iron(III), titanium(IV), zirconium(IV), and vanadium(V) could be eliminated by addition of EDTA and sodium fluoride.

(Received Apr. 5, 1982)

Keyword phrases

determination of tungsten(VI); quaternary ammonium salt; spectrophotometry; sodium 2-bromo-4, 5-dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate; ternary complex.

3,5-ジブロモサリチルアルデヒド-4-フェニル-3-チオセミカルバゾンによる銅(II) の抽出吸光光度定量

加 藤 武[®], 長谷川 章^{*}

(1982 年 5 月 27 日受理)

3,5-ジブロモサリチルアルデヒド-4-フェニル-3-チオセミカルバゾン (DBPS と略記) を用いる銅(II) の抽出吸光光度定量法について検討した. pH 2.8~7.4 に調整した銅(II) を含む試料溶液に, DBPS クロロホルム溶液の一定量を加えて振り混ぜると, 銅(II)-DBPS 錯体が生成し, これがクロロホルム相に抽出される. このクロロホルム相の 400 nm における吸光度を測定して検量線より銅(II) の濃度を求める. 検量線は銅(II) の (2~50) $\mu\text{g}/10$ ml の範囲で Beer の法則に従い, 検量線より算出した錯体のモル吸光係数は $2.06 \times 10^4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ である. 銅(II) 20 μg の場合に求めた吸光度の変動係数は 0.57 % であった. 生成した錯体は, 単離した錯体の元素分析及び連続変化法より, 銅と DBPS が 1:1 の組成比を有することを認めた.

1 緒 言

4-フェニル-3-チオセミカルバジドとピリジン-2-アルデヒド¹⁾, ビピリジルグリオキサール²⁾, その他のカルボニル化合物とから得られた 4-フェニル-3-チオセミカルバゾン類は, 多くの金属イオンと反応して水に不溶の安定な錯体を生成する. これら生成した各錯体を有機溶媒で抽出した溶液は, そのモル吸光係数が大であるため各金属イオンの高感度の吸光光度定量が期待される. しかし抽出された各金属錯体溶液はその吸収極大の位置が

接近しているため, この方法により各金属イオンの吸光光度定量を行った場合, 共存する金属イオンの影響が大であり, 直接吸光光度定量されるものはコバルト(II)¹⁾, 鉄(II)³⁾, マンガン(II)⁴⁾などその数は比較的少ない. 又銅(II) についてはピアセチルビス (4-フェニル-3-チオセミカルバゾン) を用いて, 生成した不溶の錯体をジメチルホルムアミドにより水に可溶化して吸光光度定量する方法⁵⁾が報告されている.

著者らはカルボニル化合物として 3,5-ジブロモサリチルアルデヒドを用いた 3,5-ジブロモサリチルアルデヒド-4-フェニル-3-チオセミカルバゾン (DBPS と略記) を合成し, これを銅(II) の抽出吸光光度定量に応

^{*} 近畿大学理工学部応用化学科: 大阪府東大阪市小若江 3-4-1

用したところ、妨害元素が比較的少なく、感度よく銅(II)を定量できたので報告する。

2 実験

2.1 試薬及び標準溶液の調製

2.1.1 DBPS の合成 3,5-ジプロモサリチルアルデヒド 5.6 g (0.02 モル) をエタノール 100 ml に溶解し、これに 4-フェニル-3-チオセミカルバジド 3.3 g (0.02 モル) をエタノールに溶かした溶液を加え、還流下で約 30 分間加熱した。冷却後生じた沈殿をろ過し、この沈殿をエタノールより再結晶して淡黄色の針状結晶を得た。この結晶は mp 209 °C であり、元素分析の結果は C, H, N の分析値と計算値がよく一致した。

$C_{14}H_{11}N_3OSBr_2$	C (%)	H (%)	N (%)
としての計算値	39.20	2.58	9.79
分析値	39.00	2.40	9.83

2.1.2 試薬溶液の調製 2.1.1 で合成した DBPS 0.11 g をクロロホルム 1 l に溶解して 2.5×10^{-4} M 溶液を調製した。

2.1.3 銅(II) 標準溶液の調製 銅(II) の標準溶液は特級硫酸銅五水和物 0.0393 g を水 1 l に溶解して銅(II) の濃度が 10 µg/ml の原液を調製し、この原液を適宜希釈して用いた。

2.2 装置

吸収スペクトルの測定には日立製 323 型自記分光光度計を、吸光度の測定には島津製 QV 50 型分光光度計を用い、実験にはすべて光路長 1 cm の石英セルを用いた。又 pH の測定には柳本製 pH-66A 型 pH メーターを使用した。

2.3 定量操作

銅(II) 50 µg 以下を含む試料溶液を 100 ml 分液漏斗に採り、これに酢酸-酢酸ナトリウム緩衝溶液を加えて pH を 4~5 に調整し、水を加えて全量を約 60 ml とする。これに 2.1.2 の試薬溶液を 10 ml 正確に加えて 5 分間振り混ぜる。静置後水相を分離し、クロロホルム相を 2 g の無水硫酸ナトリウムで脱水した後、同様に処理した試薬空試験液を対照として 400 nm における吸光度を測定し、検量線より銅(II) の濃度を求める。

3 結果と考察

3.1 吸収スペクトル

銅(II) 10 µg を含む溶液について 2.3 の定量操作に従って操作し、得られたクロロホルム相の吸収スペクト

ルを測定した。その結果を Fig. 1 に示す。抽出された錯体は 400 nm 付近に肩吸収帯が存在するがこの波長では試薬空試験値が小さい。従って定量には 400 nm を測定波長と定めた。

Fig. 1 Absorption spectra

Cu(II) : 10 µg; pH : 4.5; DBPS : 2.5×10^{-4} M in chloroform; I : Cu(II)-DBPS complex against reagent blank; II : Reagent blank against chloroform

3.2 pH の影響

銅(II) 10 µg を含む試料溶液に、緩衝溶液を加えて各種 pH の溶液を調製し、2.3 の定量操作に従って操作して抽出時の pH が吸光度に及ぼす影響について検討した。その結果、Fig. 2 に示すように pH 2.8~7.4 の範囲では一定の吸光度が得られた。pH 2.1 以下では錯体の生成が不完全であり、pH 9 以上では水溶液が黄色

Fig. 2 Effect of pH in aqueous phase on the extraction of Cu-DBPS complex

Cu(II) : 10 µg; DBPS : 2.5×10^{-4} M

を呈し抽出が不完全となる。

3.3 試薬量の影響

銅 10 μg を含む試料溶液に種々の濃度の DBPS のクロロホルム溶液を加え, 2.3 に従って試薬濃度が吸光度に及ぼす影響について検討した。その結果試薬濃度が $4 \times 10^{-6} \text{ M}$ 以上では一定の吸光度が得られ, 試薬の大過剰は何ら妨害にならなかった。

3.4 振り混ぜ時間の影響

銅(II) 10 μg を含む試料溶液について 2.3 の定量操作における, 反応と抽出を行う振り混ぜ時間の影響について検討したところ, 振り混ぜ時間 2 分以上で一定の吸光度が得られた。しかし銅(II) 濃度の高い場合も考えて定量操作では振り混ぜ時間を 5 分とした。

又, クロロホルム相に抽出された溶液の経時変化を調べるため, 標準の定量操作で抽出された溶液を密栓して室温 (28 $^{\circ}\text{C}$) に放置し, クロロホルム蒸発による体積の減少はクロロホルムを補充し, それから吸光度を測定した。その結果 24 時間放置しても吸光度の変化は認められなかった。

3.5 水相と有機相の体積比の影響

抽出時の水相とクロロホルム相の体積比が吸光度に及ぼす影響について検討した。クロロホルム相の体積を一定 (10 ml) に保ち, 水相の体積を変化させて抽出し, クロロホルム相の吸光度を測定した。水相とクロロホルム相の体積比が 2 : 1 のときは 2.3 の場合より 2 % 程度低い値が得られ, 12 : 1 の場合は 3 % 程度高い値が得られた。しかし 3 : 1 から 9 : 1 まではほぼ一定の吸光度が得られた。クロロホルム抽出による吸光度測定において水相の体積が増加するに従って吸光度が増加する傾向があり, これはクロロホルムの水への溶解のためであると考えられている⁹⁾。本法においても一部この傾向が出ているが, 水相の体積変化による吸光度の差が比較的小さいため, 測定には水相の体積をほぼ一定に保つことで十分であると思われる。

3.6 検量線

以上の基礎的諸条件の検討結果から 2.3 の定量操作を定め, 検量線を作成した。銅(II) の (2~50) $\mu\text{g}/10 \text{ ml}$ の範囲で原点を通る直線が得られた。検量線より算出した錯体の 400 nm におけるモル吸光係数は $2.06 \times 10^4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ である。銅(II) 20 μg について 5 回

繰り返し実験を行ったが, 得られた吸光度 (平均 0.660) の変動係数は 0.57 % であった。

なお, 3,5-ジブロモサリチルアルデヒドの代わりにサリチルアルデヒドを用いて DBPS と類似の化合物を合成し, これを銅(II) の定量に用いたがこの場合銅(II) の定量は可能であるが適用波長が紫外部 (390 nm) であり, かつ DBPS に比べて吸収強度も 18 % 程度低い。

3.7 共存イオンの影響

銅(II) 20 μg を含む溶液に各種の塩類を共存させ, 本定量法における共存イオンの影響について検討した。共存イオンが存在しない場合の吸光度 0.660 に対して誤差が 2 % 以内のものを共存イオンの許容量とした。その結果を Table 1 に示す。許容量を 30 mg と示したものは, そのイオンが妨害しないものと考えてそれ以上の濃度では測定しなかった。

Table 1 Effect of diverse ions on the determination of copper(II)

Cation	Tolerance limit (mg)	Anion	Tolerance limit (mg)
Al^{3+}	30	Br^-	30
Ba^{2+}	30	Cl^-	30
Ca^{2+}	30	ClO_4^-	30
Mg^{2+}	30	CO_3^{2-}	30
Pb^{2+}	30	NO_3^-	30
Cr^{3+}	18	NO_2^-	1
Mn^{2+}	18	HPO_4^{2-}	30
Zn^{2+}	6	NCS^-	30
Ni^{2+}	0.5	SO_4^{2-}	30
Co^{2+}	0.05	SO_3^{2-}	30
Fe^{2+}	0.02	$\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_6^{2-}$	30
Fe^{3+}	0.005		

Copper(II) taken : 20 μg

Table 1 に見るように, 陰イオンは妨害するものが少ないが, 陽イオンでは Co^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} の許容量が非常に小さい。しかし酒石酸水素カリウムを 20 mg 程度添加すれば Cu^{2+} の 10 倍程度の Fe^{2+} , Fe^{3+} が存在していても妨害しなかった。なおシアン化物イオン, 硫化物イオンの存在は妨害する。

3.8 錯体の組成

本実験で生成した錯体の組成を連続変化法で調べた。すなわち $7.5 \times 10^{-4} \text{ M}$ の銅(II) 溶液及び DBPS のエタノール溶液の所定量をそれぞれ分液漏斗に採り, 緩衝溶液を加えて溶液の pH を 4.5 付近に調整し, 水を加えて全量を約 50 ml とした後クロロホルム 10 ml を加え, 2.3 の定量操作に準じて操作し, クロロホルム相の

吸光度を測定した。その結果 Fig. 3 に示すように銅(II)とDBPSが1:1の組成比のところでピークが得られた。

Fig. 3 Composition of the extracted copper-DBPS complex by the continuous variation method

$[Cu^{2+}]+[DBPS]=7.5 \times 10^{-5}$ M in chloroform; pH: 4.6

更にこの生成した錯体の組成を確認するため、DBPS銅錯体を単離した。5×10⁻³ Mの銅(II)溶液に、同濃度のDBPSエタノール溶液をかき混ぜながら加えて反応させ、得られた沈殿を濾過水洗し、この沈殿をテトラヒドロフランから再結晶して緑黒色の銅(II)錯体を得た。この結晶のC, H, Nを分析した結果、錯体の銅(II)とDBPSとの組成比は1:1であり、連続変化法の結果と一致した。

$C_{14}H_9N_3OSBr_2CuH_2O$	C (%)	H (%)	N (%)
としての計算値	33.05	2.18	8.46
分析値	33.26	2.05	8.18

この単離した錯体を微粉末にしてその一定量を2.1・1のDBPS試薬溶液に加熱溶解したものについて、400 nmにおける吸光度を測定してモル吸光係数を求めた。その結果、単離錯体のモル吸光係数は 2.13×10^4 dm³ mol⁻¹ cm⁻¹であり、検量線より算出した値よりやや高い値が得られた。

又、この単離した錯体をジメチルホルムアミドに溶かして 2×10^{-4} M溶液を調製し、これの電導度を測定してモル電導度 $15.4 \Omega^{-1} \text{cm}^2$ を得た。これより、DBPS-

銅(II)錯体はほぼ無電荷であり⁸⁾、DBPSと銅(II)との反応により2個のプロトンを放出して中性錯体を生成したものと考えられる。従って、Aguilarら³⁾の示した2-アセチルピリジン-4-フェニル-3-チオセミカルバゾン-鉄(II)錯体より考えて、本実験で生成した銅(II)錯体は次のような式で示すことができると考えられる。

(1981年3月, 日本化学会第43) 春季年会において一部発表

文 献

- 1) J. L. G. Ariza, J. M. C. Pavon, F. Pino: *Talanta*, **23**, 460 (1976).
- 2) M. G. Balairón, J. M. C. Pavon, F. Pino: *Talanta*, **26**, 71 (1979).
- 3) M. T. M. Aguilar, J. M. C. Pavon, F. Pino: *Anal. Chim. Acta*, **90**, 335 (1977).
- 4) J. M. C. Pavon, J. C. J. Sanchez, F. Pino: *Anal. Chim. Acta*, **75**, 335 (1975).
- 5) A. G. Asuero, J. M. Cano: *Analyst* (London), **103**, 140 (1978).
- 6) 藤原昭雄, 渡辺邦洋, 川垣恭三: 分化, **27**, 645 (1978).
- 7) 上杉勝弥, 山口茂六: 分化, **28**, 268 (1979).
- 8) 加藤 武, 生川勝彦: 分化, **30**, 256 (1981).

☆

Spectrophotometric determination of copper (II) by extraction with 3, 5-dibromo-salicylaldehyde-4-phenyl-3-thiosemicarbazone. Takeshi KATO and Akira HASEGAWA (Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Kinki University, 3-4-1, Kowakae, Higashi-Osaka-shi, Osaka)

Spectrophotometric determination of copper(II) by solvent extraction with 3,5-dibromo-salicylaldehyde-4-phenyl-3-thiosemicarbazone(DBPS) was studied. DBPS was prepared by refluxing 3,5-dibromo-salicylaldehyde and 4-phenyl-3-thiosemicarbazide. DBPS reacts with copper(II) in aqueous solution of pH range from 2.8 to 7.5 and forms a water-insoluble dark green complex, which can be extracted with chloroform. Absorption band for chloroform extract of complex appeared as a shoulder at about 400 nm. The apparent molar absorption coefficient of the complex at 400 nm was 2.06×10^4 dm³ mol⁻¹ cm⁻¹, and the calibration curve for the spectrophotometric determination was linear in the range from 2 μg to 50 μg copper(II) per 10 ml. Analytical procedure is as follows: the sample solution containing less than 50 μg of copper(II) in a 100 ml separatory funnel is adjusted to pH 4~5 with acetate buffer solution and is diluted to 50 ml with water. Resulted solution is shaken for 5 min with 10 ml of 2.5×10^{-4} M DBPS solution of chloroform. After separation to two phases, the

absorbance of the complex in chloroform phase is measured at 400 nm against the reagent blank. The combining ratio of copper and DBPS in this complex was estimated to be 1:1 by the continuous variation method and it was confirmed by elemental analysis of the isolated complex.

(Received May 27, 1982)

Keyword phrases

spectrophotometry of copper(II); extraction with chloroform; 3, 5-dibromo-salicylaldehyde-4-phenyl-3-thiosemicarbazone.

ゴム加硫促進剤テトラメチルチウラムジスルフィドのコバルト錯体化-吸光度法による定量

草野 文男[®], 川崎 仁士^{*}

(1982 年 3 月 23 日受理)

テトラメチルチウラムジスルフィド (TMTD) はチオ硫酸ナトリウム存在下で塩化コバルト(II) と反応して黄緑色の錯体を生成するので, これを利用する加硫ゴム中の微量 TMTD の吸光度定量法を検討した. 錯体は pH 5~10 の範囲で波長 245 nm, 268 nm, 323 nm に三つの吸収を示す. 323 nm の吸光度は $(1\sim7.5)\times 10^{-6}$ M の範囲で直線となり, 錯体のモル吸光係数は 1.17×10^4 l cm⁻¹ mol⁻¹, 連続変化法及びモル比法により求めた DMDC とコバルトの組成比は 1:1 であった. TMTD 0.5×10⁻⁴ M を採り, 繰り返し実験 (7 回) を行ったときの変動係数は 0.22 % であった. 加硫促進剤 (2-メルカプトベンゾチアゾール, ジベンゾチアゾールジスルフィド) の影響は 0.5 % 以下の誤差であり, 加硫ゴム中の TMTD 回収率は未加硫ゴムで 95.6 %, 加硫ゴムで 67.4 % であった.

1 緒 言

テトラメチルチウラムジスルフィド (TMTD) はゴムの加硫促進剤や殺菌剤などに用いられるが, 特にゴム工業では超加硫促進剤の中でも利用度の高いものの一つとなっている. この分析はゴムの物理的性質などを知るうえに重要であるが, 加硫の工程でその一部がジメチルジチオカルバミン酸亜鉛に変化¹⁾ するため非常に困難であり, 従来マグネシウム末, 硫酸, 硫化ナトリウムなどで還元し, 更に酸分解して生成するアミン, 二硫化炭素を測定する間接定量法^{2,3)} や電導度法⁴⁾ などがあるにすぎない.

又吸光度法としては, TMTD の水溶液にチオ硫酸ナトリウムを共存させ, 硫酸銅を加えて生じる錯体の呈色を利用する報告があるが⁵⁾, この方法は感度が低く (0.1 mg 以上), 又呈色の安定性の面でも問題がある.

一方, TMTD の類似化合物のテトラエチルチウラ

ムジスルフィド (TETD) はジエチルジチオカルバミン酸銅として定量⁶⁾ されており, 又そのナトリウム塩 $[(C_2H_5)_2N-C\begin{smallmatrix} S \\ \diagup \diagdown \end{smallmatrix}-Na]$ は多くの金属イオンと反応してキレート化合物 $[(C_2H_5)_2N-C\begin{smallmatrix} S \\ \diagup \diagdown \end{smallmatrix}M/n]$ を作る性質がある⁷⁾. 著者らはこれら TETD の性質に着目し, まず TMTD のクロロホルム溶液にチオ硫酸ナトリウム溶液を共存させ, 更に塩化コバルト(II) のエタノール溶液を加えたところ, 有機相に黄緑色の安定したジメチルジチオカルバミン酸のコバルト錯体 (Co-DMDC) が生成することを見いだした^{8,9)}. この Co-DMDC は紫外部に特有の吸収を示すので, 今回これを利用する TMTD の吸光度法について検討し, 加硫ゴム中の定量に適用した.

2 実 験

2.1 装置及び試薬

吸光度の測定は島津製 UV 200 S ダブルビーム分光光度計, 10 mm の石英製吸収セルを用いた. pH 測定には東洋化学製デジタル pH メーター, TMTD 標準溶

* 岡山県工業技術センター: 岡山県岡山市伊福町 4