in about two thirds of the subjects. Combined administration of mucopolysaccharides and anabolic steroids caused conspicuous reduction in lipid level and viscosity.

Discussion and Conclusion

It has been reported several times that loading with lipids produce increase in the viscosity of whole blood and of plasma, and it has been well established that intravenous injection of chylomicron, emulsified fat, or similar large corpuscles increase blood viscosity and that administration of unsaturated fatty acids and low-fat diet reduces it. Epidemiological studies also have shown that blood viscosity is affected by dietary consumption of fat.

No report hitherto published, however, clarifies the relationship between the viscosity and the levels of specific lipid fractions. The present study of the author has revealed the existence of positive correlation between the viscosity and almost every lipid fraction. This common behavior of the fractions strongly indicate the probability that they exert their influence on the viscosity through some factor common to all of them, instead of independently, and that β -lipoprotein which is the main constituent of serum lipid fractions is mainly responsible for the influence.

The author and his coworkers also measured the viscosity of each individual fraction of the serum, and obtained high values for the β -globulin fraction. This may be regarded an evidence that β -lipoprotein plays some important role in raising the viscosity of blood.

Thus β -lipoprotein is considered to have much to do with the changes of serum viscosity due to anomalous lipid metabolism, the author measured the viscosity under the influence of lipoprotein lipase, and observed it became lower as the β -lipoprotein content decreased. Furthermore, it was found that when drugs which cause decrease of β -lipoprotein through correction of lipid metabolism are given to hyperlipemic subjects, the viscosity of their serum decreased. Therefore as far as the influence of lipids on serum viscosity is concerned, the role of β -lipoprotein must be called pretty important in augmenting the adhesion of blood cells and the viscosity of serum.

Many workers have reported that increase of β -lipoprotein plays some important part in the etiology of atherosclerosis. It is thought very probable that increase of β -lipoprotein causes atherosclerosis because it increases the viscosity of the fluid component of blood and the adhesiveness of its cellular components.

Studies on Atherosclerosis, Mainly about its Relationship with Serum Viscosity (II)

TOSHIO SHINAGAWA (2nd Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kanazawa University, Kanazawa)

The etiology of atherosclerosis has been investigated from very many angles, not only from epidemiological considerations such as race, diet, and environment, but also from endocrinological, genetical, blood rheological, neurological, and comparative pathological considerations and in relation to sexes and constitution of body fluids. Very recently, a number of surface-active agents having the power of substantially modifying the physicochemical properties of blood lipids have been tentatively administered for the purpose of inhi-

biting the occurrence of atherosclerosis. Also, as was reported in the First Report, the rheological properties of blood which are responsible for the transformation of the constituents of blood and the change of its flow characteristics have undergone gradual clarification.

It must be very pertinent to the study of the etiology and therapy of atherosclerosis to carry out clinical investigation of the physicochemical properties of blood and tissue cells. Regarding the relationship between the rheology of blood and atherosclerosis, increase of

viscosity of whole blood is thought to be responsible for the development of atherosclerosis presumably through increase of some adhesive substances in the plasma having the property of making the cellular constituents stick together.

Therefore the author measured the viscosity of serum in animals with experimental atherosclerosis and in patients with diseases closely related to atherosclerosis, and studied the relationship between sclerosis and viscosity.

Materials and Methods

The method of measuring serum viscosity and the clinical subjects employed were the same as in the First Report. The experimental animals were 35 rabbits, of which 17 were fed on lanolin.

Results

1) The relationship between age and serum viscosity was as follows. The average viscosity in the 43 male patients under 40 years was 1.773 with standard deviation of 0.089. The 36 females under 40 gave 1.773 ± 0.081 , the 84 males of age 40 and over gave 1.847 ± 0.108 , and the 46 females of the same age bracket gave 1.848 ± 0.125 . Thus in each sex the higher age group had larger values of viscosity than the lower group, but there was found no significant difference between both sexes.

2) The average and the standard deviation were found to be 1.868 and 0.129 in the 15 patients with coronary diseases. The 73 hypertensive patients gave 1.830 ± 0.094 , the 21 with cerebrovascular diseases gave 1.839 ± 0.129 , and the 19 diabetics gave 1.833 ± 0.113 , the values being decidedly higher than the value found in 15 healthy subjects in their twenties, which was 1.728 ± 0.056 .

3) Some of the rabbits in which experimental atherosclerosis was produced by lanolin feeding showed serum viscosity markedly higher than the control animals. The average was 1.758 ± 0.168 for the 17 lanolin-fed rabbits and 1.553 ± 0.080 for the 18 controls.

Discussion and Conclusion

It has been reported that increase of blood viscosity occurs in patients with coronary diseases such as myocardial infarction and angina pectoris, and the high viscosity has been regarded to have important bearing on the etiology of these diseases. The high viscosity of whole blood may be regarded as a plausible and important cause of thrombus formation in arterioles of small bores such as those of the coronary arteries, but does not fully explain the fact that thrombi are formed and atherosclerosis occurs oftener in somewhat larger arteries. In relatively large arteries, the flow of blood near the intima is what really matters.

But in the part of the stream close to the intima, the blood mainly consists of the liquid components, and it is thought better for the objective in view to measure the viscosity of plasma or serum than that of whole blood.

The author therefore measured the viscosity of serum, and found the values to be higher in subjects above 40 of age than in those under 40, who are less liable to atherosclerosis. The values were seen to be significantly higher in patients with coronary diseases, hypertension, cerebrovascular diseases and diabetes, which are regarded to be closely related to atherosclerosis, than in normal subjects. Furthermore, many of the rabbits with experimentally produced atherosclerosis were observed to have serum viscosity markedly higher than control animals. These findings indicate the probability that high serum viscosity is responsible for occurrence of atherosclerosis.

These results are also considered to be closely related to the anomalous lipid metabolism accompanying atherosclerosis.

Basing on the several results of observation described above, the author has shown the conclusion obtained from the equation of motion of viscous liquids, and the existence of positive correlation between the size of arteries and the frequency of occurrence of atherosclerosis in them as revealed by autopsy, and stressed the existence of close relationship between atherosclerosis and the rheological properties of blood.

動脈硬化症に関する研究 (第2報)

血清粘稠度を中心として

品 川 俊 男

金沢大学医学部第二内科 (担当 村上元孝教授)

論文受理 昭和38年9月17日

はじめに

著者は前報において血清粘稠度と血清脂質との関係を追求し、血清中 β -lipoprotein が粘稠度の増加に重要な意義を有すること、そしてこの β -lipoprotein を介しての血清粘稠度の増加や細胞成分の粘着性増強などが、動脈硬化の成り立ちに大きく関与している可能性のあることを述べたが、本報においては、更に引続き実験的動脈硬化症および動脈硬化症に関係深いいくつかの臨床例について検討し、硬化の発現と血清粘稠度との関係について考察を加え若干知見を得たので報告する。

実験方法

A 血清粘稠度の測定

Hess 氏粘稠度計 (内径 0.244mm) を用い、17°C, -180 mmH₂O で蒸留水と同時に測定し比粘稠度を算出した。

B 測定対象

1. 臨床的考察

第1報における同一の症例について行なった。

2. 家兎

体重 2~3 kg の正常草食雄性家兎 18 羽、及び体重 2~3 kg の雌性家兎に 15% の割合にラノリンを添加した固形飼料 (オリエンタル酵母工業 R-C5) を 1 日 200 g, 2 月投与したもの 17 羽について行なった。採血は 12 時間以上の絶食後に行ない人の場合と同様に処理した。

実験結果

A 血清粘稠度と年齢、性

血清粘稠度を測定した 211 例の比粘稠度を縦軸に、年齢を横軸にとりプロットしたのが Fig. 1 である。これを各 10 年代ごとに区切り 各々平均値を求めると Table I のごとくであり、今これを 40 才未満群と 40 才以上群とに 2 大別して 各々の平均値を求めると、40 才未満群 78 例の平均値は $1.773 \pm 0.100^*$, 40 才以上群 129 例の平均値は 1.847 ± 0.112 となり、両群間には推計学的に明らかに有意の差が認められる。

* Standard deviation

これを男女別に分けて平均値を求めると 40 才未満の男子 43 例の平均値は 1.773 ± 0.089 , 40 才以上の男子 84 例の平均値は 1.847 ± 0.108 , 40 才未満の女子 36 例の平均値は 1.773 ± 0.081 , 40 才以上の女子 46 例の平均値は 1.848 ± 0.125 となり、男女共に 40 才未満群と 40 才以上群との間に有意の差が認められるが、男女間には 40 才未満群においても、40 才以上群においても有意の差は認められなかった。

B 血清粘稠度と各種疾患

20~30 才の健康成人ならびに冠動脈疾患、高血圧症、脳血管障害、糖尿病等の動脈硬化症と関係深いと考えられている疾患々者の血清粘稠度を測定し比較検討を行っ

Fig. 1. Serum Viscosity in Various Age Groups male •, female ○.

TABLE I SERUM VISCOSITY IN VARIOUS AGE GROUPS

Age	Number of Determination	Mean	Standard Deviation
10~19	18	1.750	0.094
20~29	27	1.791	0.099
30~39	33	1.771	0.089
40~49	33	1.856	0.116
50~59	58	1.841	0.112
60~69	30	1.848	0.121
70~80	8	1.844	0.063

た (Fig. 2).

健康成人 15 例の平均値は 1.728 ± 0.056 , 冠動脈疾患々者 15 例の平均値は 1.868 ± 0.129 で両者間には推計学的に有意の差が認められる. 高血圧症 73 例の平均値は 1.830 ± 0.094 であり, 健康成人平均値との間に推計学的に有意の差が認められる. 高血圧症患者中, 心電図撮影を行ったものについて ST 降下, T 陰性等の異常所見を有する群と有しない群とに分けて平均値を求めると, 有所見群 31 例の平均値は 1.852 ± 0.097 , 無所見群 24 例の平均値は 1.792 ± 0.088 となり, 両者間にはかなりの差が認められるが, 推計学的には必ずしも有意とはいえない ($0.05 > p > 0.01$). 又, 無所見群においても健康成人平均値に比し高値を示している ($0.05 > p > 0.01$).

脳血管障害患者 21 例の平均値は 1.839 ± 0.129 , 糖尿病者 19 例の平均値は 1.833 ± 0.113 で共に健康成人平均値との間に有意の差が認められる.

すなわち, 動脈硬化性疾患々者は健康成人に比し, より高い血清粘度度を有する傾向があると云える.

C 実験的動脈硬化家兎の血清粘度度

家兎をラノリンで飼養すると屢々顕著な動脈硬化症を招来する. ラノリンを添加した飼料で飼養した家兎は対照の草食家兎に比し, 著しく血清粘度度の高いものが認められ, 対照平均 1.553 ± 0.080 に対しラノリン飼養家

Fig. 2. Serum Viscosity in Various Diseases

N: Normal
CI: Coronary Insufficiency
(-): Hypertension without Electrocardiographic Changes
(+): Hypertension with Electrocardiographic Changes
CD: Cerebrovascular Diseases
DM: Diabetes Mellitus

兎平均 1.754 ± 0.168 で両者の間に明らかに推計学的に有意の差が認められた (Fig. 3).

考 按

生体内での血液の流れや, その特性については従来からかなり詳細に亘って物理化学的に種々検討がなされ, 多くの知見が得られているが, 最近では Rheology の立場から新しく臨床と関連した面から再検討が加えられつつある. 従来, 全血粘度度と最も関係深いものとして赤血球容積があげられているが, 臨床例については Burch^{1,2)}が心筋硬塞, 狭心症などの冠動脈疾患々者の多くが赤血球増多症を伴い, 瀉血による赤血球容積の減少と粘度度の減少により症状の改善されることを指摘している. また, 心筋硬塞患者のヘマトクリット値は正常人のそれより高値を示す場合が多く, これに随伴して血液粘度度も増加し, 本症の成り立ちに血液粘度度が重要な意義をもつものと考えられている.

細管法で粘度度を測定した場合, 同じ血液でも血流が遅い程粘度度は大となるのが知られており^{3,4)}, 生体についても冠動脈疾患々者の病的な冠動脈では, 狭窄部の前部では血流速度の減少と側圧の増加から該部では一層血液粘度度は高まり, 血流停止や血栓発生の危険が大いといわれている. 血管壁の損傷を多く伴わない冠動脈小枝の如き管腔半径の小さい血管で時点を等しくして多発する血栓発生等の説明には, 血液粘度度の増加は極めて合理的且つ重要な要因として挙げる事が出来よ

Fig. 3. Serum Viscosity in Normal and Lanolin-fed Rabbits

う⁶⁾。しかしながら、一般に動脈硬化や血栓の発生し易い大いさの動脈における動脈硬化あるいは血栓の形成については、このような流体の特性の変化のみからは十分な説明はなしがたい。この際、内膜表面に極く近接した血液成分の流れが当然問題となるが、血管内における血液構成要素の密度分布は必ずしも一様ではなく、axial streamingにより赤血球は血管中心部を流れ、血管内膜と血液の接触部分では、細胞成分は僅かの血小板や遊走細胞で、血液の液性成分がその主体をなすことが知られている^{6,7)}。こういった実験成績から、硬化と粘稠度とのより密接な関係を追求するためには血液の成分中、液性成分の特性との関連を明らかにする方がより合目的であろう。よって、著者は前報でものべたごとく動脈硬化症とのつながりを明らかにする目的から、粘稠度と脂質との関係をより正しく観察するためには粘稠度に影響を及ぼす他の因子の関与が少く、正確な測定値の得られることが望ましいという点を考慮して、従来の諸家とは異なった見解から、血清を対象として測定し、粘稠度と臨床面との関係について考察を加えた。

前報にも述べたごとく、血清粘稠度が若し脂質代謝異常を介して動脈硬化症の成り立ちに関与するならば、脂質代謝の歪のくる年令や疾患で血清粘稠度に異常の来ることが予想される。著者の測定例を年代別にみると動脈硬化症の多発してくる40才台以後において動脈硬化症の少ない40才以下に比し、明らかに血清粘稠度の増加が認められ、Swank⁸⁾がviscosity indexと年令との間に認めた関係や、Hess⁹⁾が自作の粘度計によった初期の成績ともかなりよく似た傾向をしめしている。この所見は血清脂質代謝異常が同様に各年代に変化がみられるという安田¹⁰⁾、藤田¹¹⁾、村上他¹²⁾などの報告と軌を一にしており、両者の関係を推定する上に極めて興味深い。従来、血清粘稠度はアルブミンとはあまり関係なくグロブリン分画と深いつながりをもつとされ^{13)~15)}、年令と共に相対的なアルブミンの減少、グロブリンの増加を伴う総蛋白絶対量の減少が認められているが^{16)~18)}、グロブリンの絶対値のみから粘稠度の変化を説明することは出来ず、グロブリン分画中の質的に特別な分画の関与が考えられる。β-lipoproteinをも含んだβ-globulinの増加がalbumin減少とともに目立った変化を示すことが本邦人についても明らかにされているが¹⁷⁾¹⁸⁾、前報の成績と考え併せて本分画の意義は極めて大きいということが出来よう。

脳血管障害例や糖尿病例で高い血漿粘稠度が観察されている¹⁹⁾。動脈硬化と血清粘稠度との関係については、Chakravartiら²⁰⁾、花岡ら²¹⁾、並木ら²²⁾が家兎の実験的動脈硬化症について論じたものや、田中ら²³⁾が小数例の動脈硬化患者について測定した報告があるが、臨床面から系統的な考察を加えたものは見られないようである。著者の成績では冠疾患、高血圧症、脳血管障害、糖尿病などの動脈硬化症と関係深いと思われる疾患ではいずれ

も正常者に比し、血清粘稠度は有意の増加を示しており、このいずれの疾患についても前述の成績と同様、矢張り脂質代謝異常のあることが明らかにされている^{10)~12)24)}。

脂質代謝と血液粘稠度との関係については先の報告でものべたが、いずれも血液粘稠度の増加を来すことが明らかにされており、これに伴う血球成分の粘着性の増加やこれによる喰食促進から硬化進展が起るともいわれ²⁵⁾、この変化が低脂肪食により改善されること及びlipoprotein lipaseを作用させることにより、粘稠度の減少がみとめられることなどから村上ら²⁴⁾の指摘した清淨因子系列の障害ともからんで、硬化発現に演ずる粘稠度の増加はかなり重要な意義をもつものと思われる。

又、実験的動脈硬化家兎についてはChakravarti等⁵⁾は、血清粘稠度の増加と硬化の発現が平行関係にあるといい、血清脂質の増加も粘稠度の増加に関係があるとしているが、著者もほぼこれと同様の結果を得た。特にSf 10-30のlipoproteinの増加が粘稠度の増加に重要な関係をもつと考えられ²⁶⁾、このglobulin分画は脂質のtransporterとしてのみでなく、その物理化学的特性の1つからも硬化の発現や進展に大きな役割を演じているといえよう。

次に血液粘稠度と関連をもった流体力学的な面から、動脈硬化の発現について若干考察を加えてみることにする。

先に著者は動脈の内膜近接部を問題として、一部とり上げたが、該部では血流は中心部に比して非常に緩徐であるとされている⁶⁾。動脈の内膜表面近接部のところでの血流速度を水平管内を均一な液体が層流をなして流れていると仮定して検討を加えてみた。

u, v, w をそれぞれ x, y, z 軸方向の速度、 p を圧力、 ρ を密度、 μ を粘性係数とすると、非圧縮性粘性流体の運動方程式は

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} &= X - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} &= Y - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} &= Z - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

で与えられ、この場合の連続方程式は

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

である。今水平管内軸心を X 軸にとり、運動方程式の X 軸方向のものは、

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$=X - \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (1)$$

となる。真直な円管で層流では $v=0$, $w=0$, $\partial u/\partial x=0$, 定常流と仮定すれば $\partial u/\partial t=0$

又、今の場合 $X=0$ だから

$$-\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = 0 \quad (2)$$

$y=r\cos\theta$, $z=r\sin\theta$ にとり(2)を変形すると

$$-\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{du}{dr} \right) = 0 \quad (3)$$

両辺に ρr をかけて移項すると

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = \frac{r}{\mu} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \quad (4)$$

一様な真直な管内の流れでは圧力勾配 $\partial p/\partial x$ は一定であるから長さ l の管の両端の圧力をそれぞれ p_1 , p_2 とすれば

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{p_2 - p_1}{l} \text{ であり, これを(4)に代入すれば}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = \frac{p_2 - p_1}{\mu l} r \quad (5)$$

(5)を r について積分すると

$$u = \frac{p_2 - p_1}{4\mu l} r^2 + c_1 \log r + c_2 \quad (6)$$

管軸心($r=0$)における流速は有限でなければならぬから $c_1=0$, 又管壁($r=a$)において $u=0$ でなければならぬから

$$c_2 = -(p_2 - p_1)a^2/4\mu l \text{ 従って}$$

$$u = \frac{p_2 - p_1}{4\mu l} (a^2 - r^2) \quad (7)$$

管軸心($r=0$)において流速 u は最大になり, これを $u_{\max}$ とすれば

$$u_{\max} = \frac{p_1 - p_2}{4\mu l} a^2 \quad (8)$$

(7)及び(8)より

$$u = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{a^2} \right) \quad (9)$$

血管壁表面に非常に近い距離 Δh の部における流れの速さを $u_{\Delta h}$ とすると

Fig. 4.

$$u_{\Delta h} = \frac{2\Delta h \cdot u_{\max}}{a} \quad (10)$$

動脈の平均血流速度 $u_m = \frac{1}{\pi a^2} \int_0^a u 2\pi r dr = \frac{1}{2} u_{\max}$ はかなり小さい動脈に到る迄あまり減少しないから $u_{\Delta h}$ は動脈の内径に反比例することになる。少くとも、粥状硬化症が問題となる程度の大きさの血管ではこの関係がなり立つものと考えられる。

上記の数式は、Newton 流体についてのものであるが、non-Newtonian の場合にも定性的には正しい。non-Newtonian では流速が遅いと速い場合に比較して粘稠度は大となるから粘稠度の影響は一層大となるものと思われる。

勿論、血管は一様な管ではなく、弾力性を有しており又血流は定常流でなく、血液の円管内における分布も一様ではない。中心部と周辺部では密度を異にし、又 unsheared lamina を考えねばならないかも知れないが、いずれにしても一般的には内径の大なる動脈は小なる動脈に比し、内膜表面近接部では粘稠度の影響を被り易いということが出来よう。

動脈硬化は全身に一樣に来るものではなく、動脈の部位により、動脈硬化発現の頻度もかなり異っていることが知られている²⁷⁾²⁸⁾。腹部大動脈、総腸骨動脈、外腸骨動脈、鎖骨下動脈、総頸動脈、上腕動脈、橈骨動脈といった血行力学的に圧・速度等がかなり近似しているような動脈を、田所²⁹⁾の計測値に従い内径の順に比較検討すると、関²⁸⁾が514例の剖検例について報告した動脈硬化発現頻度の順位とかなりよく一致する。このことは上述の考察と照らし合わせ極めて興味深く、硬化の発現と血液の rheological property がかなり深いつながりをもっているものと言うことが出来よう。

結 語

動脈硬化症発現と血清粘稠度との関係について、臨床的および家兎を用いた実験的動脈硬化症に検討を加えた結果を得た。

1. 血清粘稠度は、人においては40才以上のものは40才以下のものに比し高値を示した。
2. 冠疾患、高血圧症、脳血管障害、糖尿病のごとき動脈硬化と関係の深い疾患では対照に比し、血清粘稠度は高値を示した。
3. 実験的動脈硬化発現家兎では対照家兎に比し、血清粘稠度は著しく高い値を示した。
4. 血清粘稠度の動脈硬化症に及ぼす意義を脂質代謝と臨床面とのつながりについて、Rheologyに関連した分野から若干考察を加えた。

終りに御指導、御校閲を賜った恩師村上教授並びに御助言を賜った横浜国立大学武藤教授に衷心より感謝いたしますと共に日夜御指導、御鞭撻を戴いた関本博士に厚く感謝いたします。

本論文の要旨は昭和37年3月、第26回日本循環器学会総会、昭和38年4月第60回日本内科学会総会において発表した。

REFERENCES

- 1) Burch, G.E., De Pasquale, N.P., *Am. Heart J.* 62 : 139, 1961
- 2) Burch, G.E., De Pasquale, N.P., *Am. J. Med.* 32 : 116, 1962
- 3) Wells, R.E. Jr., Merrill, E.W., *J. Clin. Invest.* 41 : 1591, 1962
- 4) Wells, R.E. Jr., Merrill, E.W., *Science* 133 : 763, 1961
- 5) Block, E.H., *Am. J. Med. Sci.* 229 : 280, 1955
- 6) Fåhræus, R., *Physiol. Rev.* 9 : 241, 1929
- 7) Eckstein, R.W., Book, D., Gregg, D.E., *Am. J. Physiol.* 135 : 772, 1942.
- 8) Swank, R.L., *Am. J. Clin. Nutr.* 19 : 418, 1962
- 9) Hess, W., *Deutsch. Arch. Klin. Med.* 94 : 404, 1908
- 10) 安田義頭, 日循誌, 27 : 519, 1963
- 11) 藤田嘉文, 日循誌, 25 : 732, 1962
- 12) 村上元孝, 他, 総合臨牀, 9 : 107, 1960
- 13) Rohrer, F., *Deutsch. Arch. Klin. Med.* 121 : 221, 1917
- 14) 茂在照, 東京医学会雑誌, 37 : 662, 1923
- 15) 吉川春寿, 医学のあゆみ, 3 : 171, 1947
- 16) Köppel, J., *Z. Altersforschg* 2 : 220, 1940
- 17) 熊谷肇, 東京慈恵医大誌, 66 : 154, 1952
- 18) 近新五郎, 生物物理化学, 2 : 199, 1955
- 19) Swank, R.L., *Neurology* 9 : 553, 1959
- 20) Chakravarti, R.N., Balkrishna, Zaidi, S.H. *J. Geront.* 17 : 27, 1962
- 21) 花岡正己, 他, 日本病理学会会誌, 27 : 301, 1937
- 22) 並木正己, 他, 内分泌及実験治療, 6(6) : 843, 1938
- 23) 田中博太郎, 他, 日本血液学会雑誌, 1(1) : 111, 1937
- 24) 村上元孝, 他, 治療, 44 : 1, 1962
- 25) Florey, H., *Brit. Med. J.* 2 : 1329, 1960
- 26) Goffman, J.W., Lindqvist, F., Eliote, H., Mantz, W., Hewitt, T., Stvinser, B., Herring, V., *Science* 111 : 166, 1950
- 27) Schwarz, C.J., Mitchel, J.R.A., *Circ. Res.* 11 : 63, 1962
- 28) 関増爾, 老年病, 4 : 21, 1960
- 29) 田所豊, 解剖学雑誌, 2(5) : 718, 1929