単独完全右脚ブロックの心電図とベクトル心電図

第2篇 実験的研究*

徳 永 常 登

緒 言

心電図上 QRS 間隔が 0.12 秒以上あり、右側胸部誘導の QRS 波形が rsR' を示し、ventricular activation time のおくれを示すものが、完全右脚ブロックとされている。近時研究が進むにつれて、この中には左脚前枝ブロックおよび左脚後枝ブロックの合併例が含まれることも解明されて来た。

完全右脚ブロックのベクトル心電図の特徴は、terminal appendage と呼ばれる conduction delay のある部分があり、QRS 環の終末部に見られることである。この共通点を除けば、QRS 環は極めて多様で複雑な形を呈する。従来 Massie ら¹⁾、上田ら²⁾、戸山ら³⁾の分類があるが、著者⁴⁾も左脚前枝ブロック並びに後枝ブロック合併例と考えられるものを除外した単独完全右脚ブロックの心電図・ベクトル心電図の分析を行なった。その結果 QRS 環の右側後上方成分の強調された A 群とそうでない B 群とに分類し、両群は興奮伝播過程の差異によって生じるものであると推測した。著者は、この点を実証するために、犬を用いて実験を行ない、若干の知見を得たので報告する。

実験方法

対象は 5.3 kg から 19.3 kg までの雑種成犬 20 頭である。犬にはすべて 20~25 mg/kg のペントバルビタール・ソーダの静脈内麻酔を施し、実験台に背臥位で固定したまま人工呼吸下に左または右第 4 肋間を切開して開胸した。心膜は出来るだけ心臓を自然の位置に保つように注意して切開した。Lucae 氏鼓膜穿開刀を右室自由壁を通じて刺入し、心室中隔上に分布する右脚を盲目的に切断した。

心電図および Frank 法ベクトル心電図は、第 1 回：麻酔直後人工呼吸前開胸前、第 2 回：人工呼吸下開胸にて心膜切開後、および第 3 回：右脚切断後、の計 3 回撮影した。特に開胸後の記録に際しては、その都度心膜と胸壁とを再縫合し、生理的食塩水で湿したガーゼで心臓面

から肺臓までを広く被覆して、胸壁との間に出来るだけ空間を無くし、加えて心臓の位置の移動を最小限に留めるように努めた。心電計はフクダ電子株式会社製 RS-100DH 2 型を、ベクトル心電計はフクダ電子株式会社製 VA-1A 型を用いた。心電図の誘導は標準四肢誘導、単極四肢誘導のほかに胸部誘導として、Lannek⁵⁾ が人の V_1 誘導に相当すると提唱している CV_5RL 誘導を採用した。

Fig. 1. Schematic illustration demonstrating the distribution of the main stem and subdivisions of the right bundle branch on the endocardial surface of the right ventricle.

MS: main stem, AS: anterior subdivision, LS: lateral subdivision, PS: posterior subdivision, apm: anterior papillary muscle, tv: tricuspid valve, pv: pulmonary valve.

岡山大学医学部第一内科教室（主任：小坂淳夫教授）

（論文受付：昭和49年3月8日，受理：昭和49年8月17日）

* 本論文の要旨は第27回日本循環器学会中国四国地方会および第21回ベクトル心電図研究会において発表した。

すべての記録が終了して、心臓を摘出し、右室自由壁を開き、ヨード超生体染色によって右脚の切断部位を確認した。右脚の名称は Fig. 1 に示す如くで、右脚主幹は三尖弁中隔弁の直下で心内膜下に出現し、前乳頭筋の基部で 1) 肺動脈円錐部に分布する前枝; 2) 自由壁に分布する側枝; 3) 後乳頭筋の基部をはじめ、広く中隔面に分布する後枝、の 3 つの分枝に分れている。

成 績

対象 20 頭のうち、主幹切断例 9 頭、前枝切断例 4 頭、後枝切断例 4 頭、側枝切断例 1 頭、側枝並びに前枝切断例 1 頭で、残りの 1 頭は、人工呼吸下開胸心膜切開の操作だけで、右脚を切断しなくても、偶発的に右脚ブロックを生じた。

1. QRS 間隔

Table I に示す如く、開胸心膜切開の操作だけでは、No. 8 を除いて、QRS 間隔は変化しない。右脚を切断しても、各分枝ブロック例では QRS 間隔は延長せず、主幹切断によってのみ QRS 間隔の延長 (平均 = 50 msec, 分布域 = 20 ~ 70 msec) が認められ、全例が 0.08 秒以上になった。

2. 平均電気軸

Table II に示す如く、主幹切断例では全例上方偏位を起こし、9 頭中 1 頭が 285° で、残りは全て 240° から 270° までの間にあった。分枝切断例では、前枝切断例の 2 頭で軽度の変化を認めたが、その他はほとんど変化しなかった。

3. 心電図第 II 誘導の QRS 棘波群

R 波と S 波との高さは、Table II の如くで、主幹切断例においてのみ著明に S 波が深くなる。前枝切断例ではやや S 波が深くなる傾向にある。その他の分枝切断例では、ほとんど変化しない。

第 II 誘導 S 波の幅を見ると、Table III の如く、No. 8 以外は、人工呼吸下開胸心膜切開の操作によっては変化がない。右脚を切断すると、主幹切断例のみが延長 (平均 = 73 msec, 分布域 = 60 ~ 100 msec) し、各分枝切断例では延長していない。

4. 右側胸部誘導

右側胸部誘導 CV₅RL では、主幹切断例のみ全例が notch のある R 型、rR' 型、RR' 型を呈し、興奮伝達時間の遅延 (平均 = 46 msec, 分布域 = 40 ~ 60 msec) を認めた。分枝切断例では変化がなかった。

TABLE I CHANGES IN THE QRS INTERVAL

Location of incision	Canine number	Pre-thoracotomy	Postthoracotomy		Difference
			Preincision	Postincision	
Main stem	1	50	50	120	70
	2	50	50	80	30
	3	60	60	110	50
	4	50	50	120	70
	5	60	60	100	40
	6	60	60	80	20
	7	50	50	100	50
	15	70	70	130	60
	19	60	60	120	60
Main stem and anterior subdivision	8	40	80	120	40
Anterior subdivision	9	40	40	40	0
	11	40	40	40	0
	12	70	70	70	0
	17	70	70	70	0
Posterior subdivision	10	60	60	60	0
	13	60	60	60	0
	14	70	70	70	0
	16	60	60	60	0
Lateral subdivision	18	70	70	70	0
Lateral and anterior subdivisions	20	70	70	70	0

All measurements are in milliseconds.

5. 主幹切断例の QRS 環

主幹切断例では、Table II に示す如く、全例が平均電気軸の上方偏位を起こすが、中でも、Fig. 2, Fig. 3 に示す如く、極端な上方偏位を起こす例があり、このような例では、初期ベクトルからすでに下方成分が乏しい。一方、Fig. 4, Fig. 5 に示す如く、上方偏位が極端でなく、初期ベクトルの変化も少ない例があり、これは臨床例の A 群に似ている。主幹切断例はすべて上述の 2 つの型のいずれかに属し、これを表で示すと Table IV のようになる。極端な上方偏位の例は、Table II に示す如く、第 II 誘導の R 波高が、切断前に比し、25% 以下に短縮している。

上述の 2 つの型の何れが純粋な右脚ブロックかを検討するため No. 5, No. 6 の 2 頭を用いて実験した (Fig. 6)。心電図第 II 誘導を連続記録しながら、右室側中隔上の主幹を切断して行った。その結果 2 頭共に、切断が浅くて QRS 間隔がやや延長し始める程度の時には、切断前に R 型であった波形が、RS 型となり、中隔上に一層広範囲で深い切断を加えて行くと、R 波高が次第に減少して rS 型となり、最終的には QS 型となる。この実験より平均電気軸の極端な上方偏位を示す QRS 環は純粋な右脚

ブロックではないと考える。

なお初期ベクトルは、平均電気軸の極端な上方偏位で大きく変化し、臨床例の A 群に似る例でも少しの変化 (水平面での初期ベクトルの方向は、切断前後で、No. 4 が 57° から 55° へ、No. 7 が 95° から 60° へ、No. 15 が 142° から 67° へ、No. 19 が 95° から 60° へ変化) が起こった。

6. 人工呼吸下開胸心膜切開の操作のみで生じた右脚ブロック

Fig. 7 の中段のベクトル環は、心膜切開後でまだ右室に穿開刀を刺入していない例であるが、QRS 環終末部が、刻時点の密集を示しつつ、右前方へ突出して、臨床に見られる完全右脚ブロックに似ている。心電図第 II 誘導では S 波が深くなり、QRS 間隔は 40 msec から 80 msec へと延長している。この右脚ブロックは、右側後上方成分に乏しく、心電図第 II 誘導の S 波の幅が狭く、著者の臨床例の分類 B 群に似る。著者の仮説では、A 群は B 群に比し右室前壁側の興奮伝播が遅れるから、本例に対しては、右室側中隔と前壁との境界部を広範に切断し、左室から右室への前壁の興奮伝導を遅延させ、A 群を生じさせようと意図した。結果は、Fig. 7 の下段の如く、右

TABLE II CHANGES IN THE MEAN ELECTRICAL AXIS AND IN THE AMPLITUDE OF THE R AND S WAVES IN LEAD II

Location of incision	Canine number	QRS (angular degree)		R/S (mV/mV) in lead II	
		Preincision	Postincision	Preincision	Postincision
Main stem	1	90	260	0.20/0	0.05/2.05
	2	45	240	1.03/0	0.15/1.85
	3	80	285	0.90/0	0.10/0.56
	4	90	270	1.10/0.20	0.93/0.70
	5	100	240	0.75/0	0.05/0.52
	6	70	270	1.60/0	0.06/1.16
	7	80	250	0.85/0.03	0.41/1.33
	15	80	270	2.32/0	0.90/1.12
	19	70	220	1.50/0	0.42/2.60
Main stem and anterior subdivision	8	100	215	1.65/0.50	0.50/1.40
Anterior subdivision	9	0	320	1.56/0.90	0.83/1.04
	11	120	120	0.60/0.40	0.18/0.50
	12	60	210	2.05/0	0.72/0.56
	17	60	70	1.18/0	1.35/0
Posterior subdivision	10	100	100	2.20/0	2.40/0
	13	80	70	2.10/0.20	1.60/0.20
	14	80	80	1.86/0	1.70/0
	16	80	80	1.00/0	1.00/0
Lateral subdivision	18	70	70	1.20/0	0.93/0
Lateral and anterior subdivisions	20	70	80	2.40/0	1.90/0.03

TABLE III CHANGES IN THE S WAVE DURATION
IN LEAD II

Location of incision	Canine number	S duration (msec) in lead II	
		Pre-incision	Post-incision
Main stem	1	0	100
	2	0	70
	3	0	80
	4	10	80
	5	0	70
	6	0	60
	7	10	70
	15	0	70
	19	0	80
Main stem and anterior subdivision	8	40	100
Anterior subdivision	9	20	20
	11	10	10
	12	0	20
	17	0	0
Posterior subdivision	10	0	0
	13	10	10
	14	0	0
	16	0	0
Lateral subdivision	18	0	0
Lateral and anterior subdivisions	20	0	10

側後上方成分が強調され、心電図第Ⅱ誘導でS波が深く、しかも延長した臨床例の分類A群に似たQRS環を得ることが出来た。但し、ベクトル心電図撮影後右室を開いてみると、Fig. 8に示す如く、意図した切創に加えて、主幹にも軽い擦過創が認められ、単一な原因に帰することが出来なかった。なお右脚切断前が正常伝導であった例において右室側中隔と前壁との境界部に広範な切創を加えただけでは、Fig. 9に示す如く、わずかな左軸偏位が認められるのみでQRS間隔は延長しなかった。

総括と考按

臨床面において繁用されているFrank誘導法をそのまま動物実験に用いた。この妥当性については、先に著者ら⁶⁾が、McFee, Parungaoが犬のために考案したaxial lead systemとFrank法とを比較して検討し、戸山ら⁷⁾とほぼ一致した成績を得ている。すわち、①McFee, Parungaoの誘導法よりX成分が大の傾向、②McFee, Parungaoの誘導法よりZ成分特に前方成分が小の傾向、③QRS環の回転方向について差異はない、の特徴を備えていることを考慮しておれば、Frank法を動物実験に

Canine No. 6

Fig. 2. Electrocardiograms before and after incising the main stem of the right bundle branch. Note that complete right bundle branch block with marked superior shift in the electrical axis occurred after incision.

Paper speed: 25 mm/sec,

Vertical time lines: 0.04 sec

Sensitivity, 1cm: 1 mv, CV₅: CV₅RL.

用いることは妥当と考えた。

さて単独完全右脚ブロックの実験的研究を行なうに際して、先づ検討しなければならないのは、犬ではQRS間隔が何秒以上を「完全」右脚ブロックとするかである。著者の実験では、右脚主幹例のみQRS間隔が著明に延長し0.08秒以上となった。これを諸家^{8~16, 30)}の成績と比較したものがFig. 10である。正常伝導の場合も右脚ブロックの場合も、報告者によってQRS間隔に差異があるが、それは対象例の数と種類の差異によって生じたと考える。

正常伝導のQRS間隔は、Too¹⁰⁾の報告のみ獣医学雑誌に記載された臨床的な犬の心電図によるもので、その他の報告者のものは、すべて動物実験を目的としての右

Canine No. 6

Fig. 3. Vectorcardiographic loops of the same canine as shown in Fig. 2.

脚主幹切断前の対象心電図を正常 QRS 間隔として集めている。Fig. 10 によると、Too の牧羊犬例が最長 75 msec で、その他は全て 70 msec 以下である。

次に、右脚主幹切断例の QRS 間隔は、Erickson ら⁹⁾、Uhley ら¹²⁾および Toyoshima ら³⁰⁾の例外もあるが、だいたいにおいて 70 msec 以上に延長しており、著者が得た 80 msec 以上の QRS 間隔延長は一応「完全」右脚ブロックに入ると考える。80 msec 以上という値は、Detweiler¹¹⁾、Hill¹⁶⁾ および著者の各 1 例の特発性右脚ブロックをも、「完全」右脚ブロックとして満足している。但し、Wennemark¹³⁾の報告では、ヨウ素液を右室内膜面に塗布して Purkinje-net block を起こすと、QRS 間隔が 95 msec 以上と右脚主幹切断例の QRS 間隔を越えて延長している。従って臨床例に Purkinje-net block が関与しているとすれば、完全右脚ブロックの QRS 間隔を 80 msec より一層長くとする必要が生じる可能性は否定出来ない。

右脚主幹切断によって QRS 間隔の著明な延長を見ることは一致した意見であるが、右脚各分枝切断によって著明な延長が生ずるか否かについてはまだ一致していない。戸山ら³⁾は臨床的に QRS 間隔が 0.12 秒以上の完全右脚ブロックの Frank 法ベクトル心電図を分類し、A 群は右脚前枝ブロック、B 群は後枝ブロック、C 群は主幹のブロックと述べ、この根拠として犬の実験で得た成績¹⁴⁾を挙げている。そうすると各分枝切断によって QRS 間隔の延長が認められたのであろう。しかし、Uhley ら¹²⁾と菱田ら^{17, 18)}は各分枝ブロックでは QRS 間隔がほとんど延長しないと述べており、著者の成績は後者と一致する。

右脚ブロックが主幹に局限した障害によって起こるのか、あるいは主幹より末梢が関与しているのかについても意見が分れている。藤野¹⁹⁾は、電子計算機による興奮伝播過程のシミュレーションを基にして心電図の構成を行なう方法で、右脚ブロック波形の構成を試みて、右脚の主幹に伝導障害を想定したよりも、主幹にはブロックがなく、末梢の右室自由壁の Purkinje 細胞網が興奮伝播に関与しないと想定した方が、臨床上の右脚ブロックに似た波形が得られると述べている。また、山田ら²⁰⁾は、Lungendorff 灌流を行なった犬の心臓で右脚主幹を切断すると、QRS 波形は初期部分から著明に減少し、臨床で見られる右脚ブロックの心電図やベクトル心電図とは著しく異なり、むしろ右室自由壁の内膜面にルゴール液を塗布して Purkinje 細胞網に広範なブロックを生ぜしめる方が臨床上の右脚ブロックの波形によく似ていたことを報告し、臨床例の右脚ブロックが主幹部の障害であることに否定的な意見を持っている。

一方、Detweiler¹¹⁾らは、前述した如く、実験によらない自然な右脚ブロックの 1 頭を報告している。掲載された心電図は、I, II, III, aVL, aVF で大きな S 波と aVR で大きな R 波を有し、犬の実験的右脚ブロックの特徴を備えていると述べ、犬の右脚主幹切断例が犬の臨床例の右脚ブロック心電図と似ていることが示唆されている。また、岡田^{21, 22)}は病理学的立場から、生前に完全右脚ブロックを示す例では例外なく右脚に病変が発見できたと報告している。機能と形態との間に相違があるとはいえ、病理学的には主幹障害説が有利と考える。

著者は、下記の理由で、臨床例の右脚ブロックは主幹

Canine No.15

Fig. 4. Electrocardiograms before and after incising the main stem of right bundle branch. These experimentally induced electrocardiograms in complete right bundle branch block are similar to those in clinical complete right bundle branch block of a canine reported by Detweiler.

Paper speed: 25 mm/sec,

Vertical time lines: 0.04 sec

Sensitivity, 1cm: 1 mv, CV₅: CV₅RL.

が障害されたものと考え、すなわち実験的に主幹を切断すると、Fig. 2, Fig. 3 に示す極端な上方偏位例のごとく、臨床例とは一見して異なる心電図、ベクトル心電図が得られたが、中には Fig. 4, Fig. 5 に示すごとく著者の臨床例分類 A 群に似た例が得られた。しかし、これとても厳密に言えば、右側後上方成分の強調の度合が過度である点、臨床では見られない心電図、ベクトル心電図である。ところが心臓の解剖学的位置や刺激伝導系は種によってかなりの差異があることを考慮すると、山田ら²⁰⁾の述べている犬の実験例と人の臨床例との差異は、実験と臨床との差異ではなく、犬と人との差異である可能性がある。そこで著者が犬の臨床例として比較の対象と

TABLE IV CLASSIFICATION OF THE QRS LOOPS FOLLOWING INCISION OF THE MAIN STEM OF THE RIGHT BUNDLE BRANCH

Right bundle branch block	Canine number	QRS-loop pattern
Experimental right bundle branch block	1	Marked superior shift
	2	Marked superior shift
	3	Marked superior shift
	4	II-2-A
	5	Marked superior shift
	6	Marked superior shift
	7	II-2-A
	8	II-3-A
	15	I-2-A
	19	III-2-A
Spontaneous right bundle branch block	8	I-2-B

The midtemporal vector in group A is markedly projected posteriorly, superiorly and to the right, whereas that in group B is lacking in such features.

I: The horizontal plane loop is inscribed CCW for its major portion. II: The horizontal plane loop shows a figure-of-eight in the first half; the central loop is anterior. III: The horizontal plane loop is inscribed CW in the first half. 2: The frontal plane loop shows a figure-of-eight in the first half. 3: The frontal plane loop is inscribed CCW in the first half.

したのが Detweiler の 1 例である。特にこの例は剖検により心血管系の疾患がないことが確認されている。他に自然発生的な右脚ブロックの症例として Hill ら¹⁶⁾の 1 例があるが、この例は大動脈弁狭窄並びに弁下部狭窄と高位心室中隔欠損症を合併しているの、直ちに実験例と比較することはできない。Fig. 4 の心電図は Detweiler の 1 例のものに極めて良く似ている。平均電気軸、初期ベクトル共にほとんど差異がないことから、犬に限る限り、実験的に主幹を切断すると、犬の臨床例で見られる右脚ブロック心電図が得られるものと考えられる。なお動物実験においては、主幹切断操作が必ずしも一致せず、著者も当初極端な上方偏位例を 5 例作ったように (Table II 参照)、主幹切断以外の他の要素が入って、Fig. 6 に示した実験の如く、臨床例とは異なった QRS 環を得る危険性が密んでいることを考慮すべきである。

右脚ブロックには主幹より末梢の障害が関与しているという意見^{20, 23)}の根拠の 1 つは、主幹切断前後では初期ベクトルが変化することである。著者の実験でも、前述の如く、主幹切断前後の初期ベクトルの方向に差異が生じたが、分枝切断例でも幾分かの差異が認められており、この実験では初期ベクトルの変化の有無に言及出来るだけの成績が得られていない。

前述の考察より、人工呼吸下開胸心膜切開という操作

Canine No. 15

Fig. 5. Vectorcardiographic loops of the same canine as shown in Fig. 4. Note that complete right bundle branch block with the similar pattern of group A in man occurred after incision. For explanation of the author's classification see part I and Table IV.

Canine No. 8

Fig. 7. Vectorcardiographic loops from canine No. 8. The top three panels: normal controls before thoracotomy, the middle three panels: spontaneous group B of complete right bundle branch block following thoracotomy, the bottom three panels: surgically induced group A of complete right bundle branch block following incision as shown in Fig. 8.

Canine No. 5

Canine No. 6

Fig. 6. The six long strips in the top and the five short ones in the bottom are respectively continuous. They were obtained during incision of the main stem and its surrounding tissues on right aspect of the septum. By the incision of the main stem, the R/S ratio in lead II decreased when the QRS intervals got progressively longer. Note the different degrees of R/S ratios, forming a real morphological progression from the normal R pattern to that showing QS, suggesting that complete right bundle branch block with marked superior shift could be block of conduction at a lesion lying on the main stem and its surroundings.

のみで偶発的に生じた臨床例B群に似る右脚ブロックは、QRS 間隔が0.08秒と延長しており、完全右脚ブロックのQRS環と考えて良い。その後生じたA群の特徴を有するQRS環は、その原因が右室側中隔と前壁との境界部の広範な切断または主幹切断の何れかで、その何れとも断定出来ないが、同一心臓にA、B両群が生じたことは、この研究の目的である、両群は興奮伝播過程の差異によって分れるという仮説の実証となったと考える。発生した状況より、恐らく人工呼吸下の開胸が右室負荷の原因となり、刺激伝導系が伸展してB群の右脚ブロックとなったのであろう。臨床例の基礎疾患の検討で、B群に慢性肺疾患が多かったことを考え合わせると興味深い。なお、主幹切断例が全てA群の特徴を有していたことは、冠硬化症による特殊筋線維の線維化の如き限局した機能の断裂が、全てA群を生じる可能性が示唆され、著者の

Fig. 8. Photograph of right aspect of the septum in canine No. 8 (iodine stained). Arrows 1 and 2 indicate the incisal edges, and arrow 3 points to a slightly scratched portion of the main stem, showing incision of the boundary line between right aspect of the septum and anterior aspect of the free wall, and slight scraping of the main stem.

MS: main stem,
apm: anterior papillary muscle,
pv: pulmonary valve, fw: free wall.

臨床例の検討と考え合わせると、興味深い。

次に、著者のA群は前壁側興奮伝導遅延型で、B群は後壁側興奮伝導遅延型であるという仮説について検討する。右脚ブロックの場合、健全な左脚を介して左室側より伝わった興奮が、右室を興奮させることは、ほぼ定説となっている。臨床的には、3束ブロックが完全房室ブロックへ進んだり、間歇性脚ブロックの出没に臨界修正RR間隔²⁴⁾が関係していることなどから推測出来、実験的にも立証^{25, 26)}されている。左室から右室への興奮伝導路となる心室中隔が、形態上1本の線でなく面を構成している以上、たとえ単独完全右脚ブロックの場合でも、中隔面全体が均一な興奮の伝播をするとは考えられず、刺激伝導系の解剖学的な相違あるいは疾病による障害度の差異によって、中隔面の伝播過程に変行が生ずることは、容易に推測出来る。前壁と後壁との興奮伝導時間の差異を示す極端な例が左脚分枝合併例であり、右脚ブロックと左脚前枝ブロックの合併例の実験²⁷⁾では、後壁の方が早く興奮し、右脚ブロックと左脚後枝ブロックの合併例の実験²⁸⁾では、前壁の興奮の方が早い。長屋²⁹⁾、Ericksonら⁹⁾、水野ら²⁹⁾は、単独右脚ブロック時、右室自由壁では後壁が必ず前壁より早く興奮すると報告している。著者の実験で得られた右脚ブロックが全て臨床例A群に似ていたことは、A群が前壁側の伝導遅延を表現

Fig. 9. Electrocardiograms from canine No. 9, showing normal conduction before incision. Similar incision as shown arrow 1 to 2 in Fig. 7 was not attended by QRS prolongation but by slight shift to the left of the mean electrical axis of QRS.

Fig. 10. Comparison of the QRS intervals. The results of this experiment are compared with earlier investigations on dogs.

していると考えられる。一方、豊嶋ら^{30,31)}は時には反対に後壁の方が遅れると思われる場合のあることを報告し、Hill ら¹⁶⁾の実験でも、右脚切断例が後壁の方が前壁より早く興奮したのに反し、特発性右脚ブロックでは正常伝導の場合と同様前壁の方が早く興奮している。著者の得た偶発性右脚ブロックが臨床例B群に似ているのも後壁側の伝導遅延を表現していると考ええる。

さらに著者は水平面におけるQRS環の回転方向と主幹切断部位との関係について検討してみたが、この実験では必ずしも関係があるとはいえなかった。No. 4の犬が切断部位中最も中枢側で右脚第3部の起始部に近く、No. 19が最も末梢側で前乳筋基部の各分枝分岐部に近い切断であった。No. 7, No. 8, No. 15は両者の中間である。Table IVに示す如く、主幹末梢端の切断は水平面QRS環が反時計式回転であるが、水平面でQRS環の前半部が時計式回転をするものより8字回転の方が中枢側の切断である場合もある。極端な上方偏位例では、水平面QRS環が右側前方へ偏位するので、切断部位以外の要素が加わる危険性が多いという印象を受けた。

結 論

雑種成犬20頭を用い、右脚を主幹、前枝、側枝、後枝と分けて、それぞれの切断実験を行なった。切断前後で撮影した心電図、ベクトル心電図を検討して下記の結果を得た。

- 1) QRS時間は、各分枝の切断ではほとんど延長せず、右脚主幹切断例のみすべて0.08秒以上に延長した。従って犬の「完全」右脚ブロックには0.08秒以上のQRS間隔が必要であると考えた。
- 2) QRS時間以外のパラメーターについて各分枝の切断例を比較すると、平均電気軸で前枝切断例に軽度左軸偏位の傾向があった他には、ほとんど差異が認められなかった。
- 3) 主幹切断では、大きく分けて、極端な上方偏位例と著者の臨床分類A群(右側後上方成分の強調されたQRS環)に似る例との、2種類の右脚ブロックが得られた。極端な上方偏位例は、右室側中隔上の広範な切創で生じるので、純粋な右脚ブロックではないと考えた。
- 4) 実験で得られたA群に似る右脚ブロックの中には、犬の臨床で見られる右脚ブロックと良く似たものがあり、臨床で見られる右脚ブロックは右脚主幹の障害で生じることが示唆された。
- 5) 人工呼吸下開胸心膜切開という操作だけで偶発的に著者の臨床分類B群(右側後上方成分の乏しいQRS環)に似る右脚ブロックが得られ、これをA群に似たものに変えることが出来たので、両群の間には興奮伝播過程の差異があると考えた。A群はB群より右室自由壁の前壁側の興奮伝導が遅延すると思われる。

稿を終るに臨み、御校閲をいただいた小坂淳夫教授に

深甚なる謝意を表するとともに、御懇篤なる御指導をいただいた原岡昭一助教授に深謝いたします。また実験に際し御協力、御助言をいただいた久松三生博士、湊武学士、森脇重光学士、斎藤大治学士、喜多利正学士、田原律哉学士に感謝いたします。

REFERENCES

1. MASSIE, E. & WALSH, T. J.: Clinical vectorcardiography and electrocardiography. The Year Book Publ. Chicago. 1960.
2. 上田英雄, 春見建一, 真島三郎, 佐藤忠一, 柳内嘉, 上田慶二: 右脚ブロックのベクトル心電図, 内科 11: 1257, 1963.
3. TOYAMA, S., SUZUKI, K., ISHIYAMA, T., YAMAGAMI, T., TERADA, A., TSUKAMOTO, N. & MORITA, K.: Vectorcardiogram in right bundle branch block with Frank's system. *Jap. Circul. J.* 28: 230, 1964.
4. TOKUNAGA, T.: Electrocardiogram and vectorcardiogram in isolated complete right bundle branch block (part I) clinical studies. *Jap. Circul. J.* 37: 941, 1973.
5. LANNEK, N. A.: Clinical and experimental study of the ECG in dogs. Med. Clin. Royal Vet. College, Stockholm, 1949, Haeggströms.
6. 原岡昭一, 久松三生, 湊武, 徳永常登, 森脇重光: 犬のベクトル心電図 (Frank 法と McFee, Parungao 法). 最新医学 27: 392, 1972.
7. 戸山靖一, 山上徹, 石山太朗, 塚本望, 森田慶治: 犬の orthogonal VCG について, 日本臨床 26: 745, 1968.
8. 小林太刀夫: 脚ブロックの実験的研究, 脚ブロックの研究, 第三報, 日内誌 30: 1, 1932.
9. ERICKSON, R. V., SCHER, A. M. & BECKER, R. A.: Ventricular excitation in experimental bundle-branch block. *Circulation Res.* 5: 5, 1957.
10. TOO, K. & UMEMOTO, H.: Studies on clinical applications of electrocardiogram on dogs. I. Electrocardiogram of shepherd dogs and karafuto (saghalien) dogs. *Jap. J. Vet. Res.* 7: 215, 1959.
11. DETWEILER, D. K., HUBBEN, K. & PATTERSON, D. F.: Survey of cardiovascular disease in dogs—preliminary report on the first 1,000 dogs screened. *Am. J. Vet. Res.* 21: 329, 1960.
12. UHLEY, H. N. & RIVKIN, L.: Electrocardiographic patterns following interruption of main and peripheral branches of the canine right bundle of His. *Am. J. Cardiol.* 6: 810, 1961.
13. WENNEMARK, J. R., BLAKE, D. F., KEZDI, P. & LEV, M.: Extensive intraventricular conduction defect. Experimental production with destruction of total Purkinje-net system of the canine right ventricle. *Circulation Res.* 11: 904, 1962.
14. 塚本望: 実験的右脚ブロックに関するベクトル心電図学的研究, 阪大医誌 18: 463, 1966.
15. PILEGGI, F., EBAID, M., JATENE, A., BITTENCOURT, D., TRANCHESI, J. & DECOURT, L. V.: Experimental vectorcardiographic study of right bundle branch block. Free right ventricular wall and crista supraventricularis in genesis of the QRS loop. *Am. J. Cardiol.* 18: 698, 1966.
16. HILL, J. D., MOORE, E. N. & PATTERSON, D. F.: Ventricular epicardial activation studies in experimental and spontaneous right bundle branch block in the dog. *Am. J. Cardiol.* 21: 232, 1968.
17. 菱田仁士, 村木寛茂, 小林利次, 上条正啓, 藤野哲郎, 岡島光治, 山田和生: 右脚ブロック・ベクトル心電図の実験的研究, 脚切断部位と QRS 環変化との関係, 日本臨床 26: 751, 1968.
18. HISHIDA, H.: IRBBB pattern after incising a subdivision of the right bundle branch. *Jap. Heart J.* 10: 350, 1969.
19. FUJINO, T.: On genesis of RBBB pattern in electro- and vectorcardiogram as studied by simulation of ventricular propagation process and reconstruction of QRS patterns. *Jap. Circul. J.* 32: 1533, 1968.
20. 山田和生, 岡島光治, 堀一彦, 藤野哲郎, 村木寛茂, 上条正啓, 小林利次, 永田昌久, 林博史, 阿久津暁, 菱田仁: 右脚ブロックの発生機構に関する実験的研究, 環研年報 19: 83, 1967.
21. 岡田了三: 心電図と心筋病理との対応, 総合臨床 19: 744, 1970.
22. 岡田了三: 刺激生成伝導系の形態, 心臓 5: 853, 1973.
23. DODGE, H. T. & GRANT, R. P.: Mechanisms of QRS complex prolongation in men. *Am. J. Med.* 21: 534, 1956.
24. 徳永常登, 森脇重光, 久松三生, 原岡昭一: 間歇性脚ブロック, 脚ブロック出沒の機序に関する症例を中心とした考察, 心臓 4: 958, 1972.
25. IWATSKA, T.: Studies on the activation process of experimental ventricular extrasystole. *Jap. Circul. J.* 22: 1, 1959.
26. 長屋昭夫: 実験的脚ブロック時の心室興奮伝播に関する研究, 日循会誌 23: 503, 1959.
27. WATT, T. B., JR., FREUD, G. E., DURRER, D. & PRUITT, R. D.: Left anterior arbolization block combined with right bundle branch block in canine and primate hearts. *Circulation Res.* 22: 57, 1968.
28. WATT, T. B., JR. & PRUITT, R. D.: Left posterior fascicular block in canine and primate hearts. an

- electrocardiographic study. *Circulation*, **40**: 677, 1969.
29. 水野康, 田村寛, 磯部竹飛虎, 岩塚徹, 長屋昭夫, 中川喬市, 安井昭二, 中山竜, 勝又洋, 岡島光治, 土田哲男, 大橋郁夫, 前田幸男, 富田嘉子, 宮内厚芳, 堀場希次, 堀部博, 中根基之: 心室興奮伝播機構, 呼吸と循環 **8**: 692, 1960.
  30. 豊嶋英雄, 服部光男: 脚ブロックの実験的研究, 環研年報 **7**: 99, 1955.
  31. 豊嶋英雄, 加藤宏, 猿橋よし子, 長屋昭夫, 奥村清, 堀部博: 心電図ベクトル心電図の構成法と其の応用 心臓の位置変化と心電図, ベクトル心電図右脚ブロックの場合について, 環研年報 **9**: 83, 1957.

EPL® カプセル

健保適用

日本商事株式会社

本社 大阪市東区石町2丁目30 TEL (941) 0301
営業所 札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・京都・神戸・岡山・広島・高松・福岡