僧帽弁閉鎖不全に対する弁形成術 —— 長期遠隔成績と適応の拡大 ——

Reconstruction for mitral regurgitation

—— its long-term results and the extension of its application ——

国立循環器病センター 心臓血管外科

川副 浩平・江石 清行・中谷 充・笹子 佳門

小坂井嘉夫・鬼頭 義次・川島 康生

National Cardiovascular Center Dept. of Cardiovascular Surgery.

Kohei Kawazoe, Kiyoyuki Eishi, Mitsuru Nakaya, Yoshikado Sasako,

Yoshio Kosakai, Yoshitsugu Kitoh, Yasunaru Kawashima

僧帽弁閉鎖不全(Mitral Regurgitation ; MR)に対する弁形成術が、多くの施設で試みられるようになって来ている。著者らも、施設開設当初より積極的に弁形成術を行い、手技に改良を加えつつ、最近では本症の全てを弁形成術の対象とするようになっている。本論文では、当施設における孤立性純型MRに対する弁形成術の長期遠隔成績を、著者の最近の手術方針とそれによる成績の向上を含めて報告する。

〔対象・方法〕

1987年1月より1991年12月の間に、当施設において弁形成術が行われた、狭窄病変を伴わない純型MRで、大動脈弁膜症および先天性心疾患合併例を除く136例を対象とした。手術時年齢は15～17歳(平均49.1歳)で、男女比は81/55であった。僧帽弁形成術と同時に行われた合併手術は、軽度の大動脈弁病変に対する弁形成術4例、三尖弁輪形成術22例、冠動脈バイパス術3例、左房粘液腫摘出術5例、心膜剝離切除術1例であった。一部肉眼的判断を含む病理組織学的検索によるMRの病因は、変性病変が74%と大多数を占め、感染性心内膜炎14%、リウマチ性病変7%、不明5%であった。弁形成手技は、腱索延長に対し腱索短縮が、腱索断裂に対し弁尖縫合または切除法が行われ、弁輪縫縮には主として一側または両側の交連部弁輪縫縮が、一部の症例にリングによる弁輪形成が行われた。しかし著者自身は、それまでの手技と適用に関して再検討した結果、1986年7月より次のような方針のもとに弁形成術を行うことにした。即ち、1)腱索延長や広範な腱索断裂に対する人工腱索(初期には異種処理心膜片を、後にはゴアテックス糸を用いている)の導入、2)必要最小口径(22～25 mm)への弁輪縫縮、そして、3)心停止下における完全な逆流消失の確認である。以上の方針に基づいて1991年末までに行った弁形成術は65例であった。

そこで全症例136例を、従来通りの形成手技が加

えられた71例(conventional series)と筆者の最近の方針による65例(current series)に分けて、遠隔成績を比較検討した。弁関連の合併症の定義は、The annals of Thoracic Surgery Guidelines¹⁾に準じ、event-free proportionの算出はKaplan-Meier法によった。conventional seriesの術後追跡期間は2ヶ月から169ヶ月(平均87.7ヶ月、累積496.8患者・年)、current seriesの追跡期間は2～67ヶ月(平均27.6ヶ月、累積144.9患者・年)であった。

表 1

CAUSES OF HOSPITAL AND LATE DEATHS

	Conventional (n=71)	Current (n=65)
Hospital Death	3 (4.2%)	2 (3.1%)
LOS		1
LOS following reoperation	1	
arrhythmia		1
myocardial infarction	1	
agranulocytosis	1	
Late Death	5 (7.0%)	1 (1.5%)
LOS following reoperation	1	
arrhythmia	3	
myocardial infarction	1	
suicide		1

〔結 果〕

病院死亡および遠隔死亡(表1)は、conventional seriesの71例中3例(4.2%)と5例(7.0%)、current series 65例中2例(3.1%)と1例(1.5%)にみられ、うち弁関連の死亡は、再手術後の心不全による2例であった。病院死亡を含む実生存率は、current seriesが術後5年で95.3%、conventional seriesが術後14年で84.7%であった(図1)。血栓塞栓症非発生率は、current series 98.2%、conventional series 98.4%で、感染性心内膜炎非発生率は共に100%であった。再手術は全てMRの残存或いは再発に対して行われ、その非発生率はcurrent seriesで97.9%、conventional seriesで79.8%であった(p

<0.05). さらに再手術, または高度 MR のいずれかの非発生率 (図 2) はそれぞれ 95.0% および 65.2% と両群間に明らかな差が認められた ($p < 0.05$). current series における MR の再発は, 人工腱索移植 24 例のうちの 2 例にみられたが, 1 例は同時に行った弁尖縫合部の穿孔を来したもので, 再縫合によって逆流は消失し, 他の 1 例は形成部以外の新たな腱索断裂が認められているが, 内科的管理によって社会復帰している。

【考 察】

Carpentier らによる優れた遠隔成績が, 心筋保護法の目覚ましい進歩を背景に, 世界各地の外科医に再び僧帽弁形成術の気運を高め, 近年北アメリカをはじめ多くの施設から遠隔成績が報告されるようになった。なかでも弁置換術との比較において弁形成術を評価した論文が多くみられる。Sand²⁾らは純型 MR において, 形成術の 101 例と弁置換術 389 例の成績を比較して, 病因死亡を含む 5 年生存率に著しい差を認め, 弁形成術が優れていることを示唆している。しかし, 再手術や感染性心内膜炎の頻度, また非再手術例における機能上の改善には両群間に差がなかったとしている。Cohn³⁾らは, MR に対する 75 例の弁形成群と 65 例の弁置換群の早期追跡結果から, 術後 30 ヶ月の実生存率と弁関連の合併症非発生率は, 弁形成群の成績がより良好である傾向を示すものの, 両群の間には有意差がなかったことを報告している。そして合併症のうち, 血栓塞栓症非発生率は弁形成群が, 再手術非発生率は弁置換群が明らかに優れており, 弁形成術後の主たる問題点として術後早期の再手術を指摘している。一方 Galloway⁴⁾らは, リウマチ性病変例を含む弁形成群 280 例の術後 5 年の実生存率と弁関連合併症非発生率は, 機械弁による弁置換 169 例および生体弁による弁置換 975 例に比し有意に高率であったと述べ, 特に非リウマチ性病変に対する弁形成術に限ると, 術後 5 年の再手術非発生率は 94.4% で, 機械弁置換

群の 96.6%, 生体弁置換群の 96.4% と同等であったと報告している。これらの論文にみる純型 MR に対する僧帽弁形成術の評価は, 最近の人工弁を用いた弁置換術と比較しても決して劣るものではなく, 同等もしくはより優れているということになるであろう。しかも, さらに長期間の追跡を行った Deloche⁵⁾らや Lessana⁶⁾らによれば, 再手術非発生率が変性病変ではそれぞれ術後 15 年で 92% および 13 年で 98% と, 極めて高い値が示されており, 純型 MR に対する弁形成術の長期間に亘る durability が証明されている。著者ら⁷⁾の術後 10 年の成績も, 純型 MR に対する弁形成群 82 例では再手術非発生率が 92%, 弁関連合併症非発生率が 87% と弁置換に比し極めて満足できるものであった。

以上のような文献的考察および自らの経験を根拠に, 筆者は近年ますます純型 MR に対する弁形成術の適応を拡大しつつあり, 最近では MR 全例に弁形成術を行うようになっていく。そして, 積極的に弁形成術に取り組んだ結果, 今回の検討成績に示す通り, かえって成績の向上がみられるようになった。その理由の最たるものは, 術中の逆流試験を徹底して行い, 少なくとも心停止下での逆流の完全消失をはかったことと, 弁輪縫縮を十分に加えるようにしたことと思われる。心停止下での逆流試験の信憑性には問題のあるところであるが, 心停止下で逆流を認める場合は同程度以上の逆流が術後にもみられ, また術中逆流を認めずとも術後に逆流を認めることがあり, このような場合は往々にして弁尖間の不十分な coaptation が観察されている。従って形成術の方針を, ある程度の逆流の残存を覚悟するのではなく, 少なくとも心停止下では逆流を完全になくするようにし, これに加えて十分な弁輪縫縮によって coaptation を確保することで遠隔成績の向上が得られたと考えられる。

一方人工腱索を用いることによって, 従来の手技では不確実であったり対処し得なかった広範な弁逸

図 1

Actuarial Analysis of Patient Survival - including hospital deaths -

図 2

Freedom from All Mitral Reoperation or Severe Regurgitation

脱例にも弁形成が可能となり、変性病変によるMRは全て弁形成の対象とすることができるようになった。人工腱索の長期の耐久性については未だ不明であるが、早期ないし中期の追跡を行ったいずれの報告⁸⁾⁻¹⁰⁾にも、ゴアテックス糸そのものに起因する合併症はなく、また劣化の徴候も指摘されておらず、現時点では、従来の形成手技を補う有用な方法と考えられる。

〔結 語〕

1. 孤立性純型僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術136例を、従来の手技による71例と、近年の著者の方針による65例に分けて、遠隔成績を比較検討した。
2. 最近のシリーズにおいて、再手術もしくはMR再発の頻度が有意に減少し、明らかに成績の向上がみられるようになった。
3. さらに長期の遠隔成績は今後の検討課題であるが、人工腱索移植を含め著者の基本方針は本疾患群の全例に適用でき、積極的に用いられて良いと考えられる。

〔文 献〕

- 1) Edmunds LH, Chairman; Clark RE, Cohn LH, Miller DC, Weisel RD: Guidelines for Reporting Morbidity and Mortality after Cardiac Valvular Operations. *Ann Thorac Surg* 1988; 46: 257-259.
- 2) Sand ME, Naftel DC, Blackstone EH, Kirklin JW, Karp RB: A comparison of repair and replacement for mitral valve incompetence. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1987; 94: 208-219.
- 3) Cohn LH, Kowalkar W, Bhatia S, DiSesa VJ, John-Sutton M, Shemin RJ, Collins JJ: Comparative Morbidity of Mitral Valve Repair versus Replacement for Mitral Regurgitation with and

without Coronary Artery Disease. *Ann Thorac Surg* 1988; 45: 284-290.

- 4) Galloway AC, Colvin SB, Baumann FG, Esposito R, Vohra R, Harty S, Freedberg R, Kronzon I, Spencer FC: Long-term Results of Mitral Valve Reconstruction With Carpentier Techniques in 148 Patients With Mitral Insufficiency. *Circulation (Suppl.)* 1988; 78(3): 97-105.
- 5) Deloche A, Jebara VA, Relland JYM, Chauvaud S, Fabiani J-N, Perier P, Dreyfus G, Mihaileanu S, Carpentier A: Valve repair with Carpentier techniques. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1990; 99: 990-1002.
- 6) Lessana A, Carbone C, Romano M, Palsky E, Quan YH, Escorsin M, Jegier B, Ruffenach A, Lutfalla G, Aime F, Guerin F: Mitral valve repair: Results and the decision-making process in reconstruction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1990; 99: 622-630.
- 7) 川副浩平: 僧帽弁逆流の修復手術 肺と心 1990; 37(2): 118-124.
- 8) Frater RWM, Vetter HD, Dahm M: Chordal replacement in mitral valve repair. *Circulation* 1990; 82(Suppl.): 125-130.
- 9) David TE, Bos J, Rakowski H: Mitral valve repair by replacement of chordae tendineae with polytetrafluoroethylene suture. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1991; 101: 495-501.
- 10) Kawazoe K, Eishi K, Sasako Y, Kosakai Y, Kitoh Y, Nakajima N, Kawashima Y: Clinical experience of mitral valve reconstruction with artificial chordae implantation. *Eur J Cardiothorac Surg* 1992; 6: 297-301.