[Chem. Pharm. Bull.]
35(3)1093—1097(1987)

Structure Cristalline d'un Nouvel Agent Inotrope, la Bis-cyclopropyl-méthyl-1,4-piperazine (Bis-chlorhydrate)

NGUYEN HUY DUNG,^a BERNARD VIOSSAT,^b MICHEL CUGNON DE SÉVRI-COURT^c
et MAX ROBBA^{*,c}

Laboratoire de Chimie Minérale et Structurale, U.E.R. des Sciences Pharmaceutiques,^a 1, rue Vaubénard, 14032 Caen Cedex, France, Laboratoire de Chimie Générale, U.E.R. de Médecine et Pharmacie,^b 34, rue du Jardin des Plantes, 86034 Poitiers Cedex, France, et Laboratoire de Chimie Thérapeutique, U.E.R. des Sciences Pharmaceutiques,^c 1, rue Vaubénard, 14032 Caen Cedex, France

(Reçu le 24 juillet, 1986)

The crystal and molecular structure of 1,4-bis-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride has been determined by single-crystal X-ray diffraction analysis. The crystals are monoclinic, space group $P2_1/c$, with $a = 11.641(7)$, $b = 7.017(2)$, $c = 9.32(4)$ Å, $\beta = 107.99(6)^\circ$, $Z = 2$. The structure was solved by direct methods. The hydrogen atoms were included in the refinement. The final R value is 0.035 for 1513 reflections considered to be observed. The bond distances and angles are in good agreement with the expected values. The 1,4-bis-cyclopropylmethylpiperazinium (2^+) ion has the "chair" conformation with a symmetry center. The crystal packing is due to the electrostatic attraction between chloride and nitrogen atoms, reinforced by hydrogen bonds.

Keywords—X-ray analysis; crystal structure; chair conformation; 1,4-bis-cyclopropyl-methylpiperazinium (2^+) ion

Le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive continue d'être dominé par les glucosides digitaliques, ce qui justifie la recherche d'autres agents cardiotoniques. Sélectionnée parmi une cinquantaine de dérivés ayant fait l'objet de brevets déposés par Robba et Aourousseau¹⁾ au nom de la firme INNOTHERA, la bis-cyclopropylméthyl-1,4 pipérazine²⁾ dont l'activité inotrope positive a été mise en évidence chez l'Homme dans des cardiomyopathies non obstructives³⁾ est actuellement en phase clinique I. Elle a été soumise à une étude radioacristallographique à l'état de bischlorhydrate.

Détermination de la Structure Cristalline

Le cristal choisi a pour dimensions: $280 \times 220 \times 180$ μm . Les paramètres de la maille élémentaire déterminés à partir de 24 réflexions avec le rayonnement MoK_α ($6,8 < \theta < 14,3^\circ$) ont pour valeurs: $a = 11,641(7)$; $b = 7,017(2)$; $c = 9,32(4)$ Å; $\beta = 107,99(6)^\circ$. $V = 701,7$ Å³; $Z = 2$; $D_m = 1,28(2)$; $D_x = 1,26$ Mg $\cdot$ m⁻³; $\mu = 0,440$ mm⁻¹ (MoK_α); $M_r = 267,2$; groupe spatial $P2_1/c$; $F(000) = 288$.

Les intensités ont été mesurées sur un diffractomètre automatique CAD-4 ENRAF-NONIUS, avec un balayage $\omega - 2\theta$, d'amplitude $s^\circ = 0,80 + 0,35 \tan \theta$. $1 \leq \theta \leq 35^\circ$; $-18 \leq h \leq 18$; $0 \leq k \leq 11$; $0 \leq l \leq 14$. Les réflexions 400, 040 et 002 ont été choisies pour contrôler les intensités. L'écart-type relatif moyen sur les intensités est de 0,02; 2712 réflexions indépendantes ont été mesurées; 1513 d'entre elles répondant au critère $I > 3\sigma(I)$ ont été retenues pour l'affinement.

Aucune correction d'absorption n'a été effectuée.

La structure a été résolue par les méthodes directes à l'aide de MULTAN 80.⁴⁾ L'affinement basé sur F a été effectué par la méthode des moindres carrés à l'aide d'un programme à matrice complète.⁵⁾ Les facteurs de diffusion corrigés des f' et f'' sont issus de "International Tables of Crystallography"⁶⁾; au cours de l'affinement, il a été tenu compte des corrections réelles de diffusion anormale pour Cl, N et C. Les positions des atomes non-

Fig. 1. Vue en Perspective du Cation (Bis-cyclopropyl-méthyl-1,4)pipérazinium (2^+)

Les ellipsoïdes d'agitation thermique correspondent à 50% de probabilité.

Fig. 2. Vue Stéréoscopique du Contenu de la Maille Élémentaire

hydrogène ainsi que les facteurs d'agitation thermique anisotrope ont été affinés. Les positions des atomes d'hydrogène ont été localisées avec la série de Fourier des différences $F_o - F_c$ puis affinées. Les facteurs d'agitation thermique des atomes d'hydrogène ont été laissés fixes et correspondent à ceux de l'atome porteur. Voici les valeurs obtenues à l'issue du dernier affinement: $R=0,035$; $R_w=0,038$ avec le schéma de pondération: $w=1/\sigma^2(F)$; la valeur maximale du rapport Δ/σ est égale à 0,64.

Les valeurs maximale et minimale de la densité électronique dans la série de FOURIER finale des différences valent 0,13 et $-0,09 \text{ e} \cdot \text{\AA}^{-3}$.

Les distances et angles valentiels ont été calculés à l'aide du programme ORFFE 3,⁷⁾ les distances aux plans moyens par le programme NRC.⁸⁾ Le dessin du cation (bis-cyclopropylméthyl-1,4)pipérazinium (2^+) (voir Fig. 1) et la vue stéréoscopique de la maille élémentaire (Fig. 2) ont été obtenus à l'aide du programme ORTEP.⁹⁾

Les coordonnées atomiques relatives sont rassemblées dans le Tableau I, les principales distances interatomiques et les angles valentiels dans le Tableau II. La Fig. 1 représente une vue en perspective du cation (bis-cyclopropylméthyl-1,4) pipérazinium (2^+) et précise la numérotation atomique utilisée. Ce cation présente un centre de symétrie (qui coïncide avec celui du groupe spatial), à la différence du cation *N*-méthyl pipérazinium (2^+) dans le complexe de la *N*-méthyl pipérazine avec la phénylbutazone¹⁰⁾; en effet, ce dernier cation

TABLEAU I. Coordonnées Atomiques, Facteurs de Temperature Equivalents et Ecart-Type (Entre Parenthèses)

	x	y	z	$B_{eq} (\text{\AA}^2)$
Cl	0,17254 (5)	0,55345 (6)	0,04662 (5)	3,2
N(1)	0,1246 (1)	-0,0223 (2)	-0,0008 (1)	2,1
C(2)	0,0955 (2)	0,0460 (3)	0,1399 (2)	2,5
C(3)	-0,0247 (1)	-0,0334 (2)	0,1422 (2)	2,4
C(11)	0,2439 (2)	0,0516 (3)	-0,0112 (2)	2,7
C(111)	0,3481 (2)	-0,0101 (3)	0,1228 (2)	3,2
C(112)	0,3873 (2)	0,1114 (4)	0,2659 (3)	4,5
C(113)	0,4616 (2)	0,1058 (4)	0,1580 (3)	4,3
H(N1)	0,135 (2)	-0,144 (4)	0,006 (3)	2,1
H(C2A)	0,162 (2)	0,002 (4)	0,233 (3)	2,5
H(C2B)	0,093 (2)	0,186 (4)	0,136 (3)	2,5
H(C3A)	-0,043 (2)	0,009 (4)	0,232 (3)	2,5
H(C3B)	-0,026 (2)	-0,179 (4)	0,141 (3)	2,5
H(C11A)	0,236 (2)	0,190 (4)	-0,015 (3)	2,7
H(C11B)	0,248 (2)	-0,002 (4)	-0,108 (3)	2,7
H(C111)	0,355 (2)	-0,141 (4)	0,132 (3)	3,2
H(C112A)	0,419 (3)	0,049 (4)	0,369 (4)	4,5
H(C112B)	0,342 (3)	0,231 (5)	0,269 (3)	4,5
H(C113A)	0,540 (3)	0,042 (5)	0,190 (3)	4,4
H(C113B)	0,458 (3)	0,221 (5)	0,090 (4)	4,4

$$B_{eq} = \frac{4}{3} \sum_i \sum_j \beta_{ij} \hat{a}_i \cdot \hat{a}_j.$$

possède un plan de symétrie passant par les atomes d'azote et perpendiculaire au plan des atomes de carbone. Dans le composé cité en titre, le noyau pipérazinium (2^+) présente une conformation de type chaise. Les distances C–N et C–C intracycliques sont très voisines de celles décrites dans le bichlorhydrate de pipérazine monohydrate¹¹⁾ qui présente une symétrie $\bar{1}$. Les distances C–C et C–N de l'ion pipérazinium (2^+) ont des valeurs respectivement égales à 1,527 Å d'une part, 1,490 et 1,509 Å d'autre part.

Ces valeurs sont nettement supérieures à celles décrites dans l'hexahydrate de pipérazine¹²⁾ de symétrie $2/m$: 1,491 Å pour la liaison C–C et 1,458 Å pour la liaison C–N.

La double charge cationique est apportée par les protons rattachés aux deux atomes d'azote du noyau pipérazine. Les atomes N(1) et N(1') sont situés de part et d'autre du plan moyen défini par les atomes C(2), C(3) et leurs centrosymétriques, à une distance égale à 0,681(1) Å. Les angles de liaison endocycliques ont une valeur moyenne de 110,3(9)°. La distance N(1)–C(11) reliant le noyau pipérazine au groupement méthylène en pont est un peu plus longue que les valeurs couramment admises pour les liaisons du type $N(sp^3)$ – $C(sp^3)$. En revanche, la distance C(11)–C(111) reliant ce pont au cyclopropane est plus courte que la longueur habituelle $C(sp^3)$ – $C(sp^3)$ et peut être comparée à celles rencontrées dans le chloro-1 phénylsulfonyl-1, diméthyl-2,3 cyclopropane¹³⁾: 1,511 et 1,515 Å. Les distances C–C à l'intérieur du cyclopropane sont plus courtes que les valeurs observées pour des simples liaisons de type paraffinique; elles sont très voisines de celles observées dans le dérivé précédemment cité.¹³⁾ Les angles endocycliques sont très proches de 60°. Le plan du cyclopropane (Tableau III) fait un angle de 29,70° avec le plan moyen du cycle pipérazine (défini par C(2), C(3) et leurs homologues centrosymétriques).

L'électroneutralité du composé est assurée par les ions Cl^- qui sont liés aux protons H^+ rattachés aux atomes d'azote par la liaison hydrogène: N(1)–H(N1) $\cdots$ Clⁱⁱ: 3,034(1) Å et 174(2)° avec le code de symétrie ii: (x, -1 + y, z).

TABLEAU II.

a) Distances interatomiques (Å) et angles (°)			
Distances (Å)		Angles (°)	
N(1)–C(2)	1,492 (2)	C(2)–N(1)–C(3 ⁱ)	108,8 (1)
N(1)–C(3 ⁱ)	1,489 (2)	C(2)–N(1)–C(11)	113,4 (1)
N(1)–C(11)	1,512 (2)	C(3 ⁱ)–N(1)–C(11)	110,2 (1)
C(2)–C(3)	1,512 (2)	N(1)–C(2)–C(3)	110,4 (1)
C(11)–C(111)	1,489 (3)	C(2)–C(3)–N(1 ⁱ)	111,8 (1)
C(111)–C(112)	1,497 (3)	N(1)–C(11)–C(111)	112,5 (1)
C(111)–C(113)	1,500 (3)	C(11)–C(111)–C(112)	119,4 (2)
C(112)–C(113)	1,490 (3)	C(11)–C(111)–C(113)	117,3 (2)
N(1)–H(N1)	0,86 (3)	C(112)–C(111)–C(113)	59,6 (2)
C(2)–H(C2A)	1,00 (2)	C(111)–C(112)–C(113)	60,3 (1)
C(2)–H(C2B)	0,98 (3)	C(112)–C(113)–C(111)	60,1 (2)
C(3)–H(C3A)	0,95 (3)		
C(3)–H(C3B)	1,02 (3)		
C(11)–H(C11A)	0,98 (3)		
C(11)–H(C11B)	0,97 (3)		
C(111)–H(C111)	0,92 (3)		
C(112)–H(C112A)	0,99 (3)		
C(112)–H(C112B)	1,00 (3)		
C(113)–H(C113A)	0,97 (3)		
C(113)–H(C113B)	1,01 (3)		
b) Liaison hydrogene			
	N(1)–H–Cl ⁱⁱ	3,034(1)Å, 174 (2)°	
c) Liaisons intermoléculaires ($d < 3,60$ Å) et écarts-type			
	Cl–C(2 ⁱⁱⁱ)	3,571(1)Å	
	C(113)–C(113 ^{iv})	3,567(5)Å	

Code de symétrie, i: $-x, -y, -z$. ii: $x, 1-y, z$. iii: $x, 1/2-y, -1/2+z$. iv: $1-x, -y, -z$.

TABLEAU III. Equations des Différents Plans Moyens (Pondérés à Partir des Écarts-Type sur les Positions Atomiques), Distances des Atomes à ces Plans Moyens et Angle Dièdre entre Plans

a) Paramètres rapportés à un système de coordonnées cartésiennes en Å				
	l	m	n	p
Cycle A	−0,3687	0,9291	−0,0283	0
Cycle B	0,3830	−0,7673	0,5144	2,0178
b) Distances des atomes aux plans moyens (les écarts-type sont mis entre parenthèses)				
Cycle A défini par les atomes suivants: C(2), C(2 ⁱ), C(3), C(3 ⁱ)				
Distance de N(1) au cycle A: −0,681(1) Å				
Cycle B défini par les atomes C(111), C(112), C(113)				
c) Angle dièdre (A, B) = 150°				

Plans moyens $lX + mY + nZ = p$.

La Fig. 2 représente une vue stéréoscopique du contenu de la maille élémentaire; l'empilement des molécules sous forme d'entités isolées s'effectue selon la direction $\vec{a}$. La cohésion cristalline est assurée par les contacts de van der Waals habituels. Les paramètres d'agitation thermique anisotrope des atomes non hydrogène sont rassemblés dans le Tableau IV.

En conclusion, l'étude radiocristallographique de la bis-cyclopropylméthylpipérazine a

TABLEAU IV. Parametres d'Agitation Thermique Anisotrope ($\times 10^3$)

Atomes	β_{11}	β_{22}	β_{33}	β_{12}	β_{13}	β_{23}
Cl	9,52 (4)	9,68 (8)	10,80 (5)	0,81 (5)	3,77 (4)	0,56 (6)
N(1)	5,7 (1)	8,9 (2)	6,7 (1)	0,5 (1)	2,6 (1)	0,2 (1)
C(2)	6,2 (1)	13,7 (3)	6,2 (2)	-0,2 (2)	2,6 (1)	-0,7 (2)
C(3)	6,3 (1)	12,9 (3)	6,1 (2)	0,4 (2)	2,6 (1)	1,2 (2)
C(11)	5,9 (1)	13,3 (3)	9,6 (2)	-0,5 (2)	3,5 (1)	-0,6 (2)
C(111)	6,3 (1)	14,3 (4)	12,6 (2)	0,9 (2)	2,5 (2)	-0,8 (2)
C(112)	8,1 (2)	28,2 (6)	12,1 (3)	0,0 (3)	1,6 (2)	-4,1 (3)
C(113)	6,5 (2)	22,6 (5)	17,5 (4)	-1,2 (2)	2,7 (2)	-3,2 (4)

$$T = \exp\{-h^2\beta_{11} + k^2\beta_{22} + l^2\beta_{33} + 2hk\beta_{12} + 2hl\beta_{13} + 2kl\beta_{23}\}.$$

permis de préciser la conformation chaise du cycle pipérazinique ainsi que la configuration trans di-équatoriale des deux substituants cyclaniques. L'hétérocycle est caractérisé par la présence d'un centre d'inversion et par l'absence d'un plan de symétrie à la différence de la *N*-méthylpipérazine citée précédemment¹⁰⁾ qui présente simultanément ces deux éléments de symétrie. Nous pouvons ainsi entreprendre l'étude du mécanisme de l'activité hémodynamique de ce nouvel agent inotrope.

References

- 1) M. Robba et M. Aurousseau, Brevet Français, Fr. Patent N° 8021527 (1980), Brevet Européen, Fr. Patent N° 50072 (1981), Brevet Américain, U. S. Patent 4.474.783 (1981), Brevet Japonais, Japan. Patent 163681 (1981).
- 2) G. Leclerc, *Drugs of the Future*, **10**, 907 (1985).
- 3) D. Mesangeau, I. Azancot, J. Haring, M. Maamer et M. Aurousseau, First Pharmacological Findings on INO 2628 CZ: a New Inotropic Agent with Bis-cyclopropylmethylpiperazine Structure, Abstracts of Papers, 8th International Congress Pharmacology, Tokyo, July 1981, p. 908.
- 4) P. Main, S. J. Fiske, S. E. Hull, L. Lessinger, G. Germain, J. P. Declercq et M. M. Woolfson, MULTAN a System of Computer Programs for the Automatic Solution of Crystal Structures from X-Ray Diffraction Data, Université de York, Angleterre et Louvain, Belgique.
- 5) W. R. Busing, *Acta Cryst.*, **A27**, 683 (1971).
- 6) International Tables for X-Ray Crystallography, Tome IV, Kynoch Press, Birmingham, 1974, pp. 72—75.
- 7) W. R. Busing, K. O. Martin et H. A. Levy, ORFFE 3, Oak Ridge, National Laboratory, Tennessee, 1971.
- 8) F. R. Ahmed, S. R. Hall, M. E. Pippy et C. P. Huber, NRC Crystallography Programs for the IBM/360 System—World List of Crystallography Computer Programs, Utrecht, Oosthoek, 1966, p. 52.
- 9) C. K. Johnson, ORTEP. Report ORNL-3794. Oak Ridge, National Laboratory, Tennessee, 1965.
- 10) J. Toussaint, O. Dideberg et L. Dupont, *Acta Cryst.*, **B30**, 590 (1974).
- 11) C. Rerat, *Acta Cryst.*, **13**, 459 (1960).
- 12) D. Schwartzbach, *J. Chem. Phys.*, **48**, 4134 (1968).
- 13) W. Saenger et H. Schwalbe, *J. Org. Chem.*, **36**, 3401 (1971).