**Zur Frage nach der Neubildung¹⁾ von Zellen im tierischen Organismus.
2. Mitteilung. Neuere Ergebnisse über die Bildung von Zellen
und Blutinseln aus den Dotterkugeln des Hühnerembryos**

Von

Prof. Dr. **O. B. Lepeschinskaja** (Moskau)

Histologische Abt. des Timirjaseff-Instituts für Biologie

Abteilungsleiter, Prof. Dr. O. B. LEPESCHINSKAJA

Eingegangen am 16. Juni 1935

Einleitung

Die Erforschung der Bildung von Zellen aus Dotterkugeln ist im wesentlichen nichts anderes, als die Untersuchung von frühen Stadien der Zellontogenie. Unter Ontogenie der Zelle sind alle Stadien der Zellentwicklung in der Ontogenie des Organismus zu verstehen. Die Ontogenie der Zelle umfaßt sowohl den embryonalen Zustand derselben als auch ihr reifes Alter mit der Teilungsfähigkeit, das Altern und den Tod. Die vielzelligen Organismen haben ihre Entwicklungsgeschichte, zweifellos müssen auch die Einzelligen eine solche besitzen.

Beginnt die Ontogenie des vielzelligen Organismus mit einer einzigen Keimzelle, geht also denselben Weg, den die Phylogenie der Metazoen gegangen ist, so müssen wir, der phylogenetischen Entwicklung der Zelle aus dem Protoplasma folgend, den Beginn ihrer Ontogenie ebenfalls im lebenden Protoplasma und seinen Veränderungen suchen. Und wenn im Teilungsprozeß der Zellen in einer Mutterzelle die Tochterzelle entsteht, so treten vor allem Veränderungen im Protoplasma auf, d.h. die Erzeugung der neuen Zellen beginnt mit Veränderungen im Protoplasma. Die Anlage der neuen Zelle, ihr Zentrosom, ist—wie wir annehmen—das künftige Liningerüst der Zelle und entsteht aus dem Protoplasma der Mutterzelle, d.h. es ist anzunehmen, daß die Ontogenie jeder Zelle im Protoplasma beginnt. Die Dotterkugel, deren Transformation in der Richtung der Zellbildung wir untersuchen, stellt ebenfalls einen Protoplasmaklumpen dar, der durch die in ihm in zerstäubtem Zustand enthaltene Kernsubstanz kompliziert wird.

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß jede Zelle aus dem Protoplasma als Derivat einer anderen Zelle entsteht, daß aber einige Zellen nach deren Anlage im Protoplasma durch karyokinetische

1) Um jedes Mißverständnis zu vermeiden, weise ich darauf hin, daß unter „Neubildung“ die Entstehung von Zellen im Metazoen-Organismus nicht nur durch Teilung, sondern auch durch Bildung aus protoplasmatischen Massen, durch Transformation der lebenden Substanz zu verstehen ist.

Teilung geboren werden, andere dagegen—wie unsere Kugelzellen—unabhängig von der Teilung innerhalb der Zelle selbst aus dem Protoplasma gebildet werden.

Bei der karyokinetischen Zellteilung ist die Größe der aus der Mutterzelle knospenden Tochterzelle fast dieselbe, wie die der ersteren; im zweiten Fall aber bildet die aus dem Protoplasma der Mutterzelle entstandene neue Zelle nur einen geringen, mit einem neugebildeten Kern versehenen Teil dieser Mutterzelle.

Beim Beginn unserer Untersuchungen über die Bildung von Zellen aus Dotterkugeln gingen wir von der Überlegung aus, daß wir—wenn die Phylogenie ihren Siegel der Ontogenie irgendeines in Entwicklung begriffenen Organismus aufdrückt—evtl. erwarten dürften, in den frühen Entwicklungsstadien der Eizelle, sofern sie die niederste Stufe in der Ontogenie eines jeden Organismus bildet, die vererbten Reste der Zellphylogenie, d.h. ihrer Entstehung aus dem Protoplasma verfolgen zu können. Davon ausgehend, suchten wir in der Ontogenie des Hühnerembryo nach einer Zellontogenie als Widerspiegelung der Zellphylogenie.

Die wissenschaftlichste und wahrscheinlichste Hypothese über die Phylogenie der Zelle dürfte wohl die von HAECKEL und später (1923) die von MINCHIN sein. Von diesem schreibt SEWERTZOFF, daß hier einer der hervorragendsten Protistologen unserer Zeit den Versuch unternommen hat, eine der schwierigsten und dabei interessantesten Fragen der Biologie, nämlich die Frage nach der ursprünglichen Struktur und Evolution der Zelle hypothetisch zu beantworten . . . wobei er zu einer originellen und geistreichen Hypothese über die Entstehung der Zelle kam. MINCHIN und HAECKEL sind verschiedener Ansicht von den Moneren; MINCHIN nennt sie Pseudomoneren und geht ausführlich auf ihre Evolution ein. ENGELS erkennt die Moneren HAECKELS an und behauptet, daß die Nichtzelligen ihre Entwicklung als einfache Eiweißklümpchen, welche in dieser oder jener Form Pseudopodien aussenden und einziehen, beginnen und daß im Eiweiß sich Kern und Nucleolus herausdifferenzieren—die nackten Amöben. Fassen wir diese Hypothesen von der Phylogenie der Zelle zusammen, so können wir sagen, daß aus protoplasmatischen Massen sich eine Monere heraussondert,—in deren gesamtem Protoplasma Chromatinkörnchen verstreut liegen und die die Fähigkeit der Pseudopodienbildung besitzt. Aus der protoplasmatische Substanz in der Monere entsteht vor allem ein Liningerüst, dessen Natur noch unbekannt ist und das dann mit Chromatinkörnern gefüllt wird und das Bild eines echten granulierten Kerns ergibt. Die Cytode oder Monere verwandelt sich in eine ausgebildete Zelle.

Wir wollen uns nun bei den Moneren von HAECKEL aufhalten und uns die Frage vorlegen, ob sie auch jetzt noch existieren.

In neuerer Zeit ist man dazu übergegangen, die Existenz der HAECKELschen Moneren überhaupt zu leugnen, und zwar aus dem Grund, weil man mit Hilfe von neueren und vollkommeneren mikroskopischen Methoden festgestellt hatte, daß die Gebilde, welche als HAECKELsche kernlose Moneren galten, Kerne in Gestalt von über die ganze Monere zerstreuten Chromatingranula enthalten. U.E. reichen diese Argumente für das Leugnen der Existenz von Moneren nicht aus, weil die genauere Kenntnis der feineren Struktur noch keine Widerlegung bedeutet und keinen Grund für die Behauptung, daß die Moneren verschwunden sind, bildet. Als durch exaktere Untersuchungsmethoden festgestellt wurde, daß die Atome aus Protonen und Elektronen bestehen, so verschwand deshalb das Atom nicht. Warum sollte denn die Monere verschwinden, als durch exaktere Methoden Einzelheiten ihrer Struktur festgestellt worden waren, nämlich daß in ihrem Körper verstreute Chromatinkörner liegen? Chromatinkörner sind noch keine Kerne, und so ist auch die Monere noch keine Zelle, und die Behauptung, daß in Moneren Kerne gefunden worden sind, ist nichts anderes als eine stark tendenziöse Deutung der Tatsachen, die vielleicht um viele Jahrzehnte die richtige Erforschung der Onto- und Phylogenie der Zelle verzögerte. Der Kern besitzt eine bestimmte Struktur, die die Monere in unserem Fall noch nicht besitzt. Die Zerstäubung der Kernsubstanz ist das Merkmal einer frühen Stufe der Kernentwicklung. Diese Monere mit der zerstäubten Kernsubstanz befindet sich zweifellos erst in einem Entwicklungsstadium des normalen Kerns. Die Monere ist noch keine Zelle, sondern ein frühes Entwicklungsstadium der letzteren.

Wenn wir in der Ontogenie der Zelle nach Spuren ihrer Phylogenie, nach Rekapitulationen suchen wollen, so müssen wir bei der Untersuchung der Entwicklung von Zellen aus Dotterkugeln sorgfältig darauf achten, ob im Laufe der Transformation dieser Dotterkugeln nicht solche Strukturen auftreten, die denen analog sind, welche von den Autoren der Hypothesen über die Phylogenie der Zellen beschrieben wurden, nämlich: 1) Strukturen, welche an die Moneren HAECKELs oder die Pseudomoneren MINCHINS erinnern; 2) monerenähnliche Strukturen mit Liningerüst auf verschiedenen Entwicklungsstadien; 3) Karyosome von MINCHIN und schließlich 4) Zellen, die an jungen Embryonalzellen mit basophilem, gekörneltem Plasma, basophilem Nucleolus und großem, homogenem, acidophilem Kern erinnern.

Wenn die verschiedenen Stadien der ontogenetischen Entwick-

lung von Zellen aus Protoplasma, wie wir sie bei der Transformation von Dotterkugeln, als eines protoplasmatischen Gebildes beobachten, in keiner Weise den Stadien der phylogenetischen Entwicklung von Zellen ebenfalls aus Protoplasma, wie sie in den heutzutage herrschenden Hypothesen von HAECKEL und MINCHIN dargestellt werden, entsprechen würden, so müßten entweder unsere Beobachtungen nicht den Tatsachen entsprechen und die von uns beschriebenen Bilder keine Widerspiegelung der Zellphylogenie bedeuten, oder es müßten die vorhandenen Hypothesen über die Zellphylogenie oder schließlich Hypothesen und Bilder falsch sein.

Wenn dagegen unser Schema der frühen Ontogeniestadien der Entwicklung von Zellen aus protoplasmatischer Substanz, ein Schema, gestützt auf zahlreiche experimentelle und histologische Beobachtungen an Dotterkulturen aus in Entwicklung begriffenen Hühnerembryonen, an Kulturen in vivo und in vitro, an sich entwickelnden Embryonen im Thermostat mit Hilfe eines Ultropaks,—wenn dieses Schema tatsächlich dem Bild der phylogenetischen Zellentwicklung, wie sie ENGELS, HAECKEL und MINCHIN darstellen, entspricht, so kann diese Übereinstimmung keineswegs eine zufällige sein. Die Tatsachen sprechen für sich, sie müssen unzweideutig beweisen, daß wir in unseren Untersuchungen und Schlußfolgerungen den richtigen Weg verfolgen, und außerdem müssen sie noch einmal bekräftigen, daß die Ontogenie der Zelle tatsächlich deren Phylogenie widerspiegelt.

Bevor wir zur Schilderung unserer letzten Ergebnisse übergehen, müssen wir uns den Inhalt der ersten Mitteilung kurz ins Gedächtnis zurückrufen.

Betrachten wir das Schema der Entwicklung von Dotterkugeln und der Bildung von Zellkugeln aus diesen sowie alle Photographien, die wir bei allen obenerwähnten Untersuchungsmethoden erhalten haben, so sehen wir, daß aus der Dottermasse sich Dotterkugeln heraussondern, die die Fähigkeit besitzen, Pseudopodien zu bilden, und in ihrem Protoplasma verstreute feine Granula enthalten, welche sich mit basischen Farbstoffen färben. Die Kugeln also, welche auf die FEULGEN'sche Reaktion positiv reagieren, erinnern stark an die Moneren HAECKELS.

Weiter sehen wir, wie sich allmählich in diesen „Moneren“ aus der strahlenförmig angeordneten Granulation ein kleines Bläschen entwickelt, das sich dann vergrößert. Diesem Bläschen, das sich mit sauren Farbstoffen färbt, haben wir zufällig denselben Namen gegeben, wie MINCHIN, nämlich „Liningerüst“. Unser Liningerüst entspricht völlig dem von MINCHIN für die Phylogenie der Zelle beschriebenen. Weiter sehen wir in dem Schema, wie das Linin-

gerüst sich mit Körnern füllt und einen granulierten, basophilen Kern ergibt, welcher dem Karyosom MINCHINS völlig entspricht und auf die FEULGENsche Reaktion positiv reagiert. Schließlich entsteht durch Austritt dieser Granulation aus dem Karyosom ins Plasma die Zellkugel, welche ebenfalls auf dem Schema zu sehen ist. Als Zellkugel bezeichnen wir eine junge Zelle, die, wie jede embryonale Zelle, ein basophiles, körniges Protoplasma, einen basophilen Nucleolus und einen großen, acidophilen Kern besitzt. Diese Zelle unterscheidet sich von den gewöhnlichen Zellen des äußeren Keimblatts durch ihre gigantische Größe und den großen Gehalt an Dotterkörnern im Plasma.

Außerdem haben wir in unserer ersten Mitteilung das Bild der allmählichen Entwicklung von Blutinseln aus Dotterkugeln, die nicht in der subembryonalen Höhle (wobei aus ihnen Zellen entstehen), sondern zwischen zwei Keimblättern liegen, gegeben. In diesem Fall entstehen die Blutelemente aus jedem Dotterkörnchen. Diese andersartige Entwicklung beruht auf der Verschiedenheit der äußeren Entwicklungs- und Determinationsbedingungen.

Bei der Entstehung von Blutinseln sehen wir folgende Stadien: Zunahme der Körnchengröße, Bildung von Syngranula, dann Bildung einer Plasmaschicht um jedes Körnchen und einer Hülle, d.h. Bildung eines Syncytiums, und schließlich Verlassen des Syncytiums von den einzelnen Zellen-Blutelementen (s. 1. Mitteilung).

Aus dem Gesagten geht hervor, daß schon in der 1. Mitteilung das Bild der Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln beim Hühnerembryo völlig und keineswegs zufällig dem Bild der phylogenetischen Zellentwicklung, wie sie von HAECKEL und MINCHIN geschildert wird, entspricht. Wenn wir uns der Meinung derjenigen Biologen anschließen, die das hier angeschnittene Problem ernst nehmen und seine Bedeutung für die Biologie erkennen, so müssen wir uns auch damit einverstanden erklären, daß wir, um unsere Ansicht am besten zu begründen und am exaktesten nachzuprüfen, ob das von uns entworfene Bild auch tatsächlich der Zellphylogenie entspricht, alle uns zugänglichen Untersuchungsmethoden anwenden und solche Tatsachen zutage fördern müssen, die am überzeugendsten und in einwandfreier Weise die Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln bei Hühnerembryonen beweisen könnten.

Wie jedes andere, so geht auch unser Problem im Laufe seiner Ausarbeitung in die Breite und Tiefe; es verlangt einerseits nach ergänzenden Versuchen zur ausführlichen Erforschung der Frage und andererseits—nach einer weiteren Verallgemeinerung. Dies veranlaßt uns, unsere Arbeit unter Zuhilfenahme von exakteren Methoden weiter zu verfolgen.

Methode

In der 1. Mitteilung haben wir darauf hingewiesen, daß es uns nicht gelungen war, soweit günstige Bedingungen für die Lebendbeobachtung der Kulturen herzustellen, daß wir die Zellbildung an einundderselben Kugel beobachten könnten. Die Notwendigkeit, unsere Arbeit in diesem Punkt zu ergänzen, führte uns zur Ausarbeitung einer entsprechenden Methode, mit deren Hilfe wir die Zellbildung an einundderselben Kugel sowie die Veränderungen der Dotterkugeln bei deren Umbildung zu Blutinseln in vivo mit dem Ultropak am sich im Thermostaten entwickelnden Embryonen und —ebenfalls in vivo—den Transformationsprozeß der Dotterkugeln zu Blutinseln verfolgen und die Zeit und den Ort der Hämoglobinbildung in diesen feststellen konnten. Alle diese Erscheinungen konnten mit Hilfe der neu ausgearbeiteten Methode vollständig verfolgt und einige Momente hiervon fotografiert, andere dagegen nur gezeichnet werden.

Um die Entwicklung eines Hühnerembryo im Ultropak verfolgen zu können, mußten wir vor allem einen eigens für diesen Zweck angepaßten Thermostat besitzen. Ich konstruierte dafür einen elektrischen Thermostaten, der in der Institutswerkstatt vom Institutsmechaniker J. G. TARASSOFF angefertigt wurde. Der Thermostat besitzt an der Decke eine runde Öffnung für die Kulturschale und

im Innern ein seit- und aufwärts verschiebbares Tischchen. Darauf wird die Kulturschale mit dem geöffneten Ei gestellt, und der Tisch mit Hilfe von Schrauben an die obere Öffnung gebracht. Öffnung und Objektiv des Ultropaks werden mit Watte verdeckt, und so kann die Beobachtung bei der für die Entwicklung des Embryo günstigen Temperatur von 38° vor sich gehen (Abb. I).

Um die Entwicklung der Blutinseln in vivo unter Immersion zu verfolgen, mußten wir, nachdem wir das obere Drittel oder sogar

Abb. I. Methode für Lebendbeobachtungen mit dem Ultropak und Thermostat von LEPESCHINSKAJA.

die Hälfte der Schale und des Eiweißes entfernt hatten, den Dotter mit dem Embryo mit einem Deckglas oder mit Glimmer bedecken. Aber Glas und Glimmer zerreißen bei dem leisesten Druck mit dem Objektiv sofort die Dottermembran und der sich ergießende Dotter bedeckt Glas und Glimmer, wodurch sowohl der Embryo verletzt als auch die weitere Beobachtung unmöglich gemacht wird. Um diesen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, arbeitete die Laborantin E. P. LAPISSOWA folgende wertvolle und gestreiche Methode aus: Damit die Dottermembran von den scharfen Glas- oder Glimmer-rändern nicht aufgeschlitzt wird, klebte sie ein Glas- oder Glimmerplättchen mit Kollodium auf eine in einer ganz dünnen Gummimembran ausgeschnittene Öffnung (Abb. III). Die Gummimembran mit dem angeklebten Glas oder Glimmer wird auf den Dotter gelegt, wobei die Membranenden von der Eischale herunterhängen. Auf diese Weise wird der ganze Dotter mit dem übriggebliebenen Eiweiß fast hermetisch verdeckt. Außerdem konstruierte E. P. LAPISSOWA einen kleinen Apparat mit drei Schrauben und einem Ring, der es erlaubt, das Glas zu nivellieren und es unbeweglich zu erhalten, wodurch die Beobachtung unter Immersion sehr erleichtert wird (Abb. II).

Abb. II. Vorrichtung zur Befestigung und Nivellierung der Glasplättchen (n. LAPISSOWA).

Abb. III. Gummimembran mit aufgeklebtem Glimmerplättchen.

Um die Reibung zwischen dem Glas und dem Embryo herabzusetzen, wurde das Glas- oder Glimmerplättchen mit einer dünnen Schicht Vaseline (natürlich steril) bedeckt. Unter diesen Bedingungen gelang es die Entwicklung des Embryo bis zu $1\frac{1}{2}$ Tagen zu verfolgen. Diese Zeit reicht bei Lebendbeobachtungen völlig aus, um die Entwicklung und Transformation von Dotterkugeln zu Blutinseln zu verfolgen.

Die histologische Untersuchung der Bildung von Blutinseln aus Dotterkugeln bei Hühnerembryonen wurde an Schnitten durch Eier nach 1½-tägiger Inkubation ausgeführt. Die Präparate wurden mit BOUIN fixiert und nach HEIDENHAIN gefärbt. Die Dicke der Serienschritte betrug 5 μ .

Was die Lebendbeobachtung der Dotterkultur bei der Entwicklung des Hühnerembryo und der Entstehung einer jungen Zelle aus Dotterkugeln betrifft, so war die Ausarbeitung einer Methode zu diesem Zweck, sofern wir den gesamten Vorgang an einundderselben Kugel verfolgen wollten, mit großen Schwierigkeiten verbunden, wie das schon aus der Angabe von LAWDOWSKY und TISCHUTKIN hervorgeht, derzufolge die Dotterzellen ein zartes, leicht zerfließendes Protoplasma besitzen, weshalb jede Untersuchung dieser Gebilde in frischem Zustand fast unmöglich ist. Umso größer werden diese Schwierigkeiten, wenn wir noch frühere Entwicklungsstadien, d.h. Dotterkugeln, die noch zarter als die Dotterzellen sind, beobachten wollen.

Tatsächlich konnten wir uns an Hand zahlreicher Versuche überzeugen, daß jede stärkere Belichtung der Kultur, wie das zum Fotografieren notwendig ist, überaus schädlich auf Dotterkugeln und -Zellen wirkt. Nach Beobachtungen von NIKIFOROWA in unserem Laboratorium führt die leiseste Berührung zu einer Veränderung der Dotterkugelstruktur.

Die Schwierigkeiten bestehen auch darin, daß ja bei weitem nicht jede Kugel zu einer Zelle oder Blutinsel wird. Neben dem Formbildungsprozeß kommt auch ein anderer Prozeß zur Beobachtung, bei dem Dotterkugeln und -Körner für die Bildung der Blastocoelflüssigkeit (O. B. LEPESCHINSKAJA) und die Ernährung der Zellen dienen, d.h. ein Prozeß, bei dem die Struktur der Dotterkugeln zerstört wird; wenn wir nun eine Kugel auf frühen Stadien ihrer Entwicklung zum Untersuchungsobjekt wählen, so wissen wir nicht, wohin deren weitere Entwicklung führen wird, ob zur Entstehung oder Ernährung einer Zelle. Deshalb muß, um das erwünschte, d.h. eine Zellbildung, zu erreichen, eine ganze Reihe von Versuchen angestellt werden, die ganz andere Resultate als die erwünschten ergeben. Hier haben wir nun schon eine Methode zum Auffinden der notwendigen, hoffnungserweckenden Stellen ausgearbeitet. Es werden solche Stellen aufgefunden, wo bereits Kugelzellen entstanden sind, und die Dotterkugeln eine BROWNSche Bewegung ihrer Granulation aufweisen, wobei diese Granulation etwas gröber ist als in den anderen Kugeln. Die Belichtung mußte möglichst selten und kurz geschehen, weshalb wir natürlich nicht in der Lage waren, die Zwischenstadien der Zellentwicklung zu verfolgen; indes war es vorläufig wichtiger und

zweckmäßiger nachzuweisen, daß die Zellkugel wirklich aus einer Dotterkugel entstanden war, d.h. es mußten in diesem Fall Anfangs- und Endstadium festgestellt werden, damit kein Zweifel entstehen könnte, daß es sich tatsächlich um eine Dotterkugel handelte und daß eben aus ihr die „Zelle-Kugel“ entstanden war. Als die „Zelle-Kugel“ bezeichnen wir—wie erwähnt—eine aus einer Dotterkugel neu entstandene Zelle, die einerseits alle Merkmale einer jungen Zelle (basophiles, körniges Plasma, homogener, acidophiler Kern, basophiler Nucleolus) und sich andererseits durch ihre gigantische Größe und den höheren Gehalt von Dotterkörnern im Plasma von der ektodermalen Zellschicht auszeichnet. Wegen dieser abweichenden Merkmale ist es besser, sie nicht einfach als Zelle, sondern als „Zelle-Kugel“ zu bezeichnen, um auf diese Weise an ihre Abstammung von einer Dotterkugel zu erinnern.

Für diese Versuche dienten Kulturen von Eiern nach zweistündiger Inkubation im elektrischen Thermostat mit konstanter $t^{\circ} = 38^{\circ}$, von denen mit einem Macam-Apparat periodische Aufnahmen bei 600facher Vergrößerung gemacht wurden.

Die Kultur wird in mit Ringer verdünntem Embryonalextrakt und in Hühnerplasma angesetzt. Nach zweistündiger Inkubation wurde der Embryo mit der Keimleiste und dem Boden der subembryonalen Höhle abgetragen. Dann wird mit einer Nadel die ganze Scheibe leicht entfernt und die Kultur nur aus den übriggebliebenen Teilen—der Keimleiste und der subembryonalen Höhle—angesetzt. Nach der Impfung bleibt die Kultur 1 Stunde im gewöhnlichen Thermostaten bei 38° und wird erst darauf in einen anderen Raum unter das Mikroskop gebracht, welches, wie erwähnt, in einem kleinen Thermostat ebenfalls bei 38° steht.

Eigene Beobachtungen

1. Beobachtungen mit dem Ultropak über die Entwicklung von Blutinseln beim Hühnerembryo im Thermostat von LEPESCHINSKAJA auf verschiedenen Stadien der embryonalen Entwicklung (2, 6, 12 Stunden, 1. bis 8. Tag der Inkubation).

Die anschaulichsten Bilder der Entwicklung von Blutinseln aus Dotterkugeln bei einem Hühnerembryo ergeben Embryonen nach $11\frac{1}{2}$ -tägiger oder noch längerer (6–8 Tage) Inkubation. So habe ich an einem 8-tägigen Embryo das auf Abb. IV, schematisch dargestellte Bild beobachtet. Leider war eine befriedigende Aufnahme aus rein technischen Gründen nicht zu erreichen (zu schwache Belichtung im Ultropak für solche Objekte). Noch einmal ein ebenso anschauliches

Bild zu finden gelang uns nicht, aber Aufnahmen vom gleichen Typus sind auf Abb. V, zu sehen.

Auf Abb. IV (Schema) sieht man eine große mit Blut gefüllte Ader. Im lebenden sich im Thermostat entwickelnden Embryo ist das Blut natürlich rot und bewegt sich in den Adern. In dieses Gefäß münden fast senkrecht sechs verödete Gefäße, die kein Blut führen; nur in dem einen von ihnen sind vereinzelte Blutelemente vorhanden. Jeder dieser verödeten Gefäße geht aus einer veränderten (nämlich größeren und mit gröberen Granula als die umgebenden normalen versehen) Dotterkugel hervor. Die Kugeln, aus denen die verödeten Gefäße hervorgehen, befinden sich alle auf verschiedenen Entwicklungsstadien. Die einen besitzen gröbere, die anderen feinere Granula. Ebensolche große Dotterkugeln liegen auch an den Wänden des großen Gefäßes zwischen zwei von den verödeten. Je größer die Körnchen, umso größer ist auch die Kugel.

IV

V

Abb. IV. 8-tägiger Embryo, schematisch. Das ganze Gesichtsfeld bedeckt mit normalen Dotterkugeln. An den verödeten Gefäßen, die in die große Ader münden, liegen große Dotterkugeln auf verschiedenen Entwicklungsstadien. Zwischen dem 4. und 5. verödeten Gefäß liegen zwei große auf verschiedenen Entwicklungsstadien. Abb. V. Lebender 3-tägiger Embryo, Photogramm. Mit „a“ sind die Stellen bezeichnet, wo verödete Gefäße mit Dotterkugeln beginnen.

Auf Abb. V sehen wir eine Lebendaufnahme. Sie erinnert stark an das auf dem Schema wiedergegebene Bild. Auch hier finden wir verödete Gefäße, die in eine größere Ader münden und von Dotterkugeln ausgehen. Diese bei schwacher Vergrößerung gemachte Aufnahme ist insofern wertvoll, als sie das Schema bestätigt, trotzdem hier die Gefäße nicht so schön gelagert und nicht so zahlreich sind.

Verfolgen wir stufenweise die Veränderungen in vivo von Dotterkugeln, welche an den Wänden von großen Gefäßen oder am Anfang von verödeten liegen, so sehen wir, daß sie sich von den

übrigen in der Umgebung befindlichen Dotterkugeln scharf durch die Größe und Färbbarkeit ihre Granula unterscheiden. Je größer die Kugeln und ihre Körnchen sind, umso stärker wird deren Farbe verändert: sie sind zuerst gelb, werden dann hell- und schließlich dunkelrot. Dabei schreitet die Zunahme der Körnchengröße und die Farbveränderung stets von der Peripherie der Kugel zum Zentrum fort. Direkt vor unseren Augen beginnen Veränderungen an der Peripherie von Dotterkugeln, die ein gröbere Granulation besitzen und selbst etwas größer als die normalen Kugeln sind. Die Körnchengröße nimmt von der Peripherie zum Zentrum zu und färbt sich dabei allmählich rot. Dort, wo die Dotterkugel sehr groß geworden ist, und ihrer Farbe nach fast dem normalen Blut gleicht, sehen wir vereinzelte große Körner von dunkler Färbung und mit glänzender homogener Oberflächenschicht sich von einer solchen Kugel ablösen. Es scheint, daß hier eine junge Blutzelle, ein Erythrozyt, entstanden ist, welche in das verödete Gefäß eindringt.

An Schnitten von Embryonen nach 1½-tägiger Inkubation, d.h. wenn man den Beginn der Gefäßbildung am häufigsten antrifft, können wir zahlreiche interessante Bilder beobachten, welche die Lebendbeobachtungen völlig bestätigen (wogegen diese uns ihrerseits die Möglichkeit geben, aus den histologischen Präparaten klug zu werden). Diese Schnitte wurden noch vor den Lebenbeobachtungen angefertigt und blieben unverständlich, bis sie durch die Lebendbeobachtungen völlig geklärt wurden. Zweifellos liegt hier eine Bildung von neuen Gefäßen und neuen Blutelementen aus Dotterkugeln beim Hühnerembryo vor.

Betrachten wir Fig. 1 auf Taf. 5 (Aufnahme bei 100facher Vergrößerung) und Fig. 2 (gleiche Stelle, aber 400fache Vergrößerung), so haben wir unzweifelhaft Dotterkugeln und nicht Zellhaufen vor uns. Dabei ist die Granulation von verschiedenster Größe und Form. Auf den Bildern sehen wir sowohl Dotterkugeln mit normaler feiner Granulation, als auch solche mit größeren Körnchen. Auf Taf. 5, Fig. 3, sehen wir den Übergang einer solchen Kugel aus der Dottermasse in ein verödetes Gefäß, während eine andere danebenliegende Kugel sich auf einem früheren Entwicklungsstadium befindet und die feinere Granulation noch bewahrt hat. Etwa das gleiche Bild sehen wir auf Fig. 5, aber hier ist die Kugel bereits in das verödete Gefäß gesunken und ihre Entwicklung ist weiter fortgeschritten, d.h. die peripheren Körner sind größer geworden und rechts lösen sich sogar Blutelemente ab. Auf Fig. 4 und 6 sehen wir verschiedene Entwicklungsstadien der Dotterkugeln.

Diese Beobachtungen klären uns über die Entstehung der verödeten Gefäße auf. Wenn die Blutelemente aus Dotterkugeln neu

gebildet werden, so tritt das Blut, wie auf Fig. 3 sehr schön zu sehen ist, aus der Dotterkugel ins Blutgefäß, worauf es zentripetal aus den Gefäßen für die Ernährung des Embryos fließt; die Bildungsstelle des Blutes bleibt leer bis zum nächsten Blutbildungsprozeß aus der Nachbarkugel, wozu natürlich eine gewisse Zeit gebraucht wird, während welcher das aus den Oberflächenkörnern der Kugel neuentstandene Blutgefäß (s. 1. Mitteilung) zeitweilig leer bleiben muß. Das gleiche Bild finden wir sowohl bei Lebendbeobachtung als auch in Schnitten von $11\frac{1}{2}$ -tägigen Embryonen. Alle diese Erscheinungen, die sowohl in Schnitten als auch bei Lebendbeobachtungen im Utopak zur Beobachtung gelangen, bestätigen unsere früheren Angaben über die Bildung von Blutinseln aus Dotterkugeln bei Hühnerembryonen und erlauben es diesmal mit noch größerer Sicherheit zu behaupten, daß vorläufig nichts gegen die in der 1. Mitteilung ausgesprochene Hypothese von der Entstehung der Blutinseln aus Dotterkugeln spricht, vieles dagegen diese Hypothese zu einer bestimmten Gesetzmäßigkeit erhebt. Daß in diesem Fall aus den Dotterkugeln Blutinseln und nicht, wie in der subembryonalen Höhle Zellen entstehen, d.h. daß Zellen nicht aus ganzen Dotterkugeln sondern aus jedem einzelnen Dotterkorn gebildet werden, findet seine Erklärung in den anders gearteten Entwicklungsbedingungen und der determinierenden Wirkung der Keimblätter und des zwischen diesen befindlichen Milieus, in welchem die Bildung von Blutinseln vor sich geht.

2. Beobachtungen an Hühnerembryonen über die Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln, die der Keimleiste oder dem Boden der subembryonalen Höhle entnommen wurden. Beobachtung des ganzen Vorgangs an einundderselben Kugel.

Um die Kulturen nicht der schädlichen Lichtwirkung auszusetzen, mußten wir die wichtigsten Beobachtungen in ziemlich großen Zeitabständen (1 Std. 35 Min.) vornehmen. Wir müssen aber darauf hinweisen, daß diese Veränderungen je nach der Lebensfähigkeit der Kulturen und den Entwicklungsbedingungen beschleunigt, verlangsamt oder überhaupt unterbrochen werden können.

Die Forderung an einundderselben Kugel nicht nur die Entstehung der Zelle, sondern auch ihre Teilung zu verfolgen und photographischen aufzunehmen, ist fast unerfüllbar, und wir müssen es als großen Erfolg auffassen, daß es uns gelungen ist, an einundderselben Kugel den Zellbildungsprozeß zu verfolgen, das Anfang- und Endstadium dieses Vorgangs aufzunehmen und somit nachzuweisen, daß die betreffende Zelle nicht aus einer anderen Zelle, sondern zweifellos aus der Dotterkugel entstanden war. Allein diese Beobachtungen und Aufnahmen können zum größten Teil Aufnahmen mit dem Mikro-

kino ersetzen und in überzeugender Weise die Annahme bestätigen, daß Zellen aus Dotterkugeln entstehen können.

Auf Taf. 6, Fig. 2, sehen wir eine Aufnahme von einer Dotterkugelskultur, wobei die Dotterkugeln in der beschriebenen Weise aus der Keimleiste und dem Boden der subembryonalen Höhle eines Hühnerembryo nach zweistündiger Inkubation entnommen wurden. Beide Aufnahmen stammen von einunddemselben Gesichtsfeld und sind in 1 Std. 35 Min. Abstand gemacht. Um uns zu überzeugen, daß es wirklich das gleiche Gesichtsfeld ist, genügt es, die Lage der Kugeln und die Einzelheiten auf beiden Bildern miteinander zu vergleichen: wir sehen, daß sie völlig identisch sind.

Die Aufnahmen sind aber nicht nur von einunddemselben Gesichtsfeld, sondern auch in der gleichen Höhe, d.h. bei gleichen Fokusabstand gemacht. Wir ersehen, das daraus, daß die feinsten Körnchen, sowohl die, welche in der Ecke zwischen den Dotterkugeln „b“ und „c“ liegen, als auch die anderen, auf beiden Bildern zu sehen sind; so kleine Teilchen müßten aber bei der geringsten Drehung der Mikrometerschraube verschwinden, und könnten nicht auf beiden Bildern erscheinen. Wir finden nun in der rechten oberen Ecke der Fig. 1 drei Dotterkugeln „a“, „b“ und „c“, hinsichtlich welcher wohl kein Zweifel bestehen kann, daß es tatsächlich Dotterkugeln ohne jede Spur von Kernen sind. Etwas links vom Zentrum liegt eine „Zelle-Kugel“ mit körnigem Plasma, homogenem Kern und Nucleolus. Unter dieser Zelle liegen noch 3 Dotterkugeln von verschiedener Größe. Auch in ihnen finden wir keine Anzeichen von Kernen.

Auf Fig. 2 (1 Std. 35 Min. später) hat sich das Bild bereits stark verändert: Kugel „a“ hat sich bis zum Stadium des Liningerüsts entwickelt und ist größer, als auf Fig. 1. In dieser Kugel liegt etwas exzentrisch ein homogenes Bläschen (Liningerüst), welches früher nicht vorhanden war. Kugel „b“ ist unverändert geblieben und Kugel „c“, welche eine gröbere Granulation besaß, scheint die Entwicklung früher begonnen und ein späteres Stadium erreicht zu haben, d.h. sie hat sich zu einer „Kugelizele“ umgewandelt, analog derjenigen, die noch vor Beginn der Beobachtungen und vor den Aufnahmen des betreffenden Gesichtsfeldes in der Kultur vorhanden war. In dieser neuen Zelle sehen wir, ebenso wie in der früher gebildeten, ein körniges Protoplasma, einen großen, homogenen, blauen Kern und einen Nucleolus.

Als die Kultur in toto fixiert worden war, färbten sich in diesen Zellen das körnige Plasma und der Nucleolus mit basischen, der Kern mit sauren Farbstoffen, d.h. genau so, wie sie sich in jeder jungen (embryonalen) Zelle hätten müssen. Die Dotterkugel „d“

hat sich vor allem in beiden Durchmessern merklich vergrößert, was auf das Wachstum der Zelle hindeutet, außerdem ist in ihr ein granulierter Kern—das Karyosom MINCHINS—aufgetreten.

So finden wir in allen diesen Aufnahmen eine unzweifelhafte Transformation von Dotterkugeln zu Zellkugeln. Dabei verändern sich alle diese Kugeln nicht gleichzeitig und haben das Bild von verschiedenen Entwicklungsstadien ergeben, nämlich: die eine hat sich nur bis zum Liningerüst, die andere bis zum granulierten Kern (Karyosom), die dritte bis zur ausgebildeten Zellenkugeln entwickelt.

Des Gesagten können wir noch hinzufügen, daß solche Zellkugeln sich mitotisch teilen (Taf. 6, Fig. 4 und 5). Auf Fig. 4 sehen wir eine Anaphase mit deutlicher Spindel, auf Fig. 5 ist die gleiche Mitose nach $\frac{1}{2}$ Stunde in vivo in der Kultur aufgenommen, und hier ist sie schon zu einer Telophase geworden; die Spindel ist nicht zu sehen, der Kern geht in den Ruhezustand über. Auf Schnitten von solchen Zellen fanden wir verschiedene Stadien von Mitosen und Telophasen mit Chromosomen, wie auf der farbigen Abbildung in der 1. Mitteilung. Es kann kein Zweifel bestehen, daß es wirklich eine karyokinetische Teilung der Zellkugel ist. Fig. 25 auf Taf. 6 ist unserem Schema entnommen, und unter 25a finden wir einen Schnitt durch eine Zellkugel, welche sich in der subembryonalen Höhle eines Hühnerembryos nach zweistündiger Inkubation befand.

Entsprachen in der 1. Mitteilung nicht alle Stadien der Dotterzellen in der Kultur den Stadien auf dem Schema, so finden wir jetzt auf Fig. 3 der Taf. 6 alle wichtigsten Übergangsstadien von der Dotterkugel zur Zellenkugeln in einem Gesichtsfeld. Unter „a“ sehen wir Dotterkugeln von verschiedener Größe, welche auf dem Bild des Schemas unter Nr. 6, auf der Aufnahme eines Schnittes durch die Kultur unter Nr. 6a stehen. Unter „b“ finden wir auf Fig. 3 das Anfangsstadium der Liningerüstbildung, das gleiche, wie unter Fig. 14 auf dem Schema und auf der Aufnahme eines Schnittes unter 14a.

Unter „c“ sehen wir auf Fig. 3 ein weiter fortgeschrittenes Liningerüst, wie unter Fig. 16 auf dem Schema und unter 16a auf dem Schnitt durch die Kultur. Unter „d“ ein Karyosom von MINCHIN, d.h. ein mit Körnchen gefülltes Liningerüst von LEPESCHINSKAJA, wie unter Fig. 19 auf dem Schema und unter 19a auf dem Schnitt. Schließlich unter „e“ ein Gebilde mit granuliertem Plasma in halbmondförmiger Anordnung und homogenem Kern, also dasselbe Bild, wie unter Fig. 24 auf dem Schema, und das diesem vorangehende Stadium nämlich den Austritt der Körnchen aus dem Karyosom auf Fig. 22, bzw. 22a in der Kultur und unter H, H, und C in den Aufnahmen 1 und 2. Es wird somit klar, daß das Schema der Zellent-

stehung aus Dotterkugeln völlig den in Wirklichkeit existierenden Übergangsstadien zwischen Dotterkugeln und Zellkugeln entspricht, Dabei wird die eine Serie von stufenweisen Veränderungen durch die andere völlig bestätigt.

Auf Grund dieser aufeinander folgenden Stadien können wir folgende Hauptmomente der Etappen in der Entwicklung von Zellen aus Dotterkugeln feststellen:

1) Aus der Dottermasse sondern sich vor allem Dotterkugeln heraus, die keine geformten, strukturierten Kerne besitzen und durch ihre Fähigkeit, Pseudopodien zu bilden (LEPESCHINSKAJA), an die Moneren von HAECKEL erinnern.

2) Dann finden wir in allen Serien und in dem Schema das Stadium der „Liningerüstbildung“, wobei alle Stadien seiner Entwicklung vom kleinsten bis zum größten leicht verfolgt werden können.

3) Stadium der Bildung eines „Karyosoms“ (MINCHIN) oder „granulierten Kerns“ (LEPESCHINSKAJA) und die Übergänge vom Liningerüst zum granulierten Kern.

4) Stadium der jungen Zellkugel mit basischer Granulation im Plasma, homogenem acidophilem Kern und basophilem Nucleolus.

5) Sowohl in dem Schema als auch in vivo und auf Schnitten finden wir verschiedene Stadien der mitotischen Teilung von Zellkugeln (Schema Fig. 25, Schnittaufnahme Fig. 25a, lebend—Taf. 6, Fig. 4 u. 5).

Es entsteht nun folgende Frage: was ist das für eine Granulation, die in allen Präparatenserien auftritt und auch im Leben das „Karyosom“ und die „basischen“ Körnchen im Plasma der jungen Zellkugel bildet? Hat sie etwas gemeinsames mit der Kernsubstanz, dem Chromatin, oder ist sie eine besondere Substanz für sich, die mit dem Kernchromatin nichts zu tun hat?

Bei der Lösung dieser Frage kann uns nur die FEULGEN'sche Reaktion und die mit ihr ausgeführten Versuche über die in den Dotterkugeln gewöhnlich auftretenden Veränderungen helfen.

Unsere Mitarbeiterin M. J. TEPLJAKOWA befaßte sich speziell mit diesen interessanten Untersuchungen. Mit ihrer Erlaubnis führe ich folgende von ihr erzielte Resultate an.

Nach dreistündiger Inkubation eines Hühnereies ergibt die FEULGEN'sche Reaktion eine diffuse Färbung der ganzen Dotterkugel, die eine feine Granulation besitzt. Was die im Zentrum kondensierte und das Liningerüst bildende Granulation betrifft, so reagieren sie selbst und das Liningerüst negativ und färben sich mit dem sauren Lichtgrün. Die Granulation weist aber eine schwache rosa Färbung auf, von der es schwer ist zu entscheiden, ob sie eine schwache

rosa Färbung mit dem FEULGENschen Reaktiv darstellt oder ob die Farbe der darunter liegenden Dottersubstanz durchschimmert. Auf Taf. 7 (Aufnahmenserie) sehen wir unter A die allmähliche Bildung und das Wachstum des Liningerüsts. An den Dotterkugeln sehen wir protoplasmatische Pseudopodien, die mit fortschreitender Entwicklung des Liningerüsts allmählich schwinden.

Auf einem späteren Entwicklungsstadium (36-stündige Inkubation) ist das Bild schon ganz anders. Die Dotterkugeln sind bei gleicher Vergrößerung viel größer als nach 3-stündiger Inkubation, was auf ihr Wachstum hindeutet. Die ganze Substanz der Kugel, ihre gesamte Granulation reagieren nicht mehr auf das FEULGENsche Reaktiv, wie das ehemals der Fall war, die ganze Kugel wird farblos und der Teil der Granulation, welcher positiv reagiert, ist im Zentrum der Kugel oder etwas exzentrischen konzentriert und färbt sich grell rot-violett.

Auf der Aufnahmenserie unter B auf Taf. 7 sehen wir die allmähliche Zunahme der Körnchengröße. Betrachten wir die Granulation genauer, so finden wir, daß sie sich auf den Fäden des Liningerüsts lagert (Fig. 1 und 2) und allmählich größer wird (Fig. 3). Auf Fig. 4 nehmen die Granula Stäbchenform an, wobei sie an Chromosomen erinnern und auf Fig. 5 ist die Granulation ringförmig angeordnet, wobei sie einen echten Kern mit randständigem Chromatin stark ähnelt. Auf Fig. 6 sind die Kugelgrenzen nicht zu sehen und die Granulation wird zerstäubt. Wahrscheinlich zerfällt hier die Kugel auf dem Stadium der Konzentration der Kernsubstanz.

Im allgemeinen ist die Zerstörung der Dotterkugeln, wie sie neben den Formbildungsprozessen im Dotter auftritt, durch das Fehlen einer Polarität gekennzeichnet. Diese Versuche mit FEULGENscher Reaktion auf Thymonukleinsäure, die einen Bestandteil des Chromatins bildet, zeigen also, daß auf frühen Stadien der Embryoentwicklung die Thymonukleinsäure diffus über die ganze Kugel verstreut ist, wobei Granula und Liningerüst keine Kernsubstanz, also keine Thymonukleinsäure enthalten, während auf einem späteren Stadium (36 Stunden Inkubation) sich ein granulierter Kern bzw. ein Karyosom von MINCHIN bildet, welches bereits aus Kernsubstanz besteht, da es auf die FEULGENsche Färbung positiv reagiert; dabei wird die Kugel selbst farblos, d.h. ihre Thymonukleinsäure wird in der Granulation konzentriert.

Es bleibt uns noch eine sehr wichtige Frage zu lösen. Bereits in der 1. Mitteilung wiesen wir darauf hin, daß wir es evtl. mit Merozytenkernen bei physiologischer Polyspermie zu tun haben könnten, daß also größte Vorsicht bei der Bewertung unserer Resultate

geboten sei. Bekanntlich liegen im Periblast mitten in der Dottermasse Kerne verstreut, die wir als „protoplasmatische“ Kerne bezeichnet haben und die nach BRACHET groß und unregelmäßig sind, Knospen bilden, niemals von einer individuellen Zytoplasmasschicht umgeben sind und früher oder später degenerieren. Das sind Kerne von überzähligen Spermatozoen, die RÜCKERT als „Merozyten“, LILLIE als „überzählige Spermatozoen“ bezeichneten. Das Schicksal dieser Kerne steht noch nicht endgültig fest, was aber diejenigen betrifft, die wir mit den verschiedensten Methoden beobachtet haben, so können zwar manche von ihnen sicher untergehen, aber von den Merozytenkernen wird behauptet, daß sie immer absterben, unsere dagegen können sich entwickeln und normale junge Kerne, die sich mitotisch teilen, ergeben.

Diese Zweifel veranlaßten uns sogar dazu, das Schicksal der überzähligen Spermatozoen einer besonderen Prüfung zu unterziehen, und wir waren daran, entsprechende Versuche anzustellen, stießen aber glücklicherweise auf die ausführliche Arbeit von LECAILLON (6), die die parthenogenetische Entwicklung von Hühnereiern untersuchte und dazu Hühner verwendete, die niemals befruchtet worden waren, oder solange isoliert blieben (bis zu 190 Tagen), daß an das Vorhandensein von Spermatozoen im sich entwickelnden Ei nicht zu denken war. Trotzdem fand sie in solchen parthenogeneti-

Abb. VI. Parallelaufnahmen von Abbildungen verschiedener Stadien der Kernentwicklung in Dotter von Hühnerembryonen aus parthenogenetischen Eiern und von Dotterkugeln auf verschiedenen Stadien der Kernentwicklung in ihnen. Man sieht die große Ähnlichkeit der Bilder in beiden Fällen.

schen Eiern Übergangsformen der Kerne, wie wir sie in der vorliegenden Arbeit beschrieben haben.

Auf Abb. VI, 1, sehen wir links eine Dotterkugel mit protoplasmatischem Kern aus der Arbeit von LECAILLON, recht (1a)—die Aufnahme einer Dotterkugel mit ebensolchem Kern aus unserer 1. Mitteilung (die Kugel befand sich in der subembryonalen Höhle). Die Ähnlichkeit ist auffallend. Ebenso ähnlich sind Abb. VI, 2 und 2a, von denen 2 ein Schema aus der Arbeit von LECAILLON, 2a—eine Aufnahme von einer Kugel aus der subembryonalen Höhle eines Embryos nach 2-stündiger Inkubation darstellt. In beiden Fällen haben wir den Beginn der Liningerüstbildung vor uns. Auf Abb. VI, 3 und 3a finden wir die Bildung eines granulierten Kerns (Karyosom), und hier geht die Ähnlichkeit so weit, daß in beiden Fällen ein Austritt der Granulation aus dem Liningerüst vorliegt. Schließlich sehen wir eine ebensolche Ähnlichkeit in Abb. VI, 4, 4a und 5, wo Doppelkerne dargestellt sind, die wahrscheinlich durch Amitose der granulierten Kerne entstanden sind.

Diese Ähnlichkeit der Übergangsstadien von Kernen (protoplasmatische bis granuliert Kerne) in parthenogenetisch unter Ausschluß von Spermatozoen und normal sich entwickelnden Eiern befreite uns von der Notwendigkeit, Versuche darüber anzustellen, ob nicht alle von uns beobachteten Kernstadien den durch Polyspermie entstandenen Merozytenkernen angehören. Es leuchtet ein, daß wenn ebensolche Kerne auch bei völligem Fehlen von Spermien auftreten, sie natürlich keine Merozytenkerne darstellen können.

Allerdings ist LECAILLON der Meinung, daß das Auftreten von solchen Kernen ein Merkmal der Degeneration ist. Sie konnte zu dieser Ansicht gelangen, weil sie die Entwicklung der Kerne in vivo, in der Kultur nicht beobachtet hat und auf den Zusammenhang dieser Kerne miteinander nicht eingeht. Wir dagegen haben solche Lebendbeobachtungen an Kulturen ausgeführt und kommen zu dem Ergebnis, daß die festgestellten Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung dieser Kerne und die beobachteten Veränderungen in ihnen, die alle gleichsinnig in der Richtung einer Komplizierung der Vorgänge und Bildung von geformten, teilungsfähigen Kernen verlaufen, daß das alles unmöglich ein degenerativer Vorgang sein kann. Die Tatsache, daß wir diese Erscheinungen in einem normal sich entwickelnden Ei, wo jedenfalls nicht regressive, sondern progressive Vorgänge stattfinden, beobachten, überzeugt uns noch mehr davon, daß wir es nicht mit einem degenerativen, sondern mit einem formativen Prozeß zu tun haben, mit der Transformation von Dotterkugeln zu jungen Zellkugeln. Der Embryo dürfte sich doch wohl auf Kosten seines Dotters, und nicht auf Kosten seiner eigenen Zellen ernähren.

Schlußbemerkungen

Fassen wir unsere Ergebnisse zusammen, so müssen wir sagen, daß tatsächlich die gesamten Transformationsprozesse in den Dotterkugeln einen formbildenden Charakter tragen, daß also in den aus der Dottermasse herausgesonderten Dotterkugeln, die an die Moneren HAECKELS erinnern, zuerst ein Liningerüst, dann ein Karyosom (granulierter Kern) auftritt, und schließlich aus ihnen junge, sich karyokinetisch teilende Zellen entstehen. Dieser Prozeß erinnert stark an die phylogenetische Entwicklung der Zelle aus der HAECKELschen Monere und scheint eine Rekapitulation der Zellphylogenie in der ontogenetischen Entwicklung des Hühnerembryo zu sein (dabei ist selbstverständlich diese Übereinstimmung keine zufällige). Alle fotografischen Aufnahmen und Lebendbeobachtungen bestätigen unsere Auffassung.

Zusammenfassung

1. Wenn wir die Bildung von Zellen aus Dotterkugeln (plasmatischen Gebilden) verfolgen, so untersuchen wir das Anfangsstadium der Zellontogenie.

2. Nach den Hypothesen von HAECKEL und MINCHIN besteht die Phylogenie der Zelle darin, daß aus dem Protoplasma Moneren mit über das ganze Plasma verstreuten Chromatinkörnchen abgesondert werden; die Moneren bilden Pseudopodien, und es entsteht in ihnen zunächst ein Liningerüst, dann ein granulierter Kern („Karyosom“ von MINCHIN).

3. Wenn die Ontogenie der Zelle im sich entwickelnden Organismus wirklich deren Phylogenie widerspiegelt, so muß die Zelle in ihrer ontogenetischen Entwicklung annähernd denselben Weg und die gleichen Stadien, wie in ihrer phylogenetischen Entwicklung, durchmachen. Wenn das von uns festgestellte Bild der Zellontogenie in keiner Weise der Vorstellung von deren Phylogenie entsprochen hätte, so würde das bedeuten, daß entweder unsere Hypothese von der Zellontogenie oder die von deren Phylogenie oder schließlich beide falsch sind. Die Übereinstimmung zwischen beiden bildet demgegenüber einen überzeugenden Beweis für die Richtigkeit beider Hypothesen, denn sie kann nicht zufällig sein und weist darauf hin, daß wir uns auf dem richtigen Weg befinden.

4. Die vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung unserer 1. Mitteilung (1934) und verfolgt den Zweck, die früher erhaltenen Resultate nachzuprüfen und die Frage weiter zu vertiefen.

5. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht aber darin: 1) die Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln an einundderselben Kugel und 2) die Bildung von Blutinseln am lebenden, im Thermostat sich entwickelnden Hühnerembryo mit dem Ultropak zu verfolgen.

6. Zu diesem Zweck sind neue Methoden ausgearbeitet worden. Ein neuer Thermostat für Lebendbeobachtungen mit dem Ultropak wurde gebaut, und Deckgläser, welche die Dottermembran aufschlitzen, wurden durch Glas- oder Glimmerplättchen ersetzt, welche auf eine Gummimembran aufgeklebt wurden, wobei eine besondere Vorrichtung für die Nivellierung der Plättchen konstruiert wurde. Mit Hilfe dieser Methoden können wir die Veränderungen am lebenden Objekt unter Immersion beobachten. Um die Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln an einundderselben Kugel zu verfolgen, wählten wir eine Methode an, die bis zu einem gewissen Grad mikrokineematografische Aufnahmen ersetzt.

7. Auf diese Weise stellten wir fest, daß wenn sich eine Dotterkugel zu einer Blutinsel transformiert, die Zunahme der Körnchengröße an der Peripherie beginnt unter gleichzeitigem Auftreten von Haemoglobin, durch welches die Kugel eine rote Färbung anzunehmen anfängt. Je größer die Körnchen, umso stärker färbt sich die Kugel mit Haemoglobin. Die neugebildeten Blutelemente treten aus der Granulation in ein verödetes Gefäß über. Manchmal sinkt eine ganze Kugel in ein solches Gefäß und setzt dort ihre Entwicklung nach den gleichen Gesetzen fort.

8. An Kulturen aus dem Periblast und dem Boden der subembryonalen Höhle konnten wir die Entstehung von Zellen aus Kugeln verfolgen, in denen noch 1 St. 35 Min. bevor gar keine Anzeichen einer Zelle vorhanden waren.

9. Solche Zellkugeln mit basischer Granulation im Plasma, einem großen, homogenen, acidophilen Kern und einem basophilen Nucleolus teilen sich karyokinetisch. Zwei aufeinanderfolgende Teilungsstadien haben wir in vivo an einundderselben Zellkugeln verfolgen können.

10. Mit Hilfe der FEULGENschen Reaktion auf Thymonukleinsäure, also einen Bestandteil des Chromatins (Kernsubstanz), konnte M. J. TEPLJAKOWA feststellen, daß auf frühen Entwicklungsstadien des Embryos die Thymonukleinsäure diffus über die ganze Kugel verteilt ist, und die Granulation, welche zu dieser Zeit das Liningerüst bildet, negativ reagiert. Auf späteren Stadien kondensiert sich die Thymonukleinsäure im Zentrum der Kugel in Gestalt von verschiedenen großen Körnchen und reagiert nur heftig auf die FEULGENsche Reaktion. Das weist auf den nukleären Charakter der Granulation im Karyosom und auf deren Entstehung aus der bis dahin diffus verteilten Thymonukleinsäure hin.

11. Der Einwand, daß alle von uns beobachteten Übergangsformen der Kerne Reste von Spermatozoenkernen infolge von Polyspermie darstellen, wird durch die Arbeit von LECAILLON widerlegt.

LECAILLON arbeitete an parthenogenetisch sich entwickelnden Eiern von Hühnern, die niemals befruchtet worden waren, so daß von überzähligen Spermien keine Rede sein konnte; trotzdem finden sich in solchen Eiern alle Kernformen, die wir als Übergangsstadien bei der Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln beschrieben haben.

Zum Schluß müssen wir betonen, daß die Dotterkugeln, in deren Plasma die Kernsubstanz diffus verteilt liegt und die die Fähigkeit besitzen, Pseudopodien zu bilden, stark an die Moneren HAECKELS erinnern. Außerdem treten in ihrer Entwicklung Liningerüst und granulierter Kern (Karyosom MINCHINS) auf, d.h. sie durchlaufen einen Entwicklungsgang, der völlig mit dem phylogenetischen Entwicklungsgang der Zelle, wie er von MINCHIN geschildert wird, übereinstimmt. Diese Übereinstimmung kann natürlich keine zufällige sein, wie das von den Tatsachen überzeugend bewiesen wird. Was das weitere Schicksal der Zellkugeln betrifft, so haben wir schon in der 1. Mitteilung hervorgehoben, daß das eine Frage für spezielle experimentelle Arbeiten bildet. Jetzt sei nur erwähnt, daß die Zellkugeln in ihrer äußeren Struktur viele gemeinsame Züge mit den Zellen der entodermalen Schicht aufweisen.

Wenn wir somit die Entstehung von Zellen aus Dotterkugeln untersuchen, so haben wir die Bildung von Zellen aus Derivaten anderer Zellen vor uns, und so gilt auch hier der Satz VIRCHOWS „*omnis cellula e cellula*“. Dagegen hatte VIRCHOW unrecht, als er behauptete, daß neue Zellen nur durch Teilung entstünden. Unsere Beobachtungen zeigen, daß Zellen auch aus nichtvollständigen Zellen, aus dem Protoplasma entstehen können. Bis jetzt dachte man, daß die Embryonalentwicklung ausschließlich durch Zellen zustande kommt, die durch Teilung aus bereits vorhandenen Zellen entstehen, und nur einige Autoren gingen an das Problem der Zellbildung auf irgendeinem anderen Wege heran. Unsere Beobachtungen bestätigen die Möglichkeit, daß Zellen nicht nur durch Teilung, sondern auch durch Umbildung von Zellderivaten, aus dem Zellplasma entstehen können, wobei solche Zellen in gleicher Weise an dem Aufbau des sich entwickelnden Organismus teilzunehmen scheinen, wie die durch Teilung entstandenen. Wir haben die Absicht, die Frage, ob die aus Dotterkugeln entstandenen Zellen für den Aufbau des Embryos verwendet werden, im Laufe unserer weiteren Arbeiten zu untersuchen, da wir, wie in der 1. Mitteilung erwähnt wurde, gewisse Gründe haben anzunehmen, daß das tatsächlich durchaus möglich ist.

Literatur

1. Engels, F. 1830. Dialektik der Natur (russisch), Moskau.
2. Haeckel, E. 1908. Natürliche Schöpfungsgeschichte, I. Teil, (russisch).
3. Minchin, E. 1923. Evolution of the cell.

4. Lepeschinskaja, O. B. 1934. Die Entstehung von Zellen und Blutinseln aus Dotterkugeln, Biol. Ztschr., Bd. 3, H. 2 (russisch).
5. — 1934. Entstehung der Blastocoelflüssigkeit aus Dotterkörnchen, Arch. f. Histol. Anat. u. Embryol., Bd. XIII, Nr. 1, (russisch).
6. Lecaillon 1910. Le parthenogenèse chez les oiseaux, Arch. d'Anat. Micros. t. XII.
7. Lavdowsky u. Tischautkin 1899. Von den Beziehungen der Dotterelemente zu den Keimblätterzellen, Biolog. Ztbl. Bd. XIX.

Erklärung der Tafeln

Tafel 5

Schnitte von der area vasculosa eines $1\frac{1}{2}$ -tägigen Hühnerembryo. Fix. BOUIN, Färb. nach HEIDENHAIN, Serienschnitte 5 μ .

- Fig. 1, 2. Stammen von einer Stelle, aber Fig. 1 bei schwacher Vergrößerung: Ob., Zeiss AA, Ok. 10 $\times$; Fig. 2 bei stärkerer: Ob. Zeiss 1/7, Ok. 10 $\times$. Auf beiden Aufnahmen sieht man, daß hier Dotterkugeln mit größeren oder normalen Körnern und nicht Zellhaufen vorliegen.
- Fig. 3. Entwicklung und Herausfallen von Dotterkugeln in ein verödetes Gefäß. Obj. Zeiss AA, Ok. 10 $\times$.
- Fig. 4. Zwei Blutinseln auf dem Syncytialstadium, darüber Dotterkugel mit peripherer Zunahme der Körnchengröße. Obj. Zeiss AA, Ok. 10 $\times$.
- Fig. 5. Absinken einer Dotterkugel in ein verödetes Gefäß und ihre weitere Entwicklung darin. Vergröße. wie Fig. 4.
- Fig. 6. Blutinsel auf dem Syncytialstadium und Dotterkugel mit größerer Granulation, Obj. Zeiss 1/12, Ok. 10 $\times$.

Tafel 6

- Fig. 1, 2. Entstehung von Zellen aus den Dotterkugeln eines Hühnerembryo in einer Kultur der Keimleiste und des Bodens der subembryonalen Höhle nach 2 Stunden Inkubation. Fig. 2 ist 1 Std. 35 Min. nach Fig. 1 aufgenommen (Näheres im Text).
- Fig. 3. In einem Gesichtsfeld alle Stadien der Entwicklung von Dotterkugeln.
- Fig. 4, 5. Zwei karyokinetische Teilungsstadien einer Zellkugel im Leben. Telophase mit Spindel und Ruhekern nach der Telophase. Rechts, Bilder aus dem Schema. Links, Schnitte der Kultur. Völlige Übereinstimmung der verschiedenen Stadien.

Tafel 7

Die Abbildungen stammen aus der Arbeit von TEPLJAKOWA. Veränderungen in den Dotterkugeln, dargestellt mit der FEULGEN'schen Reaktion.

- A: Entwicklung des Liningerüsts mit negativer FEULGEN'scher Reaktion. Hühnerembryo nach 3 Std. Inkubation.
- B: Hühnerembryo nach 36 Std. Inkubation.
- Fig. 1. Etwas exzentrisch gelegene Granulation in einer Dotterkugel mit positiver Reaktion auf Thymonukleinsäure.
- Fig. 2. Dieselbe Kugel bei stärkerer Vergrößerung. Man sieht die Liningerüstfäden zwischen den Granula.
- Fig. 3. Die Granula sind größer geworden.
- Fig. 4. Die Kernsubstanz ist in Stäbchen, die an Chromosomen erinnern, angeordnet.
- Fig. 5. Die Kernsubstanz bildet einen Kern mit randständigem Chromatin.
- Fig. 6. Zerfall der Kugel in der Periode der Konzentration von Kernsubstanz in Form von kleinen Vakuolen.

Lepeschinskaja: Zur Frage nach der Neubildung von Zellen im tierischen Organismus. 2. Mitteilung. Neuere Ergebnisse über die Bildung von Zellen und Blutinseln aus den Dotterkugeln des Hühnerembryos

Lepeschinskaja: Zur Frage nach der Neubildung von Zellen im tierischen Organismus. 2. Mitteilung. Neuere Ergebnisse über die Bildung von Zellen und Blutinseln aus den Dotterkugeln des Hühnerembryos

Lepeschinskaja: Zur Frage nach der Neubildung von Zellen im tierischen Organismus. 2. Mitteilung. Neuere Ergebnisse über die Bildung von Zellen und Blutinseln aus den Dotterkugeln des Hühnerembryos