内耳の再生医療

特集 Tissue engineering をベースとした組織再生誘導治療

伊藤 壽一*

Regeneration of the inner ear

This paper reviews the potential of cell transplantation to restore inner ear hair cells. Histological analysis revealed survival and incorporation of grafted stem cells in various portion of the inner, suggesting the ability of stem cells for differentiation into inner ear hair cells.

内耳の有毛細胞の障害が高度難聴や高度平衡機能障害を引き起こす。従来、哺乳類の内耳有毛細胞は、一度障害を受けると回復は困難であると考えられてきた。各種幹細胞を内耳に移植することにより、内耳有毛細胞を再生させることに成功した。さらに、DDSの技術を用い、内耳へ神経栄養因子などを投与することも可能になった。これらの方法を組み合わせることにより、障害を受けた内耳を再生させることは可能であると思われる。

Juichi Ito*

key words: inner ear; regeneration, stem cell, transplantation, drug delivery system

再生医学は障害を受けた器官・組織を修復し、機能も回復しようとするものであり、医学の分野では21世紀前半の最大のプロジェクトと考えられている。再生医学がすでに臨床応用されている分野もある。造血幹細胞を利用した骨髄移植や角膜移植など多岐にわたる。その他、再生医学により動物実験の段階ではすでに作製が可能なものに、血管、心筋細胞、骨組織、軟骨組織、ドーパミン産生神経細胞など多分野にわたるものを列挙することが出来る。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の分野での再生医学は比較的最近研究がはじまったといえる。ヒトを含め哺乳類の感覚器細胞はこれまで、一度障害を受けると再生は困難であり、機能回復はしないと考えられてきた。そのため、耳科学の分野では、中耳までの伝音難聴は治療の対象になるが、内耳の障害、特に高度感音難聴や高度内耳障害による平衡機能障害などの、感覚細胞(有毛細胞)の障害に起因する疾患は有効な治療手段がなかった。内耳の有毛細胞も一度障害を受けると再生しないと考えられ、このことが特に内耳の有毛細胞の障害に起因することの多い感音難聴の治療の困難さの原因とされている。

しかし、哺乳類の中樞神経系でも再生能力が有することがわかってきた。再生能力はあり、障害を受けても再生しようとする徴候はみられるが、再生を妨げる因子が働き、結局は再生しないと説明されている。内耳の有毛細胞も障害を受けるとまったく再生しないと考えられてきたが、鳥類ではある程度の再生が認められ¹⁾、哺乳類でも前庭器の感覚細胞は多少再生するとの報告がみられるようになってきた²⁾。

再生医学を内耳に応用する場合、現段階ではいくつかの方法があると考えられる。一つは“自発的再生の誘導”である。この自発的再生は発生、細胞死とも関連するが、内耳発生の分子機構を解明し、それを内耳障害の治療に応用しようとする試みである。

一方、筆者らはこのような自発的再生を促進する研究と並行して、“細胞移植”による内耳再生を試みた。具体的には種々の幹細胞を障害を受けた内耳に移植し、有毛細胞その他の細胞の再生に応用しようとする試みである。内耳障害を組織学的に観察すると、最も障害を受けやすいのは内耳有毛細胞である。まず、有毛細胞が障害を受けるが、初期の段階では有毛細胞以外の周囲環境(支持細胞なども含め)は、比較的正常に保たれている場合が多いと考えら

* Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University 京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

れる。単純に考えれば、有毛細胞を再生することが出来れば、内耳機能も回復するのではないかという発想である。

細胞移植による内耳再生医療に関し、当初は有毛細胞の再生を念頭において研究をはじめたが、このような方法が他の付随的な結果を生み出すことが判明した。動物の内耳に移植した、特に神経幹細胞の多くのものがグリア系の細胞に分化し、神経栄養因子を産生する可能性が認められた³⁾。神経栄養因子のなかには、有毛細胞の障害に対し、保護作用を有するものがあり、内耳に移植した神経幹細胞が、結果的に障害を受けた有毛細胞の機能を回復させる可能性を示唆する所見が得られた。

他の成果は、蝸牛軸の方向に移植した幹細胞が神経細胞に分化したことである。現在、高度難聴に対する唯一の治療法は人工内耳であるが、人工内耳手術を行ってもらせん神経節細胞が障害を受けていれば、信号を中枢に送ることは出来ず、また送る信号が限られ、結果的には良好な聞き取りが得られない。特に内耳奇形例で、らせん神経節細胞の障害が推定される場合は、人工内耳手術後の言葉の聞き取りも不良な例が多い⁴⁾。幹細胞移植により、らせん神経節細胞が再生し、内耳有毛細胞や脳幹の蝸牛神経核細胞に神経連絡をつくることが出来れば、人工内耳での聞き取りも飛躍的に増大すると期待される。

内耳障害の現状

現在、わが国には補聴器も使用できない高度難聴者および聾者が数10万人存在し、また、補聴器によりかろうじて聴覚が得られる難聴者を加えると、高度聴覚障害者の数は数100万人に達すると推測される。また、内耳障害に起因する平衡機能障害者はその総数が把握できないほどである。高度難聴者のコミュニケーション手段は聴覚以外の方法—筆談、手話などに頼っている。

このような高度難聴の原因は、内耳および中枢聴覚路の老化、騒音による障害、抗生物質や抗がん剤などの種々の薬物による障害など多岐にわたる。いずれの原因にせよ、これらの高度感音難聴に対する有効な治療手段はほとんどない。感音難聴の原因は

さまざまであるが、病態としては大部分が内耳の有毛細胞の障害である。有毛細胞の再生が可能となれば、一度喪失した聴覚の再獲得も可能と思われる。

従来、内耳有毛細胞を含め、哺乳類の中枢神経系は、一度障害を受けると再生は困難とされてきた。しかし、最近では障害を受けた哺乳類の中枢神経系でも条件さえよければ再生する系もあるという報告がある。さらに、胚性幹細胞や神経幹細胞の分離が可能となり、神経移植のドナーとして利用し、障害を受けた中枢神経系の再生を試みる報告もある。各種神経成長因子を中枢神経系に投与し、障害を受けた中枢神経系が修復されたとする報告もある。

内耳再生医療の目的は、各種神経成長因子や幹細胞を利用して、障害を受けた内耳有毛細胞や中枢聴覚路の再生を試みることである。

内耳障害の病態

内耳障害の病態を考えるに、最も障害を受けやすいのが内耳の有毛細胞であり、さらに有毛細胞からの信号を中枢に伝えるらせん神経節細胞、また内耳のイオン組成を調節するといわれる血管条細胞の障害も内耳機能低下をきたす。このなかでも最も重要なものは有毛細胞であり、障害を受けた有毛細胞が再生すれば失われた内耳機能も回復するのではないかと考えられる。

従来、鳥類、哺乳類では、内耳有毛細胞が形成されるのは発生の過程に限られ、出生後は内耳有毛細胞が一度傷害されると再生することはないとされてきた。しかし、1980年代後半に、鳥類では前庭の有毛細胞は常に再生をしており⁵⁾、聴覚系の有毛細胞も再生されることが明らかにされた⁶⁾。哺乳類においても、蝸牛における有毛細胞の再生はいまだに証明されていないものの、前庭の有毛細胞は再生することが明らかにされている^{2,7)}。

内耳有毛細胞の自発的再生

内耳の特に有毛細胞の自発再生を考える際、以下の三つの機構があげられる。

① 有毛細胞の周囲にある支持細胞が細胞分裂に

つづく細胞増殖を起こし、有毛細胞が形成される。

- ② 支持細胞が性質を変えて有毛細胞に分化転換する。
- ③ 完全に死に至っていない有毛細胞が自己修復する。

各国の内耳再生を研究する施設の多くは、この自発的再生を促進しようとする研究を行っている。

鳥類を用いた実験では、有毛細胞の再生の過程でDNAの複製が支持細胞に認められることから、支持細胞あるいはそのなかの一部の細胞の非対称的な有糸分裂により、有毛細胞が再生するとされていた⁸⁾。しかし、哺乳類においては、障害後の有毛細胞の再生の過程でDNAの複製を確認できる細胞が認められるものの、その数は非常に少なく有毛細胞の再生を担うほどではないと考えられている⁹⁾。

有糸分裂を介さない内耳有毛細胞の再生の機構の一つとして、支持細胞が直接有毛細胞に変わる分化転換が、両生類、鳥類、哺乳類においていわれている。その根拠は形態学的なもので、上皮の基底面から頂上面に至るまで、細胞体が存在する支持細胞の特徴と、微絨毛を有するという未熟な有毛細胞の特徴を兼ね備えた細胞が観察されるというものである。分化転換による内耳再生の利点として、有糸分裂によるものと比較して短期間での再生が可能である点が考えられている。

これらに対し、内耳障害後の哺乳類における有毛細胞の再生を担っているのは、完全死に至っていない有毛細胞による自己修復であるという考えがある。自発的な内耳有毛細胞の再生を誘導する因子についての研究は、成長因子やホルモンなどの細胞外から作用を及ぼす外因性の物質が中心であったが、分子生物学の発展やさまざまな遺伝子の発見により、内耳有毛細胞再生を促す細胞内のメカニズムや内耳感覚上皮細胞の動態が解明されようとしている。さらなる解析が進めば、従来不可能とされていた内耳有毛細胞再生の誘導を促す手法の発見・開発につながると思われる。

図1 神経幹細胞の内耳移植

ラット内耳に神経幹細胞を移植後の蝸牛上皮、感覚上皮の上(太矢印)に移植細胞が巣状に生着している。一部の細胞(細矢印)は蝸牛の感覚上皮内に入り込んで有毛細胞に置き換わっているように見える。

細胞移植による内耳再生

内耳有毛細胞の再生を考えた場合、自発再生を促すことも一つの方法であるが、実際にはまだ困難な面が多い。そこで筆者らは細胞移植の方法を用い、内耳再生を試みた。

内耳障害に対し、細胞移植による治療を目指す際、克服しなくてははいけないいくつかの課題がある。最大の課題は移植材料の開発である。移植材料には幹細胞を利用することを考えているが、幹細胞にもいくつかの種類・段階がある。どの幹細胞を用いるべきなのかが問題となる。移植細胞の候補にあがるのは、胚性幹細胞(ES細胞)、神経幹細胞、内耳幹細胞、間葉系幹細胞である。

ES細胞はすべての組織・器官のもとになる細胞であり、全能細胞ともいわれる。ES細胞から神経細胞に誘導するおおよその方法が確立されているが、内耳有毛細胞への誘導に関してはまったくまだ研究がなされていない。ES細胞を内耳への移植材料として用いて、果たして内耳の環境のなかで分化の方向に向かうかは疑問視される。内耳が外胚葉由来であることを考えると、ES細胞を外胚葉方向に誘導した細胞を使用するのも一つの方法である。

神経幹細胞はすでに実験的に内耳で生着し、一部内耳有毛細胞に分化することが確かめられており(図1)¹⁰⁾、今後も移植材料としての可能性は高い。

これらの幹細胞にくらべ、内耳幹細胞が実際に存在し、分離できれば内耳感覚細胞への分化という意

図2 内耳感覚器前駆細胞

内耳の原基細胞由来の細胞株 1005 は旺盛な増殖を示している培養状態では神経幹細胞のマーカー蛋白であるネスチンを高率に発現し(a), 分化傾向になる培養状態では支持細胞(サイトケラチン, p27^{Kip1})(b), 有毛細胞(ミオシン VIIa)(c), 神経細胞(ニューロフィラメント 200)(d), のマーカー蛋白を発現する。

味では最も期待が持たれるものである。筆者らは、ラット胎児の耳の原器である耳胞から内耳前駆細胞と考えるものを分離培養することに成功した(図2)¹¹⁾。この内耳前駆細胞の内耳有毛細胞への分化についても検討する価値がある。

以上の幹細胞は、いずれも内耳への細胞移植の有力なドナー候補となりうるが、ES細胞を使用するにせよ、胎児由来の細胞を使用するにせよ、倫理的問題を解決しなくてはならない。このような幹細胞にくらべ、自己由来の間葉系幹細胞は倫理的問題は少ない。間葉系幹細胞は骨髓から採取し、自己のものを利用することが可能であるからである。間葉系幹細胞が内耳有毛細胞に誘導できれば、比較的近い将来の臨床応用の可能性も考えられる。これら

の内耳への細胞移植概念図を図3に示す。

以下に各幹細胞を用いた内耳細胞移植研究の概要または結果を示す。

1. 胚性幹細胞

胚性幹細胞(ES細胞)ES細胞は、初期胚中の全能性幹細胞と同様に、個体を構成するすべての細胞に分化する能力を保持し、無制限に増やすことが出来る。

ヒトES細胞に対する期待は大きいですが、臨床応用を考えたときには、第一に第3者の細胞であるから免疫抑制剤が必要、第二に奇形腫の可能性、第三に発生早期の細胞は得やすいが発生後期の細胞を得るのが難しいなどの問題がある。

図3 内耳細胞移植の概念図

技術的な問題以外に倫理面の問題が大きく、特にヒトの場合、どの段階から生命を持った人間として扱うべきか、ES細胞樹立に必要な胚をどのようにして入手するか、遺伝子操作を行ってよいのか、など、議論の対象となる点が多い。

2. ES誘導細胞

ES細胞は、生体のすべての細胞に分化する能力を持つ細胞であるが、ある細胞への分化を選択的に誘導したり、選別したりする方法はわずかな細胞種でしか知られていない。内耳有毛細胞も、もちろんその誘導方法はまったく明らかになっていないが、蝸牛管が皮膚外胚葉のなかに形成される耳ブラコードに由来することを考えると、外胚葉への誘導をES細胞から内耳有毛細胞への誘導の第1段階と考えるのが妥当である。

ES細胞の分化誘導は胚葉体を経由した誘導する方法と、経由しないで間質細胞と共培養して誘導する方法に分けられる。ES細胞を間質系細胞株上(PA6)で培養することで、ES細胞から胚葉体を経ず、直接、皮膚外胚葉の細胞を誘導することが可能である¹²⁾。

このSDIA法とよばれる方法は、ラット胎児の頭蓋骨から得られた細胞(PA6)とES細胞の共培養によって効率よく神経分化を誘導できる方法で、マウスだけでなく、サルES細胞でも同じ方法が適応できる。また、この培養液中にBMP-4を添加するだけで、皮膚外胚葉へも誘導できる。このことから、SDIA法で誘導されたES細胞は、ある時期には皮膚・神経の共通の祖先である未分化外胚葉に相当する分化状態を経ていることが予想される。

筆者らの研究では、SDIA法によって外胚葉方向に誘導されたES細胞をマウスの内耳に移植したところ、らせん神経節細胞を再生することが可能であることを明らかにした(未発表)。

3. 神経幹細胞

筆者らは神経幹細胞の内耳への移植実験を行った¹⁰⁾。新生ラット(生後2~3日)の内耳に海馬由来の神経幹細胞を移植し、投与2~4週間後の移植した細胞の様子を観察した。その結果、蝸牛の鼓室階、前庭階、蝸牛管の内部、管腔壁に移植細胞が一塊となって見いだされ、神経幹細胞が移植後数週間たっても生着しつづけることがわかった。また、一

図4 内耳に生着した神経幹細胞

移植神経幹細胞は前庭感覚上皮の上あるいは内部に入り込んで生存している。Fアクチンのbundleからなる蜂巢様構造の内部に移植細胞が入り込んでいる。

部に神経幹細胞が有毛細胞上に生着したり、蝸牛コルチ器内に侵入して一部有毛細胞に置き換わっているのではないかと見られる(図1)。

このような神経幹細胞移植は内耳以外にも、網膜などですでに試みられているが、脳への移植において、適度に傷害を加えた場合が最も神経への分化の効率がよかったことが報告されている。また、網膜への移植においても無処置で移植を行った場合よりも、あらかじめ網膜に傷害を与えておいたほうが移植細胞の生着の効率がよいことが報告されている¹³⁾。

そこで筆者らは、アミドグリコシド系抗生物質を用いてあらかじめマウスに内耳障害を与え、障害された内耳への神経幹細胞の移植を行い移植細胞の運命を追った。

移植後7日目では移植細胞の大部分は内リンパ腔、外リンパ腔内に集塊をなして存在し、一部は単独で存在していた。移植後14日目、25日目には移植細胞は外リンパ腔、内リンパ腔の全体にわたり内側壁に沿う形で存在していた。さらに、一部の細胞は蝸牛軸の内部にも存在していた。

前庭、蝸牛にわけて観察してみると、前庭では大部分の移植細胞が前庭感覚上皮の上または内部に存在していた。細胞骨格構成蛋白であるFアクチンのマーカーであるファロイジンで染色すると、卵形嚢上皮に存在する移植細胞の大部分はFアクチンの蜂巢状の構造に入り込む形で存在しており、支持細胞層のレベルに入り込んで生存していることが示唆された(図4)¹⁴⁾。蝸牛では大部分の細胞は前庭

階、鼓室階の内腔側に添う形で存在していたが、一部の細胞はコルチ器に存在しており、また、鼓室階からコルチ器の内部まで移植細胞が連なっている像も観察され、鼓室階からコルチ器の内部に移動していることが推察された。

さらに、これらの移植細胞がどのように分化しているのか免疫組織化学的手法を用いて解析した。その結果、移植後14日あるいは25日の時点でグリア細胞のマーカーであるGFAPに陽性を示す細胞が移植細胞全体の90%と大部分を占めていた。一方、神経細胞のマーカーとされるMAP2に陽性を示す細胞は約10%と少数であり、移植細胞のほとんどがグリア細胞に分化していたが。

他方、神経幹細胞のマーカーであるネスチンに陽性を示す細胞が移植後25日の時点においても観察された。これらのネスチン陽性細胞は集塊をなして存在していた。また、前庭の感覚上皮層内部に生着している移植細胞の一部に、内耳有毛細胞のマーカーであるミオシンⅦaに陽性を示す細胞が移植後14日、25日の時点で観察され、有毛細胞への分化が示唆された。また、外リンパ腔内に存在している細胞でミオシンⅦaに陽性を示す細胞は認めなかった。

今回の移植実験の結果、神経幹細胞は内耳において少なくとも25日間は生存しうること、また、腫瘍をつくることなく感覚細胞層を含む上皮内に入り込んで生存しうることが確認された。さらに数は限られていたものの、感覚上皮内に入り込んでいた移植細胞の一部は有毛細胞のマーカーであるミオシンⅦaに陽性を示し、有毛細胞へ分化している可能性が伺われた。

一方、神経幹細胞の移植後の分化をみると、外リンパ腔では移植細胞の大部分がグリア細胞に分化しており、神経細胞のマーカーに陽性を示したものは一部であったのに対し、内耳有毛細胞のマーカーに陽性を示した移植細胞はすべて内リンパ腔の感覚細胞層に存在している細胞であり、外リンパ腔に生存している移植細胞で陽性を示す細胞はみられなかった。移植細胞の周囲の環境が分化の方向を大きく決定づけていることが示唆される。

有毛細胞の領域に生存していた移植細胞は、有

毛細胞のマーカーに陽性を示し、有毛細胞へ分化している可能性が疑われた。このことから将来への内耳有毛細胞の再生医療への応用を考えるにあたり、神経幹細胞は再生医療に応用できるポテンシャルを有していることが示唆される。しかしながら、現時点ではミオシン VIIa に陽性を示す細胞は限られており、効率よく有毛細胞へ分化させることが今度の課題である。

4. 間葉系幹細胞

骨髄には造血幹細胞が存在し、赤血球や白血球などすべての血球細胞に分化することが従来より知られているが、骨髄にはこのほかに骨髄間質細胞とよばれる付着系の細胞があり、そのなかに間葉系幹細胞が存在することが明らかになっている。この間葉系幹細胞は骨、軟骨、脂肪細胞、筋肉など中胚葉系の細胞に分化することが知られていたが、近年この間葉系幹細胞が中胚葉系だけでなく、神経細胞、肝細胞など他の胚葉系の細胞にも分化することが報告された。

再生移植医療を考えるにあたり、ドナー細胞をどのように供給するかという問題が常に存在しているが、間葉系幹細胞は患者本人の骨髄から採取できることから再生医療の実用化に向けた細胞の供給源として注目を集めている。

5. 内耳感覚器前駆細胞

内耳感覚器を構成する有毛細胞・支持細胞・蝸牛神経節神経細胞は、いずれも胎生期の内耳原基耳胞から発生するが、その3種類の細胞の *in vivo* での発生系譜はいまだ不明な部分が多い。レトロウイルスを用いた細胞トレース法やレーザーを用いた有毛細胞の再生実験から、有毛細胞と支持細胞が共通の前駆細胞から発生することが明らかにされているのみであり、胎生幹細胞や神経幹細胞などのような多能性を持つ細胞の存在が生体内で存在するか否かはいまだに明らかにされていない。

しかしながら、成長因子を添加した培地を用いた分散培養系の実験では、最終分裂後の内耳感覚上皮から不動毛様の構造を持つ有毛細胞タイプの細胞に分化する細胞群が、不死化遺伝子を用いた分散培養

系では有毛細胞または支持細胞、神経細胞、グリアのマーカー蛋白を発現する細胞群が胎生期のみならず、成熟した内耳感覚上皮からも同定されている。これらの培養細胞を用いた研究から、胎生初期の感覚上皮内には有毛細胞や支持細胞、神経細胞、グリアの共通の前駆細胞が存在する可能性が示唆されていた。

筆者らは、細胞移植による内耳再生の可能性を探るため、胎生12日ラット内耳から不死化遺伝子を用いることなく培養細胞系を樹立した。この時期の内耳では蝸牛の形成がはじまっておらず、有毛細胞や支持細胞に将来分化していく未分化な細胞が豊富に存在すると考えられている。その細胞群から樹立した、たった一つの細胞由来の細胞株1005は、旺盛な増殖を示している培養状態では神経幹細胞のマーカー蛋白であるネスチンを高率に発現するが、増殖が止まり、分化傾向になる培養状態では有毛細胞(ミオシン VI, VIIa)、支持細胞(サイトケラチン, p27^{Kip1}, Hes1)、神経細胞(ニューロフィラメント200, MAP1)、グリア(A2B5, GFAP)のマーカー蛋白を発現する細胞が出現した。この結果から細胞株1005は多能性を持つ細胞すなわち、有毛細胞、支持細胞、神経細胞、グリアに分化する能力を持つ細胞であったことが示され、内耳感覚器前駆細胞の候補細胞と考えられる¹¹⁾。

この内耳前駆細胞を障害を与えたラットの内耳に移植したところ、その細胞は内・外有毛細胞の層で生着した。しかしながら、この細胞株1005が移植先の生体内で多能性を発揮できるか否か、また、正常の内耳発達過程において、このような性質を持つ細胞がその多能性を発揮しているか否かは、今後の研究成果を待つ必要がある。

内耳再生医療支援技術

1. 内耳への新しい薬物投与方法

再生医療の目的は、障害された生体組織の再生あるいは代替を行うことである。再生医療が成り立つには、① 障害を受けた組織(細胞)に代わりうる“細胞”を供給すること、② その細胞が生着するための適切な環境(“足場”)を提供すること、③

“細胞”，“足場”が効率よく機能するための“環境因子”を供給すること、この三つが重要な要素となる。

細胞に関しては、近年特に発展に著しい“幹細胞”技術が応用されている。内耳再生医療を実現に近づけるためには、上記の幹細胞移植技術は有効な手段と考えられる。しかし、いかに幹細胞医学が進歩しても細胞が活動する周囲環境が適切に機能しないと組織の再生は誘導されない。

組織(臓器)によっては適切な足場を供給するだけで再生が誘導される場合もある。耳鼻科領域で、単純な鼓膜穿孔の場合、コラーゲン膜、ベスキチン膜などを足場として置くだけで鼓膜が再生されるのも、この考えかたを応用したものである。しかし、組織の再生能力が低い場合には、細胞を提供し、足場をつくるだけでは組織再生は期待できない場合もある。

そこで必要になるのが“環境因子”である。この“環境因子”の一種と考えられ再生医療で対象となるものに、細胞の増殖・分化促進作用を持つ細胞成長因子(growth factor: 細胞増殖因子)などの物質があげられる。細胞成長因子は分子生物学や細胞生物学などの進歩に伴って、その作用メカニズムが明らかになるとともに、遺伝子操作により大量生産が可能となっている。細胞の増殖や分化、形態形成などに働くこれらの因子を利用すれば、組織の再生促進が期待できる。

2. 再生を促進する物質とその投与方法

内耳に関してもこれまでいくつかの物質が有毛細胞保護、または再生に有効であると報告されている。しかし、細胞成長因子は一般には蛋白であり、生体内では非常に不安定で、生体に投与してもすぐ代謝され、期待する組織再生効果は得られないことが多い。

またこれらの物質の投与方法として、全身投与する場合は内耳に作用させるためには大量頻回投与しか方法がなく、薬物が他の細胞にも高濃度で作用することが考えられ、副作用の原因となる可能性がある。理想的には必要な物質を必要な部位に、必要な量だけ、適切な期間投与することである。物質の濃

度を、必要な場所で必要な期間にわたって有効値に保つドラッグデリバリーシステム(DDS)の応用が期待される。

3. 薬物徐放化技術と内耳再生医療

内耳など全身的な薬物投与効果の少ない部位では、局所に、しかも薬物を少しずつ徐放できる技術が必要である。特に内耳有毛細胞の発達・再生に役立つと考えられている細胞成長因子は、現在ではまだ入手が困難な状況にあり、出来るかぎり少量で最大限の効果が期待できる投与法の開発が望まれる。

これらの薬物の投与方法の可能性を以下に示す。

(1) 生体吸収性ゼラチンハイドロゲルを用いた薬物の徐放

薬物の徐放に、生体吸収性ハイドロゲル(biodegradable hydrogel)を徐放キャリアとして用いる方法が試みられている¹⁵⁾。このハイドロゲルは徐放したい薬物(主に蛋白質である)に対して刺激が少なく、安全性が確立されているため、徐放キャリアとして有用である。薬物を効果的に局所に投与するためには、少なくとも数日間～数週間の期間で徐放するよう操作できることが必要である。また、徐放キャリアが生体内に残存することは好ましくなく、最終的には生体内で吸収されることが要求される。徐放期間の調節に関しては、徐放キャリアであるハイドロゲルと薬物の間に生じる分子間相互作用力が利用されている。

つまり、生体内で薬物がハイドロゲルとの分子間相互作用により、一定の期間局所にとどまり、ハイドロゲルに分解酵素が作用することにより、それと同時に薬物が徐々に放出される仕組みである。このハイドロゲルには生体内での安全性と生体内での吸収性、さらに徐放したい薬物との分子間親和性が要求される。これらの要望を満たす材料として、コラーゲン、ゼラチン、ヒアルロン酸、アルギン酸などがあり、それら単独またはいくつかの物質の組み合わせで架橋を作製し徐放キャリアとして用いる。

(2) 徐放性ゼラチンハイドロゲルを用いた内耳への細胞成長因子の投与

筆者らは内耳へ薬物を徐放する研究として、BDNF(brain-derived neurotrophic factor)を組み

込んだハイドロゲルをモルモットの正円窓に留置した。留置後3日後に蝸牛より外リンパ液を採取し、BDNFが内耳リンパ液中に放出されているかどうかを確かめた。コントロールとして、BDNFを含まないハイドロゲルのみの群、BDNFを直接正円窓から微小針で投与した動物と比較検討した。その結果、ハイドロゲルにBDNFを組み込んだ場合、一定の濃度のBDNFが外リンパ液から検出された。

一方、BDNFを含まないハイドロゲルの場合は当然のことであるが、外リンパ液中にはBDNFは検出されず、また急速投与した場合も3日後にはほとんどBDNFは検出されず、代謝されたか脳脊髄液に流失したなどの可能性が考えられた。

以上の研究結果により、徐放性のハイドロゲルに組み込まれたBDNFは徐々に内耳に放出され、一定の期間、内耳である濃度を保ちながらとどまることが確認された。この徐放性ゼラチンハイドロゲル含BDNFの内耳に対する保護作用も、内耳の有毛細胞・神経細胞の数をカウントすることにより確かめられ、内耳細胞の保護・再生に有用であることが推測された。

今後の展開

内耳の特に有毛細胞が障害されるとそれは回復不能であると考えられてきた。しかし、最近では障害を受けた有毛細胞を回復させる、また再生を促す物質がいろいろ報告されるようになってきた。一方、内耳という特殊な解剖学的構造、特殊なバリアー(blood cochlear barrier)などの存在により、内耳に薬物を局所投与することは難しいとされてきた。また、仮にうまく投与されても脳脊髄液方向に流出してしまうなど、効果を発揮するには至らない結果が報告されている。

今回紹介した徐放システム、特に徐放性ハイドロ

ゲルを用いた薬物投与方法、さらにはナノテクノロジーを利用したナノカプセルの利用、薬物徐放の可能性のある細胞の移植などは、内耳障害への新しい治療方法への可能性を示すものとして期待される。

文 献

- 1) Cotanche DA : Regeneration of hair cell stereociliary bundles in the chick cochlea following severe acoustic trauma. *Hear Res* 30 : 181-195, 1987.
- 2) Forge A, Li L, Corwin JT, Nevill G : Ultrastructural evidence for hair cell regeneration in the mammalian inner ear. *Science* 259 : 1616-1619, 1993.
- 3) Iguchi F, Nakagawa T, Tateya I et al. : Trophic support of mouse inner ear by neural stem cell transplantation. *Neuroreport* 20 : 77-80, 2003.
- 4) Ito J, Sakota T, Kato H, Hazama M, Enomoto M : Surgical considerations regarding cochlear implantation in the congenital malformed cochlea. *Otolaryngol Head Neck Surg* 121 : 495-498, 1999.
- 5) Jorgensen JM, Mathiesen C : The avian inner ear. Continuous production of hair cells in vestibular sensory organs, but not in the auditory papilla. *Naturwissenschaften* 75 : 319-320, 1988.
- 6) Corwin JT, Cotanche DA : Regeneration of sensory hair cells after acoustic trauma. *Science* 240 : 1772-1774, 1988.
- 7) Rubel EW, Dew LA, Roberson DW : Mammalian vestibular hair cell regeneration. *Science* 267 : 701-707, 1995.
- 8) Evans MJ, Kaufman MH : Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos. *Nature* 292 : 154-156, 1981.
- 9) Thomson JA et al. : Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. *Science* 282 : 1145-1147, 1998.
- 10) Ito J, Kojima K, Kawaguchi S : Survival of neural stem cells in the cochlea. *Acta Otolaryngol* 121 : 140-142, 2001.
- 11) Kojima K, Tamura S, Nishida AT, Ito J : Generation of inner ear hair cell immunophenotypes from neurospheres obtained from fetal rat central nervous system *in vitro*. *Acta Otolaryngol (Suppl)* : 26-30, 2004.
- 12) Kawasaki H et al. : Induction of midbrain dopaminergic neurons from ES cells by stromal cell-derived inducing activity. *Neuron* 28 : 31-40, 2000.
- 13) Nishida A, Takahashi M, Tanihara H, Nakano I, Takahashi JB et al. : Incorporation and differentiation of hippocampus-derived neural stem cells transplanted in injured adult rat retina. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 41 : 4268-4274, 2000.
- 14) Tateya I, Nakagawa T, Iguchi F, Kim TS, Endo T et al. : Fate of neural stem cells grafted into injured inner ears of mice. *Neuroreport* 14 : 1677-1681, 2003.
- 15) Tabata Y, Nagano A, Ikada Y : Biodegradation of hydrogel carrier incorporating fibroblast growth factor. *Tissue Engineering* 5 : 127-131, 1999.