ベシル酸ベトタスチン (TAU-284) の体内動態に関する研究 (I): 単回投与時のラットおよびイヌにおける吸収, 分布, 代謝および排泄

大橋 力也, 築本美喜子, 仲村 進, 大塚 峯三, 林 一志*,
西山真一郎*, 塙 真也*, 三次 孝一*, 江角 凱夫*

Pharmacokinetic Studies of Betotastine Besilate (TAU-284) (I): Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion after a Single Oral Administration

Rikiya OHASHI, Mikiko TSUKIMOTO, Susumu NAKAMURA, Minezo OHTSUKA, Kazushi HAYASHI*,
Shin-itiyou NISHIYAMA*, Shinya HANAWA*, Kouichi MITSUGI* and Yoshio ESUMI*

Pharmaceutical Development Research Laboratory, Tanabe Seiyaku Co., Ltd., Saitama;

**Tokai Research Laboratories, Daiiti Pure Chemicals Co., Ltd., Ibaraki*

Summary: The absorption, distribution, metabolism and excretion were studied following a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to rats and dogs.

1. The blood level of radioactivity increased within 30min, reaching the $C_{\max}$ of $0.27 \mu\text{g eq./ml}$, and was decreased with a $t_{1/2}$ (1-8 hr) of 3 hrs after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats.

2. The level of radioactivity in almost tissue was attained the maximum 30 minutes after oral administration. In these tissues, the levels in liver was highest, followed by kidney, small intestine, stomach, gall bladder, pancreas and adrenal gland. The levels in other tissues were the same as plasma level or lower. The decrease of radioactivity in most tissues was similar to that in plasma.

3. The autoradiograms of pigment rats at 24 hrs after dosing, the distribution of radioactivity in the skin and the uveal-tract of eyes, melanin containing tissues, was observed. The radioactivity in these tissues was disappeared 30 days after dosing.

4. The unchanged drug was major component found in urine and bile. In rat urine, only β -oxidative metabolite was detected. In rat bile, taurine-conjugated metabolite of the unchanged drug and 5 other metabolites were detected. No metabolite was detected in plasma of rat and dog and in the urine of dog.

5. Urinary and fecal excretion were 39.7 and 61.6%, of the dosed radioactivity, respectively, within 120 hrs after oral administration to male rats. Biliary excretion accounted for 40.6% of the dose and its possible that most of it was subjected to entero-hepatic circulation.

Key words: Betotastine Besilate, TAU-284, Blood level, Plasma level, Distribution, Metabolism, Excretion, Oral administration, Rat, Dog

緒 言

ベシル酸ベトタスチン (TAU-284) は宇部興産(株)および田辺製薬(株)により共同開発中の新規抗アレルギー薬である。TAU-284 は I 型アレルギー反応抑制作用およびヒスタミン H1 受容体拮抗作用^{1,2)}を有し, さらに本化合物の中枢移行性は類薬と比較して低く, 比較的睡眠誘発作用の弱いことが特徴である³⁾。

TAU-284 の生体内動態研究の一環として ^{14}C で標識

した TAU-284 (^{14}C -TAU-284) をラットおよびイヌに経口あるいは静脈内投与した時の吸収, 分布, 代謝および排泄について検討したので報告する。

実験材料および実験方法

1. 標識化合物

^{14}C -TAU-284 は p-クロロベンズアルデヒド (carbonyl- ^{14}C) を原料にして 9 工程でアマシヤム(株)にて合成した (Lot No. CFQ 6238, 比放射能 2.0 MBq/mg お

田辺製薬株式会社 医薬開発研究所 〒335 埼玉県戸田市川岸 2-2-50

* 第一化学薬品株式会社 東海研究所 〒319-11 茨城県那珂郡東海村村松 2117

Fig. 1 Structure of ^{14}C -TAU-284

*: labeled position

よび Lot No. CFQ 8191, 比放射能 2.2 MBq/mg). 実験には標識体 (Lot No. CFQ 6238) を第一化学薬品㈱で精製後使用した (Lot. No. CP-1266, 比放射能は 2.0 MBq/mg, 放射化学的純度は 95% 以上). ^{14}C -TAU-284 の化学構造式および標識位置を Fig. 1 に示す. 放射化学的純度の測定は吸着剤としてシリカゲル 60F254 (ガラスプレート, 厚さ 0.25 mm; E. Merck), 展開溶媒としてジクロロメタン: メタノール: アンモニア水 (80: 20: 1, v/v), 1-ブタノール: エタノール: クロロホルム: アンモニア水 (4: 5: 2: 5, v/v) を用いる薄層クロマトグラフィー (TLC) により行った. また, 高速液体クロマトグラフィー (HPLC) により光学異性体 (R 体) の存在比の確認を行った結果, その割合は 1% であった. HPLC の分析条件を以下に示す.

カラム: ULTRON ES-OVM, 4.6 mm I.D. $\times$ 150 mm (信和化工)

移動相: 20 mM リン酸二水素カリウム (pH 5.5): アセトニトリル (100: 12, v/v)

流速: 0.95 ml/min

また, 消化管吸収部位に関する検討には ^{14}C -TAU-284 (Lot. No. CFQ 8191) を田辺製薬㈱にて精製した標識体 (Lot No. 961001) を使用した. 放射化学的純度は 98.2%, 比放射能 0.19 MBq/mg であった. なお, ^{14}C -TAU-284 (Lot. No. CFQ 8191) の光学異性体 (R 体) の存在比を前述と同様に測定した結果, その割合は 1.1% であった.

2. 実験動物

実験には白色雄ラット (SD 系, 生後 7 週齢, 体重 194~265 g; 日本エスエルシー) および有色雄ラット (Long Evans 系, 生後 7~8 週齢, 体重 180~263 g; 米国チャールス リバー) を用いた. 購入後のラットは水および固型飼料 (MF; オリエンタル酵母工業) を自由に摂取させ, 1 週間以上予備飼育後, 実験に供した.

雄 (生後 7 ヶ月齢, 体重約 10 kg) および雌 (生後 7 ヶ月齢, 体重約 8 kg) のビーグル犬 (Hazleton-LRE) を用いた. イヌは 1 日 1 回, 午後 1 時頃に固型飼料

(DS-5; オリエンタル酵母工業) 約 300 g を与え, 水は自由に摂取させ, 1 ヶ月以上予備飼育後, 実験に供した.

3. 投与液調製法

経口投与には ^{14}C -TAU-284 を 0.5% カルボキシメチルセルロースナトリウム水溶液に溶解し, ラット用として 0.6 mg/ml, イヌ用として 0.15 mg/ml の投与液をそれぞれ調製した. また, 静脈内投与には ^{14}C -TAU-284 を生理食塩液に溶解し, 1.2 mg/ml の投与液を調製した.

4. 投与量および投与方法

(1) 経口投与

ラットには ^{14}C -TAU-284 投与液の 3 mg/5 ml/kg をゾンデを用いて経口投与した. 投与に際して動物は投与前一晚絶食し, 投与後 4 時間より給餌を行った. なお, 水は自由に摂取させた.

イヌには ^{14}C -TAU-284 投与液の 0.3 mg/2 ml/kg をカテーテル (Nelaton Catheter No. 8; 出雲ゴム工業) を用いて経口投与した. 投与に際して, 投与前日の夕方に給餌器内に餌が残っていないことを確認し, 投与当日は午後 1 時頃に給餌した. なお, 水は自由に摂取させた.

(2) 静脈内投与

^{14}C -TAU-284 のラット血漿中濃度の測定ではエーテル麻酔下, 陰茎背静脈より, 他の実験では尾静脈よりそれぞれ 3 mg/2.5 ml/kg を投与した. 投与に際して動物は投与前一晚絶食し, 投与後 4 時間より給餌を行った. なお, 水は自由に摂取させた.

5. 放射能の測定

各試料中の放射能の測定には, 液体シンチレーションカウンター (LSC-903; Aloka および TRI-CARB 2500TR; Packard) を用いた. なお, 計数効率の補正は外部標準線源によるチャンネル比法により行った.

6. 吸収

(1) 血液および血漿中放射能濃度

雄ラットに ^{14}C -TAU-284 を経口あるいは静脈内投与した後, 飼育ケージ (TR-365S; トキワ科学器械) に収め, 所定の時間に尾静脈より血液を 50 μl 採取した.

雄または雌イヌに ^{14}C -TAU-284 を経口投与後, 代謝ケージ (第一化学薬品型; トキワ科学器械) に収め, 所定の時間に橈側皮静脈より血液 5~10 ml を採取した.

血液は組織溶解剤 Soluene-350 (Packard) 2 ml を加えて溶解し, 過酸化ベンゾイル飽和ベンゼン溶液 0.4

mlを加えて脱色後、シンチレーター Econofluor (Du Pont NEN Research Products) 13 mlを加えて放射能を測定した。イスの血漿は血液の一部を遠心分離 (1800×g, 4°C, 15 min) して得た。血漿 100 mlに組織溶解剤 Soluene-350 2 mlを加えて溶解し、シンチレーター Econofluor 13 mlを加えて放射能を測定した。

(2) 消化管吸収部位

雄ラットをエーテル麻酔下に開腹し、胃および小腸上部、中部および下部ならびに大腸を結紮してそれぞれ 8 cm のループを作製した。それぞれのループ内に ^{14}C -TAU-284 の 0.5% カルボキシメチルセルロースナトリウム溶液 0.25 mg/0.25 ml を投与した。投与後 30 分に各消化管を摘出し、生理食塩液約 30 ml で内容物を洗浄し、洗液にメタノールを加えて 50 ml とした。消化管壁は生理食塩液約 30 ml を加えてホモジナイズ後、メタノールを加えて 50 ml とした。消化管内容物の 1 ml にシンチレーター Hionic-Fluor 10 ml を加え、また消化管壁のホモジネートはその 1 ml に組織溶解剤 Soluene-350 : イソプロパノール = 1 : 1 (v/v) 混液 1 ml を添加し溶解後、シンチレーター Hionic-Fluor (Packard) 10 ml を加えて放射能を測定した。

7. 分 布

(1) 全身オートラジオグラフィー

^{14}C -TAU-284 を白色雄ラット (SD 系) あるいは有色雄ラット (Long Evans 系) に経口投与した後、飼育ケージに収め、所定の時間にエーテル麻酔死させ、速やかに被毛を電気バリカンで刈り取り、鼻腔および肛門を 5% カルボキシメチルセルロース (CMC) で塞いだ。ついで -70°C のドライアイス-アセトンにより凍結後、-20°C の冷凍庫内でアセトンを除いた。得られた凍結屍体より前後肢および尾を切り離した後、ミクロトームステージ上に 5% CMC で包埋し、-70°C のドライアイス-アセトンにより凍結後、クライオミクロトーム (PMV 450 MP; LKB) に固定し、-25°C 前後で約 35 μm の凍結切片を接着テープ (No. 810; 住友スリーエム) に貼りつけて薄切した。得られた凍結切片を -25°C 前後で凍結乾燥後、切片表面を保護膜 (4 μm ; ダイアホイル) で被い、X 線フィルム (MARG ^3H タイプ; コニカ) と密着させ 4°C で 28 日間露出した後、X 線フィルムを現像し、全身オートラジオグラムを作製した。

(2) 臓器・組織内放射能濃度

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口投与した後、飼育ケージに収め、所定の時間にエーテル麻酔下、腹部大動脈より採血致死させ、速やかに臓器・組織を摘出した。

血液は 100 μl を前述の方法に準じて血液中放射能を

測定した。残りの血液は遠心分離 (1800×g, 4°C, 15 min) して血漿を得た。血漿の 100 μl を前述の方法に準じて血漿中放射能を測定した。血液および血漿を除く各臓器・組織はその湿重量を測定し、一部の臓器・組織については小片を切り取り、その湿重量も測定した。秤量した全部あるいは一部の臓器・組織に組織溶解剤 Soluene-350 の 2 ml を加えて溶解し、必要に応じて過酸化ベンゾイル飽和ベンゼン溶液 0.4 ml を加えて脱色後、シンチレーター Econofluor 13 ml を加えて放射能を測定した。

(3) 血球移行率

血液、血漿中放射能濃度および血液のヘマトクリット値を用い、次式より血球移行率を算出した。

$$\text{血球移行率 (\%)} = \left[1 - \frac{P \times (100 - \text{Ht})}{B \times 100} \right] \times 100$$

P : 血漿中濃度 ($\mu\text{g eq./ml}$), B : 血液中濃度 ($\mu\text{g eq./ml}$), Ht : ヘマトクリット値 (%)

(4) 血漿蛋白結合

1) *In vitro*

血漿蛋白結合率：雄ラット、雄イスおよび健常成人男子の新鮮血漿に ^{14}C -TAU-284 を添加し、0.08, 0.4 および 4.00 mg/ml となるように調製後、その 1 ml を遠心型蛋白結合試験管 (MPS-3; Amicon) に入れ、遠心分離 (1000×g, 4°C, 20 min) した。得られた濾液より 100 μl を採取し、シンチレーター Atomlight (Du Pont NEN Research Products) 10 μl を加えて放射能を測定し、次式より蛋白結合率を求めた。

$$\text{血漿蛋白結合率 (\%)} = \left(1 - \frac{\text{濾液中濃度}}{\text{血漿中濃度}} \right) \times 100$$

結合の可逆性：雄ラット、雄イスおよび健常成人男子の新鮮血漿に ^{14}C -TAU-284 を添加し、4.00 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ となるように調製した試料を用いて溶媒抽出法により結合の可逆性の検討を行った。各血漿 1 μl を試験管に取り、アセトニトリル 2 μl を加え攪拌した後、遠心分離 (1800×g, 4°C, 15 min) し、得られた上清を回収した。ついで沈渣にメタノール 2 μl を加え攪拌し、遠心分離して上清の回収操作を 2 回繰り返した。採取した上清はメタノールを加えて 25 μl に希釈した後、その 1 μl にシンチレーター Atomlight 10 μl を加えて放射能を測定した。残渣については組織溶解剤 Soluene-350 の 2 μl を加えて溶解し、メタノールで 25 μl に希釈後、その 1 μl にシンチレーター Atomlight 10 μl を加えて放射能を測定した。

$$\text{溶媒可溶性画分の割合 (\%)} = \frac{B}{A+B} \times 100$$

A : 溶媒不溶性画分の放射能 (dpm)

B : 溶媒可溶性画分の放射能 (dpm)

2) *In vivo*

血漿蛋白結合率および結合の可逆性：雄ラットおよび雄イヌに ^{14}C -TAU-284 を経口投与した後、所定の時間にラットではエーテル麻酔下、腹部大動脈より血液を採取し、イヌでは橈側皮静脈より血液を採取した。血液は遠心分離 ($1800 \times g$, 4°C , 15 min) して血漿を得た後、前述の方法に準じて血漿中放射能を測定した。また、血漿蛋白結合率および血漿蛋白結合の可逆性についても前述の方法に準じて求めた。

8. 代謝

雄ラットの血漿、尿、胆汁および雄イヌの血漿、尿中の代謝物は HPLC-ラジオクロマトグラフィーおよび LC/MS/MS を用いて検索し、構造を推定した。

(1) ラット

雄ラットに ^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を経口投与した時に採取した 0~24 時間尿および胆汁を濃縮後に分析した。また、 ^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を経口投与した後 4 時間の血漿 0.5 ml をメタノール 25 ml あるいはアセトニトリル 25 ml でそれぞれ抽出後 (抽出率 89~92%), HPLC-ラジオクロマトグラフィーおよび LC/MS/MS を用いて分析した。

(2) イヌ

雄イヌに ^{14}C -TAU-284 の 0.3 mg/kg を経口投与した時に採取した 0~24 時間尿を濃縮後、また投与後、1, 2 および 6 時間の血漿 1.75 ml を純水で 2 倍希釈し、クロロホルム約 4 ml で抽出後 (抽出率 85~90%), HPLC-ラジオクロマトグラフィーを用いて分析した。

(3) HPLC および MS/MS の測定条件

ラット血漿、尿および胆汁中の代謝物の検索には HPLC 条件-I, イヌ血漿および尿中の代謝物の検索には HPLC 条件-II を使用した。

1) HPLC

HPLC 装置	: HITACHI 655 型および 6200 型
分析カラム	: TSKgel ODS-80T _M (5 μm , 4.6×150 mm I.D.; Tosoh)
カラム温度	: 40°C
移動相	: 条件-I ; 20 mM 酢酸アンモニウム緩衝液 (pH 4.6)/アセトニトリル = 7 : 3 条件-II ; 20 mM リン酸緩衝液 (pH 3.4)/アセトニトリル = 3 : 1
流速	: 1.0 ml/min
ラジオアナライザー	: Ramona-5-LS, Raytest

2) TSP-LC/MS/MS

MS/MS 装置	: Finnigan MAT TSQ700
イオン源	: Thermospray
イオン源温度	: 240°C
ベーパーライザー温度	: $70-80^\circ\text{C}$
ディスチャージ電圧	: 1.0 kV
リペラー電圧	: 30 V
コリージョンガス	: Ar, 1.0 mTorr
コリージョンエネルギー	: -20 eV

9. 排泄

(1) 尿、糞および呼気中排泄

ラット： ^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口あるいは静脈内投与した後、代謝ケージ (KN-646B ; 夏自製作所製) に収め、所定の時間に自然排泄尿および糞を分別採取した。また ^{14}C -TAU-284 を雄ラットに経口投与後、代謝ケージ (第一化学薬品型 ; 石井商店製) に収め、所定の時間に尿、糞および呼気を分別採取した。なお、呼気は投与後 20% モノエタノールアミンに採取し、トラップを採取時間ごとに交換した。

尿は水を加えて 100 ml に希釈し、その 1 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定した。糞は攪拌均質化しながら 50% メタノールを加えて 300 ml に希釈後、その 1 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定した。呼気中排泄率は $^{14}\text{CO}_2$ を捕集した 20% モノエタノールアミン 1 ml にシンチレーター Hionic-Fluor 10 ml を加えて放射能を測定した。投与後 120 時間の尿および糞採取終了後、ラットをエーテル麻酔死させ、0.5 M 水酸化ナトリウム 500 ml およびトルエン 80 ml を加えて 96 時間還流して溶解した。溶解液は水を加えて攪拌均質化しながら 900 ml に希釈し、その 0.5 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定し、体内残存率を求めた。

イヌ： ^{14}C -TAU-284 の 0.3 mg/kg を雌および雄イヌに経口投与した後、代謝ケージ (第一化学薬品型 ; トキワ科学器械) に収め、所定の時間に自然排泄された尿および糞を採取した。ただし、投与後 24 時間までの尿については必要に応じて尿道カテーテル (X 線造影用 Fr8 ; 武井医科光器製作所) 処置にて採取した。尿は水を加えて 500 ml に希釈し、その 1 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定した。糞は 50% メタノールを加えて攪拌均質化しながら 1500 ml に希釈後、その 0.5 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定した。また、投与後 120 時間の尿および糞採取終了後、代謝ケージを水で洗浄し、洗浄液中の放射能を測定した。

(2) 胆汁中排泄率

雄ラットをエーテル麻酔下、総胆管にポリエチレンチューブを挿入して胆汁が採取できるように処置後、ボールマンケージに収めた。麻酔覚醒後のラットに ^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を経口投与した後、所定の時間に胆汁、尿および糞を採取した。

胆汁は水を加えて 50 ml に希釈し、その 1 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定した。尿および糞中放射能の測定は前述の方法に準じて行った。投与後 48 時間の胆汁、尿および糞採取終了後、ラットをエーテル麻酔死させ、消化管内容物を採取した。消化管内容物は 50% メタノールを加えて攪拌均質化しながら 300 ml に希釈し、その 1 ml にシンチレーター Atomlight 10 ml を加えて放射能を測定した。また、体内残存放射能は前述の方法に準じて測定した。

(3) 腸肝循環

雄ラットをエーテル麻酔下、総胆管にポリエチレンチューブを挿入して胆汁が採取できるように処置した。このラットに、別の雄ラットに ^{14}C -TAU-284 を経口投与して得た投与後 24 時間までの胆汁の 75.5 μg (TAU-284 換算) / 151.7 kBq/kg を十二指腸内に注入した。ラットをボールマンケージに収めた後、胆汁、尿および糞を採取した。胆汁、尿および糞の採取時間、採取した試料中放射能の測定、消化管内容物および体内残存放射能の測定は胆汁排泄試験に準じた。

10. 速度論的パラメータ

最高濃度 ($C_{\max}$) および最高濃度到達時間 ($T_{\max}$) は実測値より求めた。また、消失半減期 ($t_{1/2}$) は指定した時間範囲での実測値を用いて最小二乗法により求め、みかけの半減期として表した。血液中濃度-時間曲線下面積 (AUCb) は各測定時間における実測値を直線で結び、台形法により求めた。

11. 試験成績の表示

試験成績は 1 群の動物数の平均値および標準偏差 (S.D.) で表した。また、放射能の検出限界はバックグラウンド値 (dpm) の 2 倍とした。1 群の動物例数の半数を超える数が検出限界以下の場合には N.D. (not detected) と表した。なお、放射能濃度はいずれも TAU-284 の遊離体に換算して表した。

結 果

1. 吸 収

(1) 血液中放射能濃度

1) ラット

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口投与あるいは静脈内投与した時の血液中放射能濃度を Fig. 2

Fig. 2 Radioactivity concentrations in blood after a single oral or an intravenous administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats (dose: 3 mg/kg) (mean $\pm$ S.D., $n=5$)

Table I Pharmacokinetic parameters of radioactivity concentration in blood after a single oral or intravenous administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats (dose: 3 mg/kg)

Route	$T_{\max}$ (hr)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g eq./ml}$)	$t_{1/2}$ (hr)	AUC ($\mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$)
p.o.	0.5 ± 0.1	0.27 ± 0.05	3.0 ± 0.6 (1– 8 hr) 23.5 ± 21.5 (8–24 hr)	0.87 ± 0.19 (0– 8 hr) 1.38 ± 0.23 (0–24 hr)
i.v.	—	—	0.6 ± 0.1 (2 min–2 hr) 4.6 ± 3.1 (4– 8 hr)	1.69 ± 0.19 (0– 8 hr)

— : Not calculated

(mean $\pm$ S.D., $n=5$)

に、薬物速度論的パラメータを Table I に示す。

経口投与時における血液中放射能濃度は投与後 0.5 時間に $C_{\max}$ の 0.27 $\mu\text{g eq./ml}$ に達した後、1 から 8 時間まで $t_{1/2}$ 3.0 時間、8 から 24 時間まで $t_{1/2}$ 23.5 時間で減少した。投与後 8 および 24 時間までの AUCb はそれぞれ 0.87 $\mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ および 1.38 $\mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ であった。

静脈内投与における血液中放射能濃度は投与後 2 分に 2.04 $\mu\text{g eq./ml}$ を示し、2 時間まで $t_{1/2}$ 0.6 時間、4 から 8 時間まで $t_{1/2}$ 4.6 時間で減少し、24 時間以降は検出限界以下であった。投与後 8 時間までの AUCb は 1.69 $\mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ であった。

2) イ ス

^{14}C -TAU-284 の 0.3 mg/kg を雄および雌イスに経口投与した時の血液中放射能濃度を Fig. 3 に、薬物速度論的パラメータを Table II に示す。

雄イスにおける血液中放射能濃度は投与後 1.7 時間に $C_{\max}$ 0.18 mg eq./ml を示した後、4 から 8 時間まで $t_{1/2}$ 2.9 時間、8 から 24 時間まで $t_{1/2}$ 5 時間で減少し、48 時

Fig. 3 Radioactivity concentrations in blood after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male and female dogs (dose: 0.3 mg/kg) (mean $\pm$ S.D., $n=3$)

Table II Pharmacokinetic parameters of radioactivity concentration in blood after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male or female dogs (dose: 0.3 mg/kg)

Sex	$T_{\max}$ (hr)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g eq./ml}$)	$t_{1/2}$ (hr)	AUC0-24 hr ($\mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$)
Male	1.7 ± 0.6	0.18 ± 0.02	2.9 ± 0.1 (4-8 hr)	1.39 ± 0.25
			5.0 ± 0.2 (8-24 hr)	
Female	2.7 ± 1.2	0.15 ± 0.03	2.8 ± 0.3 (4-8 hr)	1.25 ± 0.23
			6.7 ± 0.4 (8-24 hr)	

(mean $\pm$ S.D., $n=3$)

Fig. 4 Radioactivity concentrations in plasma after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male and female dogs (dose: 0.3 mg/kg) (mean $\pm$ S.D., $n=3$)

Table III Pharmacokinetic parameters of radioactivity concentration in plasma after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male or female dogs (dose: 0.3 mg/kg)

Sex	$T_{\max}$ (hr)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g eq./ml}$)	$t_{1/2}$ (hr)	AUC0-24 hr ($\mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$)
Male	1.3 ± 0.6	0.17 ± 0.03	2.9 ± 0.4 (4-8 hr)	1.38 ± 0.29
			4.7 ± 0.3 (8-24 hr)	
Female	2.7 ± 1.2	0.14 ± 0.03	3.2 ± 0.4 (4-8 hr)	1.23 ± 0.16
			4.8 ± 0.2 (8-24 hr)	

(mean $\pm$ S.D., $n=3$)

間以降は検出限界以下であった。投与後24時間までのAUCbは $1.39 \mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ であった。

雌イヌにおける血液中放射能濃度は投与後2.7時間に $C_{\max}$ 0.15 mg eq./ml を示した後、4から8時間まで $t_{1/2}$ 2.8時間、8から24時間まで $t_{1/2}$ 6.7時間で減少し、48時間以降は検出限界以下であった。投与後24時間までのAUCbは $1.25 \mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ であった。

(2) 血漿中放射能濃度

^{14}C -TAU-284の0.3 mg/kgを雄および雌イヌに経口投与した時の血漿中放射能濃度をFig. 4に、薬物速度論的パラメータをTable IIIに示す。

雄イヌにおける血漿中放射能濃度は投与後1.3時間に $C_{\max}$ の $0.17 \mu\text{g eq./ml}$ に達した後、4から8時間まで $t_{1/2}$ 2.9時間で減少した。投与後8から24時間まで $t_{1/2}$ 4.7時間で減少し、48時間以降は検出限界以下であった。投与後24時間までのAUCpは $1.38 \mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ であった。

雌イヌにおける血漿中放射能濃度は投与後2.7時間に $C_{\max}$ の $0.14 \mu\text{g eq./ml}$ に達した後、4から8時間まで $t_{1/2}$ 3.2時間で減少した。投与後8から24時間まで $t_{1/2}$ 4.8時間で減少し、48時間以降は検出限界以下になった。投与後24時間までのAUCpは $1.23 \mu\text{g eq.}\cdot\text{hr/ml}$ であった。

(3) 消化管吸収部位

^{14}C -TAU-284の0.25 mgを雄ラットの消化管の各結紮部位に注入後30分の消化管壁および内容物中の放射能残存率をTable IVに示す。

ラットの胃、小腸（上部、中部および下部）および大腸に作製した結紮ループに ^{14}C -TAU-284を0.25 mg/0.25 ml投与した後30分における放射能残存率は胃で100.5%、小腸上部で16.6%、小腸中部で66.8%、小腸下部で73.3%、大腸で95.2%であった。

Table IV Remaining radioactivity in gastrointestinal contents and walls 30 min after injection of ^{14}C -TAU-284 into ligated loops of digestive tract in male rats (dose: 0.25 mg/one loop)

Ligated Site	Remaining radioactivity(% of dose)		
	Walls	Contents	Total
Stomach	20.5±11.3	80.0±11.2	100.5±0.1
Upper-small intestine	7.8± 1.4	8.9± 3.6	16.6±3.1
Middle-small intestine	23.7± 6.4	43.1± 3.6	66.8±8.6
Lower-small intestine	21.2± 1.2	52.1± 8.6	73.3±8.4
Colon	44.4±22.6	50.7±26.6	95.2±5.8

(mean±S.D., n=3)

2. 分 布

(1) 全身オートラジオグラム

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口投与した後、5, 30分, 2, 4, 8, 24および72時間の全身オートラジオグラムを **Fig. 5A-G** に示す。

投与後5分では胃内容物、腸内容物（十二指腸部分）がもっとも高い放射能を示し、ついで肝臓、腎臓皮質に高い放射能が認められた。副腎、心臓、顎下腺には低い放射能が認められ、血液の放射能はさらに低かった。他の組織は血液と同程度かさらに低い放射能であった。

投与後30分では胃内容物、腸内容物（小腸部分）、膀胱がもっとも高い放射能を示し、ついで胆汁、肝臓、腎臓に高い放射能が認められた。副腎、褐色脂肪、精巣上体、眼球、ハーダー腺、心臓、下垂体、肺、顎下腺、脾臓、包皮腺、貯精嚢、甲状腺、舌、骨格筋、皮膚、脾臓、胸腺には血液とほぼ同程度の放射能が認められた。骨髄、前立腺、鼻介は血液より低い放射能を示し、白色脂肪、精巣はさらに低い放射能を示した。脳、脊髄には放射能はほとんど認められなかった。

投与後2時間では胃内容物、腸内容物、膀胱がもっとも高い放射能を示し、ついで胆汁、肝臓、腎臓に高い放射能が認められた。副腎、動脈、褐色脂肪、精巣上体、眼球、ハーダー腺、心臓、下垂体、肺、顎下腺、脾臓、包皮腺、骨髄、骨格筋、皮膚、脾臓、精巣、胸腺、甲状腺、舌には血液とほぼ同程度の放射能が認められた。前立腺、貯精嚢、鼻介は血液より低い放射能を示し、脳、白色脂肪、脊髄には放射能はほとんど認められなかった。

投与後4時間では腸内容物、膀胱がもっとも高い放射能を示し、ついで胆汁、胃内容物、肝臓、腎臓に高い放射能が認められた。副腎、褐色脂肪、精巣上体、眼球、ハーダー腺、心臓、下垂体、肺、顎下腺、脾臓、包皮腺、前立腺、貯精嚢、骨髄、骨格筋、皮膚、脾臓、精巣、胸腺、甲状腺、舌、鼻介には血液とほぼ同程度の放

射能が認められた。脳、白色脂肪、脊髄には放射能はほとんど認められなかった。

投与後8時間では腸内容物、膀胱がもっとも高い放射能を示し、ついで肝臓、腎臓に高い放射能が認められた。胃内容物、包皮腺、鼻介には低い放射能が認められ、血液はさらに低い放射能であった。

投与後24時間では腸内容物がもっとも高い放射能を示し、ついで肝臓、鼻介、膀胱に高い放射能が認められた。腎臓には低い放射能が認められ、血液はさらに低い放射能であった。

投与後72時間では腸内容物、肝臓、鼻介に低い放射能が認められた。血液を含む他の組織には放射能はほとんど認められなかった。

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を有色雄ラット (Long Evans 系) に経口投与した後、24, 72, 168時間および30日の全身オートラジオグラムを **Fig. 5H** に示す。

投与後24時間における放射能の分布は眼球のブドウ膜および皮膚（黒色部分）などのメラニン含有組織に低い放射能濃度が認められ、これらの組織を除き白色雄ラットとはほぼ同様な分布像を示した。

投与後72時間ではメラニン含有組織のみに放射能の分布が認められ、168時間では眼球のブドウ膜のみに放射能の分布が認められた。しかし、投与後30日ではメラニン含有組織においても放射能の分布は認められなかった。

(2) 臓器・組織内放射能濃度

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口投与した時の臓器・組織内放射能濃度を **Table V** に示す。ほとんどの組織は投与後30分に最高濃度となった。胃は投与後5分、大脳、白色脂肪および精巣は投与後2時間、小脳は投与後30分から2時間、盲腸および大腸は投与後8時間に最高濃度となった。

投与後5分では胃の放射能がもっとも高く、ついで小腸、肝臓、動脈の順に高かった。また盲腸、腎臓、大腸および膀胱は血漿中濃度より高く、脾臓、肺、脾臓、心筋および顎下腺は血漿中濃度とほぼ同程度であり、その他の臓器・組織内放射能は検出限界以下であった。

投与後30分では肝臓の放射能がもっとも高く、ついで腎臓であった。小腸、胃、膀胱、脾臓および副腎は血漿中濃度より高く、精巣上体、精巣、白色脂肪、眼球、大脳および小脳は血漿中濃度の約 1/3 以下であり、その他の臓器・組織は血漿中放射能濃度とほぼ同程度であった。

投与後8時間では大腸の放射能がもっとも高く、ついで盲腸、肝臓の順に高く、膀胱、腎臓、小腸、脾臓、胃、肺、副腎およびハーダー腺は血漿中濃度より高かった。小脳および眼球は血漿中濃度の 1/3 以下であり、下垂体および甲状腺は検出限界以下であった。その他の

Fig. 5 A : Whole body autoradiograms showing the distribution of radioactivity 5 min after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose:3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 B : Whole body autoradiograms showing the distribution of radioactivity 30 min after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 C : Whole body autoradiograms showing the distribution of radioactivity 2 hr after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 D : Whole body autoradiograms showing distribution of radioactivity 4 hr after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 E : Whole body autoradiograms showing distribution of radioactivity 8 hr after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 F : Whole body autoradiograms showing the distribution of radioactivity 24 hr after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 G : Whole body autoradiograms showing the distribution of radioactivity 72 hr after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 3 mg/kg)

1. Adrenal gland	12. Harderian gland	23. Seminal vesicle
2. Aorta	13. Heart	24. Skeletal muscle
3. Bile	14. Hypophysis	25. Skin
4. Blood	15. Intestinal contents	26. Spinal cord
5. Bone marrow	16. Kidney	27. Spleen
6. Brain	17. Liver	28. Testis
7. Brown fat	18. Lung	29. Thymus
8. Epididymis	19. Mandibular gland	30. Thyroid gland
9. Eyeball	20. Pancreas	31. Tongue
10. Fat	21. Preputial gland	32. Turbinal
11. Gastric contents	22. Prostate gland	33. Bladder

Fig. 5 H : Whole body autoradiograms showing the distribution of radioactivity 24, 72 and 168 hr and 30 day after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a pigmented male rat (long Evans) (dose: 3 mg/kg)

1. Eyeball
2. Skin (Black Area)
3. Skin (White Area)

Table V Radioactivity concentration in tissue after a single oral administration of ¹⁴C-TAU-284 to male rats (dose: 3 mg/kg)

Tissue	Radioactivity concentration (ng eq./g or ml)													
	5 min		30 min		2 hr		4 hr		8 hr		24 hr	72 hr		
Plasma	19±	14	435±	99	165±	56	106±	28	43±	5	8±	3	N.D.	
Blood	18±	13	417±	88	150±	50	102±	30	38±	8	10±	2	N.D.	
Cerebrum	N.D.		24±	8	28±	10	23±	10	19±	4	N.D.		N.D.	
Cerebellum	N.D.		24±	8	24±	8	19±	9	13±	5	N.D.		N.D.	
Hypophysis	N.D.		435±	108	255±	87	169±	50	N.D.		N.D.		N.D.	
Eyeball	N.D.		54±	16	34±	10	24±	6	11±	3	N.D.		N.D.	
Harderian gland	N.D.		305±	84	171±	46	107±	31	65±	18	15±	4	N.D.	
Thyroid gland	N.D.		377±	118	232±131		116±	45	N.D.		N.D.		N.D.	
Mandibular glan	9±	13	574±	140	255±	65	141±	44	57±	12	8±	1	N.D.	
Thymus	N.D.		276±	78	134±	62	74±	18	29±	7	N.D.		N.D.	
Heart	13±	14	510±127		188±67		124±30		48±8		6±	1	N.D.	
Trachea	N.D.		242±	100	95±	38	69±	19	28±	6	N.D.		N.D.	
Lung	17±	13	568±	170	307±104		196±	61	75±	22	11±	3	N.D.	
Liver	663±	654	9351±2622		3057±555		2088±	311	1097±	260	267±61		78±38	
Kidney	75±	95	4635±1306		1475±831		975±	380	320±	34	51±	10	11±	3
Adrenal gland	N.D.		662±	204	261±	93	161±	48	68±	16	N.D.		N.D.	
Spleen	27±	12	450±	126	197±	71	143±	16	48±	12	8±	4	N.D.	
Pancreas	13±	13	760±	203	360±	88	235±	63	88±	23	17±	9	N.D.	
Fat	N.D.		66±	11	70±	20	51±	19	41±	18	12±	4	N.D.	
Brown fat	N.D.		273±	53	185±	46	106±	28	49±	12	13±	2	N.D.	
Skeletal muscle	N.D.		310±	82	155±	85	85±	22	27±	4	29±58		N.D.	
Skin	N.D.		226±	66	102±	31	733±	19	30±	8	7±	2	N.D.	
Bone marrow	N.D.		380±	108	153±	35	106±	31	36±	7	N.D.		N.D.	
Aorta	324±	485	423±	201	131±	38	71±	22	54±	29	N.D.		N.D.	
Testis	N.D.		70±	14	99±	30	72±	14	34±	8	8±	3	N.D.	
Epididymis	N.D.		159±	49	103±	21	65±	18	32±	11	6±	1	N.D.	
Urinary bladder	38±	56	1284±	811	637±	415	1108±	799	324±	142	10±	5	N.D.	
Stmach	11919±5236		2467±2018		599±842		136±	54	75±	24	5±	2	N.D.	
Small intestine	2077±2463		3278±3732		454±279		261±	139	98±	88	6±	3	N.D.	
Cecum	86±	90	262±	163	170±130		928±1427		5082±3030		76±44		11±	4
Large intestine	42±	68	332±	95	213±163		438±	572	5511±4420		106±90		7±	7

N.D. : Notdetected

(mean±S.D., n=5)

Table VI Percentage distribution of radioactivity in blood cell after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats (dose: 3 mg/kg)

Time	Hematocrit value (%)	Ratio of radioactivity (%)
5 min	42±2	34.9±23.7
30 min	43±1	41.0± 2.0
2 hr	43±1	37.5± 3.4
4 hr	45±2	41.6± 3.8
8 hr	43±1	36.3± 5.8
24 hr	45±1	54.0±16.5
72 hr	42±2	N.C.

N.C. : Not calculated (mean±S.D., n=5)

の臓器・組織は血漿中放射能濃度とほぼ同程度であった。

投与後24時間では各臓器・組織とも放射能濃度は減少し、白色脂肪に最高濃度の約 1/5. 骨格筋, 精巢, ハーダー腺, 褐色脂肪, 精巢上体, 皮膚, 肝臓, 脾臓, 血液, 肺, 大腸, 血漿, 脾臓, 盲腸, 顎下腺, 心筋および腎臓は最高濃度の 1/10~1/100であった。膀胱, 小腸および胃は 1/100以下に減少し, その他の臓器・組織は検出限界以下であった。

投与後72時間では各臓器・組織とも放射能濃度はさらに減少し, 肝臓, 盲腸, 腎臓および大腸に最高濃度の 1/100~1/1000に減少し, その他の臓器・組織は検出限界以下であった。

(3) 血球移行性

1) ラット

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口投与した時の放射能の血球移行率を **Table VI** に示す。放射能の血球移行率は投与後 5 分から24時間まで34.9~54.0%であった。投与後72時間では血液および血漿中放射能濃度が検出限界以下であったため, 血球移行率を算出できなかった。

2) イヌ

^{14}C -TAU-284 の 0.3 mg/kg を雌雄イスに経口投与した時の放射能の血球移行率を **Table VII** に示す。雄イスにおける放射能の血球移行率は投与後 5 分から24時間まで40.3~57.0%であった。投与後48および72時間では血液および血漿中放射能濃度が検出限界以下であったため, 血球移行率を算出できなかった。

雌イスにおける放射能の血球移行率は投与後 5 分から24時間まで39.3~68.4%であった。投与後48および72時間では血液中濃度および血漿中放射能濃度が検出限界以下であったため血球移行率を算出できなかった。

(4) 血漿蛋白結合

1) *In vitro*

血漿蛋白結合率: ^{14}C -TAU-284 の雄ラット, 雄イスおよび健康成人男子 (ヒト) の血漿蛋白への結合率を

Table VII Percentage distribution of radioactivity in blood cell after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male and female dogs (dose: 0.3 mg/kg)

Time	Sex	Hematocrit value (%)	Ratio of radioactivity (%)
5 min	Male	43±4	57.0±16.4
	Female	41±4	39.3±34.1
15 min	Male	44±2	40.3± 2.4
	Female	43±2	46.6± 2.2
30 min	Male	44±1	43.5± 2.3
	Female	43±3	44.5± 2.3
1 hr	Male	46±3	45.6± 4.2
	Female	40±3	39.9± 3.2
2 hr	Male	45±1	46.0± 2.2
	Female	41±4	40.7± 3.3
4 hr	Male	42±2	42.1± 4.9
	Female	42±6	44.4± 7.4
6 hr	Male	46±3	45.6± 6.2
	Female	46±5	49.4± 4.8
8 hr	Male	48±3	48.8± 4.5
	Female	46±5	40.5±10.7
24 hr	Male	46±1	51.3±11.4
	Female	46±4	68.4± 8.9
48 hr	Male	40±2	N.C.
	Female	41±3	N.C.
72 hr	Male	41±2	N.C.
	Female	44±4	N.C.

N.C. : Not calculated (mean±S.D., n=5)

Table VIII Protein binding of ^{14}C -TAU-284 in male rat, dog or human plasma

Species	Bound fraction (%)		
	0.08 $\mu\text{g/ml}$	0.4 $\mu\text{g/ml}$	4 $\mu\text{g/ml}$
Rat (n=5)	41.6±2.2	40.5±1.0	46.8±1.8
Dog (n=3)	47.5±1.1	50.5±2.8	49.3±1.0
Human (n=3)	60.5±4.4	60.3±1.2	65.0±1.8

(Ultra-filtration method)

(mean±S.D.)

Table VIII に示す。 ^{14}C -TAU-284 を0.08, 0.40および4.00 $\mu\text{g/ml}$ の濃度となるように添加した時のラットの血漿蛋白結合率は40.5~46.8%, イヌの血漿蛋白結合率はそれぞれ47.5~50.5%, ヒトの血漿蛋白結合率は60.3~65.0%であった。なお遠心型蛋白結合試験管への吸着率は0.1%であった。

結合の可逆性: ラット, イヌおよびヒト血漿に ^{14}C -TAU-284 を4.00 $\mu\text{g/ml}$ となるように添加した時の蛋白結合の可逆性の結果を **Table IX** に示す。 ^{14}C -TAU-284 を添加した血漿をアセトニトリルおよびメタノール

Table IX Reversibility of protein binding of ^{14}C -TAU-284 in male rat, dog or human plasma

Species	Concentration ($\mu\text{g/ml}$)	Ratio of extractable fraction (%)
Rat (n=5)	4	98.8 $\pm$ 0.5
Dog (n=3)	4	99.2 $\pm$ 0.1
Human (n=3)	4	99.2 $\pm$ 0.1
(mean $\pm$ S.D.)		

Table X Protein binding of radioactivity in plasma after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats or dogs (dose: rat 3 mg/kg, dog 0.3 mg/kg)

Time (hr)	Bound fraction (%)	
	Rat (3 mg/kg)	Dog (0.3 mg/kg)
0.5	43.8 $\pm$ 5.3	—
1	—	44.6 $\pm$ 1.4
2	46.3 $\pm$ 2.2	—
4	—	49.5 $\pm$ 8.6
6	59.7 $\pm$ 1.4	—
8	—	56.2 $\pm$ 3.8
(Ultra-filtration method)		(mean $\pm$ S.D., n=3)
— : Not determined		

Table XI Reversibility of protein binding of radioactivity after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male rat or dog (dose: rat 3 mg/kg, dog 0.3 mg/kg)

Time (hr)	Ratio of extractable fraction (%)	
	Rat (3 mg/kg)	Dog (0.3 mg/kg)
0.5	98.5 $\pm$ 0.2	—
1	—	>98.6*
6	>95.3*	—
8	—	>96.0*
— : Not determined		(mean $\pm$ S.D., n=3)

* : These data were calculated using the back ground value because of low radioactivity in residual fraction.

を用いて順次抽出したところ、ラット、イヌおよびヒト血漿で98.8~99.2%の放射能が抽出された。

2) In vivo

血漿蛋白結合率： ^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを雄ラットおよび0.3 mg/kgを雄イヌに経口投与した時の血漿蛋白結合率をTable Xに示す。ラットに経口投与後30分、2および6時間の血漿蛋白結合率はそれぞれ43.8、46.3および59.7%であった。雄イヌに経口投与後1、4および8時間の血漿蛋白結合率はそれぞれ44.6、49.5および56.2%であった。

結合の可逆性： ^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを雄ラットおよび0.3 mg/kgを雄イヌに経口投与した時の血漿蛋白結合の可逆性をTable XIに示す。ラットに経口投与後30分および6時間の血漿をアセトニトリルおよびメタノールを用いて順次抽出したところ、投与後30分では98.5%、6時間では95.3%の放射能が抽出された。また、雄イヌに経口投与後1および8時間の血漿をラットと同様に処理したところ、98.6および96.0%の放射能が抽出された。

3. 代謝

(1) ラット血漿、尿および胆汁中代謝物

^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを雄ラットに経口投与した時の0-24時間尿および胆汁のHPLC-ラジオクロマトグラムをFig. 6に示す。

^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを雄ラットに経口投与した時の0-24時間尿中には未変化体および未変化体のN-(CH_2)₃-COOH基がN- CH_2 -COOHに代謝された β 酸化体(M4)の2種類のピークが認められ、HPLC-ラジオクロマトグラムより尿中放射能の95.3%が未変化体であった(38.9% of dose)。

^{14}C -TAU-284の3 mg/kgをラットに経口投与した時の24時間尿および胆汁中の未変化体ならびに代謝物の割合をTable XIIに示す。

0-24時間胆汁中には未変化体の他に数種の放射性ピークが認められ、それらは未変化体のタウリン抱合体(M3)、M4、ピペリジン体(M5)の水酸化体(M6)、アルコール体(M7)、M7のグルクロン酸抱合体(M1)、M6のグルクロン酸抱合体(M2)が推定された。HPLC-ラジオクロマトグラムにおいて未変化体、M3およびM2は胆汁中放射能のそれぞれ55.2%(24.9% of dose)、13.3%(6.0% of dose)および11.2%(5.0% of dose)であった。

^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを雄ラットに経口投与した後4時間の血漿をメタノールおよびアセトニトリルで除蛋白した試料を分析したところ、HPLC-ラジオクロマトグラム上において未変化体由来する放射性ピークのみが認められた。

(2) イヌ血漿および尿中代謝物

^{14}C -TAU-284の0.3 mg/kgを雄イヌに経口投与した後、0-24時間に採取した尿のHPL-ラジオクロマトグラム上に未変化体由来する放射性ピークが認められ、クロマトグラム上の総放射能の約96%を占めていた。

^{14}C -TAU-284の0.3 mg/kgを雄イヌに経口投与した後、1、2および6時間に採取した血漿をクロロホルム抽出した後の試料を分析したところ、HPLC-ラジオクロマトグラム上には未変化体由来する放射性ピークのみが認められた。

Fig. 6 Typical HPLC-radiochromatograms of urine (0-24hr) and bile (0-24hr) after oral administration of ^{14}C -TAU-284 to a male rat (dose: 0.3 mg/kg)

Table XII Composition of unchanged TAU-284 and its metabolites in urine (0-24hr) and bile (0-24hr) after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male rat (dose: 3 mg/kg)

Metabolite	Composition of metabolites (% of radioactivity in urine or bile)	
	Urine	Bile
M1	N.D.	7.0 (3.2)
M2	N.D.	11.2 (5.0)
M3	N.D.	13.3 (6.0)
M4	4.7 (1.9)	4.8 (2.2)
TAU-284	95.3 (38.9)	55.2 (24.9)
M6	N.D.	7.0 (3.2)
M7	N.D.	1.5 (0.7)

() : % of dose

Fig. 7 Cumulative excretion of radioactivity in urine and feces after a single oral or an intravenous administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats (dose: 0.3 mg/kg) (mean $\pm$ S.D., $n=5$)

4. 排泄

(1) 尿、糞および呼気中排泄

1) ラット

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口あるいは静脈内投与した時の尿および糞中放射能排泄率を Fig. 7 に示す。

雄ラットに経口投与後24時間までの尿中に投与量の38.9%, 96時間までに39.7%の放射能が排泄され、それ以降放射能は排泄されなかった。糞中には投与後24時間までに投与量の58.1%, 120時間までに61.6%の放射能が排泄された。投与後120時間までの尿、糞中総排泄率は投与量の101.3%であり、この時点の体内放射能残

存率は0.2%であった。また、呼気中への放射能の排泄は認められなかった。

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに静脈内投与した時、尿中に投与後24時間までに投与量の68.2%, 120時間までに 69.3%が排泄された。糞中には投与後24時間までに投与量の24.3%, 120時間までに26.9%が排泄された。投与後120時間までの尿、糞中総排泄率は投与量の96.2%であり、この時点の体内放射能残存率は0.4%であった。

2) イヌ

^{14}C -TAU-284 の 0.3 mg/kg を雄および雌イヌに経口投与した時の尿糞中放射能排泄率を Fig. 8 に示す。

Fig. 8 Cumulative excretion of radioactivity in urine and feces after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male and female dogs (dose: 0.3 mg/kg) (mean $\pm$ S.D., $n=3$)

雄イヌにおいては投与後24時間までの尿中に投与量の66.7%, 120時間までに70.5%が排泄された。糞中には投与後24時間までに21.5%, 120時間までに25.0%の放射能が排泄された。投与後120時間までの尿および糞中総排泄率は95.5%であった。この時点におけるケージ洗浄液中の放射能は投与量の1.8%であった。

雌イヌにおいては投与後24時間までの尿中に投与量の69.0%, 120時間までに73.1%が排泄された。糞中には投与後24時間までに投与量の21.8%, 120時間までに24.7%が排泄された。投与後120時間までの尿および糞中総排泄率は97.8%であり、この時点におけるケージ洗浄液中の放射能は投与量の0.5%であった。

(2) 胆汁中排泄

^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを胆管カニューレ処置をした雄ラットに経口投与した時の胆汁ならびに同時に測定した尿および糞中放射能排泄率をTable XIIIに示す。胆汁中には投与後6時間までに投与量の28.5%, 24時間までに37.3%, 48時間までに40.6%が排泄された。尿中には投与後24時間までに投与量の42.2%, 48時間までに45.3%が排泄され、糞中には投与後24時間までに6.1%, 48時間までに8.3%が排泄された。また、投与後48時間における消化管内容物および消化管内容物を除く体内放射能残存率はそれぞれ投与量の5.7および1.2%であった。

(3) 腸肝循環

^{14}C -TAU-284の3 mg/kgを胆管カニューレ処置した雄ラットに経口投与した後24時間までの胆汁を採取した。この胆汁の一部を胆管カニューレ処置した別の雄ラットの十二指腸内に注入した時の胆汁、尿および糞中への放射能排泄率をTable XIVに示す。

Table XIII Cumulative excretion of radioactivity in bile, urine and feces after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 to male rats (dose: 3 mg/kg)

Time (hr)	Excretion of radioactivity (% of dose)		
	Bile	Urine	Feces
0-2	12.0 $\pm$ 5.0	—	—
0-4	22.8 $\pm$ 6.5	—	—
0-6	28.5 $\pm$ 8.1	—	—
0-8	31.2 $\pm$ 9.2	—	—
0-12	33.9 $\pm$ 10.4	38.0 $\pm$ 3.2	—
0-24	37.3 $\pm$ 11.3	42.2 $\pm$ 4.7	6.1 $\pm$ 2.8
0-48	40.6 $\pm$ 9.0	45.3 $\pm$ 6.7	8.3 $\pm$ 3.2

— : Not determined

(mean $\pm$ S.D., $n=5$)

Table XIV Entero-hepatic circulation of radioactivity after intraduodenal injection of bile sample* to male rats (75 μg eq. of ^{14}C -TAU-284 in bile/kg)

Time (hr)	Excretion of radioactivity (% of dose)		
	Bile	Urine	Feces
0-2	8.4 $\pm$ 5.5	—	—
0-4	20.7 $\pm$ 5.8	—	—
0-6	27.4 $\pm$ 6.8	—	—
0-8	31.5 $\pm$ 7.1	—	—
0-12	36.3 $\pm$ 7.1	22.3 $\pm$ 5.1	—
0-24	41.2 $\pm$ 7.8	24.9 $\pm$ 6.4	16.1 $\pm$ 5.2
0-48	44.0 $\pm$ 7.9	25.9 $\pm$ 6.4	19.4 $\pm$ 4.9

— : Not determined

(mean $\pm$ S.D., $n=5$)

* : Bile juice obtained from another rats (0-24 hr) after a single oral administration of ^{14}C -TAU-284 (dose: 3 mg/kg)

胆汁中には注入後24時間までに注入量の41.2%, 48時間までに44.0%が排泄された。同時に採取した尿中には注入後24時間までに24.9%, 48時間までに25.9%が排泄され、糞中には24時間までに16.1%, 48時間までに19.4%が排泄された。また、注入後48時間における消化管内容物に8.3%の放射能が認められた。消化管内容物を除く体内に放射能は認められなかった。

考 察

^{14}C -TAU-284を雄ラットに経口あるいは静脈内投与および雄および雌イヌに経口投与した時の吸収、分布、代謝および排泄について検討した。

^{14}C -TAU-284を雄ラットおよび雌雄イヌに経口投与した時の血液中放射能濃度の C_{max} 、消失半減期およびラットでの胆汁中排泄試験、ならびにイヌの尿、糞中排泄試験の結果より本化合物の消化管からの吸収は速やかであり、かつ良好であると考えられる。また、本化合物の消化管吸収部位について結紮ループ吸収実験により検

討したところ、主に小腸で吸収され、特に小腸上部の寄与が大きいものと推察された。

^{14}C -TAU-284 の 3 mg/kg を雄ラットに経口投与した時の全身オートラジオグラムおよび臓器・組織内放射能濃度の検討から、大脳、小脳および眼球における放射能濃度は投与後 4 時間まで血液の約 1/4-1/8 以下であり、さらに全身オートラジオグラムにおける放射能の分布像より大脳、小脳、脊髄および眼球への放射能の移行性は低いものであった。

In vivo における抗アレルギー薬の脳内ヒスタミン H1 受容体への結合性と睡眠誘発作用との相関性が検討されており、脳内のヒスタミン H1 受容体への結合性が高い薬物ほど睡眠誘発作用を惹起させることが報告されている⁴⁾。したがって本化合物の中樞神経系への移行性が低いことから、睡眠誘発作用は弱いと考えられた。

また、全身オートラジオグラフィーおよび臓器・組織内放射能濃度の検討から特定の臓器・組織に放射能が残留することはないものと考えられた。有色雄ラットに

Fig. 9 Possible metabolic pathways of TAU-284 in rats
[] : M5 was not confirmed.

^{14}C -TAU-284 を経口投与した後の放射能の分布は、眼球のブドウ膜および皮膚などのメラニン含有組織を除き白色雄ラットとはほぼ同様であった。メラニン含有組織は投与後24および72時間に軽度の放射能が認められ、ブドウ膜は投与後168時間に極微量の放射能が認められた。これらのことからTAU-284あるいはその代謝物がメラニンと親和性を有するものと考えられる。しかし、投与後30日においてはメラニン含有組織に放射能が認められないことから、本化合物とメラニンとの結合は可逆的であると考えられる。また、イヌを用いた反復投与毒性試験において眼科学的検査（眼底検査、網膜電位図）を実施したが、特に異常は認められていない⁵⁾。

^{14}C -TAU-284 の3 mg/kg を雄ラットおよび0.3 mg/kg を雌雄イヌに経口投与した後の血漿をアセトニトリルおよびメタノールを用いて順次抽出したところ、血漿中放射能の大部分が抽出された。このことから ^{14}C -TAU-284 および代謝物と血漿蛋白との結合は可逆的であると考えられる。

雄ラットに ^{14}C -TAU-284 の3 mg/kg を経口投与した時の血漿、尿および胆汁中の代謝物をHPLC-ラジオクロマトグラフィーおよびLC/MS/MSにより検討した。血漿および尿中代謝物の化学構造より、ラットにおけるTAU-284の代謝は未変化体のタウリン抱合および β 酸化、N,O-脱アルキル化とそれに続いて起こる酸化およびグルクロン酸抱合反応であると推測された。また、イヌに ^{14}C -TAU-284 を0.3 mg/kg 経口投与した時の尿ならびに血漿のHPLC-ラジオクロマトグラムには未変化体由来するピークのみが認められた。

ラットの尿ならびに胆汁中の推定代謝物および推定代謝経路をFig. 9に示す。

雄ラットに ^{14}C -TAU-284 を経口あるいは静脈内投与した時、投与放射能は投与後48時間以内に90%以上が尿および糞中に排泄されることから、その排泄は比較的速度やかであり、体内への残留性は低いものと考えられた。また、雄ラットに ^{14}C -TAU-284 を経口投与時の胆汁中排泄試験の結果から、放射能の排泄は尿および胆汁にはほぼ1:1で排泄され、さらに胆汁中に排泄された放射能の約70%が再び消化管から吸収されたことから、未変化体および代謝物の腸肝循環が示唆された。 ^{14}C -TAU-284 を雄ラットおよび雌雄イヌに経口投与した時の尿中放射能のほとんどが未変化体であったが、尿中放射能排泄率に種差が認められた。本化合物の消化管からの吸収が良好であると考えられることから、この原因はTAU-284の代謝による種差と思われる。

要 約

^{14}C -TAU-284 をラットおよびイヌに単回経口投与後

に吸収、分布、代謝および排泄について検討した。

1. ^{14}C -TAU-284 の3 mg/kg を雄ラットに経口投与した時の血液中濃度は投与後30分に $C_{\max}$ (0.27 $\mu\text{g eq./ml}$) に達した後、1~8時間まで $t_{1/2}$ 3時間で減少した。

2. ^{14}C -TAU-284 を雄ラットに経口投与時、ほとんどの臓器・組織は投与後30分に最高濃度となった。この時点では肝臓の放射能がもっとも高く、ついで腎臓、小腸、胃、膀胱、脾臓および副腎に高く、その他の臓器・組織はいずれも血漿中濃度と同程度か、それ以下であった。その後、ほとんどの臓器・組織放射能濃度は血漿中濃度とほぼ平行して減少した。

3. ^{14}C -TAU-284 を有性雄ラット (Long Evans 系) に経口投与時、全身オートラジオグラムでは投与後24時間でブドウ膜および皮膚などのメラニン含有組織に軽度の放射能分布が認められたが投与後30日では消失した。

4. ^{14}C -TAU-284 を雄ラットに経口投与した後、尿および胆汁中にはいずれも未変化体をもっとも多く、代謝物として尿中には β 酸化体のみが認められ、胆汁中には未変化体のタウリン抱合体 (M3) およびその他5種類の代謝物が認められた。ラットおよびイヌ血漿ならびにイヌ尿中には未変化体のみが認められた。

5. ^{14}C -TAU-284 を雄ラットに経口投与後120時間までの尿中放射能排泄率は39.7%、糞中放射能排泄率は61.6%であった。投与後48時間まで胆汁中放射能排泄率は40.6%であった。腸肝循環が認められた。

文 献

- 1) 本田浩子, 村田久美子, 浜崎 篤, 坂本修身, 上野 均, 藤原 寛: 新規抗アレルギー薬ベシル酸ベトタスチン (TAU-284) のアナフィラキシー性反応抑制作用およびHistamine拮抗作用。薬理と治療, **25**(4): 9-18 (1997)。
- 2) 谷藤直子, 村田隆司, 斉藤信子, 酒井敦子, 菊地松夫, 黒葛原 啓, 成田 寛: 新規抗アレルギー薬ベシル酸ベトタスチン (TAU-284) の抗アレルギー作用。日薬理誌, **110**: 19-29 (1997)。
- 3) Kato, M., Nishida, A., Aga, Y., Kita, J., Kudo, Y., Narita, H., and Endo, T.: Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of central effect of novel antiallergic agent Betotastine besilate. *Arzeim. Forsch./Drug Res.*, (Accept)。
- 4) Quach, T. T., Duchemin, A. M., Rose, C. and Schwartz, J. C.: *In vivo* occupation of cerebral histamine H_1 -receptors evaluated with ^3H -mepyramine may predict sedative properties of psychotropic drugs. *Eur. J. Pharmacol.*, **60**: 391-392 (1979)。
- 5) 小口 敦, 川合是影, 一鬼 勉, 緒方英博, 鍼先恵美子, 増永昭彦: Betotastine besilate のイヌを用いた4週間および26週間反復投与毒性試験。応用薬理, **53**(4/5): 319-326 (1997)。