臨床で重要な薬物相互作用情報とは

The Information on Clinical Important Drug Interactions

小林 真一

(聖マリアンナ医科大学薬理学)

Shinichi KOBAYASHI

Professor, Department of Pharmacology, St. Marianna University School of Medicine, Kanagawa

Summary: Information concerning drug interactions is essential for physicians and patients when attempting to limit the number of serious adverse events. This information, however, is generally the result of research initiated by pharmaceutical companies and regulatory authorities, and as such not aimed at the needs of either physician or patient. This article carefully assesses these needs and intends to provide guidance in order to improve the current situation. To this end a number of practical examples of drug interaction are re-evaluated in terms of their informative utility.

Key words: Clinical information, Drug interactions, Adverse events, Physicians

はじめに

臨床的に薬物相互作用を考える場合には二つの側面から考える必要がある。一つは患者にとって有益な薬物相互作用であり、一般的に薬物併用療法といわれている。他方、患者にとって有害な薬物相互作用も存在し、このような場合に臨床医はその有害な相互作用をなくすための努力と同時に患者の原疾患をも治療せねばならず非常に悩むことが多い。

我が国の現状における薬物相互作用情報はまだまだ臨床医にとって臨床的にすぐ使える情報、臨床医の疑問に答えられる情報になっていないものも多く、その情報が臨床現場で十分生かされていないのが現状である。

そこでまずはじめに薬物相互作用の問題点について考え、次に現在すでに報告されている薬物相互作用情報を参考文献をもとに「臨床医にとって有益な相互作用情報とは」について考えることとする。

医療現場での薬物相互作用

一般に臨床医が薬物治療を開始する時は、そのすべてが原疾患の病因に則って薬物を選択するわけではなく、多くは患者の示す多岐に渡る症状に対して薬物を選択する場合が多い。このような場合、複数の薬物が併用投与されることになる。また患者個人個人によって症状も多少異なり併用される薬物も個々の患者で異なってくる。このように実際に薬物治療を行う場合、症状が多い疾患

また高齢患者のように加齢とともに症状の多くなる患者では併用される薬物の数は当然多くなり、このことは有害な薬物相互作用を惹起する可能性も増加することを示唆している。

1. 臨床上有益な薬物相互作用

一般の人々には「薬物相互作用」という言葉は何かネガティブなイメージでとらえられる傾向にある。しかし、先にも述べたように薬物相互作用は臨床的に有益な場合と有害な場合がある。患者側からすれば治療とは有益なものであり有益な薬物併用療法は当然のこととしてあまり意識されていないことが多い。逆に有害な薬物相互作用は患者にとって予期せぬことであり、本来治療によって軽減するはずの症状が悪化したり、精神的・肉体的ダメージは予想外であり、そのため「薬物相互作用」は望まないこと、悪いこととして理解されやすい。

実際の医療現場で臨床医はある薬物の有害作用を抑えるために他の薬物を併用投与することがある。たとえば抗癌薬を投与した癌患者に対しその副作用である吐気を抑えるために制吐薬を併用投与したり、非ステロイド系抗炎症薬と健胃消化薬・制酸薬の併用投与などの場合である。また局所麻酔薬にエピネフリンを加えたり、複数の抗菌薬、抗癌薬を同時に併用することなどは相互作用による作用増強をねらっている。

以上のような併用投与は患者にとっては有益な薬物相互作用を期待しているのである。

2. 臨床上有害な薬物相互作用

抗ウイルス薬ソリブジンと抗癌薬 5-FU の薬物相互作用は大きな社会問題にまで発展した。抗癌薬 5FU を服用していた患者が癌の進行とともに带状疱疹になり抗ウイルス薬が必要となり、ソリブジンを服用し、ソリブジン発売後 40 日以内に 18 人が亡くなった。これは 5FU を代謝するジヒドロピリミジン脱水素酵素がソリブジンの代謝物で阻害されたためである^{1,2)}。この結果、我が国も含め世界中の医療現場からソリブジンが回収された。しかし、このソリブジンと 5FU の相互作用については、我が国のように癌患者が病名告知されておらず、また自分の服用している薬物を正確に把握していない状況では完全な防止は難しいと思われる。しかしこの薬物相互作用の場合、臨床医は当然ドクターレターなどで事前に知らされていたにも関わらず、このような不幸が生じてしまったところに問題があり、情報開示の方法、また臨床医のそれらに対する教育・意識改革が必要である。

一般に臨床医は重篤な(「重篤」とは生命に関わるほど重症なものの意味)薬物相互作用が起こる可能性のある場合はその可能性のある薬物の投与を中止するし、またその相互作用が投与量に相関していれば投与量を調節する。さらにまた投与法を再検討することも考える。もちろん臨床的に最良の解決方法は原疾患を治療する同様の薬効を持ち相互作用のない他の薬物があることである。

臨床医が薬物を投与する場合、又は薬物相互作用が起こる可能性が示唆される場合、本当に得たい情報とは有害な薬物相互作用の「発生頻度」であり、有害作用を「予測するための具体的な方法」である。臨床症状をチェックすれば予測がつくのか、臨床検査で頻りにチェックすればよいのか、また特異的な検査項目はあるのか、さらに薬物血中濃度モニタリングで予測できるのかなどの情報である。

そして、もし不幸にして有害作用が発現してしまった場合、多くの臨床医はその作用が重症なものか、また生命に関わる重篤なものなのかを考える。そして、その有害作用が投与量に相関して起こったものか、可逆的で投与を中止したらもとにもどる作用か、非可逆的なものかなど有害作用の質を検討する。さらに臨床医はすべての症例において原疾患に対する治療法を中止することなく、その有害作用を解消する治療情報を探す。

薬物相互作用の情報が臨床医にとって分りにくいような情報の場合、たとえばフェントインがジゴキシンの血中濃度を 30% 減少させるという情報の場合、臨床医は患者を前にして「併用をやめるべき」なのか、「どのように投与量を調整すべきか」など、目の前の個々の患者に適応できる情報がほしいのである。

薬物相互作用の報告例

臨床医にとって有用な薬物相互作用の情報を検討するため、すでに報告されている情報のうち、典型的ないくつかを選んで考察してみる。

1. テルフェナジンとエリスロマイシン

テルフェナジンは米国では 10 年以上前から市販され、広くアレルギー性鼻炎の治療に使用されてきた。テルフェナジンは CYP3A4 で代謝され活性代謝物を生成するが、このテルフェナジンが重篤な心室性不整脈 *tor-sades de pointes* を引き起こすことは以前よりいわれていた。1992 年に一つの危険因子としてエリスロマイシンが報告され、エリスロマイシンとテルフェナジンの併

図1 テルフェナジンとエリスロマイシンの相互作用：テルフェナジンの心毒性³⁾

A：対照の心電図，B：テルフェナジン単独投与1週間後の心電図，C：テルフェナジンにエリスロマイシンを併用1週間後の心電図

用によってエリスロマイシンが肝臓の CYP3A4 を阻害し、テルフェナジンの代謝が阻害されて心電図上で QT 延長が示された(図 1³⁾)。この報告のなかで著者は「エリスロマイシンとテルフェナジンの併用投与は注意が必要である」と結論付けている。このような結論の情報の場合、果たして臨床医は何に注意すれば良いのであろうか？ 患者を前にして臨床医はこれらの併用を諦めるか、または血中薬物濃度を測定するように指示するかも知れない。しかし、これらの方法では目の前の患者の torsades de pointes を予測する事はできない。簡単に唯一臨床医が予測できる方法は心電図で注意深く QT 間隔を調べることである⁴⁾。その後、テルフェナジンの心毒性を惹起する他の薬物について相互作用の報告⁵⁻⁷⁾が多く出され、それらの薬物とテルフェナジンとの併用投与は減少している。

2. バロプロ酸とパニペネム

最近、カルバペネム系抗生物質のパニペネムと抗てんかん薬バロプロ酸の併用投与によってバロプロ酸の血中濃度が顕著に減少し、てんかん発作が引き起こされたという報告^{8,9)}がある。この相互作用は広く知られていたが、そのメカニズムがバロプロ酸の肝臓でのグルクロン酸抱合代謝をパニペネムが促進した結果であるとの報告¹⁰⁾もあり、またパニペネムが腸管細菌を減少させ、その結果、バロプロ酸の腸肝循環を減少させたとの報告¹¹⁾もある。このような情報からは臨床医はとりあえず併用を諦めるか、またはバロプロ酸の血中濃度モニタリングを行うであろう。

3. リファンピンとオンダンセトロン

最近、フィンランドにおいて制吐薬オンダンセトロン

の薬物動態に対するリファンピンの影響が検討され(図 2¹²⁾)、リファンピンによって誘導された CYP3A4 によってオンダンセトロンの代謝が促進され、その結果、制吐作用が減少する可能性を示唆した。このような情報の場合は臨床症状のチェックとともに、もし薬効が減少されれば併用を諦めるか、他の薬物に切り替える必要があろう。

4. グレープフルーツジュースとシンバスタチン

昔から食物と薬物の相互作用は知られているが、近年、多くの薬物とグレープフルーツジュースの相互作用に関する報告が多く、グレープフルーツジュースが CYP3A4 を抑制することは一般的に知られている。その結果、グレープフルーツジュースが消化管の CYP3A4 を阻害し、シンバスタチンの初回通過効果を抑制し、生体内利用率を増加させたことにより高脂血症治療薬であり HMG-CoA 還元酵素阻害薬であるシンバスタチン、シンバスタチン酸の血中濃度を増加させると報告されている(図 3¹³⁾)。最近、グレープフルーツジュースに含まれるナリンジニンが *in vitro* でシンバスタチンの代謝を阻害したとの報告¹⁴⁾もあり、グレープフルーツジュースとシンバスタチンの同時摂取は避けるべきであることが示唆されている¹⁵⁾。

5. リファンピン、リファブチンと経口避妊薬

リファンピン、リファブチンはエチニールエストラダイオールなどの血中濃度を顕著に減少することが報告されている(図 4¹⁶⁾)。この作用はリファンピンの作用のほうがリファブチンより強力である。その結果、血中 LH, FSH レベルは併用によって多少上昇する。しかし、これらの値は経口避妊薬を服用する前の値(LH: 10.4,

図2 リファンピンとオンダンセトロンの相互作用：オンダンセトロンの血中濃度推移¹²⁾

リファンピン 600 mg またはプラセボを 5 日間投与後オンダンセトロン 8 mg 経口投与(左図)、静脈投与(右図)後の血中濃度。白丸；プラセボ投与、黒丸；リファンピン投与

図3 グレープフルーツジュースとシンバスタチンの相互作用：シンバスタチン，シンバスタチン酸の血中濃度推移¹³⁾
200 mlのグレープフルーツジュースまたは水を1日3回2日間摂取し最終摂取30分後にシンバスタチン60 mgを経口投与後の血中濃度。白丸；水，黒丸；グレープフルーツジュース摂取

図4 リファンピン，リファブチンと経口避妊薬の相互作用：エチニールエストラジオールの血中濃度推移¹⁶⁾
黒丸；リファンピン，リファブチン投与前，白丸；併用後14日後。A：リファンピン併用，B：リファブチン併用

表1 リファンピン，リファブチンと経口避妊薬の相互作用：血中LH, FSHレベルの変化

	Rifampin	Rifabutin	Rifampin versus rifabutin
Luteinizing hormone (mIU/mL)			
Day 7	3.9±3.8	3.8±3.0	
Day 21	5.3±5.2	2.2±2.1	
Difference	1.4±3.5	-1.6±3.0	2.9±5.2
Follicle-stimulating hormone (mIU/mL)			
Day 7	2.9±2.1	2.7±1.9	
Day 21	4.9±3.5	2.4±2.0	
Difference	2.0±2.0*	-0.3±0.8	2.3±2.4*

Data are mean values±SD.

* $P < .01$.

FSH：13.6 mIU/mL)と比較すると明らかに低値である(表1¹⁶⁾。つまり、この報告では併用投与によって血中LH, FSHに多少の上昇は認められたが、併用期間中も被験者の排卵は経口避妊薬によって抑制されていたのである。また経口避妊薬と抗真菌薬との併用投与でも経

口避妊薬の効果が減弱されたという科学的証明はない¹⁷⁾。つまりこのような場合、臨床的にはこれら卵巣機能を示すホルモン濃度を測定することが薬効の検討には大切である。しかし一般に望まれていない妊娠が人々に深刻な状況を作り出すことも考慮すると、これらの薬物と経口避妊薬との併用には十分な注意も必要である¹⁸⁾。

結 論

有害な薬物相互作用に関する情報を医療現場で臨床医が望むような情報に改善していくために、厚生省、製薬企業などが医薬品の添付文書を改善したり、我が国の新薬開発における薬物相互作用のガイドラインを作成するなどの努力がなされている。

新薬開発過程においてはヒトでの臨床試験に入る前の非臨床試験で薬物相互作用の可能性が懸念されるものについては、その薬物が関与する肝薬物代謝酵素、特にヒトCYPの分子種を同定する必要がある。すでにこの分野の検討は多くの開発品において行われているが、いず

表2 臨床医が知りたい有害作用情報

- How to predict the ADR:
 - Clinical Symptoms
 - Laboratory Data
 - Plasma Concentration
- How to grade the ADR
- How to qualify the ADR:
 - Dose-related
 - Reversible
- How to treat the ADR
- How to pursue the treatment

れにしても非臨床試験, *in vitro* 試験においては臨床試験では検討できない毒性情報を多くの方面から検討すべきであろう。

もし、この段階で有害作用の発現が明らかとなった場合、その作用が可逆的か、不可逆的か、またその有害作用の発現を予測する具体的方法はあるのかを検討すべきである。このことは臨床的に有用な薬物を安全に使用するために必要である。

特殊患者における薬物相互作用の検討も必要であるが、特に小児患者で検討するためにはより侵襲性の少ない検査方法の確立が必要である。最近、小児でカルバマゼピンがカフェインの代謝を誘導することがカフェイン Breath Test で示された¹⁹⁾が、このような非侵襲的で精度の高い検査方法の開発も大切である。

臨床試験において重大な薬物相互作用が発現した場合、臨床的に最も大切な概念はその薬物の対象疾患における臨床的有効性と安全性のバランスである。他に代わるような薬物が存在したり、生活習慣病のようなものを対象とするような薬物であれば、その薬物の開発は中止すべきであろう。しかし、多少の毒性は覚悟しても臨床的に非常に有効な作用が期待できる薬物である場合、またその薬物に代わる有効な薬物がない疾患の場合には、併用投与を禁忌としたり、より低用量で毒性が減少し有効性が維持できるかなどの用量設定を含めた臨床検討が必要となる。

最後に臨床医にとって有用な薬物相互作用情報をまとめると表2のようになり、具体的な有害作用の予測方法(臨床症状、臨床検査、薬物血中濃度)は何か? また有害作用の程度は重篤かどうか? 有害作用の質は用量に相関したものか、可逆的なものか? その有害作用の治療法はあるのか? 原疾患の治療法は他にあるのか? などであることを繰り返し付け加えておく。

文 献

1) Diasio RB: Sorivudine and 5-fluorouracil; A clinically sig-

- nificant drug-drug interaction due to inhibition of dihydropyrimidine dehydrogenase. *Br J Clin Pharmacol* **46**(1): 1-4, (1998).
- 2) Okuda H, Ogura K, Kato A, Takubo H, Watabe T: A possible mechanism of eighteen patient deaths caused by interactions of sorivudine, a new antiviral drug, with oral 5-fluorouracil prodrugs. *J Pharmacol Exp Ther* **287**(2): 791-9 (1998).
 - 3) Honig PK, Woosley RL, Zamani K, Conner DP, Cantilena LR Jr: Changes in the pharmacokinetics and electrocardiographic pharmacodynamics of terfenadine with concomitant administration of erythromycin. *Clin Pharmacol Ther* **52**(3): 231-8 (1992).
 - 4) Piquette RK: Torsade de pointes induced by cisapride/clarithromycin interaction. *Ann Pharmacother* **33**(1): 22-6 (1999).
 - 5) Honig PK, Worham DC, Zamani K, Mullin JC, Conner DP, Cantilena LR: The effect of fluconazole on the steady-state pharmacokinetics and electrocardiographic pharmacodynamics of terfenadine in humans. *Clin Pharmacol Ther* **53**(6): 630-6 (1993).
 - 6) Honig PK, Wortham DC, Zamani K, Conner DP, Mullin JC, Cantilena LR: Effect of concomitant administration of cimetidine and ranitidine on the pharmacokinetics and electrocardiographic effects of terfenadine. *Eur J Clin Pharmacol* **45**(1): 41-6 (1993).
 - 7) Burkhart GA, Sevka MJ, Temple R, Honig PK: Temporal decline in filling prescriptions for terfenadine closely in time with those for either ketoconazole or erythromycin. *Clin Pharmacol Ther* **61**(1): 93-6 (1997).
 - 8) Yamagata T, Momoi MY, Murai K, Ikematsu K, Suwa K, Sakamoto K, Fujimura A: Panipenem-betamipron and decreases in serum valproic acid concentration. *Ther Drug Monit* **20**(4): 396-400 (1998).
 - 9) Nagai K, Shimizu T, Togo A, Takeya M, Yokomizo Y, Sakata Y, Matsuishi T, Kato H: Decrease in serum levels of valproic acid during treatment with a new carbapenem, panipenem/betamipron. *J Antimicrob Chemother* **39**(2): 295-6 (1997).
 - 10) Yamamura N, Imura K, Naganuma H, Nishimura K: Panipenem, a carbapenem antibiotic, enhances the glucuronidation of intravenously administered valproic acid in rats. *Drug Metab Dispos* **27**(6): 724-30 (1999).
 - 11) Kojima S, Nadai M, Kitaichi K, Wang L, Nabeshima T, Hasegawa T: Possible mechanism by which the carbapenem antibiotic panipenem decreases the concentration of valproic acid in plasma in rats. *Antimicrob Agents Chemother* **42**(12): 3136-40 (1998).
 - 12) Villikka K, Kivisto KT, Neuvonen PJ: The effect of rifampin on the pharmacokinetics of oral and intravenous ondansetron. *Clin Pharmacol Ther* **65**(4): 377-81 (1999).
 - 13) Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ: Grapefruit juice-simvastatin interaction: Effect on serum concentrations of simvastatin, simvastatin acid, and HMG-CoA reductase inhibitors. *Clin Pharmacol Ther* **64**(5): 477-83 (1998).
 - 14) Ubeaud G, Hagenbach J, Vandenschrieck S, Jung L, Koffel JC: *In vitro* inhibition of simvastatin metabolism in rat and human liver by naringenin. *Life Sci* **65**(13): 1403-12 (1999).
 - 15) Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ: Grapefruit juice increases serum concentrations of atorvastatin and has no effect on pravastatin. *Clin Pharmacol Ther* **66**(2): 118-27

- (1999).
- 16) Barditch-Crovo P, Trapnell CB, Ette E, Zacur HA, Coresh J, Rocco LE, Hendrix CW, Flexner C: The effects of rifampin and rifabutin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of a combination oral contraceptive. *Clin Pharmacol Ther* **65**(4): 428-38 (1999).
- 17) Weisberg E: Interactions between oral contraceptives and antifungals/antibacterials. Is contraceptive failure the result? *Clin Pharmacokinet* **36**(5): 309-13 (1999).
- 18) Clinical Effectiveness Committee: From the Clinical Effectiveness Committee. Use of rifampicin and contraceptive steroids. *Br J Fam Plann* **24**(4): 169-70 (1999).
- 19) Parker AC, Pritchard P, Preston T, Choonara I: Induction of CYP1A2 activity by carbamazepine in children using the caffeine breath test. *Br J Clin Pharmacol* **45**(2): 176-8 (1998).